

5

25

26

10

20

74

6

0

12

100



~~A. 17. 6. 18~~

14. 19. 6. 8

Handwritten notes at the top left, possibly including "Handwritten" and "Handwritten".

Handwritten notes, possibly "Handwritten" and "Handwritten".

Handwritten notes, possibly "Handwritten" and "Handwritten".

Handwritten notes, possibly "Handwritten" and "Handwritten".


Handwritten notes, possibly "Handwritten" and "Handwritten".

Handwritten notes, possibly "Handwritten" and "Handwritten".

Handwritten notes, possibly "Handwritten" and "Handwritten".

Handwritten notes at the top right, possibly including "Handwritten" and "Handwritten".

Handwritten calculations on the right side, showing a series of numbers and operations, possibly a long division or multiplication process.



P R A T I C A
D' ARITHMETICA,
E GEOMETRIA

DEL REV. P. LORENZO FORESTANI DA PESCIA
de' Minori Conuentali di S: Francesco.

Di nouo Ristampata, e con somma diligenza Ricorretta.

All' Illustrissimo, e Clarissimo Sig. Sig. e Padron Colendissimo
IL SIG. SENATORE, MARCHESE

FRANCESCO
FERRONI,

DEPOSITARIO GENERALE PER IL SERENISSIMO
GRAN DVCA DI TOSCANA.



*Per tines ad
BibliotSecam
S. Francis ci
transtyberim.
1716.*



In SIENA nella Stamparia del Pubblico MDCLXXXII.

Con licenza de' Superiori.

Ad istanza degl' Heredi di Filippo Succiuelli, e de' Fantini di Siena. e

ITALIA D. ARTHUR E. DOMETRIA


DEPOSITO IN CHANCERIA DEL REGNO D'ITALIA
DEPOSITO IN CHANCERIA DEL REGNO D'ITALIA

Il Sig. Senatore, Marchese
e Clarissimo, e Chiarissimo Sig. e
Chiarissimo Sig. e Chiarissimo Sig. e

FRANCESCO FERRO

DEPOSITO IN CHANCERIA DEL REGNO D'ITALIA
DEPOSITO IN CHANCERIA DEL REGNO D'ITALIA

Il Sig. Senatore, Marchese
e Clarissimo, e Chiarissimo Sig. e
Chiarissimo Sig. e Chiarissimo Sig. e



Il Sig. Senatore, Marchese
e Clarissimo, e Chiarissimo Sig. e
Chiarissimo Sig. e Chiarissimo Sig. e

ILLVSTRISS.^{MO} E CLARISSIMO

SIG. SIG. E PADRON

Colendissimo.



PRENDIAMO ardire di presen-
tare à V. S. Illustrissima, e Clari-
sima le virtuose memorie del P.
Lorenzo Forestano continenti la
Pratica dell' Aritmetica, e Geo-
metria; opera, che hauendo corsa
feliciss. ma carriera nel suo primo nascimento, ritor-
na adesso per mezzo delle nostre Stampe alla pubblica
luce del mondo letterato. Noi le portiamo in questa
un viuo attestato della nostra humiliss. ma seruitù, ed
essa sotto gl' auspicii di V. Sig. Illustrissima, e Cla-
rissima, ricerca sicura protezione; sperando gl'
uni di riportare dalla sua benignissima gratia l'ho-
nore d'un cortese gradimento, e non menò certa l'altra
d'hauere ad incontrare col suo pretioso nome in fronte
l'universale sodisfattione, e fortuna migliore di quel-
la, che altri già s'augurarcno dall'Imagini del Gran-
de Alessandro. Ed in vero l'oblazione di queste due
fra le Matematiche nobilissime discipline, à nessuno
egualmente si doueua, come a V. S. Clarissima, il



quale come direttore supremo delle Gran Finanze
 Toscane, può secondo l'Aritmetica numerare di pa-
 ri li vantaggi del suo, o nostro Sourano, con le prospe-
 rità de' fedelissimi Vassalli, e come portione ben gran-
 de altresì d'un Senato degno delli stupori dell'Epirota
 Ambasciatore, tiene in sorte di praticare le giustissi-
 me proportioni della Geometria nel ripartimento delle
 pene, e de' premii, non meno, che di accrescere valore
 al suo merito, nell'esercitio delle sue rare virtù. Que-
 ste ferono sì, che il Serenissimo Gran Duca per rende-
 re felice la sola Toscana, rapisse all'Olanda un Perso-
 naggio, chiaro a due Mondi, autenticando l'eccellen-
 te pregia di V. S. Clarissima, con tratto di quella pru-
 denza, che viene ricevuta per oracolo nell'Europa
 tutta. Motiui perciò, che quanto destano plauso, e
 maraviglia insieme nelle nationi ancora lontane, tanto
 prestano ardimento a noi di supplicare il suo magnani-
 mo cuore, che vagli restar servito di ricevere le più ri-
 uerenti espressioni del nostro ossequio, e di concederci
 il pregio, per il quale ci possiamo sottoscrivere
 Di V. S. Illustriss. e Clarissima

Siena il 30. Maggio 1681.

Deuotissimi Obligatissimi Servi
 G^{re}redi di Filippo Succhielli Librari in Siena,
 I Fantini Stampatori del Pubblico.

TAVOLA

DI TUTTE LE COSE PIÙ NOTABILI

Che nell' Opera si contengono.

LIBRO PRIMO.



*Divisione dell' Opera
a carte* 1.

*Dodè habbia hann-
to origine la Geo-
metria la scienza
de' numeri, pesi,
e misure* 2.

Diffinitione del numero 3.

*Diffinitione di cinque atti d' Arithme-
tica* 6.

Del modo a rileuar più figure 6.

Del sommare de' numeri 7.

Che cosa sia prona 8.

Della prona del sette. e del noue 9.

*Dimostrazione come la prona del noue
sia più fallace di quella del sette* 10.

*Dimostrazione come ambedue le dette
prone sien fallaci* 11.

Del sommar di lire, soldi. e denari 13.

Della prona del sommare 14.

Del sommar diuerse cose 14.

*Del sottrarre vna quantità, d' vn'altra
quantità* 15.

Delle prone delle sottrationi 18.

*Del sottrar lire, soldi. e denari, di lire
soldi, e denari, & altre diuerse na-
ture* 18.

Diffinitione del multiplicare 19.

*Del multiplicare vn numero via vn
altro numero* 20.

*Del multiplicare per Bericuocolo,
a carte* 21.

*Delle prone delle multiplicationi
a carte* 21.

Del multiplicar per castelluccio 22.

Del multiplicar per l' addietro 22.

Del multiplicar per crocetta 23.

Diffinitione del partire 24.

Del partir per colonna 25.

Del partire a regolo 26.

Del partire a scapezzo 28.

Del partire a danda 29.

Del partire a galera 32.

Del partire a Battello 34.

*Delle prone di diuerse qualità di parti-
tioni* 35.

*Che cosa sia rotto, e come si formino i
rotti diuersamente* 36.

Del modo di schifare i rotti 37.

*A conoscere se i rotti si possono schifare,
o no* 38.

*Come si schifino i rotti in vn' altro
modo* 38.

Del partir per ripiego 39.

*De' numeri composti, e de' numeri con-
tra se primi* 40.

Del multiplicar de' rotti 41.

*Del multiplicar sani, e rotti, diuersa-
mente* 42.

*Diffinitione perche causa il multiplicar
de' nri*

de' numeri sani in infinito cresca, & il multiplicar de' rotti minuscoli	43.
Del partir de' rotti, e di sani, e rotti, come può accadere, dell auuertimento da offeruarsi in tali operationi	45.
Del sommare insieme diuersi rotti	48.
Del sottrar de' rotti, e dell auuertimento da offeruarsi	49.
Di diuerse domande sopra i rotti	51.
Altre differenti dimande	52.
Del recare in parte, & altre varie domande	55.
Del multiplicar lire, soldi, e denari diuersamente	57.
Del multiplicar moggia, staia, e quarti, via qualsiuoglia numero	61.
Del multiplicar libre, once, denari, e grani, via qualsiuoglia numero	61.
Del partir lire, soldi, e denari, & altre diuerse quantità, per qual numero ci piace	62.
Del multiplicare libre, once, denari, e grani, via libre, once denari, e grani	64.
Come con prestezza si riduchino le lire a scudi, a ducati, & a fiorini	65.
Come con facilità si possa ridurre una quantità di scudi d' oro a scudi di moneta	67.
Dichiarationi d' alcune cose per intelligenza de' principianti.	67.

LIBRO SECONDO.

D ella regola delle tre cose, o vero quattro proportionali carte	68.
Come si risolvono le ragioni occorrenti per regola del tre	69.
Domande esemplari, cioè valutar per peso, e per misura, panno, grano, vi-	

no, olio, & altre cose	69.
D' altre variate domande che s' usano fra mercanti, cioè per cento, per migliaio, e per cantaro, cantare, denari, e gabelle, carte	70.
Come si troua la valuta d' una quantità di marochi, once, denari, e grani d' oro	99.
Del modo a valutare una quantità di salme di grani	101.
Nuova dichiarazione sopra le regole del tre	102.
Del modo a saper ridurre diuersi pesi, e misure d' un luogo ad un altro per regola del tre, con interuento di rotti, detto volgarmente la crociata de' rotti	103.
Modo dell' inuestir denari	107.
De' guadagni, e perdite che possono occorrere nel traffico mercantile	112.
Come si conoschino i guadagni, e le perdite che si fanno per cento	113.
Altro modo d' inuestire denari con limitationi di guadagni, e perdite, che possono occorrere per cento	116.
Ragioni utilissime da svegliar la memoria a i giovani studiosi dell' uso mercantile	118.
Valutationi delle diuerse monete di Venetia	126.
Valutationi di Palermo	128.
Notitia della salma generale, del cantaro, del ruotolo, e della canna di Palermo	128.
Come si deuono risolvere le ragioni de' viaggi, e trasporti di mercantie, con limitationi di guadagni, e perdite, con spese di noli, vetture, e passi, con cali, e crescimenti di pesi, misure, e monete, che possono occorrere	128.

T A V O L A

LIBRO TERZO.

D elle compagnie semplici, che si usano fra i Mercanti	137.
Delle compagnie conditionate,	139.
Diverse propositioni di compagnie carte	140.
Delle compagnie co termine di tēpo	158.
Errore di Fr. Luca, e Pietro Borgo	163.
Propositioni di compagnie gheribizzo- se	164.
Delle risoluzioni di molti bellissimi casi che fra due, tre, e quattro huomini possono accadere, carte	166.
Di molti casi, che possono oseruare nel viaggiare insieme due, tre, e quattro compagni	169.
Di tre compagni, che trouarono una borsa con denari	171.
D'una che fa vn testamento con alcune leggiadrissime conditioni	173.
In che modo s'infede il mezzo propor- tionale fra due estremi	174.
D vn nauicellaio che porta tre botti di vino, e d'una sua disgratia carte	175.
Delle foccite de' bestiami	176.
Di diuersi paschi, comprati da' Pasto- ri	177.
Errore di Fra Luca, e di maestro Fran- cesco Veronese.	178.
Errore di Pietro Catani	181.
Errore di Francesco Pagani	182.
Delle pigioni delle case	184.
Delle quattro specie de' Cambi	187.
De cambi di più sorti, e per diuersi luoghi fatti	190.
Diuerse propositioni sopra il cambiare una moneta ad vn'altra, carte	192.
Di molte propositioni risolte per rego- la del 5. e del 7.	194.

Notitia di molte cose che si conuen' ba- uere intorno a i meriti semplici	201.
De' meriti semplici	202.
Del meritare a capo d'anno, o d'altro termine	209.
Errore del Puerone	112.
Dello sconto a capo d'annò, o d'altro termine	213.
Come si saldino le ragioni semplice- mente fra i Mercanti	218.
Del modo di recare a vn di diuersi pa- gamenti	220.
De resti, come s'intendino in tempo, e denari, tra l dare, e l bauere	223.
Di molto degne propositioni sopra i resti	225.
Casi degnissimi e semplificatiui de' me- riti, & altri guadagni, perdite mercantesche.	225.

LIBRO QVARTO.

D i chiaratione de' baratti, e come si costuman fare	233.
De' baratti semplici	233.
Di tre auuertimenti che si deuono haue- re nel dare, e riceuer parte in denari n el barattar diuerse mercantie	235.
Di diuersi baratti, con dare, e riceuer parte in denari, e del quarto auuer- timento	237.
Errore di Fra Luca	240.
Errore di Fra Luca	245.
Errore di Fra Luca	248.
Di diuersi baratti con limitationi di guadagni e perdite	249.
Errore di Fra Luca	249.
De' baratti con tempo, resoluti per re- gola delle cinque proportioni.	255.
Errore di Francesco Pagani	261.

Del

T A V O L A

<i>Del modo a consolare oro, & argento,</i>		<i>lettenoli, e ghiribizzi, carte</i>	<i>378.</i>
<i>per Zecche. & Orefici</i>	<i>264.</i>	<i>Della marauigliosa multiplicatione che fa il raddoppiare un granel di grano più volte, in un dato tempo.</i>	<i>330.</i>
<i>Casi esemplari per consolare, & affinar argento</i>	<i>265.</i>	<i>A trouare diuersi numeri, a i quali ag- giungendoli, o cauandone alcuna quantità, restino, o faccino numeri quadri</i>	<i>331.</i>
<i>De' mescolamenti d'argenti, & d'altre cose</i>	<i>278.</i>	<i>Diuerse domande sopra il diuidere un numero conditionatamente in più parti</i>	<i>332.</i>
<i>Del consolar dell'oro</i>	<i>284.</i>	<i>A trouar due numeri differenti che tanto faccino a sommarli insieme, quanto a multiplicar l'uno uia l'altro</i>	<i>333.</i>
<i>Di molte variate propositioni, sopra il consolar, & affinar oro</i>	<i>285.</i>	<i>De' salari d'alcuni seruitori, ritrouati per via delle quattro quantità continue proportionali</i>	<i>339.</i>
<i>Di diuersi viaggi</i>	<i>296.</i>	<i>Del modo a fabricar cinque pesi con tal dispositione, che pesino sempre once, o vero libbre intere, da 1. per fino a 121.</i>	<i>340.</i>
<i>D'un giocatore</i>	<i>298.</i>	<i>Della regola semplice del Catano carte</i>	<i>341.</i>
<i>Casi bellissimi sopra i viaggi di diuerse persone.</i>	<i>299.</i>	<i>Di diuerse domande, resolute per detta regola, la qual è chiamata regola del primo apponere</i>	<i>342.</i>

LIBRO QVINTO.

C <i>ome si traggino le radici quadre d'ogni numero</i>	<i>305.</i>	<i>Dalcuni giouani, che vanno a cena ad una fonte</i>	<i>344.</i>
<i>Della proua generale delle radici quadre</i>	<i>309.</i>	<i>Dalcuni condotti d'acqua, che empiono, & votano una pila</i>	<i>345.</i>
<i>Della maggior approssimatione delle radici quadre</i>	<i>310.</i>	<i>Quesito industrioso d'una botte piena carte</i>	<i>346.</i>
<i>Come si troui la propinqua radice d'un rotto</i>	<i>311.</i>	<i>Del macinare una quantità di stia di grano con tre macine, carte</i>	<i>347.</i>
<i>Dell'estrattioni delle radici cube, con la proua del noue</i>	<i>313.</i>	<i>Di molti altri variati quesiti</i>	<i>348.</i>
<i>Delle progressioni continue, e discontinue</i>	<i>316.</i>	<i>D'un Padre di famiglia, il qual fa testamento, & diuide con bellissimo ordine tutti i denari che si troua, lasciandone heredi suoi Figlioli</i>	<i>350.</i>
<i>Casi bellissimi di due che caminano per un medesimo viaggio, quando in continua, & quando in discontinua progressione</i>	<i>320.</i>	<i>Bellissimo caso d'alcuni Pellegrini</i>	<i>351.</i>
<i>Di molti altri variati casi di viandanti</i>			
<i>Di quanti passi sia un miglio, & come s'intendino i passi</i>	<i>324.</i>		
<i>Errore di Fra Luca, & Filippo Calandri</i>	<i>325.</i>		
<i>Errore di Francesco Galigai</i>	<i>327.</i>		
<i>A trouar diuersi numeri quadri, casi di-</i>			

T A V O L A

<i>Di tre mercàti che caricano grano,</i>	352.
<i>De muratori a murare, de' cavalli a mägare blada, e de' molini a macinare grano</i>	353.
<i>Proposizione fatta da vn maligno</i>	354.
<i>Delle mutationi de' prezzì del grano, rispetto al pane venditale,</i>	355.
<i>De salari de seruitori, casi bellissimi carte</i>	361.
<i>Quesito fatto all' Autore</i>	364.
<i>D'alcuni che ginocano alla palla, a balestrare, e d'altre variate domande carte</i>	365.
<i>Error di Fra Luca, e del Penerone</i>	365.
<i>Openion falsa del Pagani</i>	366.
<i>Fanola di due che trouano vn' ampolla di balsamo</i>	370.
<i>D'alcune ragioni appestate sopra il vender vuoua, e contar denari a due, a due, & a tre a tre diuersamente</i>	371.
<i>A ritrouare vn numero pensato</i>	373.
<i>Come si possa inuestigare quanti punti si senopre con tre dadi</i>	374.
<i>Come si possa ritrouare vn' anello ascoso fra molte persone</i>	374.
<i>Di due, di tre, e di quattro buomini, che tolgono a refuso vna quantità di denari, come per forza di numeri si possa ritrouare quanti ne toglie ciascuno carte</i>	375.
<i>Come con vna quantità di denari si possa comprare vna medesima quantità d'animali diuersi prezzì</i>	376.
<i>Della regola composta del Caramo detta la regola delle due false posizioni</i>	379.
<i>D'vn maestro di scuola</i>	386.
<i>Di due soldati</i>	391.
<i>D'vno che vuole fabbricare vna casa carte</i>	392.
<i>D'vn quesito fatto all' Autore</i>	396.

<i>D'altro quesito</i>	398.
<i>D'vn soldato che vuol comprare vn' Archibuso</i>	401.
<i>Di due vinaiuoli che caricano vna barca di vino</i>	403.
<i>Di due ch' hanno a partire vna quantità di denari, e nel diuiderli vengono in differenze</i>	404.
<i>Di due compagni, che noleggianno vna Barca conditionatamente</i>	406.
<i>Di tre compagni, che hanno denari, e mettonsi a giocare</i>	411.
<i>Di due compagni, che hanno denari, e trouano due boise</i>	415.
<i>Di tre compagni, ch' hanno denari, & vn di loro domanda all' altro vna certa quantità de' suoi denari</i>	417.
<i>Error di Fra Luca</i>	420.
<i>D'vno, che con cento ducati vuol comprar cento animali di quattro sorti, a diuersi prezzì</i>	421.
<i>Di due che nel diuidere vna quantità di denari vengono in discordia</i>	423.
<i>Del marauiglioso artificio che usò Archimede per ritrouare vn furto</i>	424.

LIBRO SESTO.

<i>Definition del punto</i>	427.
<i>Definition della linea</i>	429.
<i>Delle linee parallele</i>	430.
<i>Che cosa sia angolo, e di quante sorti angoli sieno</i>	430.
<i>Che cosa sia superficie</i>	431.
<i>Dimostrations di diuerse figure superficiali</i>	431.
<i>Che cosa sia corpo</i>	432.
<i>Che cosa sia circonferenza, diametro, semicircolo, arco, e corda</i>	433.
<i>Delle figure quadrangolari, del rombo, e romboide</i>	433.
Come	

T A V O L A

<i>Come si misurino le superficie quadrangolari</i>	434.	<i>Perche causa (volendo trouare la superficie d'un cerchio) si prenda gli $\frac{1}{2}$ del prodotto del diametro in se medesimo</i>	472.
<i>Del modo che si offerua nel misurare le terre in diuersi luoghi</i>	434.	<i>Come si troui la superficie d'una portione d'un cerchio</i>	473.
<i>Delle diuersità de' triangoli , e come si trouino i catetti di essi</i>	437.	<i>Come si troui la corda d'una portione d'un cerchio</i>	473.
<i>Dello squadra, e come s'adoperi per misurare i triangoli, & altre diuersi figure di campi</i>	447.	<i>Come si troui la superficie di ciascun settore</i>	474.
<i>Di sei auuertimenti utilissimi al pratico misuratore</i>	448.	<i>Proposta fatta all' Autore</i>	475.
<i>Come si misurino i campi, i quali habbino diuersi lati , e sieno circondati da strade , fossati , e fiumi , che vadino serpendo</i>	449.	<i>A trouar la superficie d'una figura onata</i>	476.
<i>Come d'un campo se ne possa misurare, e staccare una quantità di staia di qual banda ci piace</i>	454.	<i>Error di maestro Francesco Veronese, carte</i>	478.
<i>Discorso sopra il pratico operare per misurare i campi</i>	457.	<i>Come da un pezzo d'arco d'un ponte, o d'una porta si possa trouare il centro del tondo , che produisse tal parte d'arco .</i>	480.
<i>D'alcune misure che sono fuor del pratico operare</i>	459.	<i>Sebastiano Serlio</i>	485.
<i>In che modo si possa diuidere una linea egualmente in quante parti ci piace , carte</i>	461.	<i>Come si diuida una superficie piana circolare, in tre parti uguali, circolarmnte</i>	486.
<i>Come si possa figurare un quadrangolo uguale ad un triangolo</i>	461.	<i>Come si misuri un pentagono, un'asse-gono, & un'ottagono</i>	487.
<i>Error del Puerone</i>	462.	<i>Come si misurino i corpi così cubi, come sferici</i>	489.
<i>Come si possa triplicare la superficie d'un quadro , e figurare un quadro triplicato</i>	463.	<i>Come dalla notitia della superficie d'una sfera si ritroui la quantità del diametro di detta sfera</i>	491.
<i>Come si figurì un quadro grande il qual capisca sette volte il quadro piccolo carte</i>	464.	<i>Come dalla notitia de i lati d'un cubo il maggior che si può dentro d'una sfera , si ritroui il diametro di detta sfera</i>	493.
<i>Come si diuida un triangolo di diuersi lati in due, o tre parti uguali</i>	465.	<i>Come si misurino le piramidi</i>	493.
<i>D'altre diuersi domande, sopra il diuidere un triangolo in alcune parti conditionate</i>	467.	<i>Come si misurino le colonne</i>	495.
<i>Delle superficie circolari</i>	471.	<i>Di due Torri in un piano, e d'una fonte fra esse</i>	497.
		<i>Di tre diuersi palle farne una sola, e saper la sua circonferenza</i>	498.

Come

T A V

Come si misurino i Teti, i palchi, i legnami, gli scialbi, e le muraglie d'ogni sorte 498.

Come si misurino le tenute delle cisterne, de pozzi, delle casse, delle botte, e de lini, 500.

Errore di Francesco Galigai, e di Filippo Calandri 505.

Come si misurino le fosse, d'oro buche da grano, e le pile da olio, 509.

Errore di Giovanni d'Ortega Spagnolo carte 511.

D'alcune altre bellissime, e variate domande 513.

LIBRO SETTIMO.

Come con una squadra artificiosa si possa lineare acque, & altre cose carte 517.

Come s'adopere la detta squadra per hauere notizia della caduta che puo hauere un condotto d'acqua per molini, e fontane, 518.

Come si possa hauere notizia dell'altezza d'una torre con l'ombra del Sole, o con uno specchio, 519.

Come si possa hauere notizia d'una lunghezza in un piano con una squadra ordinaria 523.

O L A

Come con due haste si possa trouare la medesima lunghezza 514.

Come con una squadra da misurare le terre si possa ritrouare la medesima lunghezza 525.

Come si fabbrichi un instrumento da misurar la larghezza d'una cortina di muraglia, dove altri non si possa acostare 526.

Come si metta in uso il detto instrumento 527.

Come con una squadra artificiosa si possa ritrouare l'altezza d'una cosa carte 528.

Come si faccia il quadrante Ignomonico carte 532.

Come col detto quadrante si misurino le lontananze, l'altezze, le larghezze, e le profondita 535.

Come si fabbrichi il quadrante dentro la quarta parte, d'un cerchio 544.

Come col detto quadrante si misurino le lunghezze, e l'altezze, 545.

Come facilmente senza bussola, si possa leuar la pianta d'un Palazzo, d'una Citta, e d'altre cose 550.

Il Fine della Tavola

NOl Fra Cesare da Montale. Commissario Generale dell'Ordine de' Minori Conuentuali, hauendo veduta la fede, & attestazione, che fanno il Padre Maestro Pietro Magni da Fucecchi, & il Padre Maestro Alessandro Benedetti da Pistoia, d'hauer veduta, & molto ben considerata l'Opera del R. P. E. Lorenzo Forestani da Pescia, continente le pratiche d'Arithmetica, e Geometria, & afferendo i sopradetti Riussori non hauer trouato in dette Opere cose repugnanti alla Fede Cattolica, & a i buoni costumi, ci contentiamo, e concediamo licenza al sopradetto Padre Fra Lorenzo, che possa mandare in luce, e stampare la sopradetta Opera, & in fede, habbiamo fatto la presente questo di 20. di Maggio 1601. In San Francesco, nella Città di Siena.

*Fra Cesare Montale. Comp. dell'Ordine, e Commiss. Generale concede,
che si stampi la sopradetta Opera.*

Reimprimatur
F. Modestus Paulettus de Vincanello Inquis. Gen.
Senarum.

DIVISIONE DELL'OPERA



Perche ciascuno possa piu facilmente trouare quelle propositioni, o conclusioni, che in quest' opera si contengono, sarà diuisa in sette parti, ouero libri, e di ciascuno si porrà distesamente il suo contenuto.

Nel primo libro si dimostra con breuità, che cosa sia numero, e la diffinitione de' cinque atti principali d' Aritmetica, cioè numerare, sommare, sottrarre, multiplicare, e partire, così di sani, come di rotti, con le lor proue, & anco si dimostra il modo dello schifare de' rotti, e del preder parte di qual si uoglia numero; del recare in parte, e del multiplicare lire, soldi, e denari diuersementè.

Nel secondo si dimostra la regola delle quattro cose proportionali, detta volgarmente la regola del tre, e da i Matematici è chiamata regola dorata, quale non sarà mai tanto lodata che basti. Contiensì ancora in questo secondo libro molte ragioni occorreti al traffico mercantile, cioè per cento, per migliaia, per cantaro &c. Si dimostra ancora il modo dell' inuestir danari, e conoscere i guadagni, e le perdite con trasportationi di robbe, cioè pesi, misure, e monete da vn luogo a vn altro, con limitationi di guadagni, e perdite, tare, doni, datij, gabelle, passaggi, e noli, che s' vfa ne i viaggi, e trasporti di mercantie.

Nel terzo si dimostra diuerse cōpagnie, soccide di bestiani, pigioni di case, cambij di piu forti, e per diuersi luoghi fatti: cause, e modi d' interessi, cioè mercuri, e scontati, così semplici, come a capo d' anno, o d' altro termine di tempo, con il modo di ridurre a vn di diuersi pagamenti per diuersi tempi fatti, e falsi di ragioni.

Nel quarto si dimostra la diuersità de i baratti, come semplici, e composti; risoluti per regola delle cinque proportioni; la quale volgarmente si dice la regola del cinque. Si dimostra ancora il modo del consolare, & affinare ori, & argenti per zecche, & orefici; con molti viaggi di mercanti, & altre diuerse persone; casi veramente diletteuoli.

Nel quinto si dichiara che cosa sia radice quadra, e cuba, e come si traghino le dette radici d' ogni numero; e delle lor proue per 7. e per 9. e delle progressioni continue, e discontinue, con bellissime regole, e casi; con molte conclusioni da trouar diuersi numeri quadri, e diuider numeri in diuersi parti, con molte propositioni erratiche. Da inuestigare vn numero pensato, con molte altre dimando da passar tempo; e delle due Regole del Caraino, cioè semplice, e composta, con dignissime propositioni risolute per dette regole, & anco per via di conclusioni.

Nel sesto si dichiara quelle cose piu necessarie, che alla pratica di Geometria s' aspettano, con il modo di misurare tutte le superficie, e corpi regolari, con dignissime regole, e strumenti, parte tratte da diuersi eccellentissimi Autori, e parte di nostra inuentione.

Nel settimo, & vltimo si dimostra sotto breuità il modo da liuellar acque da misurar alcune altezze con l' ombra del sole, o d' vno specchio, o con vn Asta, e come con vna semplice squadra si possa misurare vna lunghezza in vn piano, & vn' altezza; & ancora il modo da fabbricare il quadrante Ignominico, e come s' adoperi per misurar l' altezze, distanze, e profondità.

DONDE HABBI HAVUTO ORIGINE

*La Geometria, & altre cose tratte da diuersi**Autori.*

Quanta ha sempre stata la grandezza, la maestà, e l'autorità delle scienze, ouero di discipline Mattematiche, e quanto parimente sia stato il lor glorioso decoro appresso tutte le genti del mondo; e ne fanno fede gli Egittij, a i quali più che ad ogn' altro si deuie prestar fede, come primi inuentori di esse discipline, siccome Hero' noto nel libro secondo, e Diodoro nel suo primo libro testificano loro essere stati inuentori della Geometria, in questa forma, cioè.

Il Nilo, il più nobil fiume che porti tributo al mare, dal Solstitio estiuo all' Equinoctio Autunnale, con grandissime inondationi allaga tutto l'Egitto; dall' accrescimento del quale, gli Egittij augurano l'abbondanza, e la penuria delle future biade, e ricolte. Perciò che l'Egitto, quando il Nilo cresce in dodici cubiti, conosce hauer ad esser grandissima fame, se in tredici cubiti, ancora grandissima penuria; se in quattordici, giudica douerne seguire grandissima giocondità, & allegrezza; se in quindici, sicurezza grandissima; se in sedici cubiti grandissime delitie. Il quale accrescimento dicono significare il vero.

Trapassando adunque tali inondationi del Nilo i confini de' campi, e sommergendo, e confondendo quelli, gli habitatori di quelle regioni, doppo il disseccamento di tali acque, cominciarono a eregger termini in detti campi, & a misurar la lunghezza, e larghezza loro, cioè la lor superficie, per poter meglio ritrouar particolarmente ciascuno il suo; il qual modo di misurare, s'è poi dilatato, e sparso per tutte le parti del mondo. Dell' antichità, & eccellenza adunque di queste discipline, non solo ce ne fanno testimonianza (come ho detto) gli Egittij, ma ancora molti antichi scrittori, che di tempo in tempo, e d'età in età hanno illustrato l'vniuerso con la virtù, e rara scienza loro.

Con queste scienze, ouero discipline Mattematiche si prouede, e s'amministra ai Regni, alle Repubbliche, & a ciascun viuente per numero, per peso, e per misura proportionatamente, si come ne dimostra Aristotile nel secondo della Metafisica, quando dice, che il fine della scienza speculatiua non è altro che la verità; e dell' operatione, ouero pratica è l'opera compiuta.

Ancora gli antichi Filosofi inuestigatori delle cose affermano, come si tocca più la verità nelle Mattematiche discipline, che in qualunque altra scienza, ouero arte liberale; perche hanno assolutamente determinato, quella essere nel primo grado di certezza. Laonde considerando io la grandissima dolcezza, & utilità che delle scienze Mattematiche si conuegne in Theorica, & in Pratica, ho procurato con ogni diligenza di raccorre, e mettere insieme le più scelte, propositioni, che da i più lodati scrittori delle Pratiche Mattematiche habbino fin qui scritto, e quelle propositioni ho talmente dichiarate, e conchuse, che quei frutti, che hanno le diuersi opere d'altri scrittori prodotti nelle mie mani spero che quest' opera sola habbia a germogliare, fiorire, e far nuoui frutti, non solo nelle mani degli esercitanti l'arti mecaniche, ma ancora nei peregrini ingegni,

ingegni, principianti, & effercitanti le Teoriche Mattematiche .

Quel diuin Platone, Padre, e Maestro de i Filosofi, non voleua, che alcuno de' suoi scolari entrasse nella sua scuola, ouero studio, se non era prima in Geometria effercitato . Queste tali scienze, ouero discipline furono tanto intrinsecamente conosciute dagl' inuentori di esse, che da quelli fu determinato, che la prima cosa, che si douesse fare imparare a tutti quelli che si dedicauano alle scienze, fossero le discipline Mattematiche, e questa determinatione fecero per tre cause .

Prima, perche le dette scienze fanno paragon dell'ingegno dell'huomo, se egli è atto a far frutto, ò nò nell'altre scienze, si come prouerbialmente si dice, che la bontà dell'oro vien conosciuta, e prouata col fuoco, così l'ingegno dell'huomo vien conosciuto, e prouato con le discipline Mattematiche . E perciò quando trouauano alcuno, che di tali scienze non fusse capace, lo leuauano da tal cominciato studio, e l'applicauano ad altro effercitio; perche in effetto comprendeano, che la dottrina senza l'ingegno, e l'ingegno senza la dottrina non può fare vn perfetto artefice .

La seconda causa, perche gli antichi voleuano che le prime cose ad impararsi fossero le discipline Mattematiche è questa; perciò che a voler intender quelle non vi occorre aiuto d'alcun'altra scienza, la causa è, che per lor medesime si sostentano, si verificano, e si prouano, e non per autorità, ouero openione d'huomini, come fanno l'altre scienze .

La terza causa è, che conosciuano che tutte l'altre scienze, & atti haueuano bisogno dell'e discipline Mattematiche, e non solamente le liberali, & altre, che da loro dipendono, ma ancora tutte l'arti Meccaniche, e che ciò sia vero, per mezzo di tali scienze nell'occorrenze naturali, noi conosciamo in materia la descrizione; quali à, e quantità d'ogni numero Aritmetico, e d'ogni figura Geometrica, tanto di superficie piane, e conuesse, come di corpi solidi, si regolari, come irregolari, con tutte le sue proprietà, e proporzioni, come Geometricamente descriue (l'ecceellenza de' Mattematici) il Megarense Euclide in quindici libri .

Quanta, e qual sia l'vtilità, che si trae dalle discipline Aritmetiche, la possono manifestare i musici, si come proua Boetio nella sua Aritmetica; Imperò che con li numeri, e sue proprietà, proporzioni, e proportionalità, noi conosciamo la proportion dupla, la tripla, la sesquialtera, la sesquitercia &c. E se più oltre discorriamo, non trouiamo noi, che li nostri antichi per mezzo delle proporzioni hanno conosciuto quanto sia la rotondità della terra, e quanto sia il suo diametro, e degl'altri elementi? & ancora hanno conosciuto la grandezza del Sole, della Luna, e delle Stelle, così fisse, come erranti, si come dimostra Tolomeo nell'Almagesto .

Dicono, & in particolare Strabone, & Herodoto, che l'Aritmetica, scienza de' numeri è venuta da' popoli della Fenicia, mediante le mercature, e traffichi grandissimi infra quei popoli; ma Iosefo Ebreo, nella guerra degli Ebrei scriue che, e la Geometria ancora, e l'Aritmetica è stata ritrouata dagli Ebrei; ma, per nò voler io decider tal cosa, la cerò questo al giuditio del prudẽte lettore .

Eutropio nel principio del primo libro afferma, che Sidon o fu quello, che ritrouò i pessi, e le misure, in quel tempo, che Hieroboam regnaua in Giherusalemme; Azza appresso gli Ebrei, e Proca appresso tutti gli Albani .

Alcuni altri sono, che vogliono, che tali pessi, e misure sieno state ritrouate dal secondo Mercurio figliuolo di Creta, e di Giove .

Plinio

Plinio nel settimo vuole, che l'Inuentor di essi fusse Fedone Argivo. Aulo Gellio, vuole che sia stato Palamede. Strabone nel quinto libro, vuole che sia stato Fedone di Elide.

Diogene Laertio nel libro nono afferma essere stato il primo inuentore di essi Pittagora. Iosefo Ebreo dice essere stato Caim figliuolo d'Adamo.

Sono alcuni, che dicono Pittagora da Samo, esser stato ritrovatore de' numeri; alcuni altri dicono esser stato vn'altro Pittagora Scultore Regino; altri Mercurio; Liuiio dice essere stata Minerva, delle quali tutte opinioni, non volendo io essere rigoroso diffinitore, (come di sopra dissi) al prudente Lettorc ne lascerò la cura di elegger non solamente il meglio, ma qual più li piace.

Ma perche poco importa il saper precisamente il nome degl'inuentori de' numeri, pesi, e misure, perciò non mi ristringerò a darne piena notizia, basta solo, ch'io narrerò quanto sieno bisognuoli, anzi necessarie al mondo le scienze, ouero discipline Matematiche, fondate sopra il numero, peso, e misura.

Queste medesime scienze aprono la strada all'Astrologia, alla Geografia, e Corografia; Imperò che col numero, e con la misura, proportionione, e proportionalità, si descrive tutto l'vniuerso; proportionando i gradi della lor lunghezza, o larghezza in vna picciola carta.

Che sarebbe la scienza della Prospettiva, dell'Architettura, e Parte della Pittura senza l'aiuto della Geometria? che farebbono l'arti Mechaniche (come apertamente dimostra Giordano in quello *de Ponderibus*) senza il numero, peso, e misura? Si legge pure, che il gran Geometra Archimede Siracusano, con suoi mecanici ingegni, difese vn tempo la Città di Siracusa dall'impeto bellico de' Romani. Noi sappiamo pure, e giornalmente lo vediamo con l'esperienza, che senza le debite proportioni de' numeri, e misure non si fabbricano palazzi, ponti, fortezze, bastioni, ripari, artiglierie, campane, horologi, ordini di eserciti in battaglia sotto diuersi forme, cioè in battaglia quadra di gente, ouero di terreno, e molte altre ordinanze.

Il diuin Platone, & Aueroes di Babilonia, dicono, che è impossibile perfettamente specular, e diuentar Filosofo vero senza la cognitione de' numeri; poiche ogni cosa, che ha l'essere, e che si fa, è contenuta; e prende forza dal numero, come il tempo col numero; piglia la sua virtù dal proportionato numero il conceto, e la voce; e per mezzo de' punti, e delle linee le propositioni de' numeri, compongono le figure, e molti altri effetti simili, che apertamente dimostrano tutte le specie delle cose naturali, e soprannaturali esser contenute (benche diuersamente) dal numero. Boetio ancora non discostandosi dal giudizio de' detti Filosofi, conchiude, che senza le scienze, ouero discipline Matematiche sia impossibile rettamente filosofare.

Queste medesime scienze danno l'essere alla pratica speculatiua d'Algebra, & Alimucabala, delle quali fu Autore Maumeth figliuolo di Moise Arabo; quanto queste scienze, ouero discipline sieno necessarie all'huomo, ce lo dimostra il padre de' Filosofi Platone, il quale essendo addimandato perche causà infra il genere degli animali, l'huomo sia nominato animale rationale, e tutti gli altri sien detti irrationali, rispose, perche l'huomo sa numerare, e le bestie no.

Hor se così ninima parte di tali scienze (come è il numerare, per esser comune a tutti) ci fa differenti dagli animali irrationali, egli è cosa manifesta, che quanto maggior parte apprenderemo di queste tali scienze, tanto più saremo rationali, e lontani dagli animali bruti.

Finalmente

Finalmente si conosce la nobiltà, & eccellenza di quelle discipline, poiche tutte l'altre scienze non possono star separate da queste, si come Barcolo famoso legista, con sue figure Geometriche ne manifesta, & auuertisce, che la Geometria è necessaria in iure.

Quante differenze nascono alla giornata fra Dominio, e Dominio per causa di iurisdizioni? quante liti tra' fratelli, parenti, vicini, e stranieri sorgono nel diuider mobili, & immobili, le quali si conuengono per pacifico stato, mediante la ciuil Giustitia decidere? doue di necessità vi s'interpone debita misura, e calcolo, con debita proportionione; Perilche io ho voluto nel principio di quest'opera raccorre da diuerse bande, & adurre tutte le sopradette ragioni in lode delle discipline Matematiche, per dimostrar che le presetti Pratiche d'Aritmetica, e Geometria non hanno origine da cose vili, e Meccaniche; e perciò son degne, e meritano essere apprezzate di ogn'vno. Si esorta adunque ciascuno ad essercitarsi in esse, poiche aprono il sentiero a specular cose alte, e diuine.

DEFINITIONE DEL NUMERO.

S Appi benigno Lettore, che l'Aritmetica si diuidi in due parti principali, cioè Teorica, e Pratica; e volendo noi trattar della Pratica, la scieremo da parte la Teorica, la quale considera le ragioni, cagioni, sostanze, e qualità; e la Pratica della quale al presente vogliamo descriuere le sue qualità, riguarda solamente l'attioni, e calcolationi delle cose, che sono in atto; Laonde (per maggiore intelligenza degli studiosi di queste discipline) la diuideremo in cinque arti molto necessarij, i quali son questi, cioè numerare, sommare, sottrarre, multiplicare, e partire, così di sani, come di rotti. Ma prima che veniamo a trattare sopra le dette diuisioni, par cosa conueniente, se non diffusamente, almenò succintamente, dichiarar prima, che cosa sia numero. Ma perche molti altri n'hanno sufficientemente scritto; perciò noi non ci estenderemo molto a dir di esso, nè meno a dimostrare quali sieno i numeri pari, o impari, o composti, o comunicanti, o contra se primi, o laterali, o superficiali, o quadrati, o cubi &c. Se non quanto alla nostra pratica parrà, che facci di bisogno; perche non apportano utilità veruna a' Mercanti. Numero adunque, secondo Euclide, non è altro, che vna composta moltitudine d'vnità; e Leonardo Pisano, dice, che numero è vna adunatione d'vnità, e chiamasi vnità quella cosa che sempre è detta vna, quando non habbia in se compositione, & essa vnità non è numero, ma principio, e fondamento di numero, e noi non di-

scostandoci da loro, diciamo, che eccettuato la prima

vnità, tutte l'altre insieme giunte fanno numero,

cominciando dalle due vnità, che è due,

e salendo in infinito.

Boetio ancora nella sua Aritmetica dice, che

l'vnità è prima, e fondamento

d'ogni numero.

DIEFFINITIONE DI CINQUE ATTI D' *Aritmetica*.

IN questa operatione d' *Aritmetica* concorrono cinque atti principali. Il primo de' quali è numerare, cioè esplicare il significato, e relevatione di più figure. Il secondo si chiama sommare, cioè aggiungere più numeri insieme. Il terzo atto si chiama sottrarre, cioè cauare vn numero minore da vn numero maggiore. Il quarto si chiama multiplicare, cioè produrre vn numero contro vn altro numero. Il quinto, & vltimo si chiama partire, cioè diuidere vn numero egualmente in quante parti vuoi, e quel che si dice di sani, diccsi ancora di rotti, il che tutto intendiamo di mostrare con breuità.

Del modo a releuare più figure, atto primo.

VEduto, & inteso che cosa è numero, seguita il numerare, cioè releuare più figure. Il numerare adunque non è altro, che vna certa rappresentatione di numeri fatta con diuersi, e varie figure, le quali è da sapere, che dette figure, nella Pratica d' *Aritmetica* sono dieci, cioè 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. e ciascuna da per se ha il suo significato, e la prima dice vno, la seconda due, la terza tre, la quarta quattro, la quinta cinque, la sesta sei, la settima sette, l'ottaua otto, la nona 9. la decima zero, o vero nulla; il qual zero da se stesso niente significa, ma aggiunto vn zero a qualsuoglia delle dette figure verso man destra fa crescere il detto numero, mettendo però il zero a man destra d'vna figura; come per esempio sia questa, cioè, 50. che accompagnato, ouero aggiunto il zero da destra del 5. fa che dice cinquanta; ma ponendo il zero a man sinistra di detto 5. staria così, 05. il che non fa crescere, nè minuire l'istesso 5. ma resta in sua natura, e rappresenta se stesso. Le sopradette dieci figure adunque sono bastanti a rappresentarci qual numero noi vogliamo; e queste son quelle figure, che i Filosofi dicono che rappresentano noue diti, e per diti intendono ogni quantità minore di dieci; onde fra loro hanno questi termini, cioè, diti, articolo, e composito, e per diti intendono, come s'è detto di sopra; per articolo intendono ogni numero, che in dieci parti eguali si può diuidere, di maniera che non resti, o auanzi cos'alcuna, si come 10. 20. 30. 40. &c. Per numero composito intendono vn numero, che partecipa del diti, e dell'articolo, il quale diuiso in dieci parti sempre auanza qualche cosa, si come sono assai numeri, cioè 15. 18. 23. 36. &c.

Per la qual cosa secondo loro, il numero composito si ha da ritrouar sempre fra due articoli; ma perche questo non fa molto a proposito nostro, torneremo a dimostrare il modo più facile da rileuare più figure, come per esempio sono l'infra scritte, le quali sono vent'vna.

Cominciassi sempre dalla prima figura della mano destra, venendo verso la man sinistra, & alla prima se gli dice numero, alla seconda decina, alla terza centinaia, e fassi vn punto; & alla quarta figura se gli dice numero di migliaia, alla quinta decina di migliaia, & alla sesta centinaia di migliaia, e fassi vn punto; e così di tre in tre figure farai sempre vn punto, andando verso man sinistra; & alla settima figura dirai numero di milione; all'ottaua decina di milione, & alla

alla nona, centinaia di milione, e farai vn punto, & alla decima dirai numero di migliaia di milione; all'vndecima, decina di migliaia di milione; & alla duodecima, centinaia di migliaia di milione, e farai vn punto. Ma per non tediarti più, riguarda la presente formula a similitudine di scala, che mediante l'ordine di essa, con più facilità intenderai, e saprai rileuare questo, & ogni maggior numero, però sta attento, che in tutte le nostre proposizioni ci sforzeremo dichiararle con quella breuità, che potremo, e maggior intelligenza de' Lettori, e Studiosi.

285. 632. 876. 584. 097. 032. 560.

						Cinquecentosessanta.
						Trentaduemila.
						Nouantasette milioni.
						Cinquecento ottantaquattro migliaia di milioni.
						Ottocento settantasei milioni di milioni.
						Seicentotrentadue migliaia di milioni, di milioni.
						Dugento ottantacinque migliaia di milioni di milioni.

Il qual numero tutto insieme dice così 285. milioni di milioni, di milioni 632. migliaia di milioni, di milioni, 876. milioni di milioni, 584. migliaia di milioni, 97. milioni, 32. migliaia, e 560. Dicefi, che mille volte mille fanno vn milione. Par cosa conuenueuole di non lasciare i Lettori confusi, e perciò con maggior dichiarazione noi diciamo, che nessuno si deue marauigliare, se alla prima figura della mano destra del sopradetto numero, che è vn zero, noi habbiamo detto, che bisogna dirli numero; poiche hauendo prima detto, che il zero da per se solo niente ci rappresenta, la qual cosa è vera; ma in questa parte il detto zero, perche occupa il luogo d'vn numero, perciò conuiene per via forza darli titolo di numero, perche viene a dar forza al 6. che gli è vicino da man sinistra, e lo fa dir sessanta.

Del Sommare di Numeri, Atto secondo.

IL sommare è molto necessario a sapersi da ciascuno; il quale non è altro, che vn aggregatione di due, ouero più numeri d'vna medesima specie, ouero natura; cioè, se la quantità, che vuoi sommare insieme, sono tutti scudi, o tutte lire, o tutti soldi, o tutti denari, o tutte libbre, ouero oncie, o tutte braccia, o moggia, o staia, e simili; bisogna sempre porre ordinatamente vna quantità sotto l'altra, grande, o piccola sia come si voglia; Di maniera che il numero venga posto sotto il numero, se decine sotto le decine, le centinaia sotto le centinaia, e le migliaia sotto le migliaia, e vā discorrendo. Fatto questo conuiene sempre conuinciare a man dritta sotto i numeri, e sommare tutte le figure del primo grado, ouero colonne di giù in su, ouero di su in giù, e di detta somma poni il numero sotto il filo, ouero colonnello de' numeri, facendo prima vna linea, e salua le decine, le quali aggiungerai, e sommerai con il secondo filo, ouero colonnello; e di detta somma poni qualche auanza sopra le decine, e serba le decine per aggiungerle al terzo filo, che faranno le centinaia, e così farai fin tanto, che tutte le fila, ouero colonnelli saranno sommati, ouero raccolti.

& all'vltimo filo poni tanto quanto ti viene per la somma di esso . Hor poniamo che hauessimo a sommare, ouero raccorre l'infinita serie per te , o quantità di lire, e ridurle a vna somma, e quantità sola ; comincia prima dal filo, ouero colonnello de' numeri, che è il primo filo di man destra , e conta di giu in su, dicendo così, 5. & 8. fa 13. e 3. fa 16. e 2. fa 18. e 6. fa 24. e 8. fa 32. e 6. fa 38. e 3. fa 41. e così hauerai finito di contare, ouero sommare il filo de' numeri, che tutto è 41. che sono quattro decine, & auanza 1. il quale auanzo cioè 1. poni sotto il filo de' numeri, ma prima tira vna linea a trauerso sotto quelle quantità che vuoi sommare, e salua le quattro decine ; poi vattene al secondo filo dicendo così, 4. che salua i, e 7. del secondo filo fa 11. e 2. fa 13. e 3. fa 16. e 7. fa 23. e 8. fa 31. e così hauerai sommato il secondo filo, che son decine, e perche tal somma fa 31. le quali sono tre centinaia, & auanza 1. però poni 1. sotto la detta linea a dirittura del secondo filo, e salua le tre decine sopra dette ; dipoi vattene al filo delle centinaia, e dirai così, 3. che ho saluato , e 5. fa 8. e 5. fa 13. e 4. fa 17. e 2. fa 19. e 5. fa 24. e queste sono 24. centinaia, le quali sono due migliaia, & auanza quattro centinaia, il quale auanzo poni sotto la linea a dirittura del filo delle centinaia, e salua le due decine di centinaia, le quali sommerai con il filo delle migliaia, dicendo così, 2. che salua i, e 4. fa 6. e 3. fa 9. e 6. fa 15. & hauerai finito di sommare tutte le fila ; hor sappi che quando hauerai sommato l'vltimo filo di tutte quelle quantità che vuoi sommare, ti conuerà porre tutto quel numero, che per tal'vltimo filo ti sarà peruenuto ; come al presente, che essendoti peruenuto 15. si deve porre tutto il detto 15. sotto il quarto filo, che è delle migliaia, come qui di sotto

L. 6 5 8 3.
 2 7 6.
 8.
 3 4 0 6.
 5 3 2.
 2 3.
 8.
 4 5 7 5.
 L. 1 5 4 1 1.

vedi ; e se più fila ci fussero state da sommare, così haueresti proceduto fino all'vltimo ; e così concluderemo, che le dette quantità di lire sommate tutte insieme, e ridotte in vna quantità sola, fanno la somma di lire 15411. Nota che quando tu hauesse a sommare più o meno fila di queste della somma di ciascun filo, deuì sempre porre il numero cioè quel che auanza sopra le decine, e tenerè le decine, quali deuì poi sommare con il seguente filo, venendo verso man sinistra, e quando la somma nò hauesse più d'un filo, allora poni il tutto, che nella somma di detto filo t'è peruenuto .

Che cosa è proua .

S Arà nostra particolar cura di dimostrare in quest'opera tutte le proue delle nostre propositioni ; ma prima che principiamo a prouare se la suddetta son. ma stà bene, o male, vogliamo prima mostrare che cosa sia proua . Per il che noi diciamo, che proua non è altro, che vna sostantia della verità, o falsità, secondo la cosa che vogliamo prouare, e non intendiamo proua esser altro, se non che della quantità, che vogliamo prouare, cauatoe tutti li 9. cioè nouennarij, che dentro vi sono, il restante, ouero auanzo è detto proua, e se niente, auanzasse, niente sarebbe proua ; come la proua di 19. per 9. è 1. e la proua di 15. è 6. e di 25. è 7. e così la proua di 9. è zero, di 18. è zero, e di 27. è zero . E così la proua d'alcun numero per 7. s'intende che gittati via tutti li settennarij, che dentro vi sono, il resto, ouero auanzo diciamo esser proua, cioè la proua di 12. per 7. è 5. e di 25. è 4. perche tratti li settennarij di 25. auanza 4. e se nulla restasse

restasse (come si disse di sopra) nulla sarebbe proua di esso, la proua di 7. è zero, e di 14. è zero, e simili, perche tratti li settennarij di detti numeri resta zero. Et ancorche habbiamo dato esempio in materia di dette proue per 9. e per 7. nondimeno ogni numero pari, o dispari, e dal dieci in giù, e dal dieci in su può esser proua, ma li più antichi speculatori si son fermati sopra questi due numeri 7. e 9. come men fallaci, ancorche l'vno, e l'altro sia fallace, nientedimeno la proua del 7. è stata eletta per più vera proua di quella del 9. come numero che men falla, e più apertamente mostra gli errori.

Della proua del 9.

LA proua del 9. si costuma, e mettesi in vso così, che sommate le figure insieme di quella quantità, della quale vuoi pigliar la proua, e cauati tutti i nouennarij, che sono, il restante farà la proua di detta quantità; come per esempio, la proua di 58. è 4. perche sommati insieme 5. & 8. del detto 58. fanno 13. del quale gettauo via il 9. resta 4. & esso 4. diremo esser proua di 58. e così la proua di 457. somma insieme 4. 5. e 7. fanno 16. del quale trattone 9. resta 7. e così diremo che la proua di 457. per 9. farà 7.

Della proua del 7.

LA proua del 7. si prende di ciascun numero, o quantità differentemente da quella del 9. secondo l'ordine sopradetto, perche sommando insieme tutte le figure di quella quantità, che vuoi trarre la proua per 7. e della somma gettar via i settennarij non tornerebbe la proua, anzi opereresti male; ma volendo trar la proua per 7. di qualsuoglia numero, o quantità, diuiderà esso numero per 7. e l'auanzo farà proua di esso numero, come per esempio, la proua di 32. è 4. perche partito 32. per 7. auanza 4. e la proua di 682. per 7. è 3. perche partito 682. per 7. auanza 3. & esso 3. diciamo esser la proua di 682. e con quest'ordine si può prendere ancora la proua per 9. di qualsuoglia numero, e sarà la medesima, che a sommare le figure della quantità, che vuoi pigliar la proua, come nella proua del 9. di sopra s'è detto; ma questo secondo modo d'operare è alquanto più tedioso.

Come si mandi a memoria la proua del 9. e del 7.

Costumasi fra i Precettori Arimatichi dare in scritto ai lor discepoli le proue del 9. e del 7. le quali seruono per veder con prestezza, se le moltiplicazioni, o partitioni fatte da loro nelle loro operationi siano bene, o male; ma volendosi seruire di dette proue, nel prouare vna somma di più quantità, come nel sommare, ouero racorre di lire, soldi, e denari, o di qualsuoglia altra cosa, noi non lodiamo le sopradette proue, perche son troppo tediose: nientedimeno per sodisfare a qualche curioso, dimostreremo ancora, come del sommare insieme più quantità di lire, soldi, e denari, si possa per la proua del 9. e del 7. ritrouare se detta somma sia bene, e male; la qual cosa intesa ti sarà facile applicarla

carla ad ogn'altra specie di sommare. Ma fra i Mercanti, quando vogliono far proua se alcuna somma da loro raccolta stia bene, o male, si vñ fare in questo modo, cioè, che doue prima haueuano sommato di sù in giù, la rifanno, e contano di sù in giù, e guardano se la detta somma si riscontra con la prima, il qual ordine è buono, ma non è proua, anzi è vn contarla di nouo, doue più si può pigliare errore: ma in questo fa bisogno la buona pratica dell'operante, la quale val più che qualunque altra proua; Tutte le proue, che noi addurremo per dimostrare se l'operationi, che noi faremo staranno bene, o male, non solo seruiranno per tal'effetto, ma per fare ancora l'operante più esperto.

Sappi, che in tutta l'Aritmetica quattro sono le proue reali, & infallibili, le quali son queste cioè. La proua del sommare è il sottrarre; e la proua del sottrarre è il sommare. La proua del multiplicare è il partire, e la proua del partire è il multiplicare, tanto di sani, che di rotti; è ben vero che l'operante è sottoposto a poter errare nel prender dette proue, ma operando bene, noi diciamo essere infallibili per propria loro natura, perche queste proue reali non si possono falsare, nè riceuere alteratione, come le proue del 9. e del 7. ancorche sieno alquanto lunghe, e fastidiose. Le proue adunque del 9. e del 7. le quali son soliti mettersi a memoria i discepoli sono queste.

Proua del 7.

Di	7.	è	o. zero.
Di	14.	è	o.
Di	21.	è	o.
Di	28.	è	o.
Di	35.	è	o.
Di	42.	è	o.
Di	49.	è	o.
Di	56.	è	o.
Di	63.	è	o.
Di	70.	è	o.
Di	77.	è	o.

Proua del 9.

Di	9.	è	o. zero.
Di	18.	è	o.
Di	27.	è	o.
Di	36.	è	o.
Di	45.	è	o.
Di	54.	è	o.
Di	63.	è	o.
Di	72.	è	o.
Di	81.	è	o.
Di	90.	è	o.
Di	99.	è	o.

Dimostrazione, come la proua del 9. sia più fallace di quella del 7.

HAuendo esplicato il concetto nostro, come si deuino mandare a memoria le sopradette proue; resta che dimostriamo qualmente la proua del 9. sia più fallace, di quella del 7. perche ogni proua, che vien chiarita per 7. non vien chiarita per 9. e questo procede per due mancamenti; il primo de' quali è, che la proua del 9. non fa dimostrazione di zeri tralasciati; & il secondo è, che non fa dimostrazione di numeri riuoltati. Di zeri dimenticati, farebbe, come se volessi la proua di 500. per 9. che quantunque si lascino i zeri, e si pigli solo la proua di 3. sarà pur 5. che tanto farebbe se si pigliasse la proua di 500. senza lasciare i zeri, che è similmente 5. di maniera che la detta proua non ci dà auuertimento alcuno. Ma la proua per 7. farà diuerso effetto, perche se prouerai diuersi numeri, essa ti darà diuerse proue, come per esempio, se pigli la proua di 500. per 7. sarà 3. ma se pigli la proua di 5. solo senza i zeri, sarà 5. onde haue-

rai variate proue, per rispetto de' numeri, che sono differenti. Per li numeri riuoltati poi, s'intende, che se di 580. si facesse 850. la proua del 9. non ti darebbe auuertimento alcuno, e quella del 7. ti darebbe notitia dell'errore, o malitia, perche se pigli la proua per 9. di 580. è 4. e similmente se la pigli di 850. è pur 4. Laonde se bene il numero è riuoltato, non però la proua del 9. te ne dà segno veruno, ma se pigli la proua di 580. per 7. farà 6. e di 850. farà 3. di maniera che variando numeri, haurai variate proue; e perciò si conclude, che la proua del 7. sia men fallace di quella del 9. poiche chiarisce gli errori, che tione occulti quella del 9. e per questo diremo, che quella del 9. sia più fallace,

*Dimostrazione, come ambedue le sopradette proue
sien false,*

H Ora, che habbiamo dimostrato, come l'vna proua è men fallace dell'altra, seguita che dimostriamo, come nè l'vna, nè l'altra sia giusta, nè buona, anzi ambedue falsissime, e per mostrarti, che nessuna di dette proue ti possono chiarire della verità, noi ti proporremo qui vn numero, del quale ne torrai proua, o per 7. o per 9. più giusta che fai, nientedimeno, se a quel tal numero aggiungerai vn'altro numero, o quantità, e di nouo tornerai a toglierne proua per 7. o per 9. ti risulteranno le medesime proue, che prima trouasti del numero non malitiato, e non perciò ti mostreranno la falsità, come per esemplo, se piglierai la proua di 436. per 9. farà 4. e per 7. farà 2. hor se sopra 436. vi aggiungerai la multiplicatione d'vna proua, con l'altra, cioè il moltiplicato di 7. in 9. che è 63. farà 499. del quale se ne piglierai le sue proue per 7. e per 9. ti verranno le medesime proue, che prima ti vennero di 436. si che sommate 63. a qualsiuoglia quantità, o posto in mezzo, o innanzi, o doppo, col 43663. o così 63436. che non fa caso, sempre renderà la prima proua, e nientedimeno le proue non ne fanno segno nessuno. Ma sappi, che in venti anni, che habbiamo esercitato questa professione, non c'è mai peruenuto alle mani, multiplicationi, o partitioni, o altre operationi simili, delle quali le proue siano venute bene, e l'operationi sieno state male, & è conuerso, se già scientemente, o maliciosamente non le habbiamo falsificate, e perciò concludiamo esser quasi impossibile, che nell'operare si possa aggiungere, o trarre per errore, alle multiplicationi, o partitioni vn numero, che le possa falsificare, e se non ci scuopre la falsità la proua per 9. non ce la scuopra almeno la proua per 7. però prouale con qual proua ti piace, che quando l'operationi staranno male, le proue non torneranno, se già per gran disgratia non ti venisse aggiunto, o tolto (alle dette operationi) vn 7. ouero vn 9. o 14. o 18. cioè vn numero che partito per 7. non auanzi cos'alcuna, facendone la proua per 7. ouero vn numero, che partito per 9. ouero aggiungere, o leuare di quelle quantità, che vuoi prouare vn 63. come di sopra s'è detto. E perche in così lungo tempo non c'è mai accaduto trouare, che dell'operationi fatte senza malitiarle, sieno tornate le proue, & esse operationi sieno state male, perciò da questo pigliaremo ardire di seruirci della proua, o del 9. o del 7. in tutte le nostre operationi, secondo che più ci piacerà; ma per lo più ci seruiremo della proua

proua del 9. come più breue, e commoda a sommare tutte le figure, e dalla somma gettar via i nouennarij. Vfino poi gli altri quelle proue, che più gli aggradano, mentre daremo principio a prouare per la proua del 7. e del 9. la somma, ouero raccolta di più quantità di lire auanti fatta.

Proua della somma auanti fatta.

Volendo noi offeruare quanto poco auanti habbiamo detto, cioè di prouare tutte le nostre propositioni, cominceremo a prouare la somma auanti fatta, se sta bene, o no, la quale hauiamo nuouamente posta qui di sotto con le sue proue da lato a ciascheduna quantità, e prima pigliaremo la proua per 7. e poi per 9. piglia adunque la proua di 6583. per 7. che è la prima quantità, trouarai che per 7. e 3. e per 9. e 4. le quali poni fuori di contro alla detta quantità, come vedi, dipoi prendi la proua di 276. per 7. è 3. e per 9. è 6. le quali poni fuori incontro alla seconda quantità, e sotto le prime due proue, e così di tutte le quantità del detto sommare ne prenderai la proua, quantità per quantità, e gli auanzi, ouero proue le porrai incontro a ciascuna quantità, e sotto l'altre proue come vedi, finche di tutte le quantità n'habbi tolto la proua. Fatto questo resta da vedere la concordanza di dette proue, se è simile alla proua della somma generale di detto sommare, e cominciando prima per 7. somma tutte le proue, ouero auanzi, che ti son venuti per il 7. cioè, 3. 3. 1. 4. 0. 2. 1. 4. fanno 18. del quale trarrai i settenarij, resta 4. e questo salua, ponendolo sotto il filo degli auanzi, ouero proue del 7. poi similmente trarrai tutti i settenarij, che sono dentro la somma generale, cioè parti 15411. per 7. vedrai che il suo auanzo, ouero proua farà 4. la qual concorda, & è uguale al 4. che di sopra saluasti, più o meno di 4. che fusse stata la proua della somma generale, concludentemente haueremo detto, che tal somma generale fusse stata male. Resta hora a vedere se la proua della somma generale concorda con la proua del 9. Laonde sommerai insieme tutti gli auanzi, ouero proue, che ti venne per il 9. cioè 4. 6. 8. 4. 1. 4. 8. 3. fanno 39. che la sua proua per 9. è 3. e questo salua, di poi somma insieme le figure della somma generale, cioè 15411. fanno 12. che la sua proua per 9. è 3. il qual concorda col 3. che sopra saluasti. Laonde, per quanto ci mostrano le dette proue possiamo dire, che le sopradette quantità sian benissimo sommate, e così puoi procedere date stessi in molte altre somme, senza che più oltre ci estendiamo.

Lir. 6 5 8 3. per 7.	3. per 9.	4.
2 7 6.	3.	6.
8.	1.	8.
3 4 0 6.	4.	4.
5 3 2.	0.	1.
2 3.	2.	5.
8.	1.	8.
4 5 7 5.	4.	3.
1 5 4 1 1.	1 8.	3 9. — 3.
	4.	

Del Sommare Lire, Soldi, e Denari.

Perche spesse volte ai Mercanti trafficando in diuersi luoghi cō diuersi Mercanti gl'occorre sommare, sottrarre, multiplicare, e partire varie, e diuerse sorti di monete, pesi, e misure, perciò ci par cosa conueniente dimostrare il modo che deouon tenere, & in che maniera si deouon reggere; e prima diremo del sommare lire, soldi, e denari, come se haueſſimo a sommare tutte le quantità di lire, che vedi poste qui da piede. Quando hauerai accomodato tutte le quantità gradatamente vna sotto l'altra, mettendo i denari, sotto a' denari, & i soldi sotto i soldi, e le lire sotto le lire, cō bellissimo modo, il quale de uesi osservare in tutte le somme da farsi, mettendo sempre la cosa simile sotto al suo simile, perche altrimenti facendo genereresti confusione; deui sempre cominciare a sommare dalla minor moneta, o peso, o misura; cioè dal primo filo di man destra, che in questa nostra somma faranno i denari; Laonde contando il detto filo de' denari di giù in su, ouero di su in giù faranno 46. de' quali bisogna farne soldi, e perche ogni 12. den. fanno vn soldo, diremo, che li detti 46. den. fieno 3. sol. e 10. den. li quali 10. den. metterai sotto il filo de' den. tirādo prima vna linea a trauerso, e saluerai sol. 3. i quali sommerrai cō il filo de' sol. dicēdo, 3. ch'io ho saluato, e 7. fà 8. e 3. fà 11. e 1. fà 12. e 8. fà 20. e 6. 26. e 8. fà 34. e 7. fà 41. e 5. fà 46. & a questo aggiungi tutte le decine, che hai lasciate, le quali son 6. cioè 60. soldi, che sommati con 46. fanno sol. 106. de' quali bisogna farne lire, e perche ogni 20. sol. sono vna lira, i sopradetti sol. 106. faranno lir. 5. sol. 6. poni sol. 6. sotto il filo de' sol. e salua 5. lir. le quali sommerrai con il primo filo delle lire verso man destra, del qual filo la sua somma è 48. poni 8. e salua 4. decine, le quali sommerrai con il scōdo filo delle lire, venēdo verso mā sinistra, nel modo che habbiamo dimostrato nel primo sommare di lire, sol. e den. trouerai che questa presente sōma scenderà al numero di lir. 2258. sol. 6. den. 10. e così con il medesim' ordine potrai sommare, ouero raccorre diuerse quantità. Auuertendo ciascuno che desidera, e vuole a tal professione attēdere, & in essa far frutto in breue, di mandar prima a memoria le librettine dell' Abbaco, perche fanno l'operante più pronto, e sicuro nell'operare, e di più sà bisogno trouar qualche persona introdotta in queste discipline, la quale gli dimostri i principij con facilità; i quali principij non vorrebbero esser meno, che fino all'intelligenza di rotti, e poi l'operante da per sè sarà securissimo (con lo studio) di apprendere tutto quel che si contiene nella pratica d'Aritmetica, perche tutt' i principij sono difficili, & hanno bisogno di qualche dimostratione.

			5.	
			3.	
lir. 656.	sol. 19.	den. 8.	proua per 9. — 2.	
325.	7.	6.		6.
52.	8.	4.		6.
9.	16.	10.		4.
354.	18.	7.		7.
6.	11.	0.		6.
7.	13.	3.		3.
844.	15.	8.		5.
lir. 2258.	6.	10.	40.	4. Fiori

Per la che habbiamo dimoſtrato il modo, che ſi deuẽ eſſeruare nel ſommare più quantità di lire, ſoldi, e denari, reſta che dimoſtriamo il modo di prouare per la proua del 9. o del 7. ſe le dette ſomme generali ſtanno bene, o no: come per eſempio, noi vogliamo prouare per la proua del 9. ſe la ſopradetta ſomma da noi fatta ſta bene, o male; prima comincia a prouare la prima partita, ouero quantità, che lir. 656. ſol. 15. den. 8. parti 656. per 9. e quel che ne viene per la partitione laſſalo andare, e tieni a niente l'auanzo, ma per più facilità, ſomma inſieme le figure di 656. fanno 17. getta via il 9. o quanti nouennarij ci fuſſe, e ſerba l'auanzo, che di 17. gettando via 9. reſta 8. e queſte ſono lire, delle quali biſogna far ſoldi, che ſono ſol. 160. & a queſti aggiungi ſol. 15. della ſua partita, fanno ſol. 175. che la proua di 175. per 9. è 4. e queſti 4. ſon ſoldi, de' quali biſogna far denari, ſono den. 48. & a queſti conuienẽ aggiungere gli 8. den. della prima partita, fanno denari 56. del quale la proua per 9. è 2. e queſto poni di contro alla prima partita, come vedi, e con il medefimo modo prouerai tutte l'altre quantità, ponendo ſempre l'auanzo de' nouennarij dicontro alla ſua partita; e quando haurai finito di prouare tutte le quantità, ſomma inſieme tutte le proue, ouero auanzi, che ti ſon venuti per le dette quantità; i quali auanzi inſieme giunti fanno 40. del quale prendi la proua per 9. farà 4. e queſto ſalua. Reſta hora a vedere ſe la proua per 9. di tutta la ſomma generale, che è lir. 2258. ſol. 6. den. 10. concorda col 4. che hai ſaluato, piglia adunque la proua per 9. di detta ſomma generale, nel modo che di ſopra la prendeſti d'ogni quantità, trouerai che la detta proua farà 4. la qual concorda col 4. che ſopra ſaluadeſti, più, o meno che fuſſe venuto di 4. nella proua della ſomma generale, la detta raccolta ſi poteua dire, che fuſſe ſtata mal ſommata.

Per altro modo più commune, & uſitato, ſi può prouare detta ſomma, cioè con la ſottrattione, ſommando inſieme tutte le quantità di detto ſommare, eccetto o la prima, e della ſomma generale di tutte le quantità, cauife ne la ſeconda ſomma fatta ſenza la prima quantità, & il reſiduo deue eſſer eguale alla quantità, come per eſempio, la ſomma generale di tutto il noſtro ſommare, noi ſappiamo che è lir. 2258. ſol. 6. den. 10. e la ſomma delle medefime quantità, eccetto la prima, è lir. 1601. ſol. 11. den. 2. le quali tratte di 2258. ſol. 6. den. 10. reſtano lir. 656. ſol. 15. den. 8. che ſono vguagli alla prima partita del noſtro ſommare, e coſi ſi può prouare d'ogni quantità, più per paſſatempo, che per biſogno; ma la vera proua del ſommare è ſaper contar bene, e preſto di giu in ſu, e di ſu in giù, e veder ſe ſcontra vna volta, come l'altra.

Del Sòmmare Ducati, Lire, Soldi, e Denari, & altre diuerſe quantità.

Accadendo ſommare ducati, lire, ſoldi, e denari, ouero fiori ni, ſoldi, e denari, o libbre, oncie, e danari, o canne, braccia, e quarti, o marchi, oncie, danari, e grani, o moggia, ſtaia, e quarti, ſecondo la diuerſità di paefi, offrua ſempre queſt' ordine, come per eſempio, ſe ti accadeſſe ſommare inſieme più partite di ducati, lire, ſoldi, e denari; delle quali lire (mettiano che il ducato ne vaglia 7. e la lira vale ſempre per tutto ſoldi 20. & il ſoldo vale dodici denari. Queſto inteſo, aſſetta le tue partite vna ſotto l'altra, come vedi, cioè i denari ſotto denari, i ſoldi ſotto i ſoldi, le lire ſotto le lire, & i ducati

erai sotto i ducati, e quel che noi diciamo d'vn sommare, facilmente intenderai d'ogn' altro. Fatto questo, comincia sempre a sommare il filo de' denari, come di minor valore, faranno denari 28. de' quali ti conuien far soldi, che sono soldi 2. den. 4. quali den. 4. poni sotto il filo de' denari (tirando prima vna linea a trauerso) e salua sol. 2. dipoi somma il filo de' soldi, che sono soldi 49. ai quali aggiungi soldi 2. che saluasti, fanno sol. 51. che sono lir. 2. sol. 11. poni sol. 11. sotto il filo de' soldi, e salua lir. 2. le quali sommerai cò il filo delle lire, faranno in tutto lir. 22. delle quali farai ducati, che sono duc. 3. li quali aggiungerai alla somma de' duc. sommandoli tutti insieme, nel modo, che di sopra s'è detto delle lire, e vedrai che tutta la general somma farà Duc. 188. lir. 1. sol. 11. den. 4. e così senza che più ci stendia, o a dimostrar altre varietà di sommare, queste ti serviranno per guida, e scorta à saper racorre ciascun' altro.

sc. 38.	lir. 5	sol. 12	den. 8
57	6	8	4
32	4	16	8
58	5	12	8
sc. 188	lir. 1	sol. 11	den. 4.

Del Sottrarre. *Alto Terzo.*

HAuendo noi a bastanza trattato del sommare di diuerse cose, segue che dimostriamo il modo, che si deue offeruare nel sottrarre, ch'è il terzo atto delle nostre diuisioni. Il sottrarre adunque non è altro, che conoscere la differenza tra due numeri, li quali vanno tratti l'vno dall' altro, sì che di necessità bisogna che l'vno sia maggiore dell' altro, o almeno vguale, ma non si potrà giamai trarre vn numero maggiore da vn numero minore. Ma perche in detta operatione di sottrarre s'vsa in diuersi modi, si come in molte altre propositioni, & a ciascuno par più bell' ordine, e facile quello doue s'è assuefatto, & habituatato, che quello del quale non ha pratica, o cognitione alcuna, e quel ch'è peggio alcuni biasimano ogn' altro modo di operare, ancorche sia meglio di quello che vñano essi, e perciò noi diremo a quei tali, come prouerbialmente si dice, *Sordibus imbuti nequeunt dimittere fordes*. Hora tornando al proposito nostro, noi diciamo, che in tre modi può accadere d'hauere a trarre vn numero da vn' altro numero, ma per maggiore intelligenza, il numero maggiore lo chiamaremo debito, & il minore credito. Il primo modo, che può accadere d'hauere a sottrarre è questo, cioè, che tutte le figure del num. del debito possono esser maggiori che le figure del numero del credito. Il secondo modo che può accadere è, che le figure del credito possono esser vguale in potenza alle figure del debito, & ancora maggiori, ma quando fusse maggiore il credito, del debito, bisognarebbe porre il credito di sopra, e il debito di sotto. Il terzo modo, che può accadere è, che il debito sia maggiore in potenza del credito, ma le figure possono esser maggiori (eccetto la prima di man sinistra) che non sono le figure del debito, come per due esempi vedi qui di sotto. Hor poniamo che volessimo trarre 5455. da 5689. poni il maggior numero di sopra, & il minore di sotto, dipoi comincia da man diuiata, dicendo 5. di 9. resta 4. ouero, di

9. caua

9. caua 5. resta 4. il qual poni sotto il detto 5. tirando prima vna linea a trauerso, dipoi verrai verso man sinistra, e dirai cosi, 5. di 8. resta 3. il qual poni sotto al detto 5. poi venendo più auanti, dirai 4. di 6. resta 2. il qual poni sotto al detto 4. poi venendo più auanti, dirai 5. di 5. resta zero, e poni zero sotto al detto 5. & anco puoi far di non ponere il detto zero, perche vien da man sinistra, che niente accrefce al detto resto; onde diremo, che a trarre 5455. di 5689. resta 234. e questo si dimanda resto, o differenza.

Il secôdo modo di sottrarre è, se cauare vn numero da vn' altro numero, che sieno vguali in potenza, come per essempio, se tu volessi trarre 160. di 160. il restante sarà detto zero, ouero nulla, perche conuiene ritirar da man destra, e dirai cosi, zero di zero, resta zero, 6. di 6. resta zero, e 1. di 1. resta zero.

debito	5 6 8 9.	proua per 7-5	1 6 0.
credito	5 4 5 5.	2	1 6 0.
resto	2 3 4	3 3	0 0 0.
concordi.			

HAuendo dimostrato il modo di sottrarre vn numero minore da vn numero maggiore, & vn numero vguale da vn' altro numero senza l' aiuto del prestare, resta, che dimostriamo il terzo modo, il quale sarà questo, cioè; Vno deue hauere da vn' altro lire 7052. delle quali n' ha hauute lire 5698. e vogliamo sapere quante ne resta hauere: fa così, poni sempre per regola generale il debito di sopra, cioè il maggior numero, & il credito, cioè il minor numero mettilo di sotto; si come vedi, che in questa habbiamo posto, ma quando il credito fusse maggiore del debito, all' hora poni il credito di sopra, & il debito di sotto, fatto questo comincia da man destra, dicendo 8. di 2. non si può trarre, conosciuto che di 2. nō si può cauare 8. e tu sempre per regola generale aggiungi vna decina al 2. che stā di sopra, quando però tutte le figure di sotto faranno d' vna medesima specie, e natura delle figure di sopra, hora aggiungendo 10. a detto 2. farà 12. del quale trattone 8. che gli stā sotto, resta 4. e questo poni sotto al detto 8. tirando prima vna linea a trauerso, dipoi venendo più auanti verso man sinistra, trouerai il 9. e perche il detto 9. son decine, bisogna aggiungerli quella decina, che si prestò al 2. adunque se aggiungerai vna decina alle dette 9. decine faranno 10. e così dirai 10. di 5. non si può trarre, per il che conuiene aggiungere vna decina al detto 5. farà 15. e poi dirai 10. di 15. resta 5. e poni 5. sotto al 9. dipoi venendo più auanti trouerai il 6. al quale aggiungi 1. perche prestasti vna decina al 5. farà 7. e poi dirai 7. di zero, non si può trarre, laonde ti conuiene aggiungere vna decina al detto zero per modo di sommare, farà pur 10. e dirai 7. di 10. resta 3. e poni 3. sotto al 6. dipoi vieni più auanti, trouerai il 5. al quale aggiungerai 1. perche prestasti vna decina al zero, farà 6. e dirai 6. di 7. resta 1. e poni 1. sotto il 5. e così, hauremo tratto 5698. di 7052. & habbiamo trouato che resta 1354. Habbi questo per regola generale, che quando la figura di sotto è maggiore della figura di sopra, ti conuiene sempre aggiungere 10. alla figura di sopra, e poi cauare la figura di sotto, e quel che resta, poni; & ogni volta che haueraai prestato il 10. alla figura di sopra, trattone la figura, che gli stā sotto, e posto quel che resta, ti conuiene sempre tene-

re uamente 1. il qual 1. è di necessità, che tu l'aggiunga alla seguente figura di sotto verso man sinistra, e quest'ordine o Terna in tutte le sottrattioni che farai, essendo però le figure d'una medesima specie, cioè tutti ducati, o lire, o libbre, o braccia, &c. come sopra s'è detto.

Debito.	7 0 5 2.
Credito.	5 6 9 8.
	—
Resto.	1 3 5 4

Delle proue del Sottrarre.

PRima, che si venga alla dichiarazione, e dimostrazione del modo, che si deue osservare nel sottrar de' numeri, che siano di diuerse nature, par cosa conueniente di mostrar prima il modo di prouare, se le sottrattioni auanti fatte stanno bene, o no, e prima per la proua generale, & infallibile intendiamo prouarle; Nella prima proposta adunque del nostro sottrarre si pose, che il debito fusse 7052. & il credito 5698. & il resto 234. diceſi, che la proua generale, & infallibile ſia questa, cioè, ſommare il resto insieme con il credito, ſomma adunque 5698. di credito con 234. di resto, trouerai che farà 5889. che è uguale al debito; più, o meno che faceſſe la detta sottrattione diremmo, che ſteſſe male. Ma volendo prouare tal sottrattione per la proua del 7. o del 9. fa così, e prima per la proua del 7. piglia la proua di 5889. che è 8. e poi piglia la proua di 5698. che è 2. di poi cauua queſte due proue l'una dall'altra, cioè 2. di 8. reſta 3. e queſto ſalua; di poi piglia la proua del resto, cioè di 234. che farà apunto 3. il qual concorda con il 3. che ſaluaiſti; più, o meno che fuſſe ſtato di 7. la proua del resto; il detto sottrarre ſi diceua che fuſſe mal ſoluto. Prouiamolo hora per la proua del 9. prendi la proua di 5889. che è 1. e ſimilmente la proua di 5698. è 1: di poi cauua queſte due proue l'una dell'altra, cioè trahi 1. di 1. reſta zero, e queſto ſalua; hor piglia la proua per 9. di 234. cioè del resto, la qual ſimilmente è zero, che concorda con il zero, che ſaluaiſti, e perciò diramo, che la detta sottrattione ſia bene.

Ma è molto da conſiderare alla diuerſità delle proue, ouero quante, che poſſono ſuccedere, o per 9. o per 7. & acciò non ti conſondeli per te ſteſſo, porremo qui l'eſſempio. Se per caſo tu uoleſſi la proua d'un sottrarre, o per 9. o per 7. e che il numero maggiore, cioè il debito ti rendeſſe in quantità u. inor proua, che non faceſſe il numero del credito, come ſe tu uoleſſi prouare la sottrattione di 2687. del 3456. che reſta 769. prendi la proua di 3456. come maggior numero, cioè debito, che la ſua proua è zero, ſimilmente piglia la proua di 2687. come minor numero, o vogliamo dir credito, che la ſua proua è 5. hora tu hai, che la proua del maggior numero è zero, e la proua del minore è 5. hor per vedere la certezza di dette proue, douerai cauare 5. di zero, la qual coſa è impoſſibile, e perciò in queſti ſimili caſi, cauua il detto 5. della proua, che te l'ha dato, cioè di 9. reſta 4. e queſto ſalua; hor ſe piglierai la proua del resto, cioè di 769. farà ſimilmente 4. il qual concorda col 4. che ſaluaiſti.

E volendo prouare la detta sottrattione per la proua del 7. piglia la proua di

346. che è 5. e questa è la proua del numero maggiore, dipoi piglia la proua di 2687. che è 6. & è la proua del numero minore: hor ti conuerrebbe trarre 6. di 5. ma perche non si può trarre, come si doueria, bisogna trarre 5. di 6. che resta 1. e questo lo deuì trarre della proua, che te l'ha dato, cioè di 7. resta 6. e questo salua; dipoi prendi la proua del resto di detta sottrattione, cioè di 759. la proua del quale per 7. farà similmente 6. il qual concorda col 6. che saluasti, più, o meno di 6. che fusse venuto di proua dal sopradetto resto, la detta sottrattione si poteua considerare, che stesse male.

Debito	3 4 5 6.	proua per 9—0.	per 7—5.
Credito	2 6 8 7.	5.	6.
Resto	7 6 9.	4—4.	1. 6. 6.

Del Sottrarre Lire, Soldi, Denari, & altre diuerse nature.

HAuendo a sottrarre lir. 587. sol. 18. den. 7. di lir. 846. sol. 13. den. 5. Prima accomoda il maggior numero di sopra, & il minore di sotto, mettendo le lire sotto le lire, i soldi sotto i soldi, & i denari sotto i denari, dipoi comincia a sottrarre dalla minor moneta, ouero cosa, la quale sarà sempre da man destra d'ogni sottrattione, che vorrai fare. Onde in questa comincerai dai denari, e dirai così 7. di 5. non si può trarre, perciò bisogna porger aiuto alli detti 5. denari, acciò se ne possa trarre 7. E se nel sopradetto sottrarre di lire senza soldi noi prestauamo 10. alla figura di sopra, quando non se ne poteua trarre la figura di sotto, lo faceuamo giuditiosamente, atteso che tutte quelle figure erano d'vna medesima natura, ma perche in questa sottrattione concorrono diuerse nature, ci conuiene hauere altro rispetto, perciò che appresso li denari noi habbiamo li soldi, e però bisogna prestare vn soldo, cioè 12. denari alli 5. denari di sopra, e faranno denari 17. de' quali caua li 7. denari, restano denari 10. questi poni sotto a i detti 7. denari, tirando prima vna linea a trauerso, dipoi venendo più auanti alli soldi, trouerai soldi 18. ai quali bisogna aggiungere vn soldo, il quale prestasti alli 5. denari, e faranno soldi 19. e dirai 19. di 13. non si può trarre, e perciò bisogna porgere aiuto alli 13. soldi, acciò che se ne possa trarre soldi 19. e perche appresso li soldi vi sono le lire, però presterai vna lira, cioè soldi 20. alli detti soldi 13. faranno 33. de' quali benissimo si può trarre soldi 19. restano soldi 14. li quali poni sotto li sol. 18. dipoi procedi più auanti alle lire, e perche prestasti vna lira alli soldi 13. di sopra, bisogna dare vna lira alli 7. lire di sotto, che è la prima figura delle lire appresso li soldi, e faranno lire 8. dipoi dirai 8. di 6. non si può trarre, perche bisogna prestare vna decina al 6. di sopra, e farà 16. &c. osserua hora il modo, che nel sottrarre delle lire habbiamo poco prima dimostrato, e vedrai, che per detta sottrattione ti resterà lire 28. sol. 14. den. 10. fanno la proua generale, sommando il resto insieme con il credito, trouerai, che ti renderà la somma del debito principale.

Debito	lir. 8 4 6. fol. 13. den. 5.	per 9.	8.
Credito	lir. 5 8 7.	18.	7.

Resto	2 5 8.	14.	10.	7.	7.
proua	8 4 6.	13.	5.	Concordi	

	10.		24.		4.
Moggia	350.	flaia	13.	quarto	2.
	86.		18.		3.
Restano moggia	263.		18.		3.

	10		7		20		12
Ducati	450.	lir.	3.	fol.	12.	den.	4.
	275.		5.	fol.	17.	den.	10.
Restano ducati	174.	lir.	4.		14.		6.

Il medesimo ordine offeruerai nelle sottrattioni d'altre monete, o pessi, o misure, purchè tu sia consapevole delle lor parti, e diuisioni, acciò che tu possa prestare alle figure di sopra (quando n'haueranno bisogno) quella quantità che conuiene. Nelle proue poi di qualsiuoglia sottrattione, seruiti di quella generale, come di sopra habbiamo dimostrato, e se più oltre non ci estendiamo a dimostrare molte altre varie sottrattioni, pensiamo, che alli peregrini ingegni dotati d'un buono, e natural discorso, & a queste scienze inclinati, sieno a bastanza le sopradette, e quelli, che in questi casi sono grossi d'ingegno, sforzinsi di andare al precettore; altrimenti s'affaticheranno in vano, e si confonderanno il ceruello.

Diffinitione del Multiplicare.

Seguita il quarto atto, che è il Multiplicare, il quale non è altro, che moltiplicare due numeri l'vno via l'altro, cioè produrre vn numero contro vn altro numero, de' quali ne risulta vn'altro terzo numero, che se li dice prodotto. Multiplicare vn numero via vn'altro numero (secondo Euclide nel settimo, diffinition quinta) non è altro che tante volte aggiungere il numero moltiplicando, quante vnità sono nel numero moltiplicante; per la qual diffinitione si manifesta qualmente il moltiplicare, non è altro, che sommare, benchè in atto paiono diuersi, e molti mal'esperti del moltiplicare si seruono del sommare nelle loro occorrenze; come per essemplio occorrendogli moltiplicare 5. via 46. metterebbono cinque volte 46. cioè l'vno sotto l'altro, e poi lo sommerebbono insieme, e così haueriebbono moltiplicato il detto 46. via cinque per hauerlo tolto tante volte, quante sono l'vnità del moltiplicante, e questo è

quelle vuole inferire il multiplicare, la somma del quale si dice prodotto, ouero multiplicatione. E sappi, che quando si multiplica vn numero contro l'vnità, è necessario che produca il medesimo numero, si come per il Megarense nel settimo, e nella settima concectione dell'animo si manifesta.

	$\begin{array}{r} 46 \\ 46 \\ 46 \\ 46 \\ 46 \\ \hline 230 \end{array}$	$\begin{array}{r} 46 \\ 46 \\ 46 \\ 46 \\ 46 \\ \hline 230 \end{array}$
prodotto	2 3 0	somma 2 3 0 o vero prodotto.

Del Multiplicare. Atto quarto.

NEl multiplicare vn numero contro vn'altro numero, varij, e diuersi modi modi si offeruano, & a chi piace vno, & a chi vn'altro, secondo che si sono offeruiti. Ma noi intendiamo di dimostrar solamente quei modi più facili, e che per lo più sono offeruati, e messi in vso, e lasceremo da banda tante, e multiplie per gelosia, o martello, & altre girandole di ripieghi, e scapezzi; e prima dimostreremo il modo di multiplicare per schacchieri usato nel Venetiano, e per tutta Lombardia, il quale in Toscana si dice multiplicar per Bericucolo; come per effempio se volessi multiplicare 46. via 5. il che altro non si domanda voler sapere, se non quanto fa a sommare insieme cinque volte 46. ouero 46. volte 5. come di sopra habbiamo detto, la qual cosa volendo saper con prestezza, farai così, poni 46. che è il maggior numero, e di sotto poni 5. che è il minore, dipoi tira vna linea a trauerlo, come vedi, fatto questo dirai così, 5. via 6. ouero 6. via 5. (che è il medesimo) fa 30. del quale poni il zero, e salua le 3. decine, dipoi dirai 5. via 4. ouero 4. via 5. fa 20. & a questo aggiungi le tre decine, che saluasti, farà 23. e perche non ci sono altre figure da multiplicare, poni 23. appresso il zero, che prima ponesti, starà così 230. e questo diremo, che sia il prodotto del multiplicare 46. via 5. Nota che la figura di sotto si deue multiplicare con tutte quelle figure, che gli son sopra a vna per volta, e fino quante si vogliono, dicendo, ancora che quando hauerai a multiplicare vna figura contro a vn zero, farà sempre zero, come per effempio, se volessi multiplicare 7104. via 8. prima poni 8. sotto il 4. della quantità che vuoi multiplicare, dipoi tira vna linea sotto, come s'è detto. Fatto questo dirai così 4. via 8. fa 32. poni 2. e salua 3. decine, poi dirai, 8. via zero, fa zero, al quale se aggiungi le 3. decine che saluasti (per modo di sommare) farà pur 3. poni 3. e non tener a mente cosa alcuna, poi dirai 8. via 1. ouero 1. via 8. fa 8. poni 8. e poi dirai 7. via 8. fa 56. e perche non ci sono altre figure da multiplicare, poni il detto 56. e così hauerai multiplicato 7104. via 8. il prodotto del quale sarà 56832. come vedi.

	$\begin{array}{r} 7104 \\ 8. \\ \hline 56832 \end{array}$	
prodotto	5 6 8 3 2.	

Del

Del Multiplicare per Bericucolo, ouero Scacchieri.

H Auendo dimostrato come si multiplichi vn numero di più figure, via vna figura sola, dimostraremo hora, come si multiplichi vn numero. di più figure, via vn'altro numero di più figure; come per essemplio, se volessi multiplicare 986. via 534. Prima poni il numero minore sotto il numero maggiore gradatamente; dipoi multiplica l'ultima figura del minor numero, che è la prima di man destra, cioè 4, via tutto il numero maggiore, a vna figura per volta, cominciando dalla prima di man destra, & andando verso man sinistra, come s'è detto di sopra, farà 3944. il quale metti sotto a vna linea già tirata; il che fatto darai di penna al 4. per dimostrare, che quella figura s'è multiplicata, e così farai a tutte l'altre, acciò non ti venissero multiplicare più volte; dipoi multiplica la seconda figura del numero minore, che è 3. via tutto il maggior numero, col medesimo ordine, farà 2958. e questo poni sotto a 3944. ma con tal'offeruanza, che l'8. della seconda multiplicatione, venga posto sotto le decine della prima multiplicatione del 4. di maniera che resti sempre vna figura a man dritta, senza porui alcuna figura sotto; dipoi multiplica la terza figura del numero minore, che è 5. via tutte le figure del maggior numero. farà 4930. e questo lo porrai sotto la multiplicatione di 3. lasciando vna figura verso man destra, come vedi, e così hauerai finito di multiplicare le tre figure del numero minore, via tutte le figure del numero maggiore. Resta hora a sommare queste tre multiplicationi, tirando prima vna linea sotto, e cominciando da man destra, dirai così, 4. e poni 4. poi vieni alle decine verso man sinistra, e dirai 8. e 4. fa 12. poni 2. sotto il filo delle decine, e tieni vna decina, poi vattene alla fila delle centinaia, e dirai 5. e 1. che salui fa 6. e 9. fa 15. poni 5. e tieni 1. poi vattene alle migliaia, e dirai 3. e 1. che salui fa 4. e 9. fa 13. e 3. fa 16. poni 6. e salua 1. poi vattene alle decine delle migliaia, e dirai 9. e 1. che salui fa 10. e 2. fa 12. poni 2. e salua 1. poi vattene alle centinaia delle migliaia, e dirai 4. e 1. che salui fa 5. e poni 5. e così hauerai sommato detta multiplicatione; Onde dirai, che a multiplicare 986. via 534. faccia 526524. e con tal'ordine procederai in ogni multiplicatione di maggior quantità di figure.

$$\begin{array}{r}
 986 \\
 534 \\
 \hline
 3944 \\
 2958 \\
 4930 \\
 \hline
 526524
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 5 \\
 6 \\
 3
 \end{array}$$

Della proua della Multiplicatione auanti fatta.

V Otendo prouare la multiplicatione auanti fatta, per la proua del 9. farai così; prima tira due linee picciole in croce, come vedi, dipoi togli la proua di 986. sommando insieme le dette figure fanno 23. che gettati via li 9. che dentro vi sono, resta cinque di proua, e questo poni in cima della crocetta,

B 3

dipoi

dipoi togli la proua per 9. di 524. sommando le figure nel medesimo modo, trouarai, che auanza 2. di proua, e questo poni a piè della crocetta. dipoi moltiplica il 5. auanzo della prima proua via il 3. auanzo della seconda, fa 15. e di questo getta via il 6. che dentro vi sono, resta 9. e questo poni al braccio d'istesso. Il sinistro qual più ti piace della crocetta già fatta, e con questo 6. si detra con ordine l'auanzo della proua del prodotto di detta moltiplicatione, pre-di adunque la proua per 9. di 524. sommandq le figure come di sopra, fanno 24. dal quale tratto li 9. che dentro vi sono, resta 6. e questo poni all'altro braccio della crocetta, rincontro all'altro h. dell'altro lato; di maniera che se la figura del braccio dextro della crocetta, cioè li proua della moltiplicatione delle due proue, fa 6. (si conte a adesso) di necessità la proua del prodotto di tutta la nostra moltiplicatione, conuiene che sia 6. perche deue esser concordate la proua de due auanzi con la proua del prodotto, & il medesimo modo osseruarai volendola prouare per la proua del 7. eccetto; che nella proua del 7. bisogna partire quei numeri per 7. i quali per la proua del 9. tu sommassi le loro figure; e questo sia per auuertimento.

Del Moltiplicare per Castelluccio.

Il moltiplicare per Castelluccio è vsato assai in Fiorenza, per esser molto simile al moltiplicare per l'addietro, che è il proprio vniuersal moltiplicare, ch'è vsa in detta Città; e perciò di mostreremo come si opera in ambedue; e prima diremo del moltiplicare per Castelluccio, il quale si fa in questo modo, cioè, volendo moltiplicare 5407. via 489. prima acconcia il numero maggiore di sopra, & il minore di sotto gradatamente, dipoi piglia il 9. delle cinque migliaia del numero di sopra, e moltiplicalo via tutto il numero di sotto, e perche pigliando il 9. del numero di sopra restano tre figure verso man destra, però poni tre zeri sotto a vna linea come vedi dipoi moltiplica il sopradetto 5. via ciascuna figura del numero di sotto, cominciando dal 9. di man destra, dicendo 5. via 9. fa 45. poni 5. a man sinistra di quei tre zeri, che prima ponesti, e salua 4. decine; dipoi dirai 5. via 8. fa 20. e 4. che saluasti fa 44. poni 4. e salua 4. decine; e poi dirai 5. via 3. fa 15. e 4. che saluasti fa 19. poni 9. e salua vna decina, dipoi dirai 5. via 4. fa 20. e 1. che saluasti fa 21. e poni interamente 21. per esser la fine della moltiplicatione del 5. via tutte le figure del numero di sotto, si come vedi. Fatto questo, moltiplica il 4. che è vicino al sopradetto 5. cioè le 4. centinaia, via tutte le figure di sotto nel medesimo modo, aggiungi prima due zeri alla detta moltiplicatione verso man destra, per rispetto delle due figure, che restano al detto 4. pur dalla destra; dipoi moltiplica il 3. che è uicino al detto 4. via tutte le figure di sotto una per uolta, aggiungendo un zero alla d. moltiplicatione; dipoi moltiplica il 7. vltima figura del numero di sopra via tutte le figure di sotto, & alla sua moltiplicatione nò gli aggiunger alcun zero, perche al detto 7. non resta niuna figura verso man destra da moltiplicarsi; e così hauerai finito di moltiplicare ciascuna figura del numero di sopra via ciascuna figura del numero di sotto. Resta hora a somare le dd. moltiplicationi insieme, e cominciando a ttratti dritta, segui l'ordine dimostrato auanti nel sommare più quantitate di verà 2426533. per la d. moltiplicatione. Volendo poi moltiplicare per l'addietro i sopradetti numeri, noi non li faremo altra dichiarazione, per esser l'operare conforme al moltiplicare del Castelluccio.

stalluccio, come chiaramente si può vedere; ma lo metteremo solamente con le figure d'Abbaco, il quale facilmente apprenderai, mediante la dichiarazione fatta di sopra.

Per Castelluccio

$$\begin{array}{r}
 5497 \\
 4386 \\
 \hline
 21945000 \\
 17556000 \\
 3950100 \\
 30723 \\
 \hline
 24126333
 \end{array}$$

Per l'adictro.

$$\begin{array}{r}
 5497 \text{ --- } 4386 \\
 1 \text{ --- } 1 \\
 \hline
 21945000 \\
 17556000 \\
 3950100 \\
 30723 \\
 \hline
 24126333
 \end{array}$$


Del Multiplicare per Crocetta, ouero Casella.

IL multiplicare per Crocetta è molto bello, ma alquanto difficile per li molti incrociamenti, che v'interuengono, massimamente quando si multiplicano più di tre figure, e perciò fa bisogno all'operante star con la mente molto detta; il qual multiplicare si fa in questo modo, come per essempio, volessimo multiplicare 68. via 87. Prima poni vn numero sotto l'altro, con quella crocetta in mezzo, e cominciando da mandritta dirai così 7. via 8. fa 56. poni 6. sotto la linea, e tieni 5. decine, poi multiplica in croce, e per vn verso dirai 8. via 8. fa 64. e per l'altro verso 6. via 7. fa 42. aggiungi insieme questi due prodotti fanno 106. & a questo aggiungi le 5. decine che tenesti farà 111. poni 1. e tieni 11. decine, poi multiplica l'vltime figure, cioè 6. via 8. fa 48. e 11. che saluasti fa 59. e poni 59. in luogo come di sotto vedi, e così sarà finita la detta multiplicatione.

$$\begin{array}{r}
 8 \quad 7 \\
 \times \\
 6 \quad 8 \\
 \hline
 5916
 \end{array}$$

Per sodisfare a molti di perspicace ingegno, dimostreremo ancora il multiplicare per crocetta con tre figure, il quale è assai più difficile del primo, e fassi in questa maniera; come se hauessi a multiplicare 536. via 268. accomoda vn numero sotto l'altro, ma alquanto larghi, acciò che si possino tirare le linee delle dimostrazioni, le quali ti dimostreranno quelle figure, che vanno multiplicare l'vna via l'altra, e comincia da man destra, dicendo 6. via 8. fa 48. poni 8. e salua 4. decine, poi per vn verso della prima crocetta dirai 6. via 6. fa 36. e per l'altro verso 3. via 8. fa 24. che giunto con 36. fa 60. e 4. che saluasti fa 64. poni 4. e salua 6. poi per la maggior croce dirai 5. via 8. fa 40. e 6. che saluasti fa 46. e per l'altro verso dirai 2. via 6. fa 12. che giunto con 46. fa 58. poi nelle figure del mezzo dirai 3. via 6. fa 18. che giunto a 58. fa 76. poni 6. e salua 7. poi alla seconda crocetta dirai 5. via 6. fa 30. e 7. che saluasti fa 37. poi per l'altro verso dirai 2. via 3. fa 6. che giunto a 37. fa 43. poni 3. e salua 4. poi per l'vltime figure dirai 2. via 5. fa 10. e 4. che saluasti fa 14. poni il detto 14. per c-

ferè il fine della multiplicatione, e così haueremo che a multiplicare 336. via 268. per crocetta farà 142648. la qual prouata per la prova del 9. o del 7. trouerai, che starà benissimo.



Quando vno per suo spaffo volesse fare vna multiplicatione, che il suo prodotto fussero tutte vnità, cioè tutte 1. multiplichì 143. via 777. e farà 111111. e quando volesse, che venissero tutti 2. dupli 143. fa 286. e questo multiplica via 777. fa 222222. e se volesse, che venissero tutti 3. tripli 143. farà 429. e questo multiplica via 777. farà 333333. e se volesse che venissero tutte 4. quadrupli 143. & il prodotto multiplica via 777. e così ti facci dell'altre figure &c.

Del Partire, Atto quinto.

HAuendo con ogni breuità a noi possibile ragionato sopra il numerare, sommare, sottrarre, e multiplicare, seguita che ragioniamo del quinto, & ultimo atto, che è il partire. Il partire adunque non è altro che proposti due numeri, del quale il minore intendiamo, che sia partitore del maggiore, ouero vguale, quando di tal partitione ne deua peruenire interi, e sappi che di esso partire ne riesce sempre vn'altro numero, che si dice preueniente, o auuenimento di tal partire, il quale tante volte entra nel numero partito, quante vnità contiene in se il partitore. Laonde di necessità in detto partire v'intrauiene tre numeri, il primo de' quali è il numero, che noi vogliamo partire, il secondo numero è il diuisore, ouero partitore, & il terzo numero è l'auuenimento di tal partire. Dalla qual cosa nasce, che il numero il quale vogliamo partire, bisogna che sempre sia maggiore, o vguale al partitore, volendo, che di tal partire ne venga interi: altrimenti ne verrà rotti, e perche il più delle volte in ciascun partire (fuor dell'auuenimento dell'interi) ne peruiene qualche auanzo, il qual noi chiamiamo rotto, o rotti; però fa bisogno al principiante saper conoscere i rotti, e come s'habbino a scriuere, acciò che quando partirà vn numero per vn'altro numero, sappia scriuere l'auuenimento degl'interi, e de' rotti, come per esempio, se hauesse a partire 10. per 3. la qual cosa non altro vuol dire che questo; cioè, fammi di 10. tre parti vguali; per il che conuiene inuestigare quante volte il 3. entra in 10. trouerai che entra tre volte, & auanza 1. e questo auanzo lo metterai sopra vna linea, e sotto detta linea metterai il partitore, cioè 3. starà così $\frac{1}{3}$. e questo sarà vn rotto; perciò che rotto non è altro, che quantità auanzata nel partire, nella quale il partitore non può interamente entrare, allora quella quantità auanzata è detta denominata, & il partitore è detto denominatore, e la quantità denominata sarà sempre parte del nominatore. Il prodotto

pradetto rotto adunque che sia così $\frac{1}{2}$, dirà vn terzo, cioè la terza parte d'vna cosa, & hauendo a partir 15. per 4. troua quante volte il 4. entra in 15. trouerai, che v'entra tre volte, & auanza 3. il qual auanzo segnerai così $\frac{3}{4}$. con il suo partitor sotto, e dirà tre quarti, e partendo 15. per 2. ne vien 7. & auanza 1. cioè $\frac{1}{2}$, il quale si segna così $\frac{1}{2}$. e partendo per tre qual si voglia numero, l'auanzo sarà vn terzo, o due terzi, che più non può auanzare, e partendo per 4. gli auanzi faranno quarti, e per 5. faranno quinti, e per 6. faranno sesti, e per 7. faranno settimi, e per 8. faranno ottavi, e per 9. faranno noni, e per 10. faranno decimi, e per vndici faranno vndicesimi, e per 25. faranno vnticinesimi &c. le quali cose intese, e ben considerate, più facilmente intenderai ogn'altra sorte di rotte.

Del partire per tessa, ouero per colonna.

IL primo modo del partire, che nelle scuole s'efferciti da' fanciulli, è il partire per tesse, ouero per colonna, i quali sono vna cosa stessa, ma con partitori semplici, cioè da 2. per fino a 9. & anco con numeri composti per fino a 19. come per effempio, se ti fusse detto, parti 9876. per 2. prima acconeia il numero che vuoi partire doue più ti piace, dipoi metti il partitore, cioè 2. in luogo, che ti sia facile il poterlo vedere a tua posta, perche noi in tutte le nostre operationi metteremo il partitore a man sinistra, rinchiuso da vna linea curva, appresso di quel numero, che vogliamo partire. E perche nel sommare, sottrarre, e multiplicare habbiamo cominciato a operare dalle prime figure di man destra, e finito dalla sinistra. In questo quinto, & vltimo atto, che è il partire, cominceremo da man sinistra, e finiremo dalla destra; laonde essendo il nostro partitore 2. dirai così, quanti 2. entra in 9. (che è la prima figura sinistra della quantità, che vogliamo partire) trouerai, che v'entra 4. volte; & auanza 1. segna 4. sotto il 9. e l'1. che s'è auanzato consideralo dal lato sinistro dell'8. figura seguente da partirsi, dirà 18. nel quale deu' vedere quante volte vi può entrare il 2. tuo partitore, trouerai che v'entra 9. volte apunto, il quale segna sotto l'8. dipoi procedi alla figura seguente, che è 7. dicendo quanti 2. entra in 7. v'entra 3. volte, poni 3. sotto il 7. & auanza 1. il quale imaginati che sia dal lato sinistro del 6. dirà 16. nel quale il 2. entra 8. volte apunto, segna 8. sotto il 6. & hauerai che a partire 9876. per 2. ne viene 4938.

$$2) \ 9 \ 8 \ 7 \ 6.$$

$$4 \ 9 \ 3 \ 8.$$

E dicendosi parti 3587. per 4. rinchiusi con vna linea curva il 4. tuo partitore, come di sopra s'è detto, dipoi dirai così, quante volte il 4. entra in 3. prima figura di man sinistra del numero che vuoi partire, tu vedi che non vi può entrare alcuna volta, perche noi diremo, che auanza il detto 3. che col 5. che gl'è vicino dirà 35. hor vedi quante volte il 4. tuo partitore entra in 35. trouerai che v'entra 8. volte, & auanza 3. segna 8. sotto il 5. & il 3. auanzato imaginatelo dal lato sinistro dell'8. figura seguente, e farà 38. hor di nouo vedi quante volte il 4. entra in 38. trouerai che v'entra 9. volte, & auanza 2. sotto l'8. & il 2. che è auanzato imaginatelo auanti alla 7. figura seguente dirà 23. troua hora quante volte il 4. entra in 23. trouerai, che v'entra 5. volte, & auan-

za. poni 5. sotto il 3. & il 3. auanzato ponilo sopra vna linea dal lato destro, e il 4. tuo partitore segnalo di sotto, starà così. onde dirai, che a partire 2587. per 4. ne viene 895. $\frac{3}{4}$. per detta partitione.

$$\begin{array}{r} 4) \quad 3 \ 5 \ 8 \ 3 \\ \underline{8 \ 9 \ 5} \end{array}$$

Con il medesim' ordine si può partire ciascun numero per tutti quei numeri, che le loro multiplicationi s'habbino alla memoria, così composti, come semplici, ma nelle scuole, doue si costuma insegnare queste regole, non s'usa il partire per testa, che il suo partitore ascenda piu, che per fino a 19. e da 19. in su si mostra con altre regole, si come presto intenderai, ma prima daremo vn' altro essemio di partire per testa con maggiore partitore del sopradetto, accio meglio s'apprenda questo nostr' ordine. Hor sia, che tu hauesi a partire 123987. per 16. Pon prima li tuoi numeri in taucha come vedi, col partitore da mano sinistra, dipoi considera se il detto tuo partitore può entrare nelle pari figure delle sue, e perche nel partitore vi sono due figure, cioe 16. così ancora pigliarai 2. figure di man sinistra del numero, che vuoi partire, le quali faranno queste 12. e perche in detto 12. non v'entra nessuna volta il 16. agguincerai la seguente figura (che è 3.) al detto 12. farà 123. hor qui considera il 16. quante volte entra in 123. che v'entra 7. volte, & auanza 11. poni 7. sotto il 3. el 11. auanzato immaginatelo dal lato sinistro del 9. figura seguente, e farà 119. nel quale il 16. v'entra 7. volte, & auanza 7. poni 7. sotto il 9. & il 7. auanzato consideralo dal lato sinistro dell'1. farà 78. nel quale il 16. v'entra 4. volte, & auanza 14. poni 4. sotto l'8. & il 14. auanzato consideralo dal lato sinistro del 7. figura seguente, e farà 147. nel quale il 16. entra 9. volte, & auanza 3. poni 9. sotto il 7. & il 3. che auanza segnalo sopra vna linea, & il 16. tuo partitore segnalo sotto a detta linea, come vedi, starà così $\frac{7}{16}$. e così diremo, che a partire 123987. per 16. ne venga 7749. $\frac{7}{16}$. e questo basti quanto al partire, che si chiama per testa, ouero colonna.

$$\begin{array}{r} 16) \quad 1 \ 2 \ 3 \ 9 \ 8 \ 7 \\ \underline{ 7 \ 7 \ 4 \ 9} \end{array}$$

Del partire a Regolo.

Il partire a Regolo, secondo il modo Fiorentino è questo, che li Precettori lo fanno continuare ai lor discepoli per tutti li numeri delle libretine; o almeno fino a 19. accioche li habbino piu pronto per Danda, o per Galera, o per Ripiego. Hor per dimostrarti il modo di tal partire, poniamo, che s'hauesse a diuidere 234567. per 4. comincia come di sopra, accomoda il 4. tuo partitore sopra la quantità, che vuoi partire, dipoi dirai così, quanti 4. entra in 2. nessuna volta, però segna zero sotto il 2. & auanza quel 2. che giunto come decine al 3. figura seguente farà 23. e dirai, quanti 4. entra in 23. ve n'entra 5. segna 5. sotto il 3. & auanza 3. che giunto come decine al 4. farà 24. nel quale il 4. v'entra 8. volte, segna 8. sotto il 4. & auanza 2. che col 5. figura seguente farà 25. nel quale il 4. v'entra 6. volte, segna 6. sotto il 5. & auanza 1. che giun-

to al 6. figura seguente sarà 16. nel quale il 1. v'entra 4. volte, segna 4. sotto il 6. non auanza e s'alcuna; Hor vattene al 7. figura seguente, e vedi quanti 4. entra in 7. trouerai, che v'entra vn' volta, & auanza 3. segna 3. sotto il 7. & il 3. auanzato segnalo a man sinistra del primo zero, che segnasti sotto il 2. con vn poco di linea in mezzo fra il 3. & il detto zero, come vedi; Dipoi col medesimo ordine partirai per il medesimo 4. tuo partitore tutto quello, che t'è venuto per il primo partire, partendo ancora quel 3. che t'è auanzato, e tutti gli auanzi, che ti verranno gli porrai a man sinistra dell'auuenimento d'ogni partizione, e seguita a partire per 4. tante volte, quanto ti piace, e se doppo che hai partito la prima volta per 4. partiral poi per 4. auanzo insieme con l'auuenimento per 5. e l'auuenimento per 6. e per per 7. e per 8. & in fine in 10. ancor questo lo potrai fare, perche quante più regole farai, tanto più ti praticherai, e manderai a memoria le librettine, sì che bisogna durar fatica; perche *Nulla virtus est sine labore*, e questo afferma il Filosofo, *quod virtus consistit circa difficile, et iterum, bonum est difficile, malum autem facile*. Di maniera che sempre le cose laudabili s'acquistano con difficoltà, e perciò il nostro Poeta Dante n'innita, dicendo.

Hor mai conueni figliuol che tu ti sfoltri
Disse il Maestro intò, che pur in piuma
In fama non si vien, ne sotto colore.
Sotto la qual che sia vita consuma
Cotal vestigio di se in terra lascia,
Qual fumo in aria, o nell'acqua la schiuma.

Sono alcuni curiosi i quali vanno alle scuole; & in 4. o 6. giorni vorrebbero abbracciare tutte le scienze, e non hanno parte alcuna di pazienza; e quel che è peggio si lamentano de' Maestri, che li trattengono qualche giorno sopra vna regola, o propositione, non hauendo riguardo, che qualunque edificio mal fondato in breue tempo cade, e va in rouina, ma questi tali i lor fondamenti stabili li fanno nelle vanità, lasciure, e giuochi, dietro ai quali andaranno mesi, & anni, di giorno, e di notte con mille biasimi, & infamie, con danno grandemente dell'anima, e del corpo, consumando i beni paterni, e materni, & alla fine si trouano senza virtù, e senza robba; perche non imparano cosa, che col tempo gli habbia ad apportare vniua alcuna; perche quelle virtù, che li possono immortalare, e render gioueuoli a ciascuno sono da quelli disprezzate, e si vergognano di andare alle scuole ad impararle; Hor per tornare al nostro partire a Regole, noi lo metteremo qui in figura, adioche tu possa più facilmente apprenderlo, perche a quelli, che haucranno qualche poco d'ingegno, e pazienza, sarà loro facilissimo questo, & ogn'altra cosa.

Partitore: 4. oromur omnia dal 1. fino al 8.

2 3 4 5 6 7 8
0 5 8 6 4 1
0 4 4 1 1 6 5
1 1 1 2 9 8
3 2 7 7 5 7 2

Il di là detto modo di partire, da alcuni è chiamato Regolo, e da altri tau-
letta, che a noi non importa dichiarare d'onde tali nomi, o altri nomi di parti-
re deriuino, ma solo all'utilità, e breuità attendere, e perciò effortiamo i mac-
stri a far esercitare ai lor discepoli il sopradetto modo di partire, per praticar-
li nelle librettine spacciatamente.

Del partire a Scapezzo.

IL partire a Scapezzo non si può fare se il partitore non termina in zero, o più
zeri, cioè, che l'ultima figura da man dritta di detto partitore sia vn zero,
come per essemplio, 10. 20. 50. 100. 300. 1000. 4000. e così di tutti gl'altri. Et
acciò che meglio tu intenda, noi diciamo così, che tutti quei numeri, i quali
verso man destra haueranno vn zero, o più zeri continuati insieme, e che detti
numeri saranno partitori, quelli si potranno scapezzare, e non altri, come se
volemmo partire 3564. per 10. perche nel nostro partitore ch'è 10. v'è vn zero,
& è l'ultima figura di man destra, però taglia, e separa con vna linea a piombo
l'ultima figura di man destra di quella quantità, che vuoi partire, che è il 4. e
se nel partitore vi fusse due zeri, douresti tor via due figure di detta quantità,
e se nel partitore vi fusse 3. o 4. zeri continuati, come di sopra s'è detto, toglier-
resti via medesimamente 3. o 4. figure di quel numero, che volesti partire; E
per concludere, tieni questo per regola generale, di tor via sempre tante figure,
dal lato destro del numero, che vorrai partire, quanti zeri sono dal lato destro
del tuo partitore, e questo s'intende, quando fra essi zeri non v'interven-
gono altre figure, e tutte quelle figure, che ti restaranno verso man sinistra per tal se-
paratione, diremo che sia l'auuenimento di tal partire, partendo adunque 3564.
per 10. per detto scapezzo ne viene 356. & auanza 4. che si segna così $\frac{4}{10}$, i
quali schisati sono $\frac{4}{10}$, come più oltre intenderai nello schisare de' rotti.

12. 10. 20. 50. 100. 300. 1000. 4000. e così di tutti gl'altri. Et
acciò che meglio tu intenda, noi diciamo così, che tutti quei numeri, i quali
verso man destra haueranno vn zero, o più zeri continuati insieme, e che detti
numeri saranno partitori, quelli si potranno scapezzare, e non altri, come se
volemmo partire 3564. per 10. perche nel nostro partitore ch'è 10. v'è vn zero,
& è l'ultima figura di man destra, però taglia, e separa con vna linea a piombo
l'ultima figura di man destra di quella quantità, che vuoi partire, che è il 4. e
se nel partitore vi fusse due zeri, douresti tor via due figure di detta quantità,
e se nel partitore vi fusse 3. o 4. zeri continuati, come di sopra s'è detto, toglier-
resti via medesimamente 3. o 4. figure di quel numero, che volesti partire; E
per concludere, tieni questo per regola generale, di tor via sempre tante figure,
dal lato destro del numero, che vorrai partire, quanti zeri sono dal lato destro
del tuo partitore, e questo s'intende, quando fra essi zeri non v'interven-
gono altre figure, e tutte quelle figure, che ti restaranno verso man sinistra per tal se-
paratione, diremo che sia l'auuenimento di tal partire, partendo adunque 3564.
per 10. per detto scapezzo ne viene 356. & auanza 4. che si segna così $\frac{4}{10}$, i
quali schisati sono $\frac{4}{10}$, come più oltre intenderai nello schisare de' rotti.

È volendo partire il sopradetto numero per 20. farai così, perche nel tuo
partitore v'è vn zero, ti conuien separare vna figura di man destra delle quan-
tità, che vuoi partire, starà così. 3564. & il 356. che ti resta da man sinistra, lo
partirai per 2. perche del 20. tuo partitore togliendo uia uno zero, resta il 2.
parti adunque 356. per 2. ne uiene 178. & il 4. che prima togliesti uia segnalo
sopra una linea, & il tuo partitore, cioè 20. segnalo sotto, e così diremo, che a
partire 3564. per 20. ne uenga 178. $\frac{4}{10}$. per detta partizione.

20. 3564. 178. $\frac{4}{10}$

E volendo partire il sopradetto numero per 60. togli similmente l'ultima fi-
gura della quantità, che vuoi partire, resterà 356. come di sopra, il qual partit-
ore, perche tolto uia il zero del 60. restà 6. ne uerrà 59. & auanzerà 2. il quale
aggiungi come decine, al 4. che togliesti uia, farà 24. e questo poni sopra una
linea, e sotto ui segnatai 60. tuo partitore, e così diremo, che a partire 3564.
per 60. ne uenga 59. $\frac{24}{10}$ come uedi.

60. 3564. 59. $\frac{24}{10}$

E volendo partire 3564. per 100. per hauere il tuo partitore due zeri, ti conuiene separare due figure da man destra del numero, che si parte, ponendole sopra vna linea, & il 100. tuo partitore lo potrai di sotto, & haucrai per detta partitione $35\frac{6}{100}$. come vedi.

$$1) \begin{array}{r} 00 \\ 3564 \\ \hline \end{array}$$

E volendo partire 38740. per 1000. per hauere il tuo partitore 3. zeri, ti conuiene leuar via 3. figure da man destra del numero, che vuoi partire, resterà 38. e le 3. figure, che togliesti via scriuete sopra vna linea, & il 1000. tuo partitore scriuilo sotto, starà così 38. $\frac{740}{1000}$. e tanto ne verrà per detta partitione.

$$1) \begin{array}{r} 000 \\ 38740 \\ \hline \end{array}$$

E volendo partire 38746. per 120. perche nel partitore vi è vn zero solo, ti conuiene leuar via vna figura sola del numero, che vuoi partire, resterà 3874. il quale partirai per 12. che resta (tolto via il zero) a 120. tuo partitore, parti adunque 3874. per detto 12. ne verrà 322. & auanzerà 10. il quale aggiunto come decine al 6. che togliesti via, farà 106. sotto il quale segnarai 120. con vna linea in mezzo, come vedi.

$$1) \begin{array}{r} 00 \\ 38746 \\ \hline 322 \\ \hline 106 \end{array}$$

E volendo partire 5856000. per 1800. vedi che nel partitore vi son 2. zeri, quali tolti via, resterà 18. per tuo partitore, e così similmente debbitor via 2. zeri da man destra del numero, che vuoi partire, i quali tolti via resterà 58560. e questo lo partirai per 18. ne verrà 3253. & auanza 6. e questo auanzo lo segnarai sopra vna linea, e di sotto scriuerai il tuo partitore, cioè 18. starà così $3253\frac{6}{18}$, che schisati sono $\frac{6}{18}$. poteuasi ancora aggiungere il 6. auanzato a man sinistra de due zeri, che si tolsero al numero da partire, e farebbe 600. e questo metter sopra vna linea, e di sotto metter 1800. starebbe così $3253\frac{600}{1800}$. che schisati sono $\frac{600}{1800}$, si come a suo luogo, e tempo dimostreremo il modo di schisare. Segue il partire per ripiego.

$$1) \begin{array}{r} 00 \\ 5856000 \\ \hline 3253 \\ \hline 600 \end{array}$$

HAuendo noi fin qui dimostrato il modo da offeruarsi nel partire per Sca- pezzo, faria bene, che dimostrassimo hora il partir per ripiego, ma perche nel d. partire possono nascere molti rotti, rispetto gli auanzi, e non hauendo per anco difinito, che cosa sia rotto, percio diffiniremo prima, che cosa sia rotto, e come si schisino, e dipoi tratteremo del partire per ripiego, ma al presente dimostreremo del partire a Danda le sue regole, & ancora del partire a galera, percioche conuiene spesso volte seruirsi di essi nelle ragioni de' rotti.

Del partire a Danda.

IL partire a Danda è molto bello, e necessario a chi esperto ragioniere esser desidera, & è chiamato Danda, perche a ogni sottrattione, che si fa in detto partire, se li dà vna, o piu figure da man destra secondo il bisogno, talmente che detta

detta sottrattione con la figura; o figure, che se li danno, si possa partire per il tuo partitore. Hor sia che noi hauesſimo a partire 85796. per 687. acconcia in tauola il numero che vuoi partire, e dal lato sinistro poni 687. tuo partitore, rinchiuso, come vedi da vna linea curua, benche molti costumano mettere il partitore sopra quel numero, che vogliono partire. Dipoi considera quante figure sono nel tuo partitore, che in questo sono 3. piglia similmente tre figure le prime da man sinistra del numero da partire, le quali saranno queste 857. considera poi se le tre figure del partitore, cioè 687. può entrare in 857. e quante volte, trouerai che v'entra vna volta. Ma nota, che quando trouerai che il tuo partitore entrará in quella quantità di figure, che hauerai prese del numero da partire, vna, o più volte, allora farai vn punto da man destra alla fine di quelle 3. o 4. o più figure, che hauerai prese della detta quantità, che vuoi partire, per poter meglio conoscere quelle figure, che non hanno ancor seruito in detta operatione. Tornando hora al nostro operare, noi habbiamo detto, che 687. partitore entra vna volta in 857. e perciò segnara 1. dentro a due linee che formino quasi angolo retto da man destra del numero, che si parte, come vedi, dipoi moltiplica quest' 1. via 687. tuo partitore, farà pur 687. il quale poni sotto a 857. fatto questo cauà 687. di 857. resta 170. al qual resto darai da man destra il 9. figura seguente del numero che si diuide, e farà 1709. facendo vn punto al 9. per conoscere, che di esso ci siamo seruiti; hor considera quante volte 687. può entrare in 1709. la qual cosa molto ben considerata, trouerai che v'entra 2. volte, segna 2. dalla destra dell' 1. che segnaſti infra le 2. linee, dipoi moltiplica il detto 2. via il partitore, cioè 2. via 687. così dicendo, 2. via 7. fa 14. poni 4. sotto il 9. e tiene a mente 1. cioè vna decina, dipoi dirai 2. via 8. fa 16. e 1. che tenesti fa 17. poni 7. sotto il zero, e tieni 1. dipoi dirai 2. via 6. fa 12. e 1. che tenesti fa 13. poni 13. sotto il 17. e così hauerai, che a moltiplicare 2. via 687. farà 1374. il quale conuiene trarlo di 1709. resta 335. al quale darai dal lato dextro il 6. vltima figura del numero, che si diuide, secondo il nostro ordine farà 3356. e questo deuì partire per 687.

Ma perche nel tuo partitore v'è tre figure, e nel numero, che vuoi partire ve n'è 4. Sappi, che in simil caso, alla prima figura di man sinistra del partitore, che sei, le toccherà le prime due figure di man sinistra del numero che diuide cioè 33. acciòche alle figure seguenti del partitore tocchi poi vna figura per vno di quelle seguenti al 33. che s'hanno a diuidere, adunque ti conuien trouare quante volte le sei centinaia del Partitore entrano in 33. centinaia della quantità da diuidersi, le quali v'entrerebbero cinque volte; quando l'8. cioè le decine del partitore entrassero cinque volte in 35. decine del numero, che si diuide, il che non è possibile, per tanto si può giudicare, che il 6. nel detto 33. v'entra quattro volte; onde segna il detto 4. dal lato dextro del 2. infra le due linee, e poi moltiplica il detto 4. via 687. tuo partitore farà 2748. il quale posto sotto a 3356. e trattato da esso resterà 608. e così hauerai finito il detto partire, perche non c'è altra figura da dare, & il detto auanzo cioè 608. segnalo a man destra di 124. che t'è venuto per detta partitione, e sotto a detto auanzo segna 687. tuo partitore con vna linea nel mezzo, starà così $\frac{6}{1} \frac{0}{1} \frac{8}{7}$. e così haueremo, che per detta partitione ne verrà 124. $\frac{6}{1} \frac{0}{1} \frac{8}{7}$.

Sappi, che a voler dichiarare, e seriuere tutte quelle considerationi, che intorno a questo partire (& altri ancora) si conuerrebbero, sarebbe proprio vn confondere il Lettore, e perciò con questa breuità pensiamo più tosto esser me-

glio intesi, che con souerchio dire, & altri auuolimenti,

$$\begin{array}{r}
 687 \underline{1} \quad 857.9.6. \quad 1124. \\
 687. \\
 \hline
 1709. \\
 1374. \\
 \hline
 3356 \\
 2748 \\
 \hline
 608.
 \end{array}$$

auanzo,

E dicendosi parti 326875. per 574. posto che hauerai il partitore dal sinistro lato della partitione, considera se le tre figure del tuo partire, possono entrare nelle tre prime figure da man sinistra della partitione, cioè se 574. puol entrare in 326. la qual cosa è impossibile, e perciò al detto 326. aggiungi la seguente figura, che è 8. farà 3268. considera hora 574. tuo partitore, quante volte può entrare in 3268. ma per più facilità farai così, considera quante volte il 5. del partitore puol entrare in 32. del numero, che vuoi partire, il quale v'entrarebbe 6. volte, quando nell'auanzo, che è 2. imaginato dal sinistro lato del 6. seguente figura di quel numero, che vuoi partire, che fa 26. v'entrasse il 7. figura seguente del partitore similmente 6. volte, il che non è possibile, per tanto giudicheremo, che il 5. in 32. v'entri 5. volte, il quale segna dentro all'e due linee, come di sopra s'è detto, e multiplica detto 5. via 574. tuo partitore farà 2870. resta 398. & a questo aggiungi il 7. figura seguente di quel numero, che vuoi partire, farà 3987. considera hora nel detto modo quante volte 574. può entrare in 3987. trouerai, che v'entra sei volte, il qual 6. poni a man destra del 5. infra le due linee, e multiplica il detto 6. via 574. farà 3444. il quale tratto da 3987. resta 543. al quale aggiungi dalla destra il 5. figura seguente, & ultima del numero, che vuoi partire, farà 5435. nel quale procura di trouare quante volte u'entra 574. trouarai, che u'entra noue volte, segna 9. dal destro lato del 6. infra le due linee, e multiplica il detto 9. via 574. farà 5166. che tratto di 5435. resta 269. e perche non ci sono più figure da dare al detto auanzo di quelle della partitione, il nostro partire s'intende finito, e così diremo, che a partire 326875. per 574. ne uenga 569. & auanzi 269. come uedi,

$$\begin{array}{r}
 574 \underline{1} \quad 3268.7.5. \quad 1569. \\
 2870. \\
 \hline
 3987 \\
 3444 \\
 \hline
 5435 \\
 5166 \\
 \hline
 269.
 \end{array}$$

auanzo,

Del partire a Galera.


IL Partire a Galera è molto bello, e spedito, ma assai più difficile per i principianti, che non è partire a Danda; ancorche il Pagani da Bagnacavallo sia di contraria opinione, il qual dice, che il partire a Danda è intrigare il cervello ai principianti, la qual cosa da ciascun Autore è negata, perche nel partire a Danda si vede ogni volta manifesto il sottrarre, e nel partire a Galera conuien sottrarre con la memoria, in oltre il partire a Danda si può rivedere cō facilità, ma il partire a Galera non si può rivedere, rispetto alle figure dipennate; perche bisogna fidarsi delle prove, o risarlo nuouamente. Ma perche questo poco importa, torniamo al nostro proposito, e poniamo, che s'hauesse a partire 85796. per 67. a Galera. Non ad altro fine habbiamo posto i medesimi numeri del sopradetto primo partire a Danda, se non perche ti sia più facile ad intendere questo, ancorche il modo dell'operare sia molto difficile. Auuertendoti ancora, che se le figure del tuo partitore faranno due, tu deuì pigliare due figure (le prime di man sinistra) del numero, che vuoi partire, e considerarle poi se il tuo partitore vi può capere, o no, e trouato, che vi possa entrare vna, o più volte, e tu poni subito il tuo partitore sotto le dette prime figure da diuidere, e quando il tuo partitore sarà di tre figure, et tu piglierai tre figure del numero, che vuoi partire, e segnauì sotto il partitore, se però il partitore può entrare in dette figure, & in somma tante figure quante haurai nel partitore, tante figure bisogna pigliare del numero, che vuoi partire, e quando il partitore non capisse in quella vguale quantità di figure, che vuoi partire, allora darai vna figura più a quelle che s'hanno a diuidere, di maniera che il suo partitore fusse di 3. figure, bisognerebbe, che quelle partirsi fussero 4. e di più diciamo che il tuo partitore non potrà mai entrare nelle figure che vuoi partire, più di 9. volte, partendo figura per figura.

Inoltre, ogni volta che hauerai tratto il prodotto del partitore (contro la figura posta infra le due righe) delle figure sopraposte a detto partitore, e che il residuo sarà più del partitore, o quanto esso almeno, subito fa resolutione d'hauere entrato nell'operatione, e per ciò sta con la mente della.

Ritornando hora al nostro partitore, tu vedi, che il partitore è di tre figure, cioè 687. il quale considera se può entrare nelle tre prime figure di man sinistra del numero, che vuoi partire, le quali sono queste 857. la qual considerata trouarai, che v'entra vna volta, però segna 687. tuo partitore sotto a 857. e perche 687. entra vna volta in 857. però segna 1. tra due righe a man destra, come nel partire a Danda operasti, dipoi moltiplica il detto 1. via tutto il tuo partitore, cominciando da man destra, & andando verso man sinistra, sottraendo il moltiplicato d'ogni figura dalla figura sopraposta, sottraendo per testa, cioè con la memoria, o come si dice, a mente. Laonde moltiplica 1. via 7. del partitore fa 7. che tratto di 7. sopraposto resta 0. segna 0. sopra il 7. che si diuide, e dipenna il 7. del partitore, & anco il 7. sopraposto, per conoscere le figure, delle quali ti sei già seruito, acciò che non ti venghino prese altre volte, poi moltiplica 1. via 8. del partitore, fa pur 8. il quale non si può trarre di 5. sopraposto, perche tu conuien prestare al detto 5. vna decina farà 15. che trattone 8. resta 7. si come nel sottrarre di lire s' insegnauamo, segna il detto 7. sopra il 5. salua vna decina, e dipenna l'8. del partitore, & anco il 5. sopraposto, poi

poi moltiplicar via 6. del partitore fa 6. che aggiuntoli la decina, che saluasti, come semplice vnita fa 7. il qual tratto d'8. sopraposto resta 1. e questo segna sopra l'8. e dipenna il 6. e l'8. & hauerai, che sopra le figure dipennatet'auanza 170. al quale auanzo dandoli la seguente figura di quelle che vuoi partire, che è il 9. farà 1709. hora poni di nuouo il tuo partitore gradatamente sotto a 1. 09. dipoi considera che nel tuo partitore vi sono 3. figure, e quelle che ti conuien partire sono 4. però alla prima figura di man sinistra del tuo partitore vi sono tre figure, e quelle che ti conuien partire sono 4. però alla prima figura di man sinistra del partitore, che è 6. li tocca a diuidere le prime due figure del 1709. le quali faranno queste, cioè 17. troua hora quanti 6. entra in 17. vedrai che ve n'entrano due, il qual 2. poni tra le due righe, dipoi moltiplica detto 2. via il partitore, cominciando dalla prima figura di man destra, dicendo 2. via 7. fa 14. che tratto di 9. sopraposto, non si può, perliche darai vna decina al detto 9. come facesti nel sottrarre, farà 19. e quest'ordine osseruarai sempre di dare vna, o più decine alla figura sopraposta, secôdo il bisogno, acciò che se ne possa trarre il moltiplicato, che nascerà dalla figura posta tra le due righe, contro a quella figura del partitore, che l'operation richiede, caua hora 14. di 19. resta 5. il quale poni sopra il 9. sopraposto, e tieni vna decina, e dipenna il 7. & il 9. poi moltiplica 2. via 8. fa 16. al quale aggiungi 1. che saluasti fa 17. che tratto di zero sopraposto non si può, dalli vna decina dirà 19. del quale finilmente non si può trarre 17. onde ti conuien dargli vn'altra decina, e dirà 20. che trattone 17. resta 3. il quale poni sopra il zero, e salua due decine, e dipenna l'8. & il 0. poi moltiplica 2. via 6. fa 12. e 2. che saluasti fa 14. il quale tratto di 17. sopraposto resta 3. e questo poni sopra il 17. e dipenna il 6. & il 17. & hauerai per l'auanzo 335. al quale aggiuntoli 6. figura seguente di quelle che vuoi partire farà 3356. hora ti conuien rimouere il partitore, e porlo gradatamente sotto al 3356. hauerai che al 6. del partitore li toccherà il 33. e però troua quanti 6. entra in 33. ve n'entra 5. quando le figure seguenti del partitore potessero entrare 5. volte nel resto delle figure, che vuoi partire; e perciò prima che tu segni il 5. tra le due righe, e lo moltipichi contro il partitore bisogna stare auuertito; perche non entrandoui 5. volte, ti conuerrebbe guastare le figure già fatte, e per la dipennatione di esse ti confonderesti, se già tu non fussi molto esperto in esso; giudicaremo adunque che il 6. non entri in 33. più che 4. volte, il qual poni tra le due righe; poi moltiplica 4. via tutto il partitore, cominciando dalla prima figura di man destra, dicendo 4. via 7. fa 28. che tratto di 6. sopraposto non si può, perliche darai vna decina al detto 6. farà 16. del quale non si può similmente trarre 28. laonde gli datai vn'altra decina dirà 26. che similmente il detto 28. non si può trarre da detto 26. per la qual cosa ti conuien darli vn'altra decina, e dirà 36. del quale poi si potrà trarre 28. trai adunque 28. di 36. resta 8. e questo poni sopra il 6. e dipenna il 7. e il 6. e salua tre decine; dipoi moltiplica 4. via 8. fa 32. e 3. che saluasti fa 35. che tratto di 5. sopraposto non si può; ma senz'hauere a dare vna decina per volta al detto 5. aggiugeli sempre tante decine in vna volta sola, quante ne sono nel numero il quale vuoi trarre, e potendosi poi trarre di detto numero si trae, e se non si può trarre se li dà vna decina più; hora hauendo noi a trarre 35. di 5. non si può, perliche diremo subito di 35. aggiugendo 2. decine a vn tratto al detto 5. restarà zero, segna o sopra il 5. e dipenna l'8. e l'5. e salua 3. decine, poi moltiplica 4. via 6. fa 24. e 3. che saluasti fa 27. il quale tratto di 33. sopraposto, resta 6. e segna 6. sopra 33.

e dà di penna al 6. del partitore, & al 33. & hauerai per l'ultimo auanzo 608. e per detta partizione 124. che tanto ne venne nel partire a Danda.



HAuendo tu inteso il modo del partire a galera, molto più facile ti sarà il seguente, che da molti è detto partire a Battello, ouero a Danda alla Genouese; sia chiamato hor come si voglia, che quanto all'opinion nostra è molto più speditiuo, e bello, & artificioso che qualunque altro partire; e doue nel partire a galera gli auanzi restano di sopra alle figure dipennate, in quest'altro modo di partire gli auanzi restano di sotto alle figure dipennate, e non si rimuoue il partitore da vn luogo all'altro, come nel partire a galera, ma si tien fermo con la prima segnatura, rinchiuso da vna linea curua verso man sinistra del numero, che vuoi partire, a similitudine del partire a Danda, e nell'operare è quasi a lui simile, eccetto che non si segnano le figure delle multiplicazioni, che nascono dalle figure tra le due righe contro il partitore, che si deueno euare dalle figure sopraposte, ma si traggono a mente, come nel partire a galera. Come per effempio haueffimo a partire 864756. per 384. poni il tuo partitore, rinchiuso da vna linea curua a man sinistra del numero, che vuoi partire, dipoi considera quante figure sono nel partitore, tu vedi che sono tre, e così piglia tre figure del numero, che vuoi partire, le prime verso man sinistra, che saranno queste, cioè 864. e guarda se il tuo partitore 384. può entrare in 864. e quante volte, trouerai che v'entra due volte; segna 2. tra due righe, come nel partire a galera facesti; facendo ancora vn punto al 4. dell'864. per dimostrare che più oltre non si deue procedere col principio del tuo partire; dipoi multiplica 2. che segnasti infra le righe via tutto il partitore, cominciando da man destra dicendo 2. via 4. fa 8. il qual 8. doueresti segnare sotto il 4. del 864. come nel partire a danda, ma non segnare il detto 8. con la penna, ma si bene considerando con la mente, e questo deui trarre di 4. sopraposto; ma perche è impossibile trarre 8. di 4. darai vna decina al detto 4. secondo l'ordine del trattare sarà 14. che trattone il detto 8. resta 6. e questo segna sotto il 4. e dipenna il detto 4. e tieni a mente 1. per la decina che desti al 4. dipoi multiplica 2. via 8. fa 16. e 1. che teneffi a mente fa 17. il quale si douerebbe trarre di 6. figura sopraposta, ma perche non si può, ti conuerà dare due decime al detto 6. e farà 26. del quale trattone 17. resta 9. segna 9. sotto il 6. e dipenna il 6. e salua due decime; poi multiplica 2. via 7. fa 14. e 2. che saluasti fa 16. che tratto di 8. sopraposto resta zero, segna 0. sotto l'8. e dipenna l'8. e così hauendo partito 864. per 384. ne vien 2. & auanza 96. al quale auanzo datoli il 7. figura seguente, mutando il punto ad ogni figura, che li darai, sarà 967. il quale deui partire per 384. trouarai, che v'entra due volte, segna due sotto le righe, come vedi, e poi multiplica il detto 2. via tutto il partitore a vna figura per volta; dicendo

2. via

2. via 4. fa 8. che trarre dal 7. non si può, dagli vna decina farà 17. del quale trattone 8. resta 9. segna 9. sotto il 7. e dipenna il 7. e salua vna decina, e così farai in ogn'altra sottrattione, doue bisogni prestare vna, o più decine, e tante decine quante presterai, tante ne saluarai per raggiungerle alla noua multiplicatione, che nascerà dalla figura che sarà tra le due righe, contro alla figura del partitore; poi multiplica 2. via 8. fa 16. e 1. che saluasti fa 17. che trarre di 6. figura sopraposta non si può, per il che darai due decine al 6. farà 26. che trattone 17. resta 9. segna 9. sotto il 6. e dipenna il detto 6. e salua due decine, poi multiplica 2. via 3. fa 6. e 2. che saluasti fa 8. che tratto di 9. figura sopraposta resta 1. segna 1. sotto il 9. e dipenna il 9. & hauerai il secondo auanzo essere 199. al quale datoli il 5. figura seguente di quel che si diuide, farà 1995. il quale ti conuien partire per 384. che secondo l'ordine dimostrato nel partire a Danda, & a galera, al 3. del tuo partitore li tocca a diuidere le prime due, cioè 19. hor vedi quanti 3. entra in 19. che ven'entrarebbe 6. se successiuamente l'altre figure del partitore entrassero 6. volte nelle successuenti figure da partirsi, con l'aggiunta dell'auanzo di detto 19. ma perche elleno non vi possono entrare 6. volte, però giudicaremo che il 3. in 19. v'entri 5. volte, e così segna 5. tra le due righe; poi multiplica il detto 5. via tutto il partitore, cominciando da man destra, come di sopra, dicendo 5. via 4. fa 20. che trarre di 5. non si può, onde ti conuien dire di 25. resta 5. segna 5. sotto il 5. che si diuide, e dipenna il 5. sopraposto, e salua due decine, poi multiplica 5. via 8. fa 40. e 2. che saluasti fa 42. che trarre di 9. non si può, onde ti conuien dire di 49. resta 7. segna 7. sotto il 9. e dipenna il 9. e salua 4. decine, poi multiplica 5. via 3. fa 15. e 4. che saluasti fa 19. che tratto di 19. sopraposto resta zero, e dipenna il 19. & hauerai il terzo auanzo essere 75. al quale datoli il 6. figura seguente del numero che si diuide, farà 756. il quale ti conuien partire per 384. hor vedi quante volte il detto partitore entra in 756. trouarai che v'entra vna volta, segna 1. tra le due righe, poi multiplica 1. via tutto il partitore, dicendo 1. via 4. fa 4. che tratto di 6. resta 2. segna 2. sotto il detto 6. e dipenna il 6. e poi multiplica 1. via 8. fa 8. che trarre di 5. non si può, per il che darai 8. di 15. resta 7. poni 7. sotto il 5. sopraposto, e dipenna detto 5. e salua vna decina, poi multiplica 1. via 3. fa 3. e 1. che saluasti fa 4. che tratto di 7. sopraposto resta 3. poni 3. sotto il detto 7. e dipenna il 7. & hauerai per il quarto, & vltimo 372. e per detta partitione ne verrà 2251. e così hauerai finito il partire. Effortiamo ciascuno a praticarsi in questo modo di partire, e per essere più breue, e macilreuo- le degli altri, e più spedito.

384)	8 8 8 8 8 8	1 2251	
	0 8 8 8 8 2		3
	- x 8 7	proua	0 1 0
	0 3		6

Come si prouino i partimenti per la proua del 9. e del 7.

HAuendo dimostrato in che modo si faccino diuerse qualità di partitioni; resta che dimostriamo l'ordine, che si deuè osservare nel prouarle, e perciò volendo conoscere per la proua del 9. o del 7. se il sopra detto partimento stia bene, o no, tieni quest'ordine. Prima parti l'auanzo di detto partire,

C 2

che

che è 372. per 9. cioè prendi la proua di 372. per 9. secondo che nel prouare le multiplicationi si dimostrò; la quale sarà 3. e questo sezna doue più ti vien cōmodo vicino al detto partire, dipoi piglia la proua dell'auuenimento, cioè di 2251. per 9. trouarai che sarà 1. e questo poni sotto il 3. che auanzo per la prima proua; dipoi piglia la proua del partitore, cioè di 84. per 9. trouarai, che sarà 6. il quale poni sotto all'1. della seconda proua; fatto questo, in tutte le proue che vorrai fare, o per 9. o per 7. per regola generale farai così, multiplica prima la proua, che t'è venuta del tuo partitore, che sarà la terza che hai presa; via la proua dell'auuenimento, che sarà la seconda, farà pur 6. & al prodotto aggiungerai la proua dell'auanzo del partire, che sarà la prima proua che si piglia, e della somma getta via il 9. o quanti noui dentro vi fusse, e facendo la proua per 7. gettarai via tutti i 7. e serba l'auanzo; come per esemplo in questa, multiplica il 6. della terza proua via il 1. della seconda, farà pur 6. & a questo aggiungi il numero della prima proua, che è 3. farà 9. del qual gettato via il 9. resta zero, segna o. rincontro l'1. della seconda proua, come qui vedi a modo di croce, e questo zero, o altra figura che in tal luogo verrà posta, si douanda proua delle proue, e con questa figura della proua delle tre proue, conuien che si riscontri la proua del numero, che date è stato diuiso; piglia adique la proua di 64756. la quale è zero, come voluamo, e questa figura si chiama scontro di proua, e segnasi incontro all'altro zero da man sinistra, che verrà fatto a modo di croce più, o meno che fusse il riscontro della proua, si potrebbe giudicare che detta partitione stesse male, e quest'ordine di prouare offerua in tutte le partitioni, quando però tu non volisti fare la proua reale; che in tal caso doueresti multiplicar l'auuenimento del partire via il partitore, & al prodotto aggiungere l'auanzo di tal partire, e la somma deui fare tanto quāto è il numero diuiso; più o meno che facesse staria male; multiplica adunque 2251. che è l'auuenimento via 384. che è il partitore, farà 864.84. & a questo aggiungerai l'auanzo di tal partire, che fa 372. farà in tutto 64756. che è uguale al numero, che s'è diuiso, e questo batti quanto alla proua del 9. & il medesimo ordine offeruarai volendolo prouare per la proua del 7.

Che cosa sia rotto, e come si formino.

E' Tempo hormai, prima che più oltre si proceda, che dimostriamo che cosa sia rotto, oltre a quel poco che nel principio del partir per testa, ouero a colonna fu da noi detto del conoscere i rotti. Rotto adunque diciamo esser quello che ci rappresenta meno dell'vnità, come per esemplo, vn mezzo, o vn terzo, ouero vn quarto &c. il che altro non vuol dire, se nō far d'vna cosa due vgnal parti, & vna di quelle parti si chiama vn mezzo, e segnasi così $\frac{1}{2}$. & vn terzo altro non vuol dire, che diuidere vna cosa in tre parti vgnali, & vna di quelle parti si chiama vn terzo, e segnasi così $\frac{1}{3}$. e quando sotto la linea sarà 3. e di sopra sarà l'vnità, si dirà vn quarto, e segnasi così $\frac{1}{4}$. & vn quinto si scriue così $\frac{1}{5}$. & vn sesto così $\frac{1}{6}$. & vn settimo così $\frac{1}{7}$. & vn ottauo così $\frac{1}{8}$. & vn nono così $\frac{1}{9}$. & vn decimo così $\frac{1}{10}$. & vn undecimo così $\frac{1}{11}$. Ma se sopra la linea uia sarà un 2. ouero un 3. ouero un 4. e sotto la linea uia sarà un 3. ouero un 4. ouero un 5. &c. sempre quello che è posto sopra la linea si nomina per il suo proprio nome; ma quello che è posto di sotto si nomina per terzi, quarti, quinti, sesti, e uia discorrendo; laonde perche meglio tu intenda ecco l'esemplo $\frac{3}{4}$. questo

questo rotto dice due terzi; e questo dice $\frac{1}{2}$, ma occorrendo, che sopra la linea vi fusse vn numero di piu figure, e similmente di sotto, come per essempio $\frac{2}{3}$, in questo caso si nominano ambedue i numeri con il lor proprio nome; ma a quello di sotto se gli aggiunge questa dizione esimi, e nominarasi il presente rotto, ventitre trentottoesimi; similmente il presente $\frac{1}{2}$, si nomina cosi, centotrentafci dugentotrantatrecsimi. E perche meglio tu conosca quando sono rotti, o no, auueriti, che sempre il denominatore, qual' è sotto la riga, sia maggiore del denominante, che è sopra la riga, e quando sopra la riga fusse maggior numero che sotto, quello non sarebbe rotto, anzi sarebbe tante vnità, quante volte il numero di sotto entrasse nel numero di sopra, come per essempio $\frac{1}{2}$. questo diciotto festi, parti il numero di sopra, per il numero di sotto, ne viene tre interi, e perciò questi non son rotti, ma possono esser sani, e rotti mescolati; e quando il numero sotto la riga sarà vguale al numero di sopra, allora quello sarà vn' intero appunto; eccoti l'essempio $\frac{2}{2}$. questo dice otto ottaua, che partito l'8. di sopra la riga per l'8. che è di sotto, ne viene x. appunto adunque diremo che otto ottaua sono vn' intero, e questo basti quanto a conoscere, e scriuere i rotti.

Del modo di schifare i rotti.

LO schifare de' rotti, non è altro, che trouare vn numero, col quale partito ciaschedun numero, che vogliamo schifare non auanzi niente, schifasi adunque proportionatamente l'vno, e l'altro numero, cioè quello, che è sopra la riga, e quello, che gli è sotto, e per quel numero che tu parti quella quantità sopra la riga, parti ancora quella che gli è sotto, di maniera che non auanzi ne all'vna, ne all'altra quantità, come se volessimo schifare $\frac{2}{3}$. cioè ridurli a maggior intelligenza, & eleganza. Parti 2. che sta sopra la riga per 2. (perche per altro numero non si può partire) ne viene 1. qual segna sopra vna linea, poi parti 4. che è sotto la linea, similmente per 2. ne viē 2. e questo segna sotto la linea doue segnasti l'vno di sopra, starà così, cioè $\frac{1}{2}$. che tanto vale a dire $\frac{2}{4}$. quanto $\frac{1}{2}$. ma è piu elegante a dire $\frac{1}{2}$. che $\frac{2}{4}$. e perciò diremo, che schifati $\frac{2}{3}$. sono $\frac{1}{2}$. Ma per venire a maggior intelligenza dello schifar de' rotti, schifiamo hora $\frac{1}{4}$. In più modi si può schifare il detto rotto, ma per facilitar la strada auendi a questo, e poi dimostreremo gli altri. Piglia la metà di 16. che è sopra la riga, la quale è 8. poi piglia la metà di 48. che è sotto la riga, la quale è 24. segnala così $\frac{1}{4}$. hor di nuouo schifa detto rotto, e piglia la metà di 8. che è 4. e da metà di 24. che è 12. e segnala così $\frac{1}{2}$. hor nuouamente schifa detto rotto, piglia la metà di 4. che è 2. e la metà di 12. che è 6. e segnasi così $\frac{2}{3}$. e questo pur di nuouo schiferasi, pigliando la metà di 2. che è 1. e la metà di 6. che è 3. e segnasi così $\frac{1}{3}$. e questo dice vn terzo; e così diremo, che tanto vale a dire $\frac{1}{3}$. quanto $\frac{1}{4}$. ma è piu elegante a dire $\frac{1}{3}$. Sappi che il numero sopra la riga lo puoi partire per 3. o per 4. o per 5. o per qual numero più ti piace, che non importa, purché non auanzi cos' alcuna, e per il medesimo numero, che partirai quello di sopra la riga, ti couien partire ancora quello di sotto la riga, purché ne all'vno, ne all'altro auanzi cos' alcuna, e con quest'ordine puoi seguirare a partirli, fin tanto che si troua numeri che li quadri, cioè che v'entrino per l'appunto, e quando non li potrai più partire senza che auanzi, all' hora tal rotto non si potrà più schifare; e perciò bisogna in tal caso lasciarlo stare in suo essere.

Poteuasi schifare $\frac{2}{3}$ in vna volta sola, partendo per se stesso il numero sopra la riga, cioè 16. per 16. ne viene 1. e questo segna sopra vna riga, dipoi parti il numero sotto la riga, cioè 48. per il detto 16. ne vien 3. e questo lo segnairai sotto la riga; doue segnasti l'1. starà così $\frac{2}{3}$. e dirà vn terzo, come di sopra habbiamo dimostrato.

Come si schifano i rotti, e si troui il maggior commune ripiego, e conoscer se si possono schifare.

TRouasi spesse volte de' rotti, che non si possono schifare, e con quel nome, e figure medesime conuien lasciarli. Il sopradetto modo di schifare, si chiama a schifare a tastoni, vñato dai trafficanti, i quali non cercano d'imparare la regola generale di tali schifatori, anzi, hauendola noi più volte dimostrata a molti pratici computisti, hanno detto, che è vn'aggiamento dicercuello, come quei che poco si curano sapere, fuor di quella lor pratica. Ma non perciò vogliamo restare di uarne il modo. secondo Euclide nel settimo.

Dato, che noi haueſſimo a schifare $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$. Farai in questo modo, parti sempre il numero sotto la riga per il numero che gli è sopra, parti adunque 496. per 372. ne viene 1. del quale non si tien conto, & auanza 124. e quello auanzo conuien che sia partitore di 372. ne vien 3. del quale non si tien conto, & auanza niente, e quando nel partire questi numeri de rotti, schifandoli, ti viene alle mani, che non auanzi cos' alcuna, allora il common ripiego, e schifatore di tal rotto sarà quel partitore, che l'ha fatto venir tal partire senz'auanzo, adunque 124. che si partitore di 372. & auanzo niente, sarà il maggior commune ripiego, e schifatore del sopradetto rotto, cioè di $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$. Hora per schifare detto rotto, parti 372. che è sopra la riga per 124. ne vien 3. il quale segnairai sopra vna linea, starà così $\frac{2}{3}$ dipoi parti 496. che è sotto la riga per il medesimo 124. ne vien 4. il quale segna sotto la riga, doue sopra segnasti 3. starà così $\frac{2}{3}$. così harai ridotto $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$. al più basso schifo, che si possa, & a maggior intelligenza, i quali schifai sono $\frac{2}{3}$. che tanto è di valore l'vn rotto, che l'altro. E volendo conoscere quando i rotti non si possono schifare, offerua il sopradetto ordine, come se voleſſimo schifare $\frac{2}{3}$ $\frac{2}{3}$ parti 58. per 73. ne viene 11. & auanza 55. per il che tieni conto dell'auanzo, e non di quel che ne viene; dipoi parti 73. per 55. ne viene 1. del quale non si tien conto, & auanza 18. per il quale parti 55. ne vien 3. & auanza 1. diceſi che quando auanzarà 1. risolutamente si conclude tal rotto non potersi schifare, e così bisogna lasciarlo nel medesimo modo che si troua.

Come si schifano i rotti in altro modo.

VN'altro modo dimoſtra Boetio nel secondo di ſua Aritmetica a trouare lo schifatore de' rotti, il quale è questo, che ſempre ſi deue cauare il numero di sopra la riga, di quello che è di sotto, e del rimanente cauare ancora un'altra uolta, e del rimanente un'altra uolta, finche ſi poſſa cauare, e quando del rimanente non lo potrai più trarre, cauà il rimanente di eſſo, e ſe ti reſta 1. risolutamente dirai, che tal rotto non ſi può schifare, e ſe il rimanente fuſſe uguale a quello, che ne uoi trarre, allora quel rimanente ſarà ultiplo ſchifatore, ſi che

che breuiemente, questa regola vuole che si vadi cauando il minor numero dal maggiore, finche si peruenga a vn rimanente, che sia tanto quanto quello, che si doucria cauare; e quel tal rimanente vguale, sarà l'ultimo, e commune schifatore di quel tal rotto, si come haueffimo a schifare $\frac{3}{4}$. Caua 24. di 96. resta 72. del qual rimanente cauà il detto 24. resta 48. e di questo similmente cauà 24. resta 24. il quale è vguale a quello, che di lui si deue cauare; e questo 24. rimanente sarà vltimo, e maggior commune schifatore di $\frac{3}{4}$. Partu adunque 24. che è sopra la riga per 24. rimanente, ne viene 1. e questo regna sopra vna riga, dipoi parti 96. che è sotto la riga per il detto 24. rimanente, ne vien 4. che posto sotto la riga doue segnasti 1. starà così $\frac{1}{4}$. e così diremo che $\frac{3}{4}$ schifati sono $\frac{3}{4}$. Ma perche habbiamo detto, che se quel numero sopra la riga non si potesse cauare dal rimanente, il rimanente douersi cauare di lui; perciò nota questo. Vogliamo schifare $\frac{4}{5}$. cauà 64. di 96. resta 32. & hora il detto 64. nò si può cauare 32. e perciò cauà 32. di 64. resta 32. qual è vguale al 32. del quale di ragione si poucria cauare. Dicesi adunque che 32. è vltimo, e maggiore schifatore di $\frac{4}{5}$. che schifati per 32. ne viene $\frac{2}{5}$. il quale non si può più abbassare a minor denominatione, e quando per alcuni delli detti rimanenti ti restasse 1. dirai subito quel tal rotto non si potere schifare, si come haueffi a schifare $\frac{3}{4}$. cauà 23. di 91. resta 68. del quale cauà di nouo 23. resta 45. e di questo cauà 23. resta 22. del qual rimanente non si può più trarre 23. come si douerebbe; laonde cauà 22. di 23. resta 1. del quale hora 23. non si può cauare, si che per il maggior commune schifatore si haurebbe 1. e schifando per 1. rende il medesimo rotto, per ilche dirai non si potere schifare.

Ma volendo schifare i rotti per scapezzo, togli via da man destra di quel rotto, che vuoi schifare, tanti zeri di sotto, quanti di sopra la riga, come volendo schifare $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{8}$. togli via due zeri di sopra, e due zeri di sotto, resterà così $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{8}$. e questo rotto lo puoi schifare secondo l'ordine dato di sopra ne verrà $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{8}$. Sappi che non si può schifare alcun rotto per scapezzo, nè partire, nè moltiplicare alcuna quantità d'interi, se non v'interuengono zeri verso man destra di quel numero che vuoi schifare, o moltiplicare, o partire per scapezzo; perche quando la figura di man destra di quei numeri, che vuoi scapezzare, non fusse zero, o zeri continuati, non si potrebbero scapezzare in modo alguno, come per esempio stando vn rotto così $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{4}{7}$. Dicesi, che questo rotto non si può schifare per scapezzo, rispetto il 5. che è sopra la riga, il quale n'impedisce e questo basti quanto allo schifar de' rotti.

Del partire per Ripiego.

Ancorche non douessimo dimostrare il modo del partir per Ripiego, prima che dimostressimo il partire a Danda, & a Galera, nientedimeno l'habbiamo trasferito fino ad hora, acciò che sia meglio inteso, e posseduto, atteso che nel partir per Ripiego il più delle volte v'interuiene de' rotti, e perciò habbiamo voluto prima dichiarare, che cosa sia rotto, e come si scriua, e schifi.

Il partir per Ripiego è molto commodo, e perciò quando vuoi partire per ripiego vn numero per vn'altro, è necessario nel partitore trouare vno, o più ripieghi. Ripiego adunque non vuol dir altro, se non trouar due numeri, che moltiplicati l'vno via l'altro, faccin tanto, quanto il proprio numero, del quale cerchi il ripiego, e se per sorte il tuo partitore hauesse più ripieghi, sempre si

si due pigliare il maggiore, e più comune; dipoi si parte il numero che vuoi partire per vno delli numeri del ripiego, e l'aunenimento si parte per l'altro numero del ripiego, seguitando ordinatamente nel partire tante volte, quant'è parti, ouero ripieghi hauerai fatti del tuo partitore; auuertendo che solamente i numeri composti hanno ripiego; ma i numeri contra se primi non hanno ripiego alcuno, perche non sono numerati, se non dall'istessa vnità, come son questi, cioè 5. 7. 11. 13. 17. 19. 23. 29. &c. & i numeri composti son come questi, cioè 4. 6. 8. 9. 10. 12. 14. 15. e molti altri infiniti. La ragione perche questi sien detti composti, l'adduce Euclide nel primo del settimo, quando dice, il numero composto è quello, il quale si misura egualmente per altro numero; per il che noi vediamo, che il 4. è misurato dal 2. due volte; perche 2. via 2. fa 4. & il 6. è misurato dal 2. per tre volte, e dal 3. per due volte; perche 2. via 3. fa 6. e 3. via 2. fa similmente 6. & il 9. è misurato dal 3. per tre volte, perche 3. via 3. fa 9. laonde si manifesta che 9. è composto da 3. volte 3. e questo diciamo esser il ripiego di 9. e volendo poi il ripiego di 12. farà 2. e 6. & ancora 3. e 4. perche multiplicato 2. via 6. fa 12. e così 3. via 4. fa 12. e così degli altri. Hor poniamo, che volessimo partire 53006. per 63. Prima troua di che numero è composto 63. trouarai che è composto dal 7. e dal 9. cioè dal 7. per noue volte, e dal 9. per sette volte, perche multiplicato 7. via 9. ouero 9. via 7. l'vno, e l'altro fa 63. Hor che habbiamo trouato il ripiego del partitore, parti 53006. per vno de' detti numeri del ripiego. qual vuoi, che non fa caso, l'hor sia che lo parta per 7. ne viene 7572. $\frac{2}{3}$. il quale bisogna partir per 9. che è il secondo numero del ripiego, ne viene 841. & auanza 3. il qual multiplica via il 7. delli $\frac{2}{3}$. del primo partimento, farà 21. & a questo aggiungi il 2. che è sopra la linea del detto rotto, farà 23. il qual segna sopra vna linea, & il 63. tuo intero partitore segnalo di sotto, & hauerai, che a partire 53006. per 63. ne viene 841. $\frac{2}{3}$. come di sotto vedi.

$$\begin{array}{r} 7) \quad 53006. \\ 9) \quad 7572. \frac{2}{3} < \frac{1}{3}. \\ \quad 841. \quad \frac{2}{3}. \end{array}$$

E volendo partire 68747. per 192. Troua il maggior ripiego di 192. il qual è 8. e 24. & anco 12. e 16. parti adunque 68747. per 8. ne viene 8593. $\frac{1}{4}$. il qual parti per 24. ne viene 358. & $\frac{1}{3}$. il qual rotto infilzato con $\frac{1}{3}$. di sopra posti fanno $\frac{1}{3}$. & $\frac{1}{3}$. e così diremo, che per detta partitione ne venga 358. $\frac{1}{3}$. & $\frac{1}{3}$. E volendo partire il sopradetto numero per 192. lo puoi partire in tre volte, cioè per 4. e l'aunenimento per 6. e l'aunenimento per 8. e ti verrà il medesimo, che a partirlo per 8. e per 24. o per danda, o per galera, perche se tu multiplichi 4. via 6. fa 24. e questo lo multiplichi poi via 8. farà 192. e per certificarti che ne venga il medesimo, fa così parti 68747. per 4. ne viene 17186. $\frac{1}{4}$. e questo parti per 6. ne viene 2864. $\frac{2}{3}$. il qual rotto non si deue schifare, ma infilzarlo prima con li $\frac{1}{3}$. di sopra posti, e ne peruerà $\frac{1}{3}$. Nota per tuo auuertimento qualche al presente diciamo, cioè, che il secondo rotto, ouero auanzo non si deue mai schifare, e poi infilzare con altro rotto; ma prima si deue infilzare, e l'aunenimento schifare, quando si può; come per esempio, noi habbiamo di sopra infilzato $\frac{1}{3}$. che è il secondo auanzo, con $\frac{1}{3}$. e ne peruenuto $\frac{1}{3}$. ma se tu schifassi.

rai $\frac{1}{2}$, i quali schisati sono $\frac{1}{2}$, e se questo l'infilzarai con $\frac{1}{4}$, ne peruerà $\frac{3}{4}$, e ne douera peruenire $\frac{1}{2}$, di maniera che tu vedi, che schisando il rotto; e poi infilzandolo, non si contra come douerebbe, e questo ti sia per sano auuiso; poiche in nessuno Autore tal auuertimento habbiamo ancor trouato; & in oltre guarda di non segnare i rotti, che vuoi infilzare al contrario, perche quando tu uolesti infilzare più rotti, ouero auanzi, che nelle partitioni ti uenifiro, ti conuiene metterli ordinatamente, come qui di sotto vedi. Resta hora a partire 2864. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$, per 8. ne viene 358. apunto; ma bisogna partire ancora $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$, per il detto 8. laonde perche non habbiamo ancora dimostrato il partir de' rotti, però farai così; poiche nel partir per 8. non t'auanza cos' alcuna, segnarai $\frac{1}{8}$ da man dritta $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$, e questo l'infilzerai, come se fusse vn rotto, con $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$, multiplicando quel zero sopra la riga via 24. che è sotto la riga dell'altro rotto, farà pur zero, & a questo zero, per modo di sommare, aggiuncui 11, che è sopra la riga farà pur 11. segna 11 sopra una riga, e poi multiplica l'8. sotto la riga del zero, via 24. che è sotto la riga dell'11. farà 192. il qual segna sotto la riga, doue segnasti 11. starà così $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{4}$, per ilche diremo, che a partire 68747. per 192. con due ripieghi, ne ueniga 358. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$, come di sotto uedi, per la qual cosa è manifesto, che tanto ne uiene a partire un medesimo numero per un ripiego, quanto per un'altro d'un'istesso partitore, e questo basti, quanto al partir per ripiego.

8)	68747.	4)	68747.
24)	8393 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	6)	127186. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$
	358 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$	8)	2864. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$
			358. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$

Del multiplicare de' rotti.

SI come ne' numeri sani interuengono quattro atti principali, cioè *sommare*, *sottrarre*, *multiplicare*, e *partire*, così ancora nelli rotti accade, ma diuersamente da' sani, e perciò dimostreremo prima, come detti rotti si multiplichino insieme; laonde, tieni questo per regola generale, che hauendo a multiplicare alcun rotto, via alcun'altro rotto, tu deui sempre multiplicare il numero sopra la linea dell'vn rotto, via il numero sopra la linea dell'altro; e quel prodotto lo deui porre sopra vna linea; dipoi deui multiplicare il numero sotto la linea del detto rotto, via il numero di sotto la linea dell'altro, & il prodotto deui porre sotto la linea del primo prodotto, e di tal multiplicatione ne peruerà il detto rotto, che poi ti trouarai hauer posto, come per esempio; hauendo a multiplicare $\frac{2}{7}$, via $\frac{3}{7}$, fa così, u multiplica il numero, che è sopra la linea dell'un rotto, via quel che è sopra la linea dell'altro, dicendo 2. via 4. fa 8. il qual segna sopra vna linea; dipoi multiplica il numero, che è sotto la linea dell'un rotto, via quel che è sotto la linea dell'altro, dicendo 3. via 5. fa 15. il quale segna sotto la medesima linea, doue prima ponesti sopra 8. e starà così $\frac{1}{7}$, e così dicono che è multiplicare $\frac{2}{7}$, via $\frac{3}{7}$, fa cipo $\frac{1}{7}$.

$\frac{2}{7}$ $\frac{3}{7}$ fanno $\frac{1}{7}$.

Perche meglio tu resti capace, vogliamo darti vn'altro effempio del multiplicar de' rotti; hor poni d'hauere a multiplicare $\frac{1}{2}$. via $\frac{2}{5}$. fa così multiplica il denominante 3. via il denominante 5. farà 15. e questo poni sopra vna linea, dipoi multiplica il denominante 8. via il denominator 6. farà 48. e questo poni sotto la linea, doue sopra ponesti 15. e starà così $\frac{4}{3}$. il qual roto schiatio farà $\frac{4}{3}$. e tanto mantiene per detta multiplicatione.

$$\frac{1}{2} \text{ — } \frac{2}{5} \quad \frac{4}{3} \quad \frac{4}{3}$$

Et hauendo a multiplicare più rotti insieme, tieni sempre quest'ordine, di multiplicare il denominante d'vn roto, via il denominante dell'altro, & il prodotto multiplica via il denominante dell'altro roto, se bene infiniti fossero i rotti, e l'ultimo prodotto poni sopra vna linea, dipoi multiplica il denominatore d'vn roto, via il denominatore dell'altro, & il prodotto via il denominatore dell'altro roto, tanto che tutti siano multiplicati, e l'ultimo prodotto poni sotto la linea, doue ponesti l'ultimo prodotto de' denominanti; come per effempio, hauendo a multiplicare $\frac{2}{3}$. via $\frac{4}{5}$. e via $\frac{7}{8}$. e via $\frac{1}{2}$. fa così, multiplica il denominante 2. via il denominante 5. fa 10. e questo multiplica via il denominante 4. fa 40. e questo multiplica via il denominante 3. fa 120. il qual poni sopra vna linea; dipoi multiplica il denominator 3. via il denominator 6. fa 18. e questo multiplica via il denominator 5. fa 90. e questo multiplica via il denominator 8. fa 720. il qual poni sotto la linea, doue ponesti sopra 120. starà così $\frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{7}{8} \frac{1}{2}$. che schiatio detto roto farà $\frac{4}{3}$. Sappi che il numero denominante è quello che sta sopra la linea del roto, & il denominatore è quello, che sta sotto la linea; e questi nomi fa bisogno mandarli a memoria, perche molte volte usaremo chiamarli per questi nomi, per poter con più breuità esporre il concetto nostro, per non hauere ogni volta a replicare il numero sopra la riga o il numero sotto la riga.

$$\frac{2}{3} \quad \frac{4}{5} \quad \frac{7}{8} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{7}{8} \frac{1}{2} \quad \frac{4}{3}$$

E volendo multiplicare sani via rotti, farai così, come volendo multiplicare $\frac{2}{3}$. via 9. segna 1. sotto il 9. con una linea in mezzo, e quell'1. denota l'integrità di detto numero, dipoi opera come nella multiplicatione sopradetta; multiplica 3. via 9. fa 27. il quale segna sopra vna linea, dipoi multiplica 1. via 4. fa 4. il quale segna sotto la medesima linea, doue sopra segnasti 27. starà così $\frac{2}{3} \frac{2}{3}$. hor nota, che quando il numero sopra la linea, sarà maggiore di quel di sotto, della detta multiplicatione, ne uerrà sempre intieri, o uogliamo dir sani, e perciò partirai il numero di sopra la linea, che è 27. per il numero di sotto che è 4. ne uerrà 6 $\frac{3}{4}$. e così diremo, che a multiplicare $\frac{2}{3}$. via 9. faccia 6 $\frac{3}{4}$.

$$\frac{2}{3} \text{ — } \frac{2}{3} \quad 4) \quad 27. \quad 6 \frac{3}{4}$$

E uolendo multiplicare rotti, con sani, e rotti; come se dicessi multiplica $\frac{2}{3}$. via $5 \frac{1}{2}$. In questa propositione, perche con li 5. interi u'è accompagnato $\frac{1}{2}$. perciò fa di bisogno di detti 5. interi farne terzi, che si fanno multiplicando il denominatore

denominatore che è 3. uia 5. fani, fa 15. al qual si aggiunge il denominante del melesimo rotto che è 1. farà 16. il qual si segna così $\frac{1}{16}$. e questo si deve moltiplicare uia $\frac{1}{4}$. operando nel modo sopradetto, moltiplica i denominati l'uno uia l'altro, fanno 48. e questo segnalo denominante; poi moltiplica i denominatori l'uno uia l'altro fanno 15. il qual segna sotto a 48. itara così $\frac{1}{15}$. Laonde per esser maggiore il numero denominante del numero denominatore, parti il denominante che è 48. per il denominatore, che è 15. ne uiene $3\frac{1}{5}$. che schiati sono $\frac{1}{5}$. e così diremo, che per detta multiplicatione uenga $3\frac{1}{5}$.

$$\frac{1}{4} \text{ ————— } \frac{1}{16} \quad 15) \quad 48.$$

E volendo moltiplicare fani, e rotti uia fani, e rotti; come se dicessi moltiplica $3\frac{1}{4}$. uia $4\frac{1}{2}$. Perche in questa propositione cio' ciascheun numero fano è accompagnato un rotto, perciò fa bisogno ciascheun numero fano ridurre al suo rotto; Laonde di $3\frac{1}{4}$. ne farai tutti terzi, faranno $\frac{3}{4}$. e di $4\frac{1}{2}$. ne farai tutti quarti, faranno $\frac{4}{2}$. e così hauerai a moltiplicare $\frac{3}{4}$. uia $\frac{4}{2}$. ne' modi antedetti, moltiplicando i denominatori l'uno uia l'altro, cioe 11. uia 19. fa 209. il quale segna sopra una linea, dipoi moltiplica i denominatori l'uno uia l'altro, cioè 3. uia 4. fa 12. il quale segna sotto la linea, doue segnasti 209. itara così $\frac{3}{12}$. e perche è maggiore il denominante, che non è il denominatore, perciò parti 209. per 12. ne uiene $17\frac{1}{4}$. per detta multiplicatione.


$$\frac{3}{4} \text{ ————— } \frac{4}{2} \quad 12) \quad 209$$

Hauendo a moltiplicare rotti uia fani, e uia fani e rotti insieme, sappi, che si può moltiplicare infiniti rotti l'un uia l'altro, e così infiniti rotti si possono sommare insieme, che a uolertene dare le dimostrationsi crescerebbe fatica, e non sapere, perche basta hauer cognitione come si moltiplichino, o sommino due, o tre rotti, dipoi con il medesim' ordine se ne può moltiplicare, e sommare infiniti; ma nel sottrarre, e nel partir de' rotti, non possono interuenire, nè eoncorrere nell'operationi piu che due rotti soli, come operando a lor luogo potrai uedere. Hor sia che hauesimo a moltiplicare $\frac{1}{2}$. uia 6. o uia $\frac{1}{2}$. prima riduci 5. fani al suo rotto, come nella precedente si disse: dipoi a tutti quei fani, che non sono accompagnati da' rotti, segnali l'unità sotto con una linea in mezzo, per denotare l'integrità; hor in questa proposta segna così $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{3}{4}$. fatto questo moltiplica i denominatori l'un uia l'altro fanno 414. e questo segna con una riga sotto, dipoi moltiplica i denominatori l'un uia l'altro fanno 20. qual segna sotto la riga, itara così $\frac{1}{20}$. recala fani partendo 414. per 20. ne uene $20\frac{1}{2}$. per detta multiplicatione.

$$\frac{1}{2} \text{ ————— } \frac{1}{2} \text{ ————— } \frac{3}{4} \quad 20) \quad 414$$

Prima, che piu oltre si proceda, vogliamo dimostrare succintamente, per qual causa il moltiplicar de' rotti uinuisca, & il moltiplicar de' fani in infinito cresca; e se pur alcuna volta non cresce, aliueno stia in suo essere, come a moltiplicare 1. uia 8. che fa 8. e ne' rotti sempre che si moltiplica rotto uia rotto, il prodotto

prodotto vien minore di ciascun suo produttore, come a moltiplicare $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. fanno $\frac{1}{4}$. che è minore di ciascun moltiplicante, e così a moltiplicare $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. fa $\frac{1}{4}$. e perciò molti appresso di noi n'hanno fatto le marauiglie, ai quali habbiamo detto così, che il moltiplicare non è altro, che vn pigliar tante volte il numero moltiplicando, quante vnità contiene in se vno delli moltiplicanti, ouero pigliare tante volte il numero moltiplicante, quante vnità sono nel moltiplicando, come per effempio, se moltiplichì 4. via 5. fa 20. che non vuol dir altro, se non dammi 4. volte 5. ouero 5. volte 4. che l'vno, e l'altro fa 20. e così in tutti gli altri numeri, la qual cosa auuene similmente nel moltiplicar de' rotti, perche moltiplicando $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. non è altro, che domandare li $\frac{1}{2}$. di $\frac{1}{2}$. ouero li $\frac{1}{2}$. di $\frac{1}{2}$. che nell'vno, e l'altro modo faranno $\frac{1}{4}$. che schifati sono $\frac{1}{4}$. e così a moltiplicare $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. non è altro che domandare la metà d'vn mezzo, la quale è $\frac{1}{4}$. Si come in altro modo ancora proueremo, il quale sarà questo cioè, moltiplica vna mezza lira, via dieci soldi; ancorche vna mezza lira sia dieci soldi, nientedimeno ci piace per maggior intelligēza del lettore, proporre, e dire vna mezza lira; la qual cosa altro non vuol dire, se non moltiplica $\frac{1}{2}$. via 10. cioè dammi la metà di 10. la qual'è 5. e questi 5. essendo soldi vengono a essere appunto la quarta parte d'vna lira, cioè di soldi 20. laonde chiaramente si conosce, che a moltiplicare $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. fa $\frac{1}{4}$. Se bene alcuni si sono sforzati voler dimostrare Geometricamente che a moltiplicare $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. il prodotto sia maggiore in sostanza di ciascun suo produttore, e per tal dimostrazione figurano vn quadrilatero ad angoli retti, d'vn braccio per ogni lato, e diuidono ciasc un lato per metà, di modo, che vien diuiso in quattro quadretti retringoli equilateri, che per ciascun lato sono vn mezzo braccio, e dicono che a moltiplicare $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. faccia $\frac{1}{4}$. ma che questo prodotto, cioè $\frac{1}{4}$. sia maggiore in sostanza di ciascun suo produttore, cioè di $\frac{1}{2}$. la qual cosa non approuiamo, perche non si può comparare la linea alla superficie, e quando si potesse comparare, non potrà mai essere, che vno di quei quadretti sia più che la quarta parte del grande; e chi dirà esser maggiore in sostanza della metà, incorrerà nel medesimo errore che altri sono incorsi: E se bene Fra Luca dal Borgo dice (con dimostrazione Geometrica) che $\frac{1}{2}$. è maggiore in virtù, che non è $\frac{1}{4}$. non dice male; intendendo sanamente quel che egli vuol dire, cioè che $\frac{1}{2}$. essendo linea non ha larghezza, nè grossezza, ma se la lunghezza, adunque è vna cosa inuisibile, & imaginata; ma $\frac{1}{4}$. è superficie, la quale ha lunghezza, e larghezza, e perciò dice che $\frac{1}{4}$. come superficie, è maggiore in virtù, che non è vn $\frac{1}{2}$. considerandolo come linea. Soggiunge ancora, e dice, che $\frac{1}{2}$. essendo cosa, cioè linea, & $\frac{1}{4}$. superficie, non si può proportionare l'vno all'altro, perciò che la proportion sempre sarà fra le quantità d'vn medesimo genere, e perciò non si può dire, che quel quarto il quale è superficie sia maggiore, o minore di $\frac{1}{2}$. che è la sua cosa; hor tornando al nostro proposito, che moltiplicando $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. faccia $\frac{1}{4}$. eccoui l'effempio addotto da Fra Luca.



Del partir di Rotti.

Perche il partire è proua del multiplicare, si con e il multiplicare è proua del partire, però successiuamente tratteremo del partir di rotti, e perche, nella prima propositione del multiplicar de rotti, si n'ultuplicò $\frac{2}{3}$. via $\frac{3}{4}$. e fece $\frac{1}{2}$. perciò se partiremo $\frac{1}{2}$. per $\frac{3}{4}$. ne douerà venire $\frac{2}{3}$. e se partiremo similmente $\frac{1}{2}$. per $\frac{2}{3}$. ne douerà venire $\frac{3}{4}$. Ma auerti nel partir de rotti, di metter sempre il tuo partitore da man sinistra, non perche sia di preetto, ma per tenere vn'ordine fermo, e per conoscere sempre il tuo partitore. Volendo adunque con facilità conoscere qual sia il partitore, sappi che sarà sempre accompagnato con questa ditione *per*, accioche se alcuna volta il partitore ti venisse posto da man destra del rotto, che vuoi partire, con questa ditione *per*, tu lo possa conoscere. Parti adunque $\frac{1}{2}$. per $\frac{3}{4}$. ne viene $\frac{2}{3}$. ma perche tu intendi il modo, fa così: poni $\frac{3}{4}$. da man sinistra, come tuo partitore, per esser accompagnato da quella ditione *per*, & $\frac{1}{2}$. segnati da man destra, poi multiplica in croce, in questo modo, cioè, multiplica il denominante del rotto tuo partitore, via il denominatore del rotto, che vuoi partire, & il prodotto salua sempre per partitore del prodotto dell'altro lato della croce, per ilche ti conuien multiplicare 2. via 15. fa 30. quale salua per tuo partitore, dipoi multiplica il denominante del rotto, che vuoi partire, via il denominatore del rotto tuo partitore, cioè multiplica 8. via 3. fa 24. e questo parti per 30. che saluasti, ne viene $\frac{2}{3}$. che schisati sono $\frac{2}{3}$. come voleuamo, e se partirai $\frac{1}{2}$. per $\frac{2}{3}$. con il medesimo ordine, ne verrà $\frac{3}{4}$. conforme a quanto di sopra s'è detto.

$$\begin{array}{r} \text{per } \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \\ 30) \quad 24 \\ \quad 0 \frac{2}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{per } \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \\ 60) \quad 40 \\ \quad 0 \frac{2}{3} \end{array}$$

Hauendo a partire sani per rotti, sempre per regola generale metterai l'vnità sotto i sani con vna linea in mezzo, per denotare l'integrità, dipoi multiplica in croce, come per essempio, se haueffi a partire 6. per $\frac{2}{3}$. In questa tu vedi, che la ditione *per*, è accompagnata con li $\frac{2}{3}$. per ilche ne segue, che li $\frac{2}{3}$. siano partitore di 6. e perciò poni $\frac{2}{3}$. da man sinistra, e 6. segnato da man destra con l'vnità sotto, dipoi multiplica in croce il denominante del partitore, che è 2. via il denominatore del numero, che vuoi partire, che è 1. e farà 2. e questo salua per partitore, dipoi multiplica il denominatore del partitore, che è 3. via il denominante del numero, che vuoi partire, che è 6. farà 18. il qual parti per 2. che saluasti, ne viene 9. appunto

$$\begin{array}{r} \text{per } \frac{2}{3} \times \frac{6}{1} \\ 2) \quad 18 \\ \quad 0 \end{array}$$

Ad alcuni poco esperti in questa professione par cosa disorbitante, che partendo vna cosa, cioè vn numero per vn rotto, sia maggiore l'auuenimento, che non è quella cosa, che si diuide, quasi che sia maggiore la parte del tutto, il che è impossibile; si come pare in questa propositione, che habbiamo diuiso 6. per

$\frac{2}{3}$. e n'è venuto 9. ma questi 9. non sono interi, come molti credono, ma sono noue volte due terzi, e per darne maggior ragione; poniamo che tu haueſſi 6. braccia di panno, e lo voleſſi miſurare con vn paſſetto, ouero miſura, che fuſſe lunga $\frac{2}{3}$. d'un braccio, ſi domanda quanti paſſetti ſimili ſarebbono in dette 6. braccia, chiara coſa è, che 6. braccia ſono 18. terzi; hor vedi quante volte li detti $\frac{2}{3}$. entrano in 18. terzi, trouarai, che v'entrano 9. volte, adunque concludentemente poſſemo dire, che queſti 9. faranno 9. volte $\frac{2}{3}$. e non faranno noue interi, e perciò all'operante conuiene ſtare in ceruello, perche partendo ſani per rotti, ſempre parrà che venga più di quello, che ſi diuide, ma tali auuenimenti non faranno coſe intere, ma rappreſentaranno tante volte quel rotto, che è ſtato partitore.

Vogliamo darti ancora vn'altro eſſempio, acciò che meglio reſſi capace, hor poniamo, che tu haueſſi a partire $\frac{2}{3}$. per $\frac{1}{4}$. poni $\frac{1}{4}$. da man ſiniſtra, e $\frac{2}{3}$. da man deſtra; dipoi moltiplica in croce, cioè il denominante del partitore, che è 4. via il denominatore di quel rotto, che vuoi partire, che è 6. e farà 6. qual ſalua per tuo partitore; dipoi moltiplica il denominante del rotto, che vuoi partire, che è 3. via il denominatore del rotto del partitore, che è 3. farà 15. qual parti per 6. che ſaluaſti, ne viene $2\frac{1}{3}$. per detta partitione. Hor queſti $2\frac{1}{3}$. non ſono altrimenti interi, come molti penſano, perche ſe noi non diuidiamo interi, è impoſſibile che nelle parti ſiano interi; Laonde concludendo diciamo che $2\frac{1}{3}$ non ſono interi; ma ſono due volte, e mezzo $\frac{1}{3}$. cioè che $\frac{1}{3}$. entra due volte, e mezzo in $\frac{2}{3}$. eccoti l'eſſempio; poniamo, che tu haueſſi $\frac{1}{4}$. d'un braccio di panno, il quale tu voleſſi miſurare con vna miſura lunga $\frac{1}{4}$. d'un braccio; dicci che ſe detta miſura ſi ſtenderà due volte, e mezzo ſopra detto panno, ſarà vgal ſol panno; che è quanto ci occorreua dimoſtrare.

$$\begin{array}{r} \text{per } \frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \\ 6 \quad 15 \\ \hline 2\frac{1}{3} \end{array}$$

Hauendo a partire rotto per ſano, come ſe voleſſi partire $\frac{1}{4}$. per 12. ſegna 12. ſotto il 12. con vna linea in mezzo, per denotare l'integrità, & a man deſtra poni $\frac{1}{4}$. dipoi moltiplica in croce, cioè 12. denominante, via 4. denominatore, fa 48. e queſto ſalua per tuo partitore; dipoi moltiplica 3. denominante via 1. denominatore farà pur 3. il qual parti per 48. ne viene $12\frac{1}{4}$. che ſchiaſti ſono $12\frac{1}{4}$. e tanto ne viene per tal partitione.

$$\begin{array}{r} \text{per } \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \\ 48) \quad 3. \\ \hline 0. \quad 1\frac{1}{4} \end{array}$$

Et hauendo a partire ſani, e rotti per rotti ſoli, ſempre per regola generale ſi riduce l'intero al ſuo rotto, come volendo partire 6. $\frac{2}{3}$. per $\frac{1}{4}$. perche il rotto, che accompagna i ſani è in quarti, però riduci a quarti 6. $\frac{2}{3}$. che ſono $4\frac{2}{3}$. quali ſegna da man deſtra, e da man ſiniſtra poni il partitore, cioè $\frac{1}{4}$. dipoi moltiplica in croce, ma prima troua il futuro partitore, dicendo 2. via 4. fa 8. e queſto ſalua, dipoi moltiplica 27. via 3. fa 81. qual parti per 8. ne viene $10\frac{1}{8}$. per tal partitore.

per

per $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$.

$$\begin{array}{r} 8 \quad 1 \\ 1 \quad 0 \quad \frac{1}{2} \end{array}$$

Et hauendo a partire rotti soli, per sani, e rotti, farai nel medesimo modo, come di sopra, riducendo il sano al suo rotto; come volèdo partire $\frac{1}{2}$. per $8\frac{1}{4}$. farai quarti d'8. $\frac{1}{4}$. sono $\frac{1}{2}$. quali poni a man sinistra, perche è tuo partitore, e da man destra poni $\frac{1}{2}$. dipoi multiplica in croce, dicendo 35. via 6. fa 210. e questo salua per tuo nuouo partitore, dipoi multiplica 5. via 4. fa 20. qual parti per 210. ne viene $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$. che schisati sono $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$. per detta partitione.

per $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 1 \quad 0) \quad 2 \quad 0 \\ \underline{0. \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{4}} \end{array}$$

Et hauendo a partire sani, e rotti, per sani, e rotti, come se diceffi, parti $6\frac{3}{4}$. per $3\frac{1}{4}$. Prima riduci ogni sano al suo rotto, & hauerai $\frac{2}{3}$. e $\frac{1}{4}$. dipoi troua subito il partitore, che lo conoscerai a quella ditione per, e segnalo a man sinistra, il qual farà $\frac{1}{4}$. e da man destra segna $\frac{2}{3}$. dipoi multiplica in croce, ma prima il denominante del partitore, via il denominatore di quel che parte, cioè 15. via 3. fa 45. e questo salua per partitore, dipoi multiplica il denominante di quel che si parte via il denominatore del partitore, cioè 20. via 4. fa 80. il qual parti per 45. che saluasti, ne viene $1\frac{2}{3}$. per detto partimento, e que che vogliamo che basti per dimostrazione del partir de rotti.

per $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$

$$\begin{array}{r} 4 \quad 5) \quad 8 \quad 0. \\ \underline{1 \quad \frac{2}{3}} \end{array}$$

Del sommare de' rotti:

HAuendo detto affai sopra il multiplicare, e partir de' rotti, è conueniente, che trattiamo del modo di sommarli. Il sommar de' rotti non è altro, che vn'aggiuntione insieme di più rotti; i quali così giunti fanno sempre vn rotto maggiore di ciascun suo produttore, e speffe volte accade, che sommando due rotti, o più rotti insieme fanno numero intiero, & intiero, e rotto insieme, come più oltre procedendo dimostraremo. Hor volendo sommare $\frac{2}{3}$. cò $\frac{1}{4}$. multiplica in croce, come nel partir di rotti s'è fatto, cioè il denominante dell'vn rotto, via il denominatore dell'altro, dicendo così 2. via 3. fa 6. dipoi multiplica 1. via 5. fa 5. e questo poni sotto il 4. le quali due multiplicationi, cioè 4. e 5. sommerai insieme, fanno 9. il qual segna sopra vna linea, dipoi multiplica i denominatori l'vn l'altro, cioè 2. via 3. fa 6. qual segna sotto la linea doue segnaffi 9. & hauerai per la detta somma $\frac{5}{6}$. che è maggiore di $\frac{2}{3}$. e d'vn mezzo suoi producenti; Sappi, che la multiplicatione de' denominatori l'vno

via

via l'altro, farà sempre partire della somma delle multiplicazioni in croce, insieme giunti, e l'auuonimento farà la somma di quei rottì.

$$\begin{array}{r} \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \\ \hline 4 \\ 5 \\ \hline 1 \ 0) \ 9 \quad \frac{1}{2} \\ \underline{0} \quad \frac{1}{2} \end{array}$$

E volendo sommare $\frac{1}{2}$. con $\frac{1}{2}$. multiplica in croce, come di sopra s'è detto, dicendo 4. via 5. fa 20. e poni 20. dipoi moltiplica 3. via 6. fa 18. e questo aggiungelo con 20. fa 38. poi multiplica i denominatori l'vno via l'altro, cioè 4. via 6. fa 24. per il quale parti 38. ne viene $1\frac{1}{2}$. per la soma de' sopradetti rottì.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ \hline 1 \\ 2 \\ 0 \\ \hline 2 \ 4) \ 3 \ 8 \\ \underline{1} \quad \frac{1}{2} \end{array}$$

E volendo sommare molti rottì insieme; come se dicessi, somma $\frac{1}{2}$. con $\frac{1}{2}$. con $\frac{1}{2}$. e con $\frac{1}{2}$. Deui sempre sommare due rottì insieme, quali a te piace, hor somma $\frac{1}{2}$. con $\frac{1}{2}$. nel modo come di sopra, fanno $1\frac{1}{2}$. salua l'intero da parte, e somma $1\frac{1}{2}$. con $\frac{1}{2}$. che è il rotto seguente, fanno $2\frac{1}{2}$. e questo somma co' $\frac{1}{2}$. osservando il medesim'ordine, fanno $3\frac{1}{2}$. e questo aggiungi all' 1. che saluasti $2\frac{1}{2}$. e tanto faranno a sommare insieme i sopradetti quattro rottì.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ \hline 1 \\ 2 \\ 0 \\ \hline 1 \ 2) \ 1 \ 7 \\ \underline{1} \quad \frac{1}{2} \end{array} \quad \begin{array}{r} \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ \hline 1 \\ 0 \\ 1 \ 2 \\ \hline 2 \ 4) \ 2 \ 2 \\ \underline{0} \quad \frac{1}{2} \end{array} \quad \begin{array}{r} \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \\ \hline 6 \\ 0 \\ 6 \ 6 \\ \hline 7 \ 2) \ 1 \ 2 \ 6 \\ \underline{1} \quad \frac{1}{4} \end{array}$$

Fanno $2\frac{1}{2}$.

E volendo sommare sani, e rottì, con sani, e rottì, opera nel sopradetto modo, mettendo da parte i sani, e dipoi somma i rottì insieme, e la loro somma aggiungi con i sani. Ma auuerti di non ridurre i sani a rottì, e poi sommarli, come fanno alcuni (diremo) poco esperti; perche quei numeri che sono sani li fanno rottì, e poi li sommano, per hauerli di nouo a ridurre a numeri sani, come se haueffino a sommare $8\frac{1}{2}$. con $6\frac{3}{4}$. ridurrebbono $5\frac{1}{2}$. a quarti, sono $2\frac{1}{2}$. e similmente $6\frac{3}{4}$. li ridurrebbono a terzi, sono $2\frac{1}{3}$. e poi sommarebbono $2\frac{1}{3}$. con

con $\frac{3}{4}$. multiplicando in croce, come di sopra s'è detto, fanno $15. \frac{1}{4}$. La qual operatione, per essere i sani, che si sommano numeri piccoli li vien lor fatta facilmente. Ma se i sani, che volessero sommare fussero numeri grandi, durerebbono fatica a cauarne le mani, e perciò a noi par molto più leggiadro, e breue questo nostro modo, cioè sommare prima inuiceme i sani, 8. e 6. fanno 14. dipoi sommare $\frac{3}{4}$. con $\frac{1}{4}$. la qual cosa da vn pratic si farà con la memoria senza adoperar penna; ma per osseruare la regola, multiplica in croce, come di sopra s'è detto, trouerai, che fanno $1. \frac{1}{4}$. e questo raggiunto con 14. che prima sommassi, farà in tutto $15. \frac{1}{4}$. che è vguale al primo operare.

$$\begin{array}{r} 8 \\ 14 \\ \hline 15 \frac{1}{4} \end{array} \quad \begin{array}{r} \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \\ 8 \\ 6 \\ \hline 14 \\ 1 \frac{1}{4} \\ \hline 15 \frac{1}{4} \end{array}$$

Del sottrarre de' Rotti.

HAuendo fin qui dimostrato, con quella breuità, ch'habbiamo saputo, i truagliamenti del multiplicare, partire, e sommare de' rotti: resta che trattiamo del quarto atto, che è al sottrarre, e cominceremo in questo modo, dicendo, che il sottrarre de' rotti è molto simile al sommare, eccetto doue s'habbia a sottrarre sani, e rotti, di sani, e rotti, perche bisogna ridurre tutti gl'interi a rotti, e poi multiplicare in croce, e cauare il minor prodotto dal maggiore, & il residuo partirlo per la multiplicatione dei denominatori l'vn via l'altro de' detti rotti, e l'auuenimento sarà la differenza, che è da vn rotto all'altro, o da interi, e rotti, di altri interi, e rotti.

Hauendo a sottrarre vn rotto da vn'altro rotto, come per esempio hauendo a trarre $\frac{3}{4}$. di $\frac{4}{5}$. prima è da notare (a chi ha poca cognitione de' rotti) se il rotto che vuoi cauare, si può trarre di quell'altro rotto, o no; e per voler conoscere questo, tenga questa regola generale, pòghinsi i rotti da qual mano si pare, che non sia caso, si multiplichino in croce, ma prima si multiplichi il denominante di quel rotto, che hauerà inãzi di se questa ditione di, via il denominatore dell'altro rotto, & il prodotto segnisi, dipoi multiplichisi il denominante dell'altro rotto, via il denominatore del suo contrario, & il prodotto segnisi sotto al primo prodotto, e se del primo prodotto, che segnassi non si potrà trarre il secondo, resolutamente dirai, che il rotto, qual vuoi cauare di quell'altro sia maggiore, e che sia impossibile a poterlo trarre, la qual consideratione non è notata così da ogn'vno. Hor al proposito nostro, noi habbiamo fra i sopradetti che la ditione di, è auanti li $\frac{4}{5}$. e non alli $\frac{3}{4}$. perche la proposta dice, di $\frac{3}{4}$. e no di $\frac{4}{5}$. e perciò conuiene prima multiplicare il denominante 4. via il denominatore 5. dell'altro rotto, farà 20. dipoi multiplica per l'altro lato della croce 2. via 5. fa 10., e questo poni sotto al 20. e caualo di detto 20. resta 10. dipoi multiplica li denominatori dell'vn rotto via l'altro, cioè 4. via 5. fa 20. e questo sarà partitore di 10. che ti restò; parti adunque 10. per 20. ne viene $\frac{1}{2}$. per il resto di tal sottrattione, ouero differenza di detti rotti,

$$\begin{array}{r}
 \frac{3}{8} \text{ di } \frac{5}{1} \\
 \times \\
 \hline
 15 \\
 \hline
 2. \\
 0. \quad \frac{5}{8}
 \end{array}$$

Et hauendo a sottrarre vn rotto d'alcun sano, sempre il detto numero intero lo metterai sopra vna linea; cō l'vnità sotto, la qual dimostra l'integrità di detto sano, come se hauessi a cauare $\frac{1}{4}$ di 5. poni l'vnità sotto al detto 5. dipoi moltiplica in croce, come di sopra, ricordandoti della ditione *di*, che è auanti al 5. e perciò il primo a moltiplicarsi farà 5. via 8. fa 40. dipoi moltiplica 3. via 1. fa pur 3. il qual poni sotto al detto 40. e caualo, resta 37. dipoi moltiplica li denominatori l'vno, via l'altro, cioè 1. via 8. fa 8. per il quale parti 37. ne vien 4. $\frac{5}{8}$. per il resto di tal sottrattione. Ma per più breuità, doue nelle sottrattioni non interuengono rotte se non da vna parte, farai così, vedi quanto manca dal rotto che vuoi trarre, fino a vñ intero, cioè da $\frac{1}{4}$ che vuoi trarre fino a vñ intero, vi manca $\frac{3}{4}$. poni $\frac{3}{4}$. e tienti a mente 1. per l'integrità, che hai prestata sopra $\frac{1}{4}$. & il detto 1. lo deuì cauare dal numero intero 5. cioè di 5. resta 4. e così hauerai, che a cauare $\frac{1}{4}$ di 5. resta 4. $\frac{5}{8}$. Con il medesimo ordine si può cauare rotte di rotte, e rotte di sani, e rotte; ma fa bisogno hauer gran pratica in detti rotte.

$$\begin{array}{r}
 \frac{3}{8} \text{ di } \frac{5}{1} \\
 \times \\
 \hline
 40 \\
 \hline
 3 \\
 \hline
 8) 37 \\
 \hline
 32 \\
 \hline
 5 \\
 \hline
 \text{resta. } 4 \frac{5}{8}
 \end{array}$$

in altro modo. $\frac{5}{1}$

E dicendo, trai $\frac{1}{4}$ di 6. $\frac{1}{2}$. ancorche senza ridurre i sani a rotte, e senza adoperar penna si possa con breuità far detta sottrattione; pur tuttauolta ci piace (per osservare la regola) ridurre l'intero al suo rotto, & hauerai, che bisognerà cauare $\frac{1}{4}$ di $\frac{1}{2}$. moltiplica in croce, ricordandoti della ditione *di*, che è auanti al 13; per moltiplicarsi prima contra il denominatore dell'altro rotto, dicendo 13. via 4. fa 52. dipoi per l'altra croce dirai 2. via 3. fa 6. che tratto di 52. resta 46. dipoi moltiplica i denominatori l'vno via l'altro, cioè 2. via 4. fa 8. per il quale parti 46. ne viene 5. $\frac{5}{8}$. per detta sottrattione.

$$\begin{array}{r}
 \frac{1}{4} \text{ di } \frac{1}{2} \\
 \times \\
 \hline
 52 \\
 \hline
 6 \\
 \hline
 8) 46 \\
 \hline
 40 \\
 \hline
 6 \\
 \hline
 \text{resta. } 4 \frac{6}{8}
 \end{array}$$

E di-

E dicendo tra $6\frac{2}{3}$, di $1\frac{1}{2}$, riduci ogn'intero al suo rotto, haurai $\frac{20}{3} \cdot \frac{2}{3} +$ moltiplica in croce, cioè 63 , via 3 , fa 189 , e per l'altro verso moltiplica 4 , via 20 , fa 80 , che tratto di 189 , resta 109 , poi moltiplica i denominatori l'vno via l'altro, cioè 3 , via 4 , fa 12 , per il qual parti 109 , ne viene $9\frac{1}{12}$, per detta sottrattione.

$$\begin{array}{r} 30 \text{ di } 4 \\ 3 \times 4 \\ \hline 12 \\ 189 \\ \hline 109 \\ 80 \\ \hline 29 \end{array}$$

$$12) 109$$

Et hauendo a trarre vn rotto d'vn altro rotto, e detti rotti sieno di natura simili, come per essempio dicessi, tra $\frac{1}{2}$, di $\frac{2}{3}$, ouero $\frac{2}{3}$, di $\frac{1}{2}$, in queste simili senza moltiplicare in croce, basta trarre il denominante del rotto, che vuoi trarre del denominante di quell'altro, e volendo trarre $\frac{1}{2}$, di $\frac{2}{3}$, cauà 3 , di 5 , resta 2 , che son $\frac{2}{3}$, e volendo trarre $\frac{2}{3}$, di $\frac{1}{2}$, cauà 2 , di 3 , resta 1 , che è $\frac{1}{3}$, e così farai le simili.

Di diuerse domande sopra i rotti.

E Ssendo giunti, noue potremo meglio, e più a pieno dimostrare, come il sommare sia proua del sottrarre, & il sottrarre sia proua del sommare, e similmente il moltiplicare sia proua del partire, & è conuerso, come già nel trattato de' fani si disse, perciò nelle seguenti domande si potrà conoscere le dette proue, ma prima noteremo alcune domande appartenenti al sottrarre, & al moltiplicare.

Qual'è più, e quanto $\frac{2}{3}$, o $\frac{2}{3}$, moltiplica in croce, & il denominante di quel rotto, che li dati maggior prodotto, quel rotto diremo, che sarà maggiore; Laonde moltiplica 3 , via 6 , fa 42 , e questo poni sopra il 7 , denominante, e produttore di esso 42 , poi moltiplica 6 , via 9 , fa 45 , e questo segna sopra il 5 , denominante, e produttore di esso 45 , hora tu vedi, che il 5 , de $\frac{2}{3}$, ha prodotto maggior numero, che non ha fatto il 7 , de $\frac{2}{3}$, per il che diremo, che sia più $\frac{2}{3}$, che $\frac{2}{3}$, ma per saper quanto sia più, cauà 42 , di 45 , resta 3 , e questo parti per la moltiplicatione de' denominatori l'vno via l'altro, cioè 6 , via 9 , fa 54 , per il qual parti il sopradetto 3 , ne viene $\frac{1}{18}$, che schifati sono $\frac{1}{18}$, e così diremo, che $\frac{2}{3}$ sieno più $\frac{1}{18}$, che non sono $\frac{2}{3}$, e così farai le simili.

$$\begin{array}{r} 45 \\ 3 \times 6 \\ \hline 18 \\ 42 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$54) 3$$

D 2

Piglia

Parti tal numero per 6. che ne venga 5. il numero che vogliamo trouare nascerà dalla multiplicatione del partitore, via il numero, che vogliamo, che ne venga, perciò moltiplica 6. via 5. fa 30. e questo è il numero, che partito per 6. ne vien 5. come domandauamo.

Qual numero si partirà per $5\frac{1}{2}$. che ne venga $8\frac{1}{2}$? moltiplica $5\frac{1}{2}$. via $8\frac{1}{2}$. fa $48\frac{1}{4}$. e questo sarà quel numero, che partito per $5\frac{1}{2}$. ne verrà $8\frac{1}{2}$.

Per qual numero si partirà $16\frac{1}{4}$. che ne venga $3\frac{1}{2}$? questa è differente alla sopradetta, perche in quella il partitore è noto, & in questa bisogna trouarlo, però parti $16\frac{1}{4}$. per $3\frac{1}{2}$. ne viene $4\frac{1}{4}$. e questo sarà il numero partitore di $16\frac{1}{4}$. volendo che ne venga $3\frac{1}{2}$. E che sia la verità, risguarda questa ne' sani, dicendo, per qual numero si partirà 24. che ne venga 6? parti 24. per 6. ne vien 4. e questo sarà partitore di 24. e ne verrà 6. appunto.

Parti tal rotto per $\frac{3}{4}$. che ne venga $\frac{1}{4}$. quando il partitore è noto, allora bisogna moltiplicare quel partitore via qualche vuoi che ne venga, & il prodotto sarà quel che si deue partire per il sopradetto partitore, acciò che ne dia d'auuenimento quanto si domanda; moltiplica adunque $\frac{3}{4}$. via $\frac{1}{4}$. fanno $\frac{3}{16}$. e questo è il rotto, che partito per $\frac{3}{4}$. ne viene $\frac{1}{4}$. come si domandaua.

Parti tal rotto per $\frac{1}{4}$. che ne venga $1\frac{1}{8}$. questa non vuole inferir altro, se non trouare vn rotto, che li $\frac{1}{4}$. ci vadino dentro vna volta, & vn sesto, e per trouar tal rotto farai così, moltiplica $\frac{1}{4}$. via $1\frac{1}{8}$. fanno $\frac{1}{8}$. e questo sarà quel rotto, che partito per $\frac{1}{4}$. ne verrà $1\frac{1}{8}$. auuertendo, che questo non è vn sano, ma si dice, che li $\frac{1}{4}$. entrano in $\frac{1}{8}$. vna volta, & vn sesto.

Parti $\frac{1}{4}$. per tal rotto, che ne venga $1\frac{1}{8}$. perche in questa il partitore non è noto, bisogna partire $\frac{1}{4}$. per $1\frac{1}{8}$. ne viene $\frac{2}{9}$. e questo sarà il partitore di $\frac{1}{4}$. il quale ci darà d'auuenimento $1\frac{1}{8}$. come si richiede.

Moltiplica 6. via tal numero, che faccia 30. questa domanda deriuu dal partire, parti adunque 30. per 6. ne vien 5. e questo sarà il numero, che moltiplicato via 6. farà 30. come voleuamo.

Via qual numero si moltiplicherà $3\frac{1}{2}$. acciò che faccia $20\frac{1}{2}$? parti $20\frac{1}{2}$. per $3\frac{1}{2}$. ne viene $5\frac{1}{4}$. e questo sarà il numero, che moltiplicato via $3\frac{1}{2}$. farà $20\frac{1}{2}$.

Via qual numero si moltiplicò $\frac{2}{7}$. che il prodotto fu $6\frac{1}{2}$? questa è simile alla sopradetta, parti $6\frac{1}{2}$. per $\frac{2}{7}$. ne viene $9\frac{1}{4}$. e questo è quel numero, che moltiplicato via $\frac{2}{7}$. farà $6\frac{1}{2}$.

Con qual numero si aggiunto $5\frac{1}{4}$. che fece $12\frac{1}{2}$? questa domanda deriuu dal sottrarre; perciò trai $5\frac{1}{4}$. di $12\frac{1}{2}$. resta $7\frac{1}{4}$. e con questo numero si aggiungerà $5\frac{1}{4}$. e farà $12\frac{1}{2}$. secondo la nostra proposta.

Con qual rotto s'aggiungerà $\frac{2}{7}$. che faccia $\frac{2}{7}$? auuerti, che quando ti fuisse proposto, che douosse far meno di $\frac{2}{7}$. cioè del rotto, col quale si deue aggiungere il rotto da trouarsi: allora resolutamente dirai tal dimanda essere insolubile, perche se a vna cosa aggiungerai vn'altra cosa, il congiunto deue far più di quella cosa, alla quale è stata aggiunta l'altra, e non meno, e questo lo conoscerai in virtù di quella domanda indietro posta, la qual dice, qual'è più, e quanto &c. però troua la differenza, che è tra $\frac{2}{7}$. di $\frac{2}{7}$. resta $\frac{1}{7}$. e questo sarà quel rotto, che aggiunto con $\frac{2}{7}$. farà $\frac{2}{7}$. secondo la nostra domanda.

Di qual rotto fu tratto $\frac{2}{7}$. che restò $\frac{1}{7}$? questa domanda deriuu dal sommare, somma adunque $\frac{2}{7}$. con $\frac{1}{7}$. fanno $\frac{3}{7}$. e questo è quel rotto, del quale fu tratto $\frac{2}{7}$. e restò $\frac{1}{7}$.ianne proua.

tra i primi due rotti, resterà la differenza, che è tra i secondi rotti sopradetti.

Moltiplica li $\frac{2}{7}$. di $\frac{2}{7}$. via tanti quinti, che faccino $6\frac{2}{5}$. Prima piglia $\frac{2}{5}$. di $\frac{2}{7}$. ne viene $\frac{4}{35}$. hor moltiplica $\frac{1}{5}$. via tal numero, che faccia $6\frac{2}{5}$. fa così, parti $6\frac{2}{5}$. per $\frac{1}{5}$. ne vien 12. e di questo fanno quinti, faranno 65. quinti, e così diremo, che li $\frac{2}{7}$. di $\frac{2}{7}$. si moltiplicaranno via 65. quinti, e faranno $6\frac{2}{5}$. fanno proua, e lo vedrai.

Domandasi $\frac{1}{4}$. di quanti terzi sono li $\frac{2}{7}$. prima bisogna sapere $\frac{2}{7}$. di che numero sono li $\frac{1}{4}$. che si troua partendo $\frac{2}{7}$. per $\frac{1}{4}$. ne viene $\frac{8}{7}$. e di questo li $\frac{1}{4}$. sono $\frac{2}{7}$. perche se si piglia $\frac{1}{4}$. di $\frac{2}{7}$. ne viene $\frac{2}{28}$. Hor per uedere $\frac{2}{7}$. quanti terzi sono, parti $\frac{2}{7}$. per $\frac{1}{3}$. ne viene $2\frac{2}{7}$. e di tanti terzi sono li $\frac{1}{4}$. cioè di due terzi, e mezzo, fanno proua a tuo piacere.

Caua li $\frac{2}{7}$. di $\frac{1}{4}$. di tanto, che resti li $\frac{3}{7}$. di $\frac{2}{7}$. Prima piglia $\frac{3}{7}$. di $\frac{1}{4}$. ne viene $\frac{3}{28}$. poi piglia $\frac{2}{7}$. di $\frac{1}{4}$. ne viene $\frac{2}{28}$. il quale aggiungi con $\frac{3}{28}$. fanno $\frac{5}{28}$. e di tanto si cauaranno. Fanne proua, caua $\frac{5}{28}$. di $\frac{1}{4}$. resta $\frac{3}{7}$. e se di $\frac{2}{7}$. ne cauarei $\frac{3}{7}$. restara $\frac{1}{7}$. che sono le parti de' sopradetti rotti.

Dammi la differenza, che è dalli $\frac{2}{7}$. de $\frac{1}{4}$. alli $\frac{4}{7}$. de $\frac{2}{7}$. Prima piglia $\frac{2}{7}$. di $\frac{2}{7}$. ne viene $\frac{4}{7}$. poi piglia $\frac{2}{7}$. di $\frac{2}{7}$. ne viene $\frac{4}{7}$. hora la domanda dice così, dammi la differenza, che è da $\frac{4}{7}$. a $\frac{1}{7}$. caua $\frac{3}{7}$. da $\frac{4}{7}$. resta $\frac{1}{7}$. e questa è la differenza, che si troua tra le parti de' sopradetti rotti, secondo la proposta.

Piglia la metà, che è tra $\frac{1}{4}$. e $\frac{2}{7}$. somma $\frac{1}{4}$. con $\frac{2}{7}$. fanno $1\frac{1}{14}$. e di questo piglia la metà; ne viene $\frac{1}{7}$. per la metà che si ricercaua.

Domandasi 7. di che numero sono $\frac{2}{7}$ e $\frac{1}{7}$. di che numero, ouero rotto sono $\frac{2}{7}$? queste sono due domande, la prima delle quali non uol dir altro, che moltiplicare $\frac{2}{7}$. uia tal numero, che faccia 7. per ilche, offeruando i nodi, & ammaestramenti detti di sopra, partirai 7. per $\frac{2}{7}$. ne viene $1\frac{1}{2}$. e questo è quel numero, che 7. ne sono li $\frac{1}{2}$. perche se tu pigli $\frac{1}{2}$. d'8. $\frac{3}{2}$. ne vien 7. E per la seconda domanda, parti $\frac{1}{7}$. per $\frac{2}{7}$. ne viene $\frac{2}{7}$. e questo sarà quel rotto, che li $\frac{1}{7}$. ne faranno $\frac{2}{7}$. perche pigliando $\frac{2}{7}$. di tal rotto, ne viene $\frac{1}{7}$. il che serue per la sua proua. Nota bene, che noi diciamo, che $\frac{2}{7}$. faranno $\frac{2}{7}$. di $\frac{2}{7}$. laonde partirai $\frac{1}{7}$. per $\frac{2}{7}$. ne uerrà $\frac{2}{7}$. e perciò habbiamo detto, che $\frac{1}{7}$. sono $\frac{2}{7}$. di $\frac{2}{7}$.

Parti 18. per tal numero, che ne uenga 10. & auanzi 7. Perche la domanda uol che auanzi 7. dirai $\frac{7}{18}$. e se uolesti che auanzasse 5. diresti $\frac{5}{18}$. & auanzando 4. diresti $\frac{4}{18}$. e così seguendo un punto più il denominatore del denominante. Hora in questa proposta, dice che uol che ne uenga 10. sani, però parti 10. ne viene $1\frac{1}{2}$. e questo sarà quel numero partitore di 18. per il quale ne uerrà 10. & auanzerà 7.

Del recare a parte, & altre varie domande.

Domandasi 3. che parte è di 9? e $\frac{2}{7}$. che parte sono di $\frac{1}{4}$? e $3\frac{1}{2}$. che parte sono di $10\frac{1}{2}$? queste sono 2. domande, & il modo di recare a parte è molto bello, e comodo al ragioniere, perche si fanno le ragioni con molta breuità, ma bisogna auuertire, che il più, mai puol essere parte del meno, e uolendo soluere le sopra dette proposte, cominceremo dalla prima, per la quale uogliamo sapere, 3. che parte sia di 9. parti adunque il numero minore, che è 3. per il numero maggiore, che è 9. ne viene $\frac{1}{3}$. che schisati sono $\frac{1}{3}$. per ilche diremo, che 3. sia la terza parte di 9. cioè $\frac{1}{3}$. Hor soluasi la seconda domanda, uolend noi sapere $\frac{2}{7}$. che parte sono di $\frac{1}{4}$. ci conuien partire $\frac{2}{7}$. per $\frac{1}{4}$. ne viene $\frac{8}{7}$. e tal

Domandasi $\frac{2}{3}$. d'vna libbra, quante oncie sono, perche vna libbra è 12. oncie, però prendi $\frac{2}{3}$. di 12. ne viene $6\frac{2}{3}$. e così diremo, che $\frac{2}{3}$. d'vna libbra sono oncie $6\frac{2}{3}$.

Domandasi $\frac{2}{3}$. d'un anno, quanti mesi, e giorni sono, perche un'anno è 12. mesi, però prendi $\frac{2}{3}$. di 12. ne viene mesi $4\frac{2}{3}$. hora è da uedere $\frac{2}{3}$. d'un mese quanti giorni sono, preudi $\frac{2}{3}$. di 30. (perche un mese è diuiso in 30. giorni) ne uien 20. e così dirai, che $\frac{2}{3}$. d'un anno sono mesi 4. e giorni 20.

Domandasi $\frac{1}{4}$. d'una canna, quante braccia sono; perche la canna si diuide in 4. braccia, però prendi $\frac{1}{4}$. di 4. ne uien $1\frac{1}{4}$. e così dirai, che $\frac{1}{4}$. d'una canna sono braccia $1\frac{1}{4}$.

Domandasi $\frac{2}{3}$. d'una salma quante staia sono, perche una salma è staia $11\frac{1}{4}$. però prendi $\frac{2}{3}$. di $11\frac{1}{4}$. ne uien $4\frac{1}{2}$. e tante staia dirai, che sieno $4\frac{1}{2}$. d'una salma.

Del multiplicare lire, soldi, e denari diuersamente.

Forse a qualcheduno parrà, che troppo habbiamo tardato a dimostrare il modo del multiplicare lire, soldi, e denari uia qual numero ci piace; la qual cosa habbiamo fatto per esplicar prima tutt' i traugliamenti de' rotti, e perciò hora ne daremo quella più facil dichiarazione, che si potrà, il che faremo in ogn' altra nostra operatione.

Hauendosi a multiplicare *lit. 20. sol. 13. den. 7.* uia 6. nel soluere simili proposte, sono diuersi pareri, perciò che alcuni cominciano a multiplicare dalle lire, poi i soldi, e poi i denari, secondo il modo Fiorentino; alcuni altri poi, cominciano a multiplicare dai denari, e poi i soldi, e poi le lire, che è il più commune uso; Laonde, e l'uno, e l'altro modo intendiamo di mostrare; seruasi poi l'operante di quel che più gli piace; E prima operaremo secondo l'uso Fiorentino, cominciando a multiplicare dalle lire; tirando prima una linea sotto quelle lire, soldi, e denari, che vogliamo multiplicare. Fatto questo multiplica 6. uia *lit. 20.* fa *lit. 120.* le quali poni sotto le *lit. 20.* dipoi multiplica il detto 6. uia soldi 14. fa soldi 78. de' quali farai lire, che sono lire 3. sol. 18. e queste poni gradatamente sotto le lire 120. dipoi multiplica il detto 6. uia denari 7. fa denari 42. de' quali ne farai soldi, sono sol. 3. e den. 6. e questi poni sotto le lire 3. sol. 18. gradatamente, cioè le lire sotto le lire, i soldi sotto i soldi, e i denari, sotto i denari, dipoi somma ogni cosa insieme, trouerai che faranno lire 124. sol. 1. den. 6. per detta multiplicatione.

lit.	20.	sol.	13.	den.	7.	(6.)
	120.	o.	o.			
	3.	18.	o.			
	o.	3.	6.			
lit.	124.	1.	6.			

Vogliamo per il più commune uso dimostrare la medesima multiplicatione, poni lire 20. soldi 13. den. 7. con una linea sotto, e da man destra tra due linee, come uedi, poni 6. tuo multiplicatore, dipoi comincia dai denari, e multipli-

376. via 8. denari, fanno denari 3008. de' quali farai soldi, che sono soldi 250. & auanza denari 8. poni 8. denari, che t'auanza, e salua 250. soldi, dipoi moltiplica 376. via soldi 16. fanno soldi 6266. de' quali farai lire, che sono lire 313. & auanza soldi 6. poni soldi 6. che t'auanza, e salua lire 313. dipoi moltiplica 376. via lire 37. fanno lire 13912. & a queste aggiungi lire 313. che saluasti, fanno in tutto lire 14225. soldi 6. den. 8. per detta multiplicatione.

lir.	37.	16.	8.	(376.)
lir.	14225.	6.	8.	

† E volendo multiplicare lire, soldi, e denari via vn rotto; come per effempio dicessi, moltiplica lire 16. soldi 15. den. 4. via $\frac{1}{4}$. la qual proposta non vuol dir altro, che questo, cioè, dammi li $\frac{1}{4}$. di lire 16. sol. 15. den. 4. ouero piglia $\frac{1}{4}$. delle dette lire, che in tutt' i modi riferisce, e risulta il medesimo; Et in due modi la detta proposta si può risolvere, e prima moltiplica 3. denominante del rotto tuo multiplicatore via lire 16. soldi 15. den. 4. nel sopradetto modo, cominciando dai denari, trouerai, che farà lire 50. soldi 6. den. 0. e questi parti per 4. denominatore di detto rotto, ne viene lire 12. soldi 11. den. 6. per detta multiplicatione.

lir.	16.	15.	4.	$\frac{1}{4}$.
4)	50.	6.	0.	
	12.	11.	6.	

† E per l'altro modo, a voler multiplicare lire 16. soldi 15. den. 4. via $\frac{1}{4}$. parti prima lire 16. soldi 15. den. 4. per 4. denominatore del rotto tuo partitore, ne viene lire 4. sol. 3. den. 10. e tanto ne viene per vn quarto; dipoi moltiplica lire 4. sol. 3. den. 10. via 3. denominante di detto rotto, fa lire 12. sol. 11. den. 6. per detta multiplicatione, come di sopra.

lire 16.	15.	4	$\frac{1}{4}$.
4.	3.	10	
lire 12.	11.	6	

¶ E dicendo se vn fiorino valesse lire 4. sol. 16. den. 8. si domanda $\frac{1}{4}$. d'vn fiorino, quante lire, soldi, e denari farebbono, fa così, piglia $\frac{1}{4}$. di lire 4. sol. 16. den. 8. nel modo sopradetto, trouarai, che faranno lire 4. sol. 0. den. 6. $\frac{2}{3}$. e così farai le simili.

lire	4.	16.	8.	$\frac{1}{4}$.
6)	24.	3.	4.	
	4.	0.	6. $\frac{2}{3}$.	

† Et hauendo a multiplicare lire, soldi, e denari via sani, e rotti insieme, come se dicessi, moltiplica lire 18. soldi 13. den. 4. via 12. $\frac{1}{3}$. Prima moltiplica $\frac{1}{3}$.
via

E dicendo trai $6\frac{2}{3}$, di $13\frac{1}{4}$, riduci ogn'intero al suo rotto, haurai $\frac{20}{3}$ di $\frac{53}{4}$ +
 multiplica in croce, cioè 63 , via 3 , fa 189 , e per l'altro verso multiplica 4 , via
 20 , fa 80 , che tratto di 189 , resta 109 , poi multiplica i denominatori l'vno via
 l'altro, cioè 3 , via 4 , fa 12 , per il qual parti 109 , ne viene $9\frac{1}{12}$, per detta sot-
 trazione.

$$\begin{array}{r} 12 \text{ di } 11 \\ 3 \times 4 \\ \hline 1 \quad 8 \quad 9 \\ \quad 8 \quad 0 \\ \hline \end{array}$$

$$12) 109$$

Et hauendo a trarre vn rotto d'vn altro rotto, e detti rotti sieno di natura si-
 mili, come per essempio dicessi, trai $\frac{1}{2}$, di $\frac{2}{3}$, ouero $\frac{2}{3}$, di $\frac{1}{2}$, in queste simili
 senza multiplicare in croce, basta trarre il denominante del rotto, che vuoi
 trarre del denominante di quell'altro, e volendo trarre $\frac{1}{2}$, di $\frac{2}{3}$, cauà 3 , di 5 ,
 resta 2 , che son $\frac{2}{3}$, e volendo trarre $\frac{2}{3}$, di $\frac{1}{2}$, cauà 2 , di 3 , resta 1 , che è $\frac{1}{3}$, e
 così farai le simili.

Di diuerse domande sopra i rotti.

E Sfendo giants, doue potremo meglio, e più a pieno, dimostrare, come il
 sommare sia proua del sottrarre, & il sottrarre sia proua del sommare, e si-
 milmente il multiplicare sia proua del partire, & è conuerso, come già nel
 trattato de' sani si disse, perciò nelle seguenti domande si potrà conoscere le det-
 te proue, ma prima noteremo alcune domande appartenenti al sottrarre, & al
 multiplicare.

Qual'è più, e quanto $\frac{1}{2}$, ò $\frac{2}{3}$, multiplica in croce, & il denominante di quel
 rotto, che ti dà il maggior prodotto, quel rotto si serra, che sarà maggiore;
 Laonde multiplica 3 , via 6 , fa 42 , e questo poni sopra il 7 , denominante, e pro-
 ducente di esso 42 , poi multiplica 6 , via 9 , fa 45 , e queste segna sopra il 5 , de-
 nominante, e produttore di esso 45 , horato rotti, che il 5 , & $\frac{45}{5}$, ha prodotto
 maggior numero, che non ha fatto il 7 , & $\frac{42}{7}$, per il che diremo, che ha più
 che $\frac{2}{3}$, ma per saper quanto sia più, cauà 42 , di 45 , resta 3 , e questo parti per la
 multiplicatione de' denominatori l'vno via l'altro, cioè 6 , via 9 , fa 54 , per il qual
 parti il sopradetto 3 , ne viene $\frac{1}{18}$, che schifati sono $\frac{1}{18}$, e così diremo, che $\frac{1}{2}$
 s'è più $\frac{1}{18}$, che non sono $\frac{2}{3}$, e così farai le simili.

$$4 \quad 5 \quad 4 \quad 2$$

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{1}{18}$$

D 2

Piglia

Parti tal numero per 6. che ne venga 5. il numero, che vogliamo trouare, nascerà dalla multiplicatione del partitore, via il numero, che vogliamo, che ne venga, perciò multiplica 6. via 5. fa 30. e questo è il numero, che partito per 6. ne vien 5. come domandauamo.

Qual numero si partirà per $5\frac{2}{3}$. che ne venga $8\frac{1}{2}$? multiplica $5\frac{2}{3}$. via $8\frac{1}{2}$. fa $48\frac{1}{2}$. e questo sarà quel numero, che partito per $5\frac{2}{3}$. ne verrà $8\frac{1}{2}$.

Per qual numero si partirà $16\frac{1}{4}$. che ne venga $3\frac{1}{2}$? questa è differente alla sopradetta, perche in quella il partitore è noto, & in questa bisogna trouarlo, però parti $16\frac{1}{4}$. per $3\frac{1}{2}$. ne viene $4\frac{1}{4}$. e questo sarà il numero partitore di $16\frac{1}{4}$. volendo che ne venga $3\frac{1}{2}$. E che sia la verità, riguarda questa ne' fani, dicendo, per qual numero si partirà 24. che ne venga 6? parti 24. per 6. ne vien 4. e questo sarà partitore di 24. e ne verrà 6. appunto.

Parti tal rotto per $\frac{3}{4}$. che ne venga $\frac{1}{4}$. quando il partitore è noto, allora bisogna multiplicare quel partitore via qualche vuoi che ne venga, & il prodotto sarà quel che si deuè partire per il sopradetto partitore, acciò che ne dia d'auuenimento quanto si domanda; multiplica adunque $\frac{3}{4}$. via $\frac{1}{4}$. fanno $\frac{3}{16}$. e questo è il rotto, che partito per $\frac{3}{4}$. ne viene $\frac{1}{4}$. come si domandaua.

Parti tal rotto per $\frac{1}{4}$. che ne venga $1\frac{5}{8}$. questa non vuole inferir altro, se nò trouare vn rotto, che li $\frac{1}{4}$. ci vadino dentro vna volta, & vn sesto, e per trouar tal rotto farai così, multiplica $\frac{1}{4}$. via $1\frac{5}{8}$. fanno $\frac{5}{8}$. e questo sarà quel rotto, che partito per $\frac{1}{4}$. ne verrà $1\frac{5}{8}$. auuertendo, che questo non è vn sano, ma si dice, che li $\frac{1}{4}$. entrano in $\frac{5}{8}$. vna volta, & vn sesto.

Parti $\frac{1}{4}$. per tal rotto, che ne venga $1\frac{5}{8}$. perche in questa il partitore non è noto, bisogna partir $\frac{1}{4}$. per $1\frac{5}{8}$. ne viene $\frac{2}{7}$. e questo sarà il partitore di $\frac{1}{4}$. il quale ci darà d'auuenimento $1\frac{1}{2}$. come si richiede.

Multiplica 6. via tal numero, che faccia 30. questa domanda deriua dal partire, parti adunque 30. per 6. ne vien 5. e questo sarà il numero, che multiplicato via 6. farà 30. come voleuamo.

Via qual numero si moltiplicherà $3\frac{1}{2}$. acciò che faccia $20\frac{2}{3}$? parti $20\frac{2}{3}$. per $3\frac{1}{2}$. ne viene $5\frac{1}{3}$. e questo sarà il numero, che multiplicato via $3\frac{1}{2}$. farà $20\frac{2}{3}$.

Via qual numero si multiplicò $\frac{3}{7}$. che il prodotto fu $6\frac{1}{2}$? questa è simile alla sopradetta, parti $6\frac{1}{2}$. per $\frac{3}{7}$. ne viene $9\frac{1}{2}$. e questo è quel numero, che multiplicato via $\frac{3}{7}$. farà $6\frac{1}{2}$.

Con qual numero si aggiunto $5\frac{3}{4}$. che fece $12\frac{1}{2}$? questa domanda deriua dal sottrarre; perciò trai $5\frac{3}{4}$. di $12\frac{1}{2}$. resta $7\frac{1}{4}$. e con questo numero si aggunderà $5\frac{3}{4}$. e farà $12\frac{1}{2}$. secondo la nostra proposta.

Con qual rotto s'aggiungerà $\frac{4}{7}$. che faccia $\frac{2}{3}$? auverti, che quando ti fusse proposto, che douosse far meno di $\frac{4}{7}$. cioè del rotto, col quale si deuè aggiungere il rotto da trouarsi: allora resolutamente dirai tal dimanda essere insolubile, perche se a vna cosa aggunderai vn'altra cosa, il congiunto deuè far più di quella cosa, alla quale è stata aggiunta l'altra, e non meno, e questo lo conoscerai in virtù di quella domanda indietro posta, la qual dice, qual'è più, e quanto &c. però troua la differenza, che è tra $\frac{4}{7}$. di $\frac{2}{3}$. resta $\frac{1}{6}$. e questo sarà quel rotto, che aggiunto con $\frac{4}{7}$. farà $\frac{2}{3}$. secondo la nostra domanda.

Di qual rotto fu tratto $\frac{1}{6}$. che restò $\frac{1}{6}$? questa domanda deriua dal sommare, somma adunque $\frac{1}{6}$. con $\frac{1}{6}$. fanno $\frac{2}{6}$. e questo è quel rotto, del quale fu tratto $\frac{1}{6}$. e restò $\frac{1}{6}$. fanno proua.

che quando i multiplicatori di minor valore, si possono ridurre a parte di quello di maggior valore, purché ne peruenga vn rotto basso, e facile, sarà sempre più breue, e leggiadro operare, ma quando nel ridurre a parte simili multiplicatori, ne peruenisse vn rotto alto, il quale non si potesse abbassare con schifar- lo, in tal caso è meglio lasciare stare i multiplicatori, senza ridurli a parte, & operare come di sopra habbiamo dimostrato, e questo nostro auuertimento ser- uati per auuiso in tutte le multiplicazioni, doue fussero più multiplicatori.

Lire	15	15	4	$12\frac{2}{3}$
	5	5	$1\frac{1}{3}$	
	10	10	$2\frac{2}{3}$	
	189	4	0	
Liro	199	14	$2\frac{2}{3}$	

Del Multiplicare moggia, staia, e quarti via vn numero.

Volendo multiplicare moggia, staia, e quarte via qualsiuoglia numero, come se dicessi, multiplica moggia 8. staia 15. e 3. quarte via 6. sappi che 24. staia sono vn moggio, e 4. quarte, sono vno staio. Poni in tauola moggia 8. staia 15. e tre quarte, tirando vna linea sotto, e da man destra poni 6. tuo multiplicatore, dipoi comincia dalla cosa di minor valore, cioè dalle quarte, e multiplica 6. via tre quarte fa 18. quarte, delle quali farai staia, che sono staia 4. e 2. quarte, poni 2. quarte sotto le 3. e salua 4. staia; dipoi multiplica il detto 6. via 15. staia, fa 90. e 4. che saluasti farà 94. staia, delle quali farai mog- gia, che sono moggia 3. e staia 22. poni 22. sotto il 15. e salua 3. moggia, dipoi multiplica 6. via 8. moggia, fa 48. e 3. che saluasti, fa 51. moggia, e queste po- ni sotto l'8. moggia, & hauerai che detta multiplicatione farà moggia 51. sta- ia 22. e 3. quarti.

mog.	8.	st.	15.	q.	3.	(6
	51.	22.	2.			

E volendo multiplicare moggia, staia, e quarti via vn rotto, o via fani, e rot- ti; offerua il modo del multiplicare lire, soldi, e denari via rotte, e via fani, e rotte insieme.

Del multiplicare libbre, once, danari, e grani via qual numero ti piace.

Volendo multiplicare libbre, once, denari, e grani via fani, o fani, e rotte come più ci piace, farai così. Poniamo, che haueffimo a multiplicare libbre 122. once 6. denari 10. e grani 12. via $8\frac{1}{4}$. sappi, che 12. once fanno vna libbra, e 24. danari, ouero danapefi fanno vn'oncia, e 24. grani fanno vn danaro. Saputo questo, poni in tauola libbre 122. once 6. dan. 10. gra. 12. e da man de- stra poni $8\frac{1}{4}$. tuo multiplicatore; dipoi parti lib. 122. on. 6. den. 10. e gra. 12. per 4. denominatore de $\frac{1}{4}$. tuo multiplicatore, dicendo il 4. in 122. v'entra 30. volte,

✚ E dicendo parti lire 30. fol. 16. den. 8. per $\frac{7}{2}$. se hauerai ben' a m' mo si l'au-
uifo, che da noi ti sù dato nel partir de' rotti, ti ricorderai, che deu' in simili
proposti, si troua questa ditione *per*, significa sempre quel numero, ouero rotto
esser partitore, adunque hora nel promuniare questa nostra proposta, si dice
così, parti per 7. del $\frac{2}{2}$. e non per 8. laonde, se il 7. farà (come veramente è)
partitore l'8. farà multiplicatore, però multiplica lir. 30. fol. 16. den. 8. via 8.
facendone ottaiui, fanno lir. 246. fol. 13. den. 4. e questo parti per 7. nel modo
sopradetto, ne viene lir. 35. fol. 4. den. 9 $\frac{1}{2}$. per detta partitione.

$$\begin{array}{r} \frac{7}{2}) \text{ Lire } 30. \quad 16. \quad 8. \\ \hline \cdot 246. \quad 13. \quad 4. \\ \cdot 35. \quad 4. \quad 9\frac{1}{2}. \end{array}$$

✚ E dicendo, parti lir. 64. fol. 18. den. 4. per 4 $\frac{3}{4}$. perche il tuo partitore termi-
na in terzi, bisogna ridurre in terzi quel che vuoi partire; multiplica adunque
lir. 64. fol. 18. den. 4. via 3. cominciando dai denari, come poco auanti habbia-
mo dimostrato, trouarai che farà lir. 194. fol. 15. den. 0. e questo lo partirai per
4 $\frac{3}{4}$. riducendo ancora questo partitore in terzi, che sono 14. terzi, hora tu hai
a partire lir. 194. fol. 15. den. 0. per 14. come puri numeri; ne viene lire 13.
fol. 18. den. 2 $\frac{1}{2}$. per detta partitione.

$$\begin{array}{r} 4\frac{3}{4}) \text{ Lire } 64. \quad 18. \quad 4. \\ \hline 14) \quad 194. \quad 15. \quad 0. \\ \quad 13. \quad 18. \quad 2\frac{1}{2}. \end{array}$$

✚ E dicendo, parti lire 24. soldi 16. den. 8. per lire 5. fol. 13. den. 4. questa, &
altre simili in più modi si possono risolvere, ma il primo da noi più vfato è que-
sto, cioè, riduci fol. 13. e den. 4. del tuo partitore a parte di lira, che per i do-
cumenti dati, trouarai che sono $\frac{2}{3}$. hora tu hai a partire lire 24. soldi 16. den. 8.
per lire 5. $\frac{2}{3}$. perche il tuo partitore termina in terzi, ti conuien far tutti terzi
del partitore, & anco di quel che vuoi partire, di poi osserua il modo della so-
pradetta, e trouarai, che ne verrà lire 4. fol. 7. den. 7 $\frac{1}{2}$. e se per vn' altro mo-
do la vorrai risolvere, farai così, reca a parte di lira, tanto i soldi, e den. che
vuoi partire, quanto i soldi, e den. del partitore; haurai adunque, che ti con-
uerrà partire lire 24 $\frac{2}{3}$. per lire 5 $\frac{2}{3}$. operarai come nel partir de' rotti da noi sù
dimostrato, e trouarai, che ne verrà lire 4 $\frac{1}{3}$. che ridotti a soldi, e den. sono
lire 4. fol. 7. den. 7 $\frac{1}{2}$. come di sopra per il primo operare.

$$\begin{array}{r} 5\frac{2}{3}) \text{ Lir. } 24. \quad 16. \quad 8. \\ \hline 17) \quad 74. \quad 10. \quad 0. \\ \quad 4. \quad 7. \quad 7\frac{1}{2}. \end{array}$$

✚ E volendo partire libbre 26. once 10. dan. 18. e grani 20. per 4. poni 4. tuo
partitore da n' an sin' ista, di poi vedi quante volte il detto 4. entra in libbre 26.
trouarai, che v'entra 6. volte, poni 6. sotto il 26. & auanza 2. libbre, delle quali
farai

farai once, sono once 24. & a questi aggiungi once 10. che vuoi partire, fanno once 34. le quali partite per il detto 4. ne viene 8. poni 8. sotto le 10. once, & auanza 2. once, delle quali farai danari, che sono danari 48. & a questi aggiungi danari 18. che vuoi partire, fanno danari 66. i quali parti per 4. ne vien 16. poni 16. sotto li 18. danari, & auanza 2. danari, de quali farai grani, che sono 48. grani, a i quali aggiungi 20. grani, che vuoi partire, fanno grani 68. che partiti per 4. ne vien 17. segna 17. sotto li 20. grani, & hauerai che ne viene in tutto libbre 6. once 8. danari 16. e grani 17. per detta partitione, e queste vogliamo che bastino a esserti scorta, e guida ad ogn'altra partitione di monete, pesi, e misure, con rotti, o senza, che da te stesso potrai comprendere facilmente il modo.

4) Libbre 26.	10.	18.	20.
6.	8.	16.	17.

E volendo multiplicare libbre, once, danari, e grani, via libbre, once, danari, e grani, ouero multiplicare lire, soldi, e denari, via lire, soldi, e denari, ouero multiplicar moggia, staia, e quarti, via altre moggia, staia, e quarti, o altri pesi, o monete, o misure, non fare come hanno fatto alcuni poco pratici, che hauendo a multiplicare lire 3. fol. 3. den. 3. via lir. 3. fol. 3. den. 3. hanno ridotto in den. l'vna, e l'altra parte, che ciascuna è den. 759. & hāno multiplicato den. 759. via den. 759. che fanno 576081. e questi hanno detto, che son denari de quali hanno fatto lire, che secondo la loro opinione, per d. multiplicatione ne verrebbe lire 2400. fol. 6. den. 9. cosa in vero molto ridicolosa, e lontana dalla verità, perche il multiplicare denari via denari, il prodotto di essi nō son denari, ma sono dugentoquarantesimi di denari, cioè, che ogni 240. punti di tal prodotto fanno vn denaro, perliche se partirai 576081. per 240. ne verrà denari 2400. $\frac{2}{3}$ $\frac{9}{10}$. che ridotti a lire, sono lir. 10. fol. 0. den. 0. $\frac{2}{3}$ $\frac{9}{10}$. e perciò in queste multiplicationi, offerua le regole da noi date, si come ancora per questo secondo esempio potrai comprendere. Multiplica libbre 16. once 4. den. 12. e grani 12. via libbre 6. once 8. den. 10. e grani 16. farai così, poni in tavola quelle libbre, & once, che vuoi multiplicare, e da mā destra poni quelle libbre, & once, che hanno a seruire per tuo multiplicatore, anchorche scambian sole niente importarebbe, dipoi parti per 12. le libbre 16. once 4. den. 12. e grani 12. ne viene libbre 1. once 4. den. 9. e grani 1. e tanto ne viene per la multiplicatione d'vn'uncia; e se questo lo partirai per 24. l'aumentamento sarà quel che tocca a multiplicare per vn denaro; e se questo secondo auuenimēto, lo partirai per 24. quel che te ne verrà per detto partimento, sarà quel che tocca a multiplicare per vn grano, si come alla fine di questa nostra dichiarazione con le dimostrazioni, e figure potrai meglio comprēdere; fatto questo tira vna linea sotto il terzo auuenimento delle partitioni, dipoi multiplica 16. grani (che è vno de' tuoi multiplicatori) via quel che ne viene per vn grano, e quel prodotto che farà lo metterai sotto la detta linea; dipoi multiplica 10. denari, che è vn'altro de' tuoi multiplicatori, via quel che ne viene per vn denaro, & il prodotto che ne peruerà lo metterai sotto a quei denari, e grani, che ti resultò della prima multiplicatione; dipoi multiplica 8. once via quel che ne viene per vn'uncia, & il prodotto poni sotto, dipoi multiplica libbre 6. via libbre 16. once 4. den. 12. & il prodotto poni sotto a gli altri prodotti, fatto questo somma insieme questi quattro prodotti, distintamente le libbre dall'once, e l'once dai

dai denari, & i denari dai grani, come di sotto vedi, hauerai che faranno in tutto libbre 109. onc. 9. den. 10. e gra. $0\frac{4}{7}$. per detta multiplicatione.

12)	16.	4.	12.	12.	6	8	10	16
24)	1.	4.	9.	1.				
24)	0.	0.	16.	$9\frac{1}{2}$				
	0.	0.	0.	$16\frac{1}{2}$				
	0.	0.	10.	$22\frac{1}{2}$				
	0.	6.	19.	$18\frac{1}{2}$				
	10.	11.	0.	8.				
	98.	3.	3.	0.				
Libbre 109.					9.	10.	$0\frac{4}{7}$.	

Non resta senza proposito, e commodo nostro, ma più per utilità d'altri ci siamo dilatarati intorno alle cose de' rotti, e multiplicationi, e partitioni di monete, pesi, e misure, perciò che mediante le sopradette dichiarazioni noi non haueremo più bisogno di replicare, segna, o poni tanto, e salua tanto, e così moltiplica la figura, che è sotto, o sopra la linea del tal rotto, & altre cose, che tediarebbono troppo a lettori.

Come si riduchino le lire a ducati, o scudi, o fiorini, secondo che più ti piace.

Volendo ridurre vna quantità di lire a ducati, ci conuieni partire quella tal quantità di lire, per tante lire, quanto vale vn ducato, come per esempio se ti fusse detto li r. 386. fol. 16. den. 4. quanti ducati sono a lir. 7. per ciascū duc. fa così, parti lir. 386. fol. 16. den. 4. per 7. nel modo che habbiamo dimostrato nel partir di lire, soldi, e denari per numero intero, trouarai, che ne verrà ducati 55. fol. 5. e den. $2\frac{2}{7}$. e tanti ducati diremo che sono le sopradette lire. Ma nota, & intendi bene, che i soldi, e denari, che ci sono peruenuti fuori de' ducati 55. non sono soldi, e denari di piccioli, cioè soldi correnti, ma sono soldi, e denari a oro, che vno di detti soldi vale fol. 7. correnti, e così vno di detti denari a oro, vale 7. denari correnti, e sempre che noi diremo tanti soldi, o den. a oro, noi intendiamo, & intender si deue da ciascuno, che vno di detti soldi, o vno di detti denari vaglia tanti soldi, o tanti denari correnti, quante lire vale il ducato, o lo scudo, o il fiorino, con i quali faranno accompagnati i detti soldi, e denari a oro. Intendendo sempre, & operando (per non generar confusione) che vn ducato, o vno scudo, o vn fiorino vaglia fermamente soldi 20. a oro, e ciascun soldo a oro poi vale tanti soldi correnti, quante lire vale il ducato, o lo scudo, o il fiorino, come di sopra habbiamo detto.

7)	Lir. 386.	16.	4.
	Duc. 55.	5.	$2\frac{2}{7}$.

VE dicendo lir. 526. fol. 18. den. 4. quanti scudi d'oro sono a lir. $7\frac{1}{2}$. per scudo? Fa così parti lir. 526. fol. 18. den. 4. per $7\frac{1}{2}$. come nel partir di lire, fol. e denari habbiamo dimostrato, trouarai, che ne verrà scudi 70. soldi 5. den. $1\frac{1}{2}$.

E

E di-

7 $\frac{1}{2}$)	Lire	526.	18.	4.
15)		1053.	16.	8.
	Scudi	70.	5.	1 $\frac{1}{2}$.

† E dicendo lir. 2350. fol. 16. den. 4. quanti fiorini sono a lir. 4. fol. 16. den. 8. il fiorino? Fà così, parti lir. 2350. fol. 16. den. 4. per lir. 4. fol. 16. den. 8. recado prima a parte di lira fol. 16. den. 4. i quali sono $\frac{1}{2}$. d'vna lira, parti adunque per 4 $\frac{1}{2}$. le sopradette lire, trouarai che ne verrà fiorini 486. fol. 7. den. 5. $\frac{1}{2}$. come di sotto vedi.

4 $\frac{1}{2}$)	Lire	2350.	16.	4.
29)		14104.	18.	0.
		486.	7.	6 $\frac{1}{2}$.

† E dicendo, ducati 128. fol. 15. den. 8. a oro a lir. 7. per ducato, quante lire sono? multiplica la quantità de' duc. fol. e den. via 7. cominciando dai den. trouarai che faranno lir. 901. fol. 9. den. 8.

Duc.	128.	15.	8.	(7)
Lire	901.	9.	8.	

† E dicendo, scudi 223. fol. 16. den. 8. d'oro a lir. 7. $\frac{1}{2}$. per scudo, quante lire sono? multiplica scudi 223. fol. 16. den. 8. via 7 $\frac{1}{2}$. come nel multiplicar delle lir. fol. e den. habbiamo dimostrato, trouarai che faranno lir. 1678. fol. 15. et tante lire faranno i sopradetti scudi.

Scudi	223.	16.	8.	7 $\frac{1}{2}$.
	111.	18.	4.	
	1566.	16.	8.	
Lire	1678.	15.	0.	

† E dicendo, fiorini 326. fol. 15. den. 4. a lir. 5. fol. 16. den. 8. il fiorino, quante lire sono? fa così, reca fol. 16. den. 8. a parte di lira, i quali sono $\frac{1}{2}$. d'vna lira, dipoi multiplica lir. 326. fol. 15. den. 4. via 5 $\frac{1}{2}$. come nel multiplicare di lire, fol. e den. via interi, e rotti faccesti; ouero multiplica lir. 326. fol. 15. den. 4. via lir. 5. fol. 16. den. 8. come nel multiplicare di lir. fol. e den. via lire fol. e den. habbiamo dimostrato, partendo i fiorini per 20. e quel che ne viene lo partirai per 12. trouarai che all'vno, & all'altro modo tornerà il medesimo, e quest'ordine terrai, quando tu non potessi recare a parte di lira (se non con rotto difficile) quei soldi, e denari, che hanno da seruire per tuoi multiplicatori.

Fiorini	326.	15.	4.	5 $\frac{1}{2}$.
6)	54.	9.	2 $\frac{3}{4}$.	
	272.	6.	1 $\frac{1}{2}$.	
	1633.	16.	8.	
Lire	1906.	2.	9 $\frac{1}{2}$.	

Volendo

Volendo vna quantita di ducati (che per altro uocabolo commune si chiama-
no feudi di moneta) ridurli a feudi d'oro con breuita, senza ridurli prima a lire,
come per effempio, se dicessi così. Ducati 320. fol. 16. den. 3. a lire 7. per du-
cato, quanti feudi d'oro sono a lire 7 $\frac{1}{2}$. per feudo, fa così, perche lo feudo di
moneta, o vogliamo dire il ducato, vale lir. 7. cioè 14. carlini, e lo feudo d'oro
vale 15. carlini, però bisogna tor via vn carlino per feudo; e restaranno feudi
d'oro. Conuene adunque de' sopradetti ducati 320. fol. 16. den. 3. cauare 320.
carlini, cioè a ragione d'vn carlino per feudo; per il che, parti carlini 320. fol.
16. den. 3. per 15. perche ogni 15. carlini fanno vn feudo d'oro, trouarai che per
d. partitione ne verrà feudi 21. fol. 7. den. 9. i quali tratti di duc. 320. fol. 16. den. 3.
restano duc. 299. fol. 8. den. 6. d'oro, e così hauerai ridotti li feudi di moneta a
feudi d'oro.

Duc.	320.	16.	3.
15)	21.	7.	9.
Duc.	299.	8.	6. d'oro.

Così per il contrario, quando tu voleffi ridurre feudi d'oro a feudi di moneta
e senza prima ridurli a lire, come per effempio, e per proua della sopradetta, si
dicessi così. Seudi 299. fol. 8. den. 6. d'oro a lire 7 $\frac{1}{2}$. per feudo, quanti feudi di
moneta sono, a lire 7. per ciascuno feudo? fa così parti feudi 299. fol. 8. den. 6.
per 14. ne viene feud. 21. fol. 7. den. 9. i quali sommarai insieme con li feudi 299.
fol. 8. den. 6. faranno in tutto feudi 320. fol. 16. den. 3. di moneta, cioè di lire 7.
per feudo.

Seudi 299.	8.	6.
14)	21.	7.
Seudi 320.	16.	3.

di moneta.

Dichiarationi per intelligenza de' principianti.

A Voler fare di denari soldi, parti i denari per 12. l'aumento saranno
soldi, e l'auanzo saranno denari.

A voler di soldi far denari, multiplica i soldi via 12. & il prodotto sarà den.

A voler fare di soldi lire, parti i soldi per 20. o per scapezzo, l'aumento
saranno lire, e l'auanzo saranno soldi.

A voler far di lire soldi, multiplica le lire via 20. & il prodotto sarà soldi.

A voler far d'onze libbre, parti l'onza per 12. (andando però 12. onze alla
libbra) e l'aumento saranno libbre, e l'auanzo saranno onze.

A voler far di libbre onze, multiplica libb. via 12. & il prodotto sarà onze.

Vna libbra è 12. onze; vn marco d'oro è 8. onze, vn'oncia è 24. denari, vn
denaro è 24. grani.

La libbra dell'oro in valuta ferma pesa per 56. feudi, e l'oncia dell'oro vale
8. feudi, & vno feudo pesa 72. grani, con il qual ordine si può sapere quante
granella di grano sono in vno staio, o in vn sacco, o in vn moggio, dandoli il
peso di tante libbre per staio, ma conuerrebbe, che i grani fossero egualmente
grossi e proportionati di peso alli 72. grani, che pesa vno feudo.

LIBRO SECONDO

DELLA REGOLA

DEL TRE.



Auendo fin qui (con l'aiuto di Dio) sufficientemente trattato sopra le cinque parti principali della pratica d'Aritmetica, cioè numerare, sommare, sottrarre, multiplicare, e partire, così di più, come di rotti, e di esse datone quelle più facili dichiarazioni, che da noi sia stato possibile. Seguita hora, che dimostriamo la regola delle tre cose, o quattro proportionali, la quale i Pratici matrici chiamano regola d'oro, e dai Pratici vulgari è chiamata a Regola del Tre. L'inestimabil commodità, & vtilità, ch'essa n'apporta, la lasceremo giudicare a coloro, che s'esercitano a maneggiare i numeri, e trafficare mercantie, conciosia che fra le cose proportionali non occorre difficoltà, o dubbio alcuno, che non si leui col beneficio di questa regola.

Sappi, che in questa regola interuengono quattro quantità, ouero numeri proportionali, de' quali tre sempre son noti, & il quarto ignoto, e volendo trouare la quarta quantità ignota, è di necessità multiplicare la seconda via la terza, ouero la terza via la seconda, che tanto fa; & il prodotto partire per la prima quantità, e l'auuenimeto sarà sempre la quarta quantità che si cerca a noi ignota. Ma è da auuertire che la prima quantità conuiene che sia sempre della natura della terza, come per effempio chiaramente dimostreremo, dicendo così 8. pere vagliono 12. quattrini, che varranno 10. pere? E queste diciamo essere quelle tre quantità note, per il che tu vedi chiaramente, che la prima quantità è dell'istessa natura, e qualità della terza, cioè pere. Laonde conuien multiplicare la seconda quantità via la terza, cioè 12. quattrini via 10. pere; che vogliamo valutare, farà 120. e questo parti per la prima quantità, cioè per 8. ne vien 15. e questa è la quarta quantità proportionale, & è dell'istessa materia della seconda quantità, perche a questo 15. con tal proportionione risponde il 10. che l'8. corrisponde al 12. che l'una, e l'altra corrisponde per sesquialtera, cioè per la metà. Per il che hauendo inteso la natura, ordine, & operationi di detta regola del tre, facilmente verrai in cognitione di quei quesiti, che di mano in mano metteremo, fondati sopra detta regola, con le dichiarazioni facilissime.

Ancorche molti valent'huomini, anzi tutti quelli, che intorno alle Pratiche d'Aritmetica hanno scritto, si sieno sforzati (per intelligenza de' giouani studiosi di tali discipline) di dichiarare la regola del Tre, con quella maggior dilucidatione, e facilità c'hanno saputo; nientedimeno ancor noi a loro imitatione non vogliamo restar di dirne il parer nostro per vtilità commune; & acciò che con più facilità il principiante apprenda il nostro modo di procedere nella Regola del Tre, cominceremo in questa maniera, andando ordinatamente dalle cose facili alle difficili. Dicoti dunque, che essendoci proposto tre quantità note, la prima si chiama manifesta, la seconda si chiama non simile, e

la terza si chiama simile alla manifesta, come per essempio, diremo così; le vn braccio di tela vale soldi 16. che varranno braccia 30? Noi habbiamo qui tre cose note, la prima è vn braccio di tela, che è la cosa manifesta, perche noi sappiamo la sua valuta, la quale è soldi 16. e perciò il detto 1. cioè vn braccio, richiede esser posto per la prima quantità da man sinistra; dipoi tu vedi che li soldi sedici non è cosa simile, nè alla prima, nè alla terza quantità, e perciò conuen porla per la seconda quantità; dipoi tu vedi, che 30. braccia di tela, che vogliamo valutare, è cosa simile alla prima quantità, cioè dell'istessa natura, e di più è quella quantità, della quale cerchiamo sapere la sua valuta, la qual valuta sarà poi la quarta quantità proportionale; e perciò il detto 30. richiede esser posto per la terza quantità da man destra, e la cosa non simile sempre si pone nel mezzo; cioè infra la cosa manifesta, e la cosa simile alla manifesta. Volendo adunque soluere la sopradetta proposta; multiplica la terza quantità via la seconda; cioè braccia 30. di tela via soldi 16. faranno 480. e perche per la prima quantità noi habbiamo vno, perciò non puoi diuidere 480. ma resta in tuo officio, e della medesima natura della seconda quantità, cioè tutti soldi, i quali ridotti a lire, sono lire 24. Onde dirai, che braccia 30. di tela a soldi 16. il braccio vagliono lire 24.

Nota che quella cosa della quale vuoi sapere la valuta, conuen sempre metterla nel terzo luogo; ma perche occorrerà spesso volte, che tutte tre le quantità faranno ducati, o lire, o braccia, o libbre; sappi che non perciò ne seguirà, che siano tutte simili; perche se per la prima quantità noi haucremo ducati, i detti ducati faranno capitale, ouero guadagno, ouero capitale, e guadagno insieme; che di tal quantità deue essere ancora la terza quantità; ma la seconda quantità non deue essere simile nè alla prima, nè alla terza quantità, come per essempio, si dice così. Ducati 8. guadagno ducati 2. si domanda 12. ducati alla medesima ragione quanto guadagneranno; se bene noi habbiamo che tutte tre le quantità sono ducati, non tedi meno la proposta stia bene in regola, perche la prima quantità è capitale, & è manifesto che il detto capitale guadagna ducati 2. Il detto 2. adunque, che è la seconda quantità, farà guadagno assoluto; il quale non è simile, nè alla prima, nè alla terza quantità. Habbiamo poi la terza quantità, cioè ducati 12. che è simile alla prima, cioè proprio capitale; ma non ha ancora operato, o vogliamo dire, non ci ha manifestato il suo guadagno; e perciò richiede esser posta nel terzo luogo, multiplica adunque 12. via 2. fa 24. il qual parti per 8. ne vien 3. e questa è la quarta quantità proportionale, la quale è simile alla seconda cosa a noi nota, cioè guadagno assoluto. E dicendo braccia 3. di Fiorenza tornano in Siena braccia 3 $\frac{1}{2}$. si domanda braccia 24. di Fiorenza quante torneranno in Siena? se bene in questa proposta son tutte braccia, non sono però tutte d'un paese, nè simili in lunghezza; e perche la prima, e la terza quantità sono d'un medesimo luogo, e la seconda quantità è di differente luogo; perciò diremo, che tal proposta stia bene in regola, multiplica adunque braccia 24. di Fiorenza, via braccia 3 $\frac{1}{2}$. di Siena, faranno 75. il qual parti per braccia 3. di Fiorenza, che è la cosa manifesta, ne viene braccia 25. le quali sono della natura della seconda quantità, cioè braccia alla misura di Siena.

E dicendo, se con tre ducati si compra braccia 6. di panno; con lire 40. quante braccia se ne comprerà, queste tre quantità son tutte diuerse di natura, cioè ducati, braccia, e lire, e pur la proposta stia bene in regola, ancorche sia il contrario,

rtatio, secondo i nostri documenti; ma certamente se noi consideriamo quali siano queste due nature, cioè della prima, e terza quantità, conosceremo che sono differenti, e che non sono d'un medesimo nome, se bene son quasi simili in specie, cioè tutti danari da spendere, perche la prima quantità vien nominata in ducati, e la terza vien nominata in lire, laonde fa bisogno ridurre li ducati in lire, ouero le lire in ducati, acciò che la prima, e terza quantità sieno d'una medesima natura, e nome, e così farai di tutte l'altre quantità proporzionali, riducendo sempre la terza quantità alla natura della prima: ouero la prima alla natura della terza, e per la terza quantità si deue metter sempre quella cosa della quale si cerca sapere la sua valuta. Hor per tornare alla sopradetta proposta, qual dice, che per 3. ducati si compra braccia 6. di panno, e noi vogliamo sapere per lire 40. quante braccia se ne comprerà, fa così, riduci li 3. ducati in lire, che a lire 7. per ducato sono lire 21. e così haueremo che la prima, e terza quantità faranno simili, cioè tutte lire; per ilche multiplica la terza quantità via la seconda, cioè lire 40. via braccia 6. di panno, farà 240. e questo parti per la prima quantità, che è la cosa manifesta, cioè per lire 21. ne viene $11\frac{2}{7}$. e questa diremo, che sia la quarta quantità proporzionale, la quale farà della natura della seconda, cioè braccia, e così diremo, che per lire 40. si comprerà braccia $11\frac{2}{7}$. di panno.

$$\begin{array}{r} 21 \overline{) \quad 6 \quad 40} \\ \underline{\quad \quad \quad} \\ 240 \\ 11\frac{2}{7} \end{array}$$

Ma quando la proposta fusse data al contrario, che la terza quantità fusse posta nel luogo della prima; allora, & in tal caso conuiene riuoltar le quantità, e metterle per ordine secondo i nostri documenti, come per esempio si dicesse così, libbre 16. di seta quanto varranno alla medesima ragione, che libbre 4. simili valsero lire 50. questa proposta non è in regola, perciò che quella quantità della quale vogliamo saper la sua valuta è posta nel luogo della cosa manifesta, cioè nel primo luogo; laonde col tuo giuditio essendo la proposta irregolare, la farai regolare, dicendo così; se libbre 4. di seta vagliono lir. 50. quāto varranno libbre 16. e così hauerai accordato, che la prima, e terza quantità faranno d'una medesima natura, e di più hauerai posto nel terzo luogo quella quantità, della quale vogliamo sapere la sua valuta, che è quanto a noi importa dimostrar; fatto questo multiplica la seconda cosa via la terza, cioè lir. 50. via libbre 16. di seta, farà 800. e questo parti per la prima quantità, cioè per libb. 4. che è la cosa manifesta, ne viene lir. 200. per la valuta di lib. 16. di seta.

$$\begin{array}{r} 4 \overline{) \quad 50 \quad 16} \\ \underline{\quad \quad \quad} \\ 800 \\ 200 \end{array}$$

E dicendo, il braccio del panno vale lir. 6. sol. 13. den. 4. si domanda quanto varranno braccia 16. simili. Molti altri Scrittori Arismetici pratici, hanno consumato (quando la seconda quantità è stata nominata da più nomi) ridurre tutti

tutti quei nomi a vn nome solo, come in questa proposta, che la seconda quantita vien nominata da tre nomi, cioe da lire, soldi, e denari, per il che ridurrebbono ogni cosa a denari, che farebbono den. 1600. e multiplicherebbono questi denari via le braccia 16. che vogliono valutare, farebbono 25600. denari, de' quali conuien faine soldi, e lire, che secondo i nostri documenti faranno lire 106. sol. 13. den. 4. Ma noi no intendiamo in questa nostra opera di voler operare, ne trattare secondo i modi, e riti d'altri scrittori, ne se il modo del loro operare sia o piu breue, o piu longo, obuono, o cattiuo, ma solo intendiamo voler dimostrare, e dichiarare quei modi, e regole da noi offeruate, e che giudichiamo sieno per esser piu facili ai lettori. Tornando adunque alla nostra propositione, qual dice, se vn braccio di panno vale lire 6. sol. 13. den. 4. si domanda quanto varranno braccia 16. simili. Fa cosi, multiplica braccia 16. via lire 6. sol. 13. den. 4. cominciando dai denari, secondo che nel multiplicare di lire, soldi, e denari via quasiuoglia numero da noi fu dimostrato, trouerai, che farà lire. 106. sol. 13. den. 4. per la valuta di dette braccia 16. di panno.

1) lire 6 13 4 16.			
<u>106 13 4</u>	Proua	1*1	Proua
	per 7.	4	per 9.
			4*4
			7

Volendo per la proua del 7. o del 9. prouare se la sopradetta proposta sia ben
resoluta, fa così, e prima per la proua del 7. Prendi prima la proua per 7. di quel
la cosa, che vuoi valutare, cioè di braccia 16. di panno, getta via i settennari, a
modo di partire, tronarai che auanzarà 2. per la proua di 16. il qual 2. poni so
pra la crocetta, come nella proua del multiplicare numero via numero al suo
luogo dimostrammo, dipoi prendi la proua per 7. di lir. 6. sol. 13. den. 4. par
tendo per 7. le dette lire, soldi, e denari, trouarai che auanza 4. il qual poni a
pie della crocetta, fatto questo, multiplica la prima proua via la seconda, cioè
2. via 4. fa 8. del quale prendi la proua per 7. ne viene 1. e questo poni dal de
stro lato della crocetta; resta hora a trouare la proua della valuta di braccia
16. di panno, cioè la proua di lir. 106. sol. 13. den. 4. le quali partirai per 7. trou
arai, che auanzarà 1. per la proua, il qual segna dal sinistro lato della crocetta,
e perche la proua delle 2. proue, cioè la figura che è posta dal dextro lato della
crocetta cocorda, & è vguale alla figura posta dal sinistro lato di tal crocetta,
perciò diremo, che la d. soluzione sia bene, ma quando le dette due figure non
venissero uguali, offeruando il predetto ordine, si potrebbe giudicare, che detta
soluzione stesse male, e così da te stesso potrai prouare per la proua del 7. o
del 9. ogn'altra proposta, mediante questi nostri documenti.

47 E dicendo, la libbra d'alcuna mercantia vale lir.6. fol.12. den. 4. si domanda quanto varranno libb. $12\frac{1}{2}$. multiplica $12\frac{1}{2}$. via lir.6. fol.12. den.4. trouarai che farà lir.82. fol. 14. den. 2. per la valuta di dette libbre $12\frac{1}{2}$. e volendone far la proua per 7. o per 9. fa così delle libbre $12\frac{1}{2}$. ne farai mezzi, faranno 25. mezz libbre, del quale prendi la proua per 7. come numero intero ne vien 4. il qual poni sopra la crocetta; dipoi piglia la proua di lir. 6. fol.12. den. 4. trouarai, che farà 6. il qual poni sotto la crocetta, hor multiplica la prima proua via la seconda, cioè 4. via 6. fi 24. del quale cauara la prima proua che è 3. e questo poni dal destro lato della crocetta, dipoi prédi la proua di lir.82. fol.14. den.2. trouarai, che farà 5. del quale ti conuien far mezzi, perche delle libbre $12\frac{1}{2}$. ne facci mezzo libbre, e poi ne prendesti la proua, e perciò del detto 5.

facendone mezzi, faranno 10. mezzi; del qual 10. prendi la proua per 7. come puro numero ne vien 3. per la proua, il qual poni dal sinistro lato della crocetta, e scontrerà con la figura del destro lato più, o meno, che fusse venuto, si potrà giudicare che tal solutione stesse male.

$$\begin{array}{r}
 1) \quad \text{tir. } 6. \quad 12 \quad 4 \quad 12\frac{1}{2} \\
 \hline
 \quad \quad 3. \quad 6. \quad 2. \\
 \quad \quad 79. \quad 8. \quad 0. \\
 \hline
 \text{tir. } 82. \quad 14. \quad 2.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Proua} \quad 4 \\
 \text{per } 7. \quad 3\frac{1}{2} \\
 \hline
 \quad \quad 6
 \end{array}$$

E dicendo il braccio del panno vale tir. 6. sol. 12. den. 6. si domanda quanto varranno braccia $13\frac{1}{2}$. opera come nella sopradetta, moltiplica $13\frac{1}{2}$. via tir. 6. sol. 12. den. 6. trouarai, che farà tir. 87. sol. 9. den. 0. per la valuta di braccia $13\frac{1}{2}$. Fanne proua per 7. o per 9. come ti piace, hor pigliane la proua per 7. e prima caua la proua di $13\frac{1}{2}$. riducendo l'interi a quinti sono 66. quinti, del qual piglia la proua per 7. come puro numero ne vien 3. il qual poni sopra la crocetta, dipoi caua la proua di tir. 6. sol. 12. den. 6. trouarai, che farà 1. il qual poni da piè della crocetta, fatto questo, moltiplica la prima proua via la seconda, cioè 3. via 1. fa 3. del quale, perche non se ne può cauare la proua per 7. resta il medesimo 3. per proua delle due proue, per il che poni il detto 3. dal destro lato della crocetta. Resta hora che tu prendi la proua di lire 87. sol. 9. den. 0. trouarai che farà 2. il qual bisogna ridurre a quinti, che sono 10. quinti, e di questo prendi la proua per 7. come puro numero, ne vien 3. il quale scontra con la figura del destro lato della crocetta, come voleuamo. Nota, che le proue che ti verranno per 7. o per 9. delle valute delle mercantie, ti conuien sempre ridurli a mezzi, o terzi, o quarti, o quinti, secondo che hauerai ridotto quelle braccia, o libbre, o staja &c. che hauerai valutato, e poi prendine la proua come puri numeri.

$$\begin{array}{r}
 1) \quad \text{tir. } 6. \quad 12. \quad 6. \quad 13\frac{1}{2} \\
 \hline
 \quad \quad 1. \quad 6. \quad 6. \\
 \quad \quad 86. \quad 2. \quad 6. \\
 \hline
 \text{tir. } 87. \quad 9. \quad 0.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Per } 7. \quad 3\frac{1}{2} \\
 \hline
 \text{Per } 9. \quad 3 \\
 \hline
 \quad \quad 6
 \end{array}$$

E dicendo, la libbra d'alcuna mercantia vale tir. 16. sol. 13. den. 8. si domanda quanto varranno once 7. A voler soliere questa, prima ti conuien trovare quanto vale vn'oncia, e perche vna libbra ordinariamente si diuide in 12. once, perciò parti tir. 16. sol. 13. den. 8. per 12. ne viene tir. 1. sol. 7. den. 9. $\frac{2}{3}$. per la valuta d'vn'oncia, e se questo lo moltiplicarai via le 7. once, hauerai la valuta di esse; facendo così, moltiplica once 7. via 2. denominante de $\frac{2}{3}$. d'vn denaro, fa 14. il qual parti per 3. denominatore, ne uien 4. & auanza $\frac{2}{3}$. poni $\frac{2}{3}$. e salua 4. denari, dipoi moltiplica 7. once uia den. 9. fa 63. al quale aggiungi den. 4. che sa luasti, sarà 67. denari, che sono sol. 5. e den. 7. poni 7. den. e salua 5. soldi, dipoi moltiplica 7. once, uia 7. soldi, sarà 49. soldi, ai quali aggiungi soldi 5. che

che saluasti faranno soldi 54. che sono lir. 2. fol. 14. poni fol. 14. e salua lire 2. dipoi multiplica 7. once via vna lira, farà 7. lire, alle quali aggiungi lir. 2. che saluasti faranno lire 9. le quali segnarai come di sotto vedi, e così hauremo, che le 7. once variano lire 9. fol. 14. den. 7 $\frac{2}{7}$.

12)	Lire	16.	13.	8.
		1.	7.	9 $\frac{2}{7}$.
		9.	14.	7 $\frac{2}{7}$.

Once 7.

La sopradetta propoſta ſi poteua ſoluere ancora per regola del 3. dicendo, ſe once 12. (cioè vna libra) coſtano lir. 16. fol. 13. den. 8. che coſtaranno once 7 $\frac{2}{7}$ multiplica le 7. once via lir. 16. fol. 13. den. 8. farà lir. 116. fol. 15. den. 8. quali parti per 12. cioè per la coſa manifeſta, ne viene lir. 9. fol. 14. den. 7 $\frac{2}{7}$. come di ſopra per il primo operare.

12)	Lire	16.	13.	8.	7.
		116.	15.	8.	
		9.	14.	7 $\frac{2}{7}$.	

E dicendo la libbra d'alcuna mercantia vale lir. 18. fol. 16. den. 8. ſi domanda quanto varranno libb. 30. & once 5. fa così, troua prima quanto vale vn'oncia partendo per 12. le lir. 18. fol. 16. den. 8. ne viene lir. 1. fol. 11. den. 4 $\frac{2}{7}$. e tanto vale vn'oncia; dipoi tira vna linea ſotto, e multiplica le 5. once via lir. 1. fol. 11. den. 4 $\frac{2}{7}$. nel modo come di ſopra s'è detto, farà lir. 7. fol. 16. den. 11 $\frac{1}{7}$. per la valuta di 5. once, le quali porrai ſotto la detta linea già tirata; dipoi multiplica libbre 30. con la valuta d'vna libbra, cioè via lir. 18. fol. 16. den. 8. farà lire 565. le quali poni ſotto alla valuta di 5. once, e ſomma inſieme queſte due valute, ouero prodotto, faranno lir. 572. fol. 16. den. 11 $\frac{1}{7}$. per tutta la valuta di libb. 30. & once 5. Sopradette. Fanne proua per 7. Prima piglia la proua di libbre 30. la qual'è 2. e queſto multiplica per 12. fa 24. al quale aggiungi once 5. farà 29. e di queſto prendi la proua per 7. la qual'è 1. e queſto poni ſopra la crocetta; dipoi piglia la proua di quanto vale vn'oncia, cioè di lir. 1. fol. 11. den. 4 $\frac{2}{7}$. trouarai, che farà 3. il quale poni ſotto la crocetta; fatto queſto multiplica la prima proua via la ſeconda, cioè 1. via 3. fa 3. e queſto poni dal deſtro lato della crocetta, dipoi prendi la proua di lire 572. fol. 16. den. 11 $\frac{1}{7}$. trouarai che farà 3. il qual poni dal ſiniſtro lato della crocetta, perſe che tu vedi che ſcòtra con il 3. che poniſti dal deſtro lato. E ſe ne farai ſimilmente la proua per 9. trouarai, che tornerà giuſtiſſima.

12)	Lir.	18.	16.	8.	30	5.	
		1.	11.	4 $\frac{2}{7}$.			Per 7. 3 $\frac{1}{7}$ 3
		7.	16.	11 $\frac{1}{7}$.			Per 9. 7 $\frac{1}{7}$ 5
		565.	0.	0			
	Lir.	572.	16.	11 $\frac{1}{7}$.			

E di-

E dicendo, la libbra d'alcuna mercantia vale $\text{li}. 16. \text{sol}. 12. \text{den}. 8.$ si domanda quanto varranno libb. 20. once 7. e 3. quarti, perche la libbra si diuide in 12. once; e l'oncia si diuide in 4. quarti; perciò è da vedere quanto viene vn'oncia e quanto vn quarto al sopradetto prezzo della libbra, parti adunque $\text{li}. 16. \text{sol}. 12. \text{den}. 8.$ per 12. ne viene $\text{li}. 1. \text{sol}. 7. \text{den}. 8. \frac{2}{3}.$ e tanto vale vn'oncia, hor parti la valuta dell'oncia per 4. ne vien $\text{sol}. 6. \text{den}. 11. \frac{1}{3}.$ e tanto vale vn quarto, dipoi tira vna linea sotto, e moltiplica 20. libbre via la valuta d'vna libbra, & il prodotto poni sotto la linea già tirata; dipoi moltiplica 7. once via la valuta d'vn'oncia, e li tre quarti via la valuta d'vn quarto, e queste tre moltiplicationi le porrai gradatamēte vna sotto l'altra, dipoi sommale tutte insieme, trouara i che faranno $\text{li}. 342. \text{sol}. 8. \text{den}. 2. \frac{1}{3}.$ per la valuta delle soprad. libb. oncie, e quarti,

12)	Lire 16.	12.	8.	20	7	3
4)	1.	7.	8.	16.	14.	12.
	0.	6.	11.	1.	10.	11.
	332.	13.	4.	10.	11.	11.
	9.	14.	0.	7.	10.	11.
	1.	0.	9.	1.	10.	11.
	Lire 342.	8.	2.	1.		

E se dicessi, il quarto de' garofani vale $\text{sol}. 5. \text{den}. 8.$ si domanda quanto varranno libb. 100. Sappi, che poche proposte ti possono esser fatte, le quali non si possono diuersamente, & in più modi risolvere; ma noi le dimostreremo; e dichiareremo secondo quei modi fin qui da noi offeruati; laonde per soluer la d. proposta fa così, troua prima quanto vale vna libbra di garofani, a $\text{sol}. 5. \text{den}. 8.$ il quarto d'vn oncia, trouarai, che la libbra vale $\text{li}. 13. \text{sol}. 12. \text{den}. 0.$ hora deu' vederé quanto vagliono libb. 100. moltiplica lib. 100. via $\text{li}. 13. \text{sol}. 12. \text{den}. 0.$ farà $\text{li}. 1360.$ per la valuta di libb. 100. di garofani; ancora poteui di 100. libbre farne quarti 248. quarti per libbra, e poi valutarli a $\text{sol}. 5. \text{den}. 8.$ al quarto, e ti faria venuto la medesima valuta.

Lir.	0.	5	8.	100	13	12
	1.	2.	8.	13	12.	0.
	13.	12.	0.	100	13	12.
	Lir. 1360.	0.	0.	13	12.	0.

E dicendo, se $\frac{1}{4}$. d'vn braccio di panno costano $\text{li}. 3. \text{sol}. 8. \text{den}. 8.$ che costeranno similmente $\frac{1}{4}$. d'vn braccio? Fa così moltiplica $\frac{1}{4}$. via $\text{li}. 3. \text{sol}. 8. \text{den}. 8.$ ne viene $\text{li}. 2. \text{sol}. 17. \text{den}. 2. \frac{2}{3}.$ e questo parti per $\frac{1}{4}$. che è la cosa manifesta, trouarai, che ne verrà $\text{li}. 3. \text{sol}. 16. \text{den}. 3. \frac{1}{3}.$ per la valuta di $\frac{1}{4}$. d'vn braccio di panno.

$\frac{1}{4}$	Lir.	3.	8.	8.	$\frac{1}{4}$
		17.	3.	4.	
		2.	17.	2.	
3)		11.	8.	10.	
	Lir.	3.	16.	3.	

Prima

Prima, che più oltre si proceda, noi non vogliamo passar con silenzio l'auuertimento, che si deue hauere della varietà delle monete, perciò che secondo i luoghi, e paesi, doue vno si ritroua si deue operare, e considerate come, e quanto sia la lor valuta, così di pesi, come di misure, massimamente l'oro, che hora cresce, & hora cala per la malitia delle monete, ma per tutto vna lira s'intende valere 20. soldi, & il soldo 12. denari, ancorche vna lira sia più grossa d'un'altra, nondimeno ciascuna è 20. soldi; & il soldo 12. denari in ogni luogo, ma sono più grossi i soldi d'vno, che l'altro, e così i denari; si come a Bologna, e quasi per tutta Romagna, e molte parti di Lombardia, che vna lira s'intende 20. Bolognini, & il bolognino si fa di 12. denari; la qual lira è quasi il doppio della nostra di Toscana; perciò per maggior intelligenza c'è parso a proposito dare questo auuertimento, acciò che ritrouandosi in luoghi simili, doue facesse bisogno valutar mercantie, tu possa risolvere i conti rettamente, ancorche molte altre varietà di monete si potrebbero addurre, delle quali per breuità non vogliamo trattare.

¶ Vn sacco di grano, o di qualsiuoglia sorte di biade, per tutta Toscana s'intende, o si fa di tre staia, & vno staio di grano suol pesare ordinariamente dal le 55. alle 58. libbre, secondo la bontà, o tristezza de' grani. Hauendo adunque a valutare vna quantità di sacco di grano a tante lire il sacco, come se per esempio dicessi, il sacco del grano vale lir. 13. sol. 12. den. 8. si domanda quanto varranno sacco 17. fa così, multiplica 17. via lir. 13. sol. 12. den. 8. trouarai che sarà lire 231. sol. 15. den. 4. e tante lire varranno.

1)	Lir.	13.	12.	8.	17.
		231.	15.	4.	

¶ E dicendo, il sacco del grano vale lir. 10. sol. 16. den. 2. si domanda quanto varranno staia 84. In tre modi si può risolvere questa proposta; il primo modo sarà questo, dicendo, se staia 3. cioè vn sacco, vagliono lir. 16. e den. 8. che varranno staia 84. multiplica 84. via lir. 10. sol. 16. den. 8. farà lir. 910. quali partirai per 3. cioè per la cosa manifesta, ne viene lir. 303. sol. 6. den. 8. e tanto varranno le sopradette staia 84. di grano; hor per il secondo modo farai così delle staia 84. ne farai sacco, partendo 84. per 3. ne vien 28. dipoi dirai così, se vn sacco vale lir. 10. sol. 16. den. 8. che varranno sacco 28. multiplica 28. via lir. 10. sol. 16. den. 8. farà lir. 303. sol. 6. den. 8. e tanto varranno le sopradette staia 84. hor volendo soluer per vn'altro modo tal proposta, fa così, troua prima quanto vale vno staio a lir. 10. sol. 6. den. 8. il sacco, trouarai che lo staio varrà lir. 3. sol. 12. den. 2. dipoi dirai, se vno staio vale lir. 3. sol. 12. den. 2. quanto varranno staia 84. multiplica 84. via lir. 3. sol. 12. den. 2. farà lir. 303. sol. 6. den. 8. e così habbiamo dimostrato, che operando diuersamente, ne vien sempre la medesima valuta.

3)	Lire	10.	16.	8.	84.
		910.	0.	0.	
	Lire	303.	6.	8.	

¶ E dicendo il sacco del grano vale lir. 11. sol. 15. den. 6. si domanda quanto varranno sacco 16. staia 2. Ancor questa in tre modi si può risolvere, il primo de' quali

quali è questo, cioè, delle sacca 16. staia $2\frac{1}{2}$. ne farai staia 3. trouarai, che sono staia $50\frac{1}{2}$. dipoi dirai così, se staia 3. costano lir. 11. fol. 15. den. 6. quanto costeranno staia $50\frac{1}{2}$. moltiplica $50\frac{1}{2}$. via lir. 11. fol. 15. den. 6. & il prodotto parti per 3. cioè per la cosa manifesta, trouarai, che ne verrà lir. 199. fol. 3. den. 10 $\frac{1}{2}$. per la ualuta delle sopradette staia.

3)	Lire	11.	15.	6.	$50\frac{1}{2}$
4)		2.	18.	$10\frac{1}{2}$.	
		8.	16.	$7\frac{1}{2}$.	
		588.	15.	0.	
3)		597.	11.	$7\frac{1}{2}$.	
	Lire	199.	3.	$10\frac{1}{2}$.	

E dicendo, la canna del panno, che è 4. braccia uale lir. 18. fol. 16. den. 8. domando quanto uarranno canne 30. braccia $3\frac{1}{2}$. fa così, troua prima quanto uale un braccio, partendo lir. 18. fol. 16. den. 8. per 4. ne uiene lir. 4. fol. 14. den. 2. e tanto uale un braccio, hora ti conuien uedere quato uale un fello d'un braccio, partendo lire 4. fol. 14. den. 2. per 6. ne uiene fol. 15. den. 8 $\frac{1}{2}$. e tanto uale un fello, dipoi tira una linea sotto, e moltiplica 30. canne uia lir. 18. fol. 16. den. 8. che è la ualuta d'una canna, farà lire 565. e questo poni sotto la detta linea, dipoi moltiplica 3. braccia uia lir. 4. fol. 14. den. 2. farà lire 14. fol. 2. den. 6. e queste poni sotto, dipoi moltiplica $\frac{1}{2}$. uia la ualuta d'un fello, cioè moltiplica 5. uia fol. 15. den. 8 $\frac{1}{2}$. farà lir. 3. fol. 18. den. 5 $\frac{3}{4}$. e questo poni sotto, dipoi somma questi tre prodotti insieme, faranno lire 583. fol. 0. den. 11 $\frac{3}{4}$. per la ualuta delle sopradette canne, braccia, e felli.

4)	Lire	18.	16.	8.	30
		4.	14.	2.	$3\frac{1}{2}$
		0.	15.	$8\frac{1}{2}$.	
		565.	0.	0.	
		14.	2.	6.	
		3.	18.	$5\frac{3}{4}$.	
	Lire	583.	0.	$11\frac{3}{4}$.	

E dicendo, la canna del muro, che è 16. braccia, uale lir. 9. fol. 13. den. 4. si domanda quanto uarranno canne 24. braccia $1\frac{1}{2}$. Fa così parti lire 9. fol. 13. den. 4. per 16. per uedere quanto uale un braccio, trouarai che ne uiene fol. 12. den. 1. dipoi tira una linea sotto, e parti detti fol. 12. den. 1. per 3. per uedere quanto uale $\frac{1}{2}$ d'un braccio, trouarai, che ne uiene fol. 4. den. 0 $\frac{1}{2}$. dipoi moltiplica 13. braccia uia la ualuta d'un braccio, cioè uia fol. 12. den. 1. farà lir. 7. fol. 17. den. 1. e questo poni sotto alla ualuta d'un terzo, dipoi moltiplica 24. canne uia lir. 9. fol. 13. den. 4. farà lir. 232. le quali poni sotto, fatto questo somma insieme questi prodotti, trouarai che faranno lir. 240. fol. 1. den. 1 $\frac{1}{2}$. per la ualuta delle sopradette canne.

16)	Lire	9.	13.	4.	24	13 $\frac{3}{4}$.
		0.	12.	1.		
		0.	4.	0. $\frac{3}{4}$.		
		7.	17.	1.		
		232.	0.	0.		
	Lire	240.	1.	1 $\frac{3}{4}$.		

Sappi, che quando ti conuenisse valutare alcune sorti di meroantie, come libbre, & once, tu puoi ridurre l'once a parte di libbra, & hauendo a valutare sacca, e staia, ouero moggia, e staia, tu puoi ridurre le staia a parte d'un sacco, o d'un moggio, & hauendo a valutare canne, e braccia, o pezze di panno, o braccia, tu puoi ridurre le braccia a parte d'una canna, o d'una pezza, e cosi d'ogn' altra cosa, il che facendo farà più maestreuole operare, e più breue, sempre che non ne peruega qualche parte, cioè rotto difficile. Hor volendo soluere la sopradetta per il modo di recare a parte, farai cosi le braccia $12\frac{3}{4}$. riducile a parte di canna, trouarai che faranno $\frac{1}{4}$. dipoi multiplica canne $24\frac{1}{2}$ via lir. 9. sol. 13. den. 4. che è la valuta d'una canna, farà lir. 240. sol. 1. den. $1\frac{3}{4}$. come fece per il primo operare.

1)	Lire	9.	13.	4.	24 $\frac{1}{2}$.
		1.	12.	2 $\frac{3}{4}$.	
		8.	1.	1 $\frac{1}{4}$.	
		232.	0.	0.	
	Lire	240.	1.	1 $\frac{3}{4}$.	

E dicendo, la soma del vino vale lire 16. sol. 16. si domanda quanto varranno some 8. barili 1. fiaschi 7. vn boccale, vna mezzetta, & vn quartuccio, sappi che vna soma di vino in Toscana s'intende 2. barili, & vn barile si diuide in 20. fiaschi, ma in Volterra il barile si fa di 16. fiaschi, & vn fiasco si diuide in due boccali, & vn boccale si diuide in due mezzette, & vna mezzetta si diuide in 2. quartucci, che con più picco la misura non si può mescer vino. Il fiasco del vino deue pesare libbre 6. netto. Volendo hora valutare il sopradetto vino, farai cosi, troua la valuta di ciascuna misura sopradetta da per se, e prima parti lir. 16. sol. 16. per 2. ne viene lir. 8. sol. 8. e tanto vale vn barile, e questo parti per 20. ne viene sol. 8. den. $4\frac{2}{3}$. e tanto vale vn fiasco, e questo parti per 2. ne viene sol. 4. den. $2\frac{2}{3}$. e tanto vale vn boccale, e questo parti per 2. ne viene sol. 2. den. $1\frac{1}{3}$. e tanto vale vna mezzetta, e questo parti per 2. ne viene sol. 1. den. $0\frac{1}{3}$. e tanto vale vn quartuccio; fatto questo tira vna linea sotto l'ultima partitione, dipoi multiplica 8. come, via la valuta d'una soma, e cosi tutte l'altre misure le multiplicarai via le lor valute, e quei prodotti li sommarai insieme, & haue-
rai la valuta di tutto il sopradetto vino.

2)	Lire	16.	16.	0.	8	1	7	1	1	2
20)		8.	8.	0.						
2)		0.	8.	$4\frac{1}{2}$.						
2)		0.	4.	$2\frac{1}{2}$.						
2)		0.	2.	$1\frac{1}{2}$.						
		0.	1.	$0\frac{1}{2}$.						
		0.	1.	$0\frac{1}{2}$.						
		0.	2.	$1\frac{1}{2}$.						
		0.	4.	$2\frac{1}{2}$.						
		2.	18.	$9\frac{1}{2}$.						
		8.	8.	0.						
		134.	8.	0.						
	Lire	146.	2.	$1\frac{1}{2}$.						

E dicendo la soma del vino, la quale è 40. fiaschi vale lir. 15. sol. 16. si domanda quanto varranno some 8. e fiaschi 19. Prima bisogna trouare quãto vale vn fiasco, la qual cosa trouarai se partirai lir. 15. sol. 16. per 40. ma per più comodità partirai per il suo ripiego, che il più commodò ripiego di 40. è 4. e 10. parti aduque lir. 15. sol. 16. per 4. ne viene lir. 3. sol. 19. e questo partirlo per 10. ne viene sol. 7. den. $10\frac{1}{2}$. e tanto varrà vn fiasco; dipoi tira vna linea sotto, e multiplica 19. fiaschi via la valuta d'vn fiasco, & il prodotto poni sotto a detta linea, dipoi multiplica 8. some via la valuta d'vna soma, & il prodotto poni sotto, dipoi somma insieme questi due prodotti, & haerai la valuta delle sopradette some 8. e fiaschi 19. di vino.

4)	Lire	15.	16.	0.	8	19
10)		3.	19.	0.		
		0.	7.	$10\frac{1}{2}$.		
		7.	10.	$1\frac{1}{2}$.		
		126.	8.	0.		
		133.	18.	$1\frac{1}{2}$.		

E dicendo, il moggio del grano, che è staia 24. vale lir. 76. sol. 16. si domanda quanto varranno staia 16. $\frac{2}{3}$. fa così, troua prima quanto vale vno staio, partendo lire 76. sol. 16. per 24. ne viene lire 3. soldi 4. e tanto vale vno staio, troua hora quanto vale vn quarto di staio, partendo lire 3. soldi 4. per 4. ne viene sol. 16. per la valuta d'vn quarto, dipoi tira vna linea sotto; fatto questo multiplica li $\frac{2}{3}$. cioè il 3. denominante di detti $\frac{2}{3}$. via la valuta d'vn quarto, che sono soldi 16. farà lire 2. soldi 8. per la valuta d' $\frac{2}{3}$. d'vno staio, e questo poni sotto la linea già tirata, dipoi multiplica staia 16. via la valuta d'vno staio, cioè via lire 3. soldi 4. farà lire 51. sol. 4. che sommate con lire 2. soldi 8. faranno lire 53. soldi 12. per la valuta di staia $16\frac{2}{3}$. di grano.

24)	Lire	76.	16.	0.	16 $\frac{1}{4}$.
		3.	4.	0.	
		0.	16.	0.	
		2.	8.	0.	
		11.	4.	0.	
	Lire	53.	12.	0.	

Poteuasi ancora moltiplicare le dette staia 16 $\frac{1}{4}$. via lir. 76. fol. 16. che fanno lire 1286. fol. 8. den. 0. e queste partire per 24. ne viene lire 53. fol. 12. den. 0. e farebbe bellissimo, e sicuro operare.

E dicendo, il moggio del grano vale lire 80. fol. 8. si domanda quanto varranno moggia 18. staia 14 $\frac{3}{4}$. fa così, parti lir. 80. fol. 8. per 24. ne viene lir. 3. fol. 7. e tanto vale vno staio, dipoi parti lir. 3. fol. 7. per 5. ne viene fol. 13. den. 4 $\frac{1}{2}$. e tanto vale $\frac{1}{5}$. d'vno staio; fatto questo tira vna linea sotto a dette partitioni, dipoi moltiplica il 2. denominante de' $\frac{3}{4}$. via fol. 13. den. 4 $\frac{1}{2}$. farà lir. 1. fol. 6. den. 9 $\frac{1}{2}$. e tanto varranno $\frac{3}{4}$. d'vno staio, e questo poni sotto la linea, dipoi moltiplica le 14. staia via la valuta d'vno staio, cioè via lir. 3. fol. 7. farà lir. 46. fol. 18. e tanto varranno le 14. staia; dipoi moltiplica 18. moggia via la valuta d'vn moggio farà lire 1447. fol. 4. e tanto varranno 18. moggia; hora ti conuiene sommare tutti tre questi prodotti, trouarai che faranno lire 1495. fol. 8. den. 9 $\frac{1}{2}$. per la valuta di tutto il sopradetto grano.

24)	Lire	80.	8.	0.	18.	14.	$\frac{3}{4}$.
		3.	7.	0.			
		0.	13.	4 $\frac{1}{2}$.			
		1.	6.	9 $\frac{1}{2}$.			
		46.	18.	0.			
		1447.	4.	0.			
	Lire	1495.	8.	9 $\frac{1}{2}$.			

Poteuasi ancora la sopradetta proposta risolvere per regola del tre, in questo modo, cioè, riducendo a staia tutte le moggia 18. e staia 14 $\frac{3}{4}$. le quali sono staia 446 $\frac{3}{4}$. e poi dir così, se staia 24. costano lir. 80. fol. 8. che costarano staia 446 $\frac{3}{4}$? moltiplica 446 $\frac{3}{4}$. via lir. 80. fol. 8. & il prodotto parti per 24. cioè per la cosa manifesta, ne verrà lire 1495. fol. 8. den. 9 $\frac{1}{2}$. come di sopra.

Ancora poteui operare in quest'altro modo molto macisruole, e bello, cioè le staia 14 $\frac{3}{4}$. recarle a parte d'vn moggio; trouarai che faranno $\frac{1}{4}$ d'vn moggio; fatto questo si doueria dir così, se vn moggio di grano vale lir. 80. fol. 8. che varranno moggia 18 $\frac{1}{4}$. moltiplica 18 $\frac{1}{4}$. via lir. 80. fol. 8. farà lir. 1495. fol. 8. den. 9 $\frac{1}{2}$. per la detta valuta.

1) Lire 80. 8. 0. 18 $\frac{1}{2}$.
 16. 1. $7\frac{1}{2}$.

48. 4. $9\frac{1}{2}$.
 1447. 4. 0.

Lire 1495. 8. $9\frac{1}{2}$.

Perche nel valutare molte mercantie occorre spesso volte partire la valuta d'vna cosa per qualche numero alto, il quale apporta fastidio all'operante, volendo conseruare il partitore intero, perciò dimostreremo come si possa partir per ripiego. Hor sia che haueffimo a partire lir. 386. fol. 18. den. 4. per 56. il qual partitore è veramente numero troppo grãde a voler partire in vna volta sola cō la memoria, e perciò fã bisogno trocare il suo ripiego, che il più commodo ripiego di 56. diremo che sia 7. & 8. la onde partendo le sopradette lir. 386. fol. 18. den. 4. per il primo numero del ripiego, cioè per 7. ne viene lire 55. fol. 5. den. $5\frac{1}{2}$. ma questo auuenimento non è di valor nissuno, ma solamente serue per commodità, ma l'ultimo nostro partitore che farà 8. cioè il secondo numero del ripiego, ci darà d'auuenimento tanto, quanto ci darebbe a partire le sopradette lire 386. soldi 18. den. 4. per 56. in vna volta sola; parti adunque lir. 55. fol. 5. den. $5\frac{1}{2}$. per 8. ne viene lir. 6. fol. 18. den. $2\frac{1}{2}$. per l'intera partitione, e perciò attendi a questi nostri documenti; perciò che quando noi haueremo vn partitor difficile a maneggiare con la memoria, senza replicar altro noi troueremo il suo ripiego, per il quale poi partiremo quello ci occorrerà.

9) Lire 386. 18. 4.
 8) 55. 5. $5\frac{1}{2}$. < $\frac{1}{2}$.
 6. 18. $2\frac{1}{2}$.

E dicendo, lo staio della farina, che è libbre 50. vale lir. 3. fol. 16. den. 8. si domanda quanto varranno libb. 17. fã così, parti lir. 3. fol. 16. den. 8. per 50. cioè per il suo ripiego, troua rai che ne viene sol. 1. den. $6\frac{2}{3}$. e tanto vale vna libbra, per il che volendo tu sapere la valuta di 17. libbre, ti conuien multiplicare 17. via sol. 1. den. $6\frac{2}{3}$. trouarai che farà lir. 1. fol. 6. den. $0\frac{2}{3}$. e tanto varranno le 17. libbre.

5) Lire 3. 16. 8. 17.
 10) 0. 15. 4.
 0. 1. $6\frac{2}{3}$.
 Lire 1. 6. $0\frac{2}{3}$.

E dicendo, lo staio della farina vale lir. 5. fol. 10. si domanda quanto varranno libb. 7. & once 9. fã così, troua prima quanto vale vna libbra; partendo lir. 5. fol. 10. per 50. ne viene sol. 2. den. $2\frac{2}{3}$. e tanto vale vna libbra, hora ti conuien trouare quanto valẽ vn'oncia, perciò parti sol. 2. den. $2\frac{2}{3}$. per 12. ne viene den. $2\frac{1}{3}$. e tanto vale vn'oncia; Volendo hora sapere quanto varranno le 7. libbre, e 9. once, multiplica 7. libbre via la valuta d'vna libbra, e le 9. once via la valuta d'vn'oncia, & i lor prodotti sommalì insieme, & hauerai che varranno sol. 17. den. $0\frac{1}{2}$.
 E di-

5)	Lire	5.	10.	0.	7	9
10)		1.	2.	0.		
12)		0.	2.	2 $\frac{2}{5}$		
		0.	0.	2 $\frac{2}{5}$		
		0.	15.	4 $\frac{4}{5}$		
		0.	1.	7 $\frac{7}{5}$		
	Lire	0.	17.	0 $\frac{3}{5}$		

E dicendo, lo staio della farina vale lir. 5. fol. 10. si domanda quanto varranno staia 20. libb. 19. & onz. 7. farai come nella sopradetta, trouando la valuta d'vna libbra, e d'vn'oncia, dipoi moltiplica 7. onze via la valuta d'vn'oncia, dipoi moltiplica 19. libbre via la valuta d'vna libbra, e doppo moltiplica 20. staia a via lir. 5. fol. 10. che è la valuta d'vno staio, e questi tre prodotti sommali insieme, trouarai che faranno lir. 112. fol. 3. den. 1. per tutta la valuta delle sopradette staia, libbre, & onze.

50)	Lire	5.	10.	0.	20.	19.	7.
		0.	2.	2 $\frac{2}{5}$			
		0.	0.	2 $\frac{2}{5}$			
		0.	1.	3 $\frac{3}{5}$			
		2.	1.	9 $\frac{9}{5}$			
		110.	0.	0.			
	Lire	112.	3.	0 $\frac{1}{5}$			

E dicendo, se vna pezza di panno lunga braccia 63. valesse duc. 56. fol. 18. den. 8. quanto varrebbero pezze 12. braccia 7 $\frac{1}{2}$. fa così, riduci le pezze in braccia, faranno in tutto braccia 826 $\frac{1}{2}$. dipoi per regola del tre, dirai così, se braccia 63. costano duc. 56. fo. 18. den. 8. che costaranno braccia 826 $\frac{1}{2}$. moltiplica 826 $\frac{1}{2}$. via duc. 56. fol. 18. den. 8. farà duc. 47074. fol. 7. den. 6 $\frac{1}{2}$. e questo lo partirai per 63. a danda, o per ripiego, o per galera, come più ti piace, trouarai, che ne verrà duc. 747. fol. 4. den. 2 $\frac{1}{2}$. per la valuta delle sopradette pezze, e braccia.

E volèdo risolvere la sopradetta proposta per vn'altro modo assai bello, farai così, troua prima la valuta d'vn braccio, partendo duc. 56. fol. 18. den. 8. per 63. ouero per il suo ripiego, trouarai che ne verrà fol. 18. den. 0 $\frac{1}{2}$. a oro per la valuta d'vn braccio, resta ancora a trouare la valuta d'vn festo d'vn braccio, il che trouarai, partendo la valuta d'vn braccio per 6. ne viene fol. 3. den. 0 $\frac{1}{2}$. a oro, fatto questo tira vna linea sotto, e moltiplica 5. denominante de $\frac{1}{5}$. via fol. 3. den. 0 $\frac{1}{2}$. farà fol. 15. den. 0 $\frac{1}{2}$. e tanto varranno $\frac{1}{5}$. d'vn braccio, dipoi moltiplica le 7. braccia via la valuta d'vn braccio, farà duc. 6. fol. 6. den. 6 $\frac{3}{5}$. e tanto varranno le 7. braccia, dipoi moltiplica le 12. pezze via la valuta d'vna pezza, cioè via duc. 56. fol. 18. den. 8. farà duc. 740. fol. 2. den. 8. fatto questo somma insieme tutti questi tre prodotti, faranno duc. 747. fol. 4. den. 2 $\frac{1}{2}$. che è vguale al sopradetto primo operare.

80)	✓ Duc.	56.	18.	8.	13	7	5
7)		8.	2.	8.			
9)		0.	18.	0.			
		0.	0.	7			
		0.	15.	0			
		6.	6.	6			
		740	2	8			

Lire 747- 4- 2 $\frac{3}{2}$.

Et dicendo così, se il barile dell'olio, che è 110. libbre, valesse lir. 24. fol. 15. che varrebbero barili 12. libb. 7. & once 9. fa così, di 12. barili, e 7. libbre, ne farai libbre, che sono in tutto libb. 1327. perché per le 9. once noi poniamo $\frac{1}{2}$. d'vna libbra, e poi dirai così, se libb. 110. costano lir. 24. fol. 15. che costarano libb. 1327. $\frac{1}{2}$ moltiplica 1327. $\frac{1}{2}$ via lir. 24. fol. 15. & il prodotto parti per 110. trouarai che ne verrà lir. 298. fol. 14. den. 10 $\frac{1}{2}$. Ouero farai in quest'altro modo, troua prima quanto viene vna libbra, partendo lir. 24. fol. 15. per 110. cioè per il suo spiego, ne viene fol. 4. den. 6. e tanto vale vna libbra, e poi parti fol. 4. den. 6. per 12. ne viene den. 4 $\frac{1}{2}$. e tanto vale vn'oncia; hora tu hai la valuta d'vn barile, d'vna libbra, e d'vn oncia, per il che moltiplica 12. barili, 7. libbre, e 9. once via le sopradette lor valute, e quei tre prodotti che ti verranno li sommerai insieme, trouarai che faranno lir. 298. fol. 14. den. 10 $\frac{1}{2}$. per tutta la valuta.

110.							
10)	Lire	24.	15.	0	11	12	7
11)		2.	9.	6.			
12)		0.	4.	6.			
		0.	0.	4			
		0.	3.	4			
		1.	11.	6.			
		297.	0.	0.			

Perche acciò spesso volte vendere, e comprare terreni; & acciò che s'habbi cognitione del modo, che si doue tenere nel valutar le terre, perciò tratteremo di quello, che si offerua in Fiorenza, come Metropoli di Toscana. Sappi adunque, che in Fiorenza si misurano, si vendono, e comprano terreni a staiora, panora, pugnora, e braccia; & vno staioro sono 12. panora, & vn panoro sono 12. braccia, di manierache vno staioro di terra è 1728. braccia quadre; & in Pisati misurano, comprano, e vendono a stiora, e pertiche, delle quali ne va 66. allo stioro, & ogni 3. stiora fanno vno staioro da seme; & a Pescia, e per tutta Valdiniuole si misurano i terreni, si comprano, e vendono a coltre, quartieri, scale, e pertiche. Vna coltra è 4. quartieri, vn quartiere è 30. scale, vna scala è 4. pertiche, & vna pertica è 25. braccia quadre, la qual pertica è lunga 7. braccia da terra, le quali sono vn poco più scarse, che quelle del panno, perciò che

ciò che ogni 96. braccia da pannò, sono 100. braccia da terra, & una coltra di terra è pertiche 480. quadre.

E dicendo, lo staiaro della terra in Fiorenza vale $\text{duc. } 32. \text{ fol. } 16.$ si domanda quanto varranno 24 staiara, 8 panora, 7 pugnora, e 5 braccia. Ha così, riduci tutte le sopradette staiara, panora, e pugnora a braccia, trouarai che in tutto faranno braccia 42713. dipoi dirai così, se braccia 1728. cioè uno staiaro valgliono $\text{duc. } 32. \text{ fol. } 16.$ quanto costaranno braccia 42713? multiplica 42713 per via $\text{duc. } 32. \text{ fol. } 16.$ & il prodotto parti per 1728. trouarai che ne verrà $\text{duc. } 810. \text{ fol. } 15. \text{ den. } 1 \frac{1}{2}.$

Hor foliula per quest'altro modo, troua prima quanto vale vn panoro, partendo duc. 32. fol. 16. per 12. ne viene ducati 2. fol. 14. den. 8. dipoi troua quanto vale vn pugnoro, partendo duc. 32. fol. 14. den. 8. per 12. ne viene fol. 4. den. 6. $\frac{2}{3}$. a oro, dipoi troua quanto vale vn braccio, partendo nuouamente per 12. ne viene den. 4. $\frac{2}{3}$. a oro; hor tu hai la valuta d'vno flaioro, d'vn pugnoro, e d'vn braccio, perciò multiplica 24. flaioro, 8. panora, 7. pugnora, e 5. braccia. vale le sopradette lor valute, ciascuna da per se, e tutti quei prodotti li founarai insieme, trouarai che faranno duc. 810. fol. 15. den. 1. $\frac{1}{2}$.

[illegible]

21. 17. 4.
 787. 4. 0.
 Duc. 810. 11. 5. 1.

E dicendo, lo fiorio della terra, secondo l'vso di Pisa, vale duc.28. fol.16. si domanda quanto varranno fiora 16. e pertiche 28. fa così, troua prima quanto vale vna pertica, partendo duc.28. fol.16. per 66. cioè per il suo ripiego, trouarai che ne viene fol.8. den.8 $\frac{1}{4}$ per la valuta d'vna pertica, dipoi multiplica 28. pertiche via la valuta d'vna pertica, e le 16. fiora, via la valuta d'vno fiorio, e questi due prodotti sommati insieme, faranno duc.473. fol.10. den.4 $\frac{1}{4}$. E volendola soluere per vn'altro modo, farai così, riduci le 16. fiora, a pertiche; multiplica 16. via 66. & al prodotto aggiungi 28. pertiche; faranno in tutto pertiche 1084. multiplica 1084. via duc.28. fol.16. & il prodotto parti per 66. ne verrà duc.473. fol.0. den.4 $\frac{1}{4}$. che è uguale al primo operare.

66	28.	16.	o.	16.	28.
7)	4.	16.	o.		
11)	o.	8.	8.		
	12.	4.	4.		
46c	16.	o.	o.		
Dec. 473.	o.	47.			

E dicendo, la scala della terra, secondo l'vso di Pescia, vale lir. 7. fol. 8. si domanda quanto varranno 4. coltre, 2. quartieri, 16. scale, e 3. pertiche, fa così delle 4. coltre, 2. quartieri, 16. scale, e 3. pertiche ne farai scale, trouarai che sono scale 556 $\frac{1}{2}$. perche le 3. pertiche sono $\frac{1}{2}$ d'vna scala; dipoi moltiplica 356 $\frac{1}{2}$ via lir. 7. fol. 8. farà 4119. fol. 19. e questo parti per 1. cioè per vna scala, che è la cosa manifesta, ne viene le medesime lir. 4119. fol. 19. per la valuta delle sopradette coltre di terra.

1)	Lire	7.	8.	10.	556 $\frac{1}{2}$
		1.	17.	0.	
		5.	11.	0.	
		4114.	8.	10.	
		4119.	19.	0.	

E dicendo, la coltra della terra vale duc. 134. fol. 16. den. 8. si domanda quanto varranno 7. coltre, 2. quartieri, 10. scale, e 3. pertiche. Fa così, troua prima quanto valé vn quartieri, partendo duc. 134. fol. 16. den. 8. per 4. ne viene duc. 33. fol. 14. den. 2. etanto vale vn quartieri, dipoi troua quanto vale vna scala partendo duc. 33. fol. 14. den. 2. per 30. ne viene duc. 1. fol. 2. den. 5 $\frac{1}{2}$. per 4. ne viene fol. 5. den. 7 $\frac{1}{2}$. a oro; e tanto vale vna pertica. Fatto questo moltiplica 7. coltre, 2. quartieri, 10. scale, e 3. pertiche, via le sopradette lor valute ciascuna da per se, & i prodotti sommarai insieme, trouarai che faranno duc. 1023. fol. 6. den. 6 $\frac{1}{2}$. per la valuta delle sopradette coltre di terra.

Ancora poteui far così, cioè di tutte le sopradette coltre, quartieri, scale, e pertiche, fane pertiche, che sono pertiche 3643. dipoi dir così, se pertiche 480. cioè vna coltra, costano duc. 134. fol. 16. den. 8. che costaranno pertiche 3643. moltiplica 3643. via duc. 134. fol. 16. den. 8. & il prodotto parti per 480. trouarai che ne verrà duc. 1023. fol. 6. den. 6 $\frac{1}{2}$.

134.	16.	8.
33.	14.	2.
1.	2.	5 $\frac{1}{2}$.
0.	5.	7 $\frac{1}{2}$.
10.	16.	10 $\frac{1}{2}$.
11.	4.	8 $\frac{1}{2}$.
67.	8.	4.
943.	16.	8.
Duc. 1023.	6.	6 $\frac{1}{2}$.

E dicendo, vno piglia vna casa a pigione, della quale paga a ragione di duc. 57. fol. 16. l'anno, si domanda quanto pagará in 3. anni, 7. mesi, e 13. giorni. Vniuersalmente vn'anno si fa di 12. mesi, & vn mese si fa di 30. giorni, perciò ti conuien vedere quanto douerà pagare in vn mese, partendo duc. 57. fol. 16. per 12. ne viene duc. 4. fol. 16. den. 4. e tanto pagará il mese, dipoi ti conuien vedere quanto pagará il giorno, partendo duc. 4. fol. 16. den. 4. per 30. ne viene fol. 3. den.

den. 27 $\frac{1}{2}$. a oro, e tanto pagará il giorno. Hora tu fai qualche paga l'anno, il mese, & il giorno, perciò moltiplica 3. anni via quel che paga l'anno; e 7. mesi li moltiplicarai via quel che paga il mese, e 13. giorni li moltiplicarai via quel che paga il giorno, e questi tre prodotti li sommarai insieme, trouarai, che faranno ducati 209. fol. 4. den. 0 $\frac{1}{2}$, e tanto douerà pagare di pigione in tutto il sopradetto tempo.

12)	57.	16.	0.	3	7	13
30)	4.	16.	4.			
	0.	3.	2 $\frac{1}{2}$.			
	2.	1.	8 $\frac{1}{2}$.			
	33.	14.	4.			
	173.	8.	0.			
	Duc. 209.	4.	0 $\frac{1}{2}$.			

✚ E dicendo, vno ha di salario duc. 160. l'anno, si domanda quanto douerà hauere in 4. anni, 6. mesi, e 20. giorni. Questa è simile alla sopradetta, però nel sopradetto modo la potrai risolvere, trouando quanto li viene il mese, & il giorno, dipoi moltiplicare 4. anni, 6. mesi, e 20. giorni, via quel che guadagna l'anno, il mese, & il giorno separatamente, e quei prodotti sommarai insieme, e tanto quanto fusse tal fortuna, tanto guadagnarebbe nel sopradetto tempo. Potessis ancora ridurre tutto il tempo, del quale pretende hauere il salario, in giorni, trouarai che sono giorni 1640. dipoi conueniua dir così, se in 360. giorni, cioè vn'anno, egli ha di salario duc. 160. quanto douerà hauere in giorni 1640. moltiplica 1640. via 160. & il prodotto partirai per 360. trouarai che ne verrà duc. 731 $\frac{1}{2}$. e tanti ducati douerà hauere. Potessis ancora solucere in quest' altro modo molto più breue, e più streuole, riducendo 6. mesi, e 20. giorni a parte d'vn'anno, i quali sono $\frac{1}{2}$. d'vn'anno, dipoi conueniua dir così, se in vn'anno doue hauer di salario duc. 160. fol. 10. quanto douerà hauere in anni 4 $\frac{1}{2}$. moltiplica 4 $\frac{1}{2}$. via duc. 160. fol. 10. farà duc. 731. fol. 3. den. 4. e tanto douerebbe hauer di salario.

1)	160.	10.	0.	4	$\frac{1}{2}$.
	17.	16.	8.		
	89.	3.	4.		
	842.	0.	0.		
	Duc. 731.	3.	4.		

✚ E dicendo, il cento d'alcuna mercantia vale lir. 87. fol. 10. si domanda quanto varranno libbre 9. & once 9. Ancorché questa, & altre simili in diuersi modi si possin solucere, nientedimeno, noi dimostreremo quei modi più offeruati, e più facili, volendo a dunque soluer la sopradetta domanda, farai così, troua prima quanto vale vna libbra, al sopradetto prezzo del cento, parti lire 87. fol. 10. per 100. cioè per il suo ripiego, che è 10. e 10. trouerai che ne viene fol. 17. den. 6. e tanto vale vna libbra, troua hora quanto vale vn'oncia, partendosol. 17. den. 6. per 12. ne viene fol. 1. e den. 5 $\frac{1}{2}$. e tanto vale vn'oncia, hauendo hora

trouare la valuta d'vna libbra, e la valuta d'un'oncia, resta a trouare la valuta di 9. libbre, e di 9. once, per il che multiplica 9. once, via sol. 1. den. $5\frac{1}{2}$. farà soldi 13. den. $1\frac{1}{2}$, e tanto varranno le 9. once, dipoi multiplica le 9. libbre via sol. 17. den. 6. farà lir. 7. sol. 17. den. 4. e tanto varranno le 9. libbre, dipoi somma insieme questi due prodotti, faranno lir. 8. sol. 10. den. $7\frac{1}{2}$. per tutta la valuta.

10)	Lire 87.	10.	0.	9	9
10)	8.	15.	0.		
12)	6.	17.	6.		
	0.	1.	$5\frac{1}{2}$.		
	0.	13.	$1\frac{1}{2}$.		
	7.	17.	6.		
	8.	10.	$7\frac{1}{2}$.		

¶ Potresti la sopradetta domanda soluere in quest'altro modo molto più leggiadro, cioè le 9. once recarle a parte di libbra, le quali sono $\frac{9}{16}$. dipoi conueniua dir così, se libb. 100. costano lir. 87. sol. 10. che costeranno libb. $9\frac{9}{16}$. multiplica $9\frac{9}{16}$. uia lire 87. sol. 10. farà lir. 853. sol. 2. den. 6. e questo parti per 100. a scapezzo, leua con una linea a piombo due figure da man destra, ti resterà da man sinistra lir. 8. le quali salua; dipoi multiplica 53. (che sono le due figure tolte al detto numero) uia 20. per farne soldi, farà 1060. al quale aggiungi li 2. soldi, che di sopra doueui partire, farà soldi 1062. & a neo questo lo partira per 100. cioè per scapezzo, leuando due figure da man destra con una linea a piombo, ti resterà da man sinistra sol. 10. iquali saluarai; dipoi multiplica 62. (che sono le due figure tolte al detto numero de' soldi) uia 12. per farne denari, farà den. 744. al quale aggiungi li 6. denari, che di sopra doueui partire, faranno den. 750. il qual parti per 100. leuando due figure da man destra, ti resterà da man sinistra den. 7. iquali salua, e da man destra ti resterà 50. che sono $\frac{1}{2}$. d'un denaro, il qual rotto schisato è $\frac{1}{4}$. e così hauerai che a partire lir. 853. sol. 2. den. 6. per 100. partendo per scapezzo, come habbiamo fatto, ne uienē lir. 8. sol. 10. den. $7\frac{1}{2}$. come di sotto uedi, e questo modo di partire per 100. cioè per scapezzo, s'ua uniuersalmente per tutto, & è breue, e bel partire.

100)	87.	10.	0.	9	$\frac{1}{4}$.
	21.	17.	6.		
	65.	12.	6.		
	787.	10.	0.		
	81	53.	2.	6.	
		20.			
	101	62.			
		12.			
	71	50.			

Varranno Lire 8. 10. $7\frac{1}{2}$.

Edi.

E dicendo libbre cento di lana vagliono $\text{lit. } 54. \text{ fol. } 15.$ si domanda quanto varranno libbre 76. fa così, moltiplica libbre 76. via $\text{lit. } 54. \text{ fol. } 15.$ farà $\text{lit. } 41. 12. 2 \frac{1}{2}.$ e queste partirai per la cosa manifesta, cioè per 100. per ripiego, o per scapezzo, come ti piace, hor partirai per scapezzo, ne verrà $\text{lit. } 41.$ & auanzarà 61. il qual lo moltiplicarai via 20. per cauarne i soldi, farà 1220. qual parti similmente per 100. ne vien $\text{fol. } 12.$ & auanza 20. il qual si conuien moltiplicare via 12. per cauarne i denari, farà 240. e questo lo partirai medesimamente per 100. ne verrà $\text{den. } 2.$ & auanzarà $\frac{2}{5}.$ che schifati sono $\frac{2}{5}.$ d'un denaro, e così dirai, che le libbre 76. di lana a lire 54. fol. 15. il cento, varranno $\text{lit. } 41. \text{ fol. } 12. \text{ den. } 2 \frac{1}{2}.$

100)	Lire 54.	15.	0.	76.
	411	61.	0.	
		20.		
	121	20.		
		12.		
	211	40.		

Varranno Lire 41. 12. 2 $\frac{1}{2}$.

Solui in quest' altro modo, parti $\text{lit. } 54. \text{ fol. } 15.$ per 100. cioè per il suo ripiego, che è 101. laonde partendole per il primo 10. ne verrà $\text{lit. } 5. \text{ fol. } 9. \text{ den. } 6.$ e tanto varrà vna decina di libbre di detta lana; e se partirai le dette $\text{lit. } 5. \text{ fol. } 9. \text{ den. } 6.$ per l'altro 10. ne verrà $\text{fol. } 10. \text{ den. } 11 \frac{1}{2}.$ e tanto varrà vna libbra. Volendo hora sapere quanto varranno 76. libbre, che sono 7. decine, e 6. libbre, moltiplica 6. libbre via $\text{fol. } 10. \text{ den. } 11 \frac{1}{2}.$ che è la valuta d'vna libbra, farà $\text{lit. } 3. \text{ fol. } 5. \text{ den. } 8 \frac{3}{4}.$ dipoi moltiplica 7. decine via $\text{lit. } 5. \text{ fol. } 9. \text{ den. } 6.$ che è la valuta d'vna decina, farà $\text{lit. } 38. \text{ fol. } 6. \text{ den. } 6.$ per la valuta di 7. decine, hor questi due prodotti li formarai insieme, faranno $\text{lit. } 41. \text{ fol. } 12. \text{ den. } 2 \frac{1}{2}.$ come di sopra per primo operare.

10)	Lire 54.	15.	0.	76.
10)	41	9.	6.	
	0.	10.	11 $\frac{1}{2}$.	
	3.	5.	8 $\frac{3}{4}$.	
	38.	6.	6.	
	Lire 41.	12.	2 $\frac{1}{2}$.	

E dicendo, il cento della lana vale $\text{lit. } 64. \text{ fol. } 16. \text{ den. } 8.$ si domanda quanto varranno libbre 834. fa così, tu vedi che le libbre 834. di lana, le quali vogliamo valutare, sono 8. centinaia, 3. decine, e 4. libbre, e perciò operarai come nell' antecedente, trouando prima la valuta d'vna decina, partendo $\text{lit. } 64. \text{ fol. } 16. \text{ den. } 8.$ per 10. ne viene lire 6. fol. 9. den. 8. e tanto vale vna decina; dipoi parti $\text{lit. } 6. \text{ fol. } 9. \text{ den. } 8.$ per 10. ne viene $\text{fol. } 12. \text{ den. } 11 \frac{1}{2}.$ e tanto varrà vna libbra, hora noi habbiamo la valuta d'un cento di libbre, d'vna decina, e d'vna libbra, e perciò moltiplica 8. centinaia, 3. decine, e 4. libbre via le lor valute,

ciascuna da per se, e quei tre prodotti li sommarai insieme, trouarai che faranno lir. 540. sol. 14. den. 2 $\frac{2}{3}$. per tutta la valuta della sopradetta lana; e se multiplicarai libb. 834. di lana via lir. 54. sol. 16. den. 8. farà lir. 45071. dipoi se questo prodotto lo partirai per 100. per scapezzo; come poco prima habbiamo dimostrato, trouarai che ne verrà lir. 540. sol. 14. den. 2 $\frac{2}{3}$. che è uguale al sopradetto auuencimento, di maniera che sta in tuo arbitrio d'operare in qual modo ti piace.

10)	Lire 64.	16.	8.	8.	3	4
	6.	9.	8.			
	0.	12.	11 $\frac{1}{2}$.			
	2.	11.	10 $\frac{1}{2}$.			
	19.	9.	0.			
	518.	13.	4 $\frac{1}{2}$.			
	Lire 540.	14	2 $\frac{2}{3}$.			

E dicendo, il cento d'alcuna cosa vale lir. 98. sol. 15. si domanda quanto varranno libb. 1864. & once 8 $\frac{1}{2}$. questa nel modo dell'anteditta soluerai; trouando prima la valuta d'vna decina, e d'vna libbra; e di più ti conuien trouar la valuta d'vn'oncia; il che trouarai partendo la valuta d'vna libbra per 12. fatto questo, noi habbiamo a valutare 18. centinaia, e 6. decine, 4. libbre, & once 8 $\frac{1}{2}$. e perciò multiplica once 8 $\frac{1}{2}$. via la valuta d'vn'oncia; dipoi multiplica le 4. libbre, via la valuta d'vna libbra, dipoi multiplica le 6. decine via la valuta d'vna decina, e doppo multiplica 18. centinaia via la valuta d'vn centinaio. Fatto questo somma insieme tutti questi prodotti, trouarai che faranno lir. 1841. sol. 7. den. 11 $\frac{1}{2}$. per tutta la valuta delle sopradette libbre.

10)	Lire 98.	15.	0.	18.	610.	4.	8 $\frac{1}{2}$.
10)	9.	17.	6.				
	0.	19.	9.				
	0.	1.	7 $\frac{1}{2}$.				
	0.	0.	9 $\frac{1}{2}$.				
	0.	13.	2.				
	3.	19.	0.				
	59.	5.	0.				
	1777.	10.	0.				
	Lire 1841.	7.	11 $\frac{1}{2}$.				

E dicendo, il cento d'alcuna cosa vale lir. 34. sol. 16. den. 8. si domanda quanto varranno 18. centinaia, e mezzo; In questa proposta non accade trouar la valuta d'vna decina, nè d'vna libbra, ma basta multiplicare 18. centinaia, e mezzo via lir. 34. sol. 16. den. 8. nel modo che altre volte habbiamo dimostrato, trouarai che farà lire 644. sol. 8. den. 4. per la sopradetta valuta.

1)	Lire	34.	16.	8.	18 $\frac{1}{2}$.
		17.	8.	4.	
		627.	c.	0.	
	Lire	644.	8.	4.	

E dicendo, il cento d'alcuna cosa vale lir. 62. sol. 3. den. 4. si domanda quanto varranno libbre 1675. Volendo soluere la presente proposta per via di recare a parte, il qual modo, è molto bello, e breue, fa così, tu vedi, che ci conuien valutare 16. centinaia, e 75. libbre, quali 75. libb. conuien vedere, che parte son di 100. trouarai che son $\frac{3}{4}$. laonde dirai, se vn centinaio di libbre della sopradetta mercantia vale lir. 62. sol. 3. den. 4. che varranno centinaia 16 $\frac{3}{4}$? moltiplica 16 $\frac{3}{4}$. via lir. 62. sol. 3. den. 4. come nella precedente factsti, trouarai che farà lir. 1041. sol. 5. den. 10. per la valuta delle sopradette libbre 1675. e così potrai fare altre simili, quando si potranno recare a parte.

1)	Lire	62.	3.	4.	16.	$\frac{3}{4}$.
		15.	10.	10.		
		46.	12.	6.		
		994.	13.	4.		
	Lire	1041.	5.	10.		

E dicendo, il cento d'alcuna mercantia vale ducati 20 $\frac{1}{2}$. si domanda quanto varranno libb. 938. sbattondone di tara libb. 6. per cento, e datio dell'ammontare 1. per cento. Questa è ragione doppia, e prima bisogna cauare la tara, in questo modo, dicèdo se di libb. 100. se ne cauà di tara libb. 6. quante se ne sbatterà di libb. 938. moltiplica 938. via 6. fa 5628. e questo parti per 100. ne viene 56. & auanza 28. e tante libb. se ne deuē cauare di tara, e perche è costume tra i Mercanti, che nelle robbe, che si vendono a peso, cioè a centinaia, o migliaia, l'auanzo, cioè il rotto della tara, se non arriva alla metà del partitore, sempre tal'auanzo si lascia andare, e se detto auanzo, o rotto fusse quanto la metà, ouero più della metà del partitore, in tal caso il detto rotto si piglia per vn'intero, o perche in questa c'è auanzato 28. il qual è meno di 50. cioè della metà di 100. nostro partitore, perciò lo lasceremo stare senza farne conto alcuno, ma se fusse auanzato 50. o più, noi haueremmo preso il detto 50. per vn'intero, e doue douemo cauare di tara libb. 56. ne cauaremo 1. libbra più, cioè libb. 57. cauà adunque libb. 57. di libb. 938. restano libb. 881. nette di tara, quali valutarai a duc. 20. e sol. 10. il cento, secòdo i modi, e regole di sopra dimostrate, trouarai che varranno duc. 180. sol. 16. den. 2 $\frac{3}{4}$. ma perche di sopra s'è detto, che di questa valuta bisogna cauare vn ducato per cento, perciò dirai così, se di 100. duc. si sbattono vn ducato, quanti se ne sbatterà di duc. 180. sol. 16. den. 2 $\frac{3}{4}$. moltiplica 1. via duc. 180. sol. 16. den. 2 $\frac{3}{4}$. farà la medesima quantità, la qual partirai per 100. ne verrà duc. 1. sol. 16. den. 2. e questo lo trarrai di duc. 180. sol. 16. den. 2 $\frac{3}{4}$. restaranno duc. 179. sol. 0. den. 0 $\frac{3}{4}$. per detto pagamento delle soprad. libbre 938. sbattono la tara, & il datio.

E di-

10)	20.	10.	0.	82. nette
10)	2.	1.	0.	
	0.	4.	$1\frac{1}{2}$	
	0.	8.	$2\frac{1}{2}$	
	16.	8.	0.	
	164.	0.	0.	
	Duc. 180.	16.	$2\frac{1}{2}$.	

E dicendo, il cento della lana vale lire 54. fol. 15. si domanda quanto varranno 4. balle; che pesano in tutto libb. 960. sbattendo di sacchi, e legami libb. 6. per balla, e tara delle libb. $5\frac{1}{2}$. per cento. Prima è necessario trarre la tara delle 4. balle, e perche d'ogni balla se ne sbatte libb. 6. perciò moltiplica 6. via 4. fa 24. e questo lo trarrai di 960. resterà libb. 936. di lana, netta di sacchi, e legami, delle quali libb. 936. bisogna trarne la tara a ragione di $5\frac{1}{2}$. per cento, onde dirai così, se di libb. 100. si sbatte libb. $5\frac{1}{2}$. quante se ne sbatterà di libb. 936. moltiplica $5\frac{1}{2}$. via 936. farà 4992. il qual parti per 100. ne viene 49. & auanza $\frac{1}{2} \frac{2}{5} \frac{3}{5}$. e perche il detto auanzo è più della metà del partitore, cioè più di 50. il detto auanzo lo piglierai per 1. intero, cioè per vna libbra più, la quale aggiungi a 49. farà 50. il qual tratto di 936. resterà libb. 886. e questa farà la lana netta di sacchi, legami, e tara, la quale valutarai a lir. 54. fol. 15. il cento, trouarai che varrà lir. 485. fol. 1. den. 8 $\frac{1}{2}$. & hauendosene a sbattere il datio a tanto per 100. operaresti come nella sopradetta.

10)	Lire 54.	15.	0.	886. nette
10)	5.	9.	6.	
	0.	10.	$11\frac{1}{2}$	
	3.	5.	$8\frac{1}{2}$.	
	23.	16.	0.	
	238.	0.	0.	
	Lire 485.	1.	$8\frac{1}{2}$.	

E dicendo, il cento della carne vale lir. 16. fol. 15. si domanda quanto varranno libb. 875. sbattendone di tara libb. 5. per cento, douendo pagare ancora 5. denari per libbra delle nette di gabella. Tutte queste son ragioni doppie, e foluansi in questo modo cioè; Prima bisogna cauarne la tara a ragione di 5. per cento, così dicendo; se di libb. 100. se ne sbatte 1 lb. 5. quante se ne sbatterà di libb. 875? moltiplica 875. via 5. fa 4375. il qual parti per 100. ne viene 43. & auanza 75. ma perche auanza più della metà del partitore, cioè più d'vna mezza libbra, pigliaremo il detto auanzo per vn intero, e l'aggiungeremo a 43. farà 44. e questo lo cauaremo di 875. restaranno libb. 831. nette di tara, quali valutarai a lire 16. fol. 15. il cento, trouarai che varranno lir. 139. fol. 3. den. 10 $\frac{1}{2}$. Resta hora, che al detto costo vi si aggiunga, o si tragga la spesa della gabella, secondo, che son d'accordo i compratori, e venditori, hor sia che la detta gabella

della s'habbi ad aggiungere, multiplica 5. den. via libb. 831. nette di tara, para den. 4155. de quali farai soldi, e de soldi ne farai lire, trouarai che faranno lire 17. fol. 6. den. 3. e tanto si douerà pagare di gabella, ouero datio, le quali aggiunte alle sopradette lire 139. fol. 3. den. 10 $\frac{1}{2}$. faranno in tutto lire 156. fol. 10. den. 1 $\frac{1}{2}$. e tanto varranno le sopradette libb. 831. di carne, nette di tara, insieme con la spesa della gabella.

10)	Lire	16.	15.	0.	831. nette
10)		1.	13.	6.	
		0.	3.	4 $\frac{1}{2}$.	
		0.	3.	4 $\frac{1}{2}$.	
		5.	0.	6.	
		134.	0.	0.	
		139.	3.	10 $\frac{1}{2}$.	
		17.	6.	3.	
	Lire	156.	10.	1 $\frac{1}{2}$.	

E dicendo, il cento della bambace vale duc. 44. fol. 10. si domanda quanto varranno libb. 986. dandone di dono libb. 3 $\frac{1}{2}$. per cento, sappi che questa si solve al contrario della sopradetta; perciò che doue la tara si caua di libb. 100. il dono si aggiunge sopra 100. a dunque perche si dona libb. 3 $\frac{1}{2}$. per cento, aggiungi 3 $\frac{1}{2}$. a 100. farà 103 $\frac{1}{2}$. di poi dirai così, se libb. 103 $\frac{1}{2}$. vagliono duc. 44. fol. 10. quanto varranno libb. 986. multiplica 986. via duc. 44. e fol. 10. & il prodotto parti per 103 $\frac{1}{2}$. ti verrà duc. 423. fol. 18. den. 7 $\frac{1}{2}$. per la valuta della sopradetta bambace.

103 $\frac{1}{2}$.	44.	10.	986.
	4387.	0.	0.
207)	8774.	423.	18.
			7 $\frac{1}{2}$.

E dicendo, il cento della cera nuoua vale duc. 22. & il cento della cera vecchia vale duc. 18. si domanda quanto varranno libb. 840. di mescolata, che tiene della nuoua libb. 55. per cento, & il resto tiene di cera vecchia, sbattendo di tara della vecchia libb. 4. per cento, e dono della nuoua 2. per cento, e datio di tutta la valuta duc. 3. per cento. Prima, si deue scorporare la cera nuoua dalla cera vecchia, dicendo così se libb. 100. di cera sia nuoua, e vecchia, tengono libb. 55. di cera nuoua, quante libbre ne terranno libb. 840. multiplica 840. via 55. & il prodotto parti per 100. ne verrà 462. e tante libbre di cera nuoua dirai che sia in tutto il sopradetto corpo di cera; la qual trarrai di libb. 840. resterà libb. 378. di cera vecchia. Hora conuien trarre la tara della cera vecchia a ragione di libb. 4. per cento, perche multiplica 4. via 378. fa 1512. il qual parti per cento ne vien 15. & il rotto, cioè l'auanzo, lassalo andare per le ragioni, che già habbiamo dette, caua adunque libb. 15. di libb. 378. restaranno libb. 363. di cera vecchia netta di tara, quale valutarai a 18. duc. il cento; multiplica 363. via 18. & il prodotto parti per cento, ne vien duc. 65. fol. 6. den. 10. per la valuta

luta della cera vecchia ; auertendo che da mezzo denaro in su , noi pigliamo per vn denaro intero , e da mezzo denaro in giù , lo lasciamo andare . Resta hora a vedere quanto vale la cera nuoua a duc. 22. il cento, ma perche la proposta dice che ne dona 2. libbre per cento , perciò aggiungi 2. a 100. farà 102. e dipoi dirai così, se libb. 102. di cera nuoua costano duc. 22. quanto costaranno libb. 462. multiplica 462. via 22. & il prodotto parti per 102. ne verrà duc. 99. fol. 12. den. 11. per la valuta della cera nuoua ; hora somma insieme la valuta della cera vecchia, con la valuta della cera nuoua, trouarai che in tutto faranno duc. 164. fol. 19. den. 9. e di questi douiamo cauare il datio a ragione di duc. 3. per cento, dicendo così, se di ducati 100. si cabà duc. 3. quanti se ne cauara di duc. 164. fol. 19. den. 9. multiplica 3. via duc. 164. fol. 19. den. 9. & il prodotto parti per 100. ne viene duc. 4. fol. 18. den. 11 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{2}$. ma noi pigliaremo il rotto per vn denaro intero, e diremo che ne venga duc. 4. e fol. 19. che tratti di duc. 164. fol. 19. den. 9. restaranno duc. 160. fol. 0. den. 9. per la valuta di libb. 840. di cera fra nuoua, e vecchia, netta di tara, dono, e datio .

A Edicendo, il migliaio della Lana vale lir. 736. fol. 16. den. 8. si domanda quãto varranno libb. 6836. questa, & altre simili in diuersi modi si possono soluere, ma prima la dimostraremo per regola del tre , dicendo, se libb. 1000. di lana costano lir. 736. fol. 16. den. 8. quanto costaranno libb. 6836. multiplica 6836. via lir. 736. fol. 16. den. 8. farà lir. 5036992. fol. 13. d. 4. e queste le partirai per mille, leuando con vna linca a piombo tre figure verso man destra , starà così 5036. 1992. adunque diremo che per detta partitione ne venga lir. 5036. & auanza 992. e questo auanzo lo moltiplicarai via 20. per farne soldi , & al prodotto aggiungerai fol. 13. che di sopra si doueua partire, faranno fol. 19853. i quali similmente partira i per mille, cioè per scapezzo, ne verrà fol. 19. & auanzarà fol. 853. e questo lo moltiplicarai via 12. per farne denari, & al prodotto aggiungerai 4. den. che di sopra si douean partire, faranno in tutto den. 10240. quali partira i per mille, ne viene den. 10. & auanza 240. del quale auanzo non terremo conto nessuno , perche non passa la metà del partitore , cioè la metà di mille , che è 500. e così diremo, che le sopradette libb. 6836. di lana à lire 736. fol. 16. den. 8. il migliaio , varranno lire 5036. fol. 19. den. 10. come di sotto vedi ,

1000)	Lire 736.	16.	8.	6836
	5036	1992.	13.	4.
		20.		
	191	853.		
		12.		
	101	240.		

Varranno lir. 5036. fol. 19. den. 10.

*H*or soluila in quest' altro modo, da noi molto vfato , come più commodo . Prima cerca di trouare quanto vale il cento ; la qual cosa trouarai , se partira i lire 736. fol. 16. den. 8. che è la valuta d'vn migliaio, per 10. perche dieci centinaia fanno vn migliaio, trouarai che varrà lire 73. fol. 13. den. 8. fatto questo troua quanto vale vna decina, partendo lir. 73. fol. 13. den. 8. per 10. ne viene lir. 7. fol. 7. den. 4 $\frac{2}{3}$. Resta a trouare quanto vale vna libbra , la qual cosa trouarai,

uarai, se partirai lir. 7. fol. 7. den. 4. $\frac{2}{3}$. per 10. ne viene fol. 14. den. 8. $\frac{2}{3}$. e tanto varrà vna libbra. Hora noi habbiamo la valuta d'vna libbra, d'vna decina, d'vna centinaia, e d'vn migliaio, perciò bisogna multiplicare 6. migliaia, 8. centinaia, 3. decine, e 6. libbre di lana, via i sopradetti prezzi, ciascuna da per se, cioè 6. migliaia via la valuta d'vn migliaio, otto centinaia, via la valuta d'vn centinaio, 3. decine via la valuta d'vna decina, e 6. libbre via la valuta d'vna libbra; e tutti questi quattro prodotti li sommarai insieme, trouarai che faranno lir. 5036. fol. 19. den. 10. $\frac{2}{3}$. per la valuta della sopradetta lana. Ma sappi, che nel valutar simil mercantie in grosso, non si tien conto d'onze, o di mezza libbra, ma la mezza si fa intera, se già non fusse oro, argento, cannella, garofani, reubarbaro, muscho, seta, e cose di valore, che in simil vendite, si fa llima d'onze, quarti, denari, e grani, & i mezz grani si lassano andare, o si fanno interi; perciò se alcun caso ti fusse proposto, con trauagliamento di libbre, & onze, come per esempio volemmo valutare lib. 6235. & on. 8. $\frac{1}{2}$. di lana a tante lire il cento, ouero il migliaio, si fa solo per destar la mente a chi cerca disciplinarsi in questa scienza, e per praticarli nelle multiplicationi, e partitioni, e similmente per saper distinguere vna cosa da vn'altra, e perche simili casi possono occorrere nel traffico mercantile.

10)	Lire 736.	16.	8.	6	8	3	6
10)	73.	13.	8.				
10)	7.	7.	4. $\frac{3}{4}$.				
	0.	14.	8. $\frac{2}{3}$.				
	4.	8.	5. $\frac{1}{4}$.				
	22.	2.	1. $\frac{1}{2}$.				
	589.	9.	4.				
	4421.	10.	0.				
	Lire 5036.	19.	10. $\frac{2}{3}$.				

7 E dicendo il migliaio della lana vale lir. 915. fol. 18. den. 4. si domanda quanto varranno libb. 12876. sbartendone di tara libb. 8. per migliaio, douendosi pagar di gabella, oltre al costo den. 5. per libbra delle nette. Neta che in tutte le proposte, doue conuenega cauar tare a tanto per cento, o per migliaio, o per cantaro, o per peso, secondo le conventioni, e costumi de' paesi, bisogna la prima cosa che si faccia, cauar la tara, e ridurre le libbre lorde, a libbre nette. Hor in questa, volendola neta dalla tara, dirai così, se di libb. 1000. di lana si deuè cauar di tara libb. 8. quante se ne douerà cauare di libb. 12876? multiplica 12876. via 8. fa 103008. il qual parti per mille, per scapezzo, ne viene 103. & auanza 8. del quale auanzo non si tien conto, per esser meno della metà del partitore, e se il detto auanzo fusse da 500. in su, per fino a mille, si pigliarebbe per vn'intero, come nel valutar del cento delle mercantie habbiamo fatto, caua adique 103. di 12876. restano libb. 12773. nette di tara, quali valutarai a lire 915. fol. 18. den. 4. il migliaio, operando nei modi sopradetti, trouarai che varranno lir. 11699. dipoi perche s'è detto, che oltre alla sopradetta valuta si deuè pagar di gabella den. 5. per libbra delle nette, perciò multiplica libb. 12773. via 5. farà den. 63865. de quali farai soldi, e lire, hauerai che sono lir. 266. fol. 2. den. 1. e queste

quante l'aggiungerai al primo colto, faranno *lir. 11965. sol. 2. den. 11 $\frac{1}{2}$* e tãto spenderà in detta lana con la gabella, e se altre spese facesse, come vetture, spese per suo viuere, mance, beueraggi, passi, e porti, e qualunque altra spesa che facesse, sempre s'aggiungono le dette spese, al costo della prima compra, & in tutta la somma della spesa gli listerà poi quella incrcatia condotta in casa, acciò che si possa sapere quanto la debba riuendere, a voler guadagnare tanto per cento, come più oltre procedendo intenderai.

10)	Lire 915.	18.	4.	12773. nette
10)	91.	11.	10.	
10)	9.	3.	2 $\frac{1}{2}$.	
	0.	18.	3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$.	
	2.	14.	11 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$.	
	64.	2.	3.	
	64.	2.	10.	
	10991.	0.	10.	
	11699.	0.	0 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$.	
	266.	2.	1.	
	Lire 11965.	2.	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$.	

E dicendo, il migliaio della lana Cipriotta vale *duc. 84.* & il migliaio della lana Barbarefca vale *duc. 72.* & il migliaio della lana Sardefca vale *duc. 65.* si domanda quanto varranno *libb. 9870.* di mescolata, che tiene di Cipriotta *libb. 320.* per migliaio, e di Barbarefca *libb. 300.* per migliaio, & il resto Sardefca sbatendo di tara della Cipriotta *libb. 8.* per migliaio, e dono della barbarezca *4.* per migliaio, e tara della Sardefca *11.* per migliaio, e per messettaria *duc. 2 $\frac{1}{2}$.* per cento dell'ammontare. Queste si possono proporre con modi diuersi, cioè con soldi, e denari, con dati, gabelle, e passaggi, & altri traugliamenti, quali apportano all'operante più fatica, che vtilità, e paiono gran cose a chi non sa, ma effectiuamente son cose triuali. Volendo adunque folter questa proposta, prima è necessario trouare leparatamete quanta lana sia di ciascuna sorte in tutto il corpo di *libb. 9870.* dicèdo così, se in vn corpo di mille libbre di lana mescolata v'è dentro *libb. 320.* di lana Cipriotta, quanta ne farà in *libb. 9870.* moltiplica *9870:* via *370:* & il prodotto parti per *1000.* ne viene *libb. 3158.* di lana Cipriotta, la quale nettarai dalla tara a ragione di *8:* per migliaio, e quelle libbre nette che ti restaranno le valutarai a *duc. 84.* il migliaio, nel modo sopradetti, trouarai che varranno *duc. 265. sol. 3. den. 5.* e quelli salta per la valuta della lana Cipriotta. Hor bisogna vedere quanta lana Barbarefca si troua in detto corpo, dicèdo come di sopra, se dentro a *libb. 1000.* di lana mescolata ve n'è *libb. 300.* di Barbarefca, quanta ne farà in *libb. 9870.* moltiplica *9870:* via *300:* & il prodotto parti per *1000.* ne viene *libb. 2961.* di lana barbarezca, quale valutarai a ragione di *duc. 72.* il migliaio, dandoli di dono *libb. 4.* per migliaio, per il che ti conuiene dir così; se *libb. 1004.* di lana barbarezca valgono *duc. 72.* quanto varranno *libb. 2961.* moltiplica *2961:* via *72:* & il prodotto parti per *1004.* trouarai che ne verrà *duc. 212. sol. 6. den. 9.* per la valuta della lana barbarezca, e questi

et que si habet. Resta hora a sapere quanta lana Sardesca sia in detto corpo, e per saperlo farai così: somma libb. 2158. di lana Cipriotta insieme cò libb. 2061. di lana Barbarese, faranno libb. 6119. le quali tratte di libb. 9870. restano libb. 3751. di lana Sardesca; la quale ti conuien nettare dalla tara, a ragione di 11. per migliaia, e quelle libbre nette che ti restaranno, le valutarai a ragione di duc. 65. il migliaia, trouarai che varranno duc. 341. fol. 3. den. 0. fatto questo sommarai insieme duc. 267. fol. 7. den. 5. con duc. 212. fol. 6. den. 9. e con duc. 241. fol. 3. den. 0. faranno in tutto duc. 716. fol. 13. den. 2. per tutto l'ammontare di detta lana netta di tara, e dono; Resta hora a sbattere il datio di tutto l'ammontare, dicendo così, se di duc. 100. si sbatte duc. $2\frac{2}{3}$. di datio, quanti se ne sbatterà di duc. 716. fol. 13. den. 22. multiplica 716. fol. 13. den. 2. via $2\frac{2}{3}$. & il prodotto parti per cento, ne viene duc. 17. fol. 18. den. 5. e questi li trarrai di duc. 716. fol. 13. den. 2. restaranno a pagamento duc. 698. fol. 14. den. 9. nette di tara dono, e datio, e così farai le simili.

Per nò mancare d'adornare questa nostra opera si di propositioni, come delle proue di esse, vogliamo al presente dimostrare, come le sopradette proposte si possino prouare in diuersi modi; e prima col riuoltare la ragione al contrario, come per essemplio: Prouiamo prima la seconda ragione del cento, qual dice così: libbre 100. di lana vagliono lir. 54. fol. 15. si domanda quanto varranno libb. 76. noi habbiamo trouato che vagliono lir. 41. fol. 12. den. $2\frac{2}{3}$. hor per farne la proua, riduci prima fol. 12. den. $2\frac{2}{3}$. a parte di lira, che sono $\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. dipoi riuoltando la ragione dirai così, se lir. 41 $\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. mi danno libb. 76. di lana, quante libbre me ne daranno lir. 54 $\frac{1}{2}$. multiplica 54 $\frac{1}{2}$. via 76. & il prodotto parti per 41 $\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. trouarai, che ne verrà libb. 100. appunto, si come doueua venire. Poterai ancora prouar così, dicendo, se libb. 76. di lana costano lir. 41. fol. 12. den. $2\frac{2}{3}$. che costaranno libb. 100. multiplica la terza via la seconda, & il prodotto parti per la prima, trouarai che ne verrà lir. 54. fol. 15. più o meno che ne venisse staria male.

Si può prouare ancora in quest'altro modo, che è bello, e buono; multiplica sempre la cosa manifesta, cioè la prima via la quarta; dipoi multiplica la seconda cosa via la terza, e se queste due multiplicazioni faranno vguale, la ragione starà bene, e se non faranno vguale starà male. Multiplica adunque la cosa manifesta, cioè libb. 100. via la quarta cosa, che è lir. 41. fol. 12. den. $2\frac{2}{3}$. farà 4161. e tanto deuè fare a multiplicare la seconda cosa via la terza; per il che multiplica 76. via 54 $\frac{1}{2}$. farà similmente 4161. per la qual cosa diremo che è di soluzione sia bene, e così potrai prouare ogni sorte di ragioni, solate per regola del tre, e questo ti sia per essemplio a tutte l'altre.

E dicendo, il cantaro del zuccaro, che in Pisa è libb. 151. e vale duc. 27. fol. 15. si domanda quanto varranno libb. 470. sappi che queste simili in diuersi modi si possino soluere; ma prima per regola del tre, diremo così, se libb. 151. di zuccaro costano duc. 27. fol. 15. che costaranno libb. 470. multiplica 470. via duc. 27. fol. 15. & il prodotto parti per 151. trouarai che ne verrà duc. 86. fol. 7. den. $5\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. per la valuta delle sopradette libb. 470. zuccaro.

Soluita hora in quest'altro modo, troua prima quanto vale vna libbra, partendo i detti duc. 27. fol. 15. per 151. ne viene fol. 7. den. $8\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. a oro, e tanto vale vna libbra; hora dirai così, se vna libbra di zuccaro vale fol. 7. den. $8\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. che varranno libb. 470. multiplica 470. via fol. 3. den. $8\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. nei modi dati, trouarai, che farà duc. 86. fol. 7. den. $5\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. come di sopra s'è detto.

E se per vn'altro modo assai bello vorrai soluere la sopradetta proposta, farai così; e prima, di tutta quella quantità di libbre, che vorrai valutare, ne farai cantara a ragione di libb. 151. ouero 150. il cantaro, secondo l'uso de' paesi, perche in molti luoghi il cantaro si fa di 150. libbre; volendo adunque far cantara delle sopradette libb. 470. le partirai per 151. ne viene 3. cantara, & auanza 17. libbre, per ilche dirai così, se vn cantaro vale duc. 27. fol. 15. quāto varranno 3. cantara, multiplica 3. via duc. 27. fol. 15. farà duc. 83. fol. 5. per la valuta di 3. cantara, e questi salua. Dipoi ci resta a valutare le 17. libbre, che auanzarono fuori delle 3. cantara, e perciò dirai così, se libb. 151. vagliono duc. 27. fol. 15. quanto varranno libb. 17. multiplica 17. via duc. 27. fol. 15. & il prodotto parti per 151. ne viene duc. 3. fol. 2. den. 5. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ per la valuta di 17. libb. i quali sommarai insieme con duc. 83. fol. 5. che saluasti, faranno duc. 86. fol. 17. den. 5. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ per tutta la valuta di 3. cantara, e 17. libbre; la qual valuta scontra con le valute del primo, e secondo operare, di maniera che si lascia in libertà l'operante di poter usare qual modo più gli piace, che tutti son sicuri, e buoni; si che non ci estenderemo a dartene maggior dichia ratione, se non di quelle cose, che habbiamo fin qui dimostrato.

¶ Poniamo hora, che il cantaro sia di libb. 150. come s'usa in molti luoghi, e volessimo sapere quanto varranno lib. 844. d'alcuna mercantia a duc. 24. fol. 10. il cantaro. Prima delle libb. 844. ne farai cantara, partendo 844. per 150. ne viene 5. cantara, & auanza 94. libb. che sono 9. decime, e 4. libb. fatto questo studio di trouare quanto vale vna libbra, partendo duc. 24. fol. 10. per 150. ma partilo per il suo ripiego, cioè per 10. e per 15. perche vn cantaro son 15. decime, e l'auuenimento farà la valuta d'vna decina di libbre, parti adunque duc. 24. fol. 10. per 15. ne viene duc. 1. fol. 12. den. 8. e tanto vale vna decina di libbre, e se questo lo partirai per l'altro numero del ripiego, cioè per 10. ne verrà fol. 3. den. 3. $\frac{1}{2}$ a oro, per la valuta d'vna libbra, hora vogliamo sapere quanto varranno 5. cantara, 9. decime, e 4. libb. per ilche multiplica 5. cantara via duc. 24. fol. 10. che sono la valuta d'vn cantaro, farà duc. 122. fol. 10. per la valuta di 5. cantara, dipoi multiplica le 9. decime via duc. 1. fol. 12. den. 8. che è la valuta d'vna decina, farà duc. 14. fol. 14. e questi poni sotto la valuta delle 5. cantara, dipoi multiplica le 4. libb. via fol. 3. den. 3. $\frac{1}{2}$. che sono la valuta d'vna libbra, farà fol. 13. den. 0. $\frac{1}{2}$. per la valuta di 4. libb. e questi poni sotto alle sopra dette valute, dipoi somma insieme questi tre prodotti, faranno duc. 137. fol. 17. den. 0. $\frac{1}{2}$. per tutta la valuta delle sopradette libb. 844.

¶ E se per vn'altro modo assai più facile vorrai soluere la sopradetta proposta, farai così, dicendo, se libb. 150. cioè vn cantaro vagliono duc. 24. fol. 10. quanto varranno libb. 844. multiplica 844. via duc. 24. fol. 10. & il prodotto parti per il suo ripiego, cioè per 10. e per 15. che hora non importa a partir prima per 10. che per 15. trouarai, che ne verrà duc. 137. fol. 17. den. 0. $\frac{1}{2}$. si come venne per il primo operare

15)	Duc. 24.	10.	0.	5.	9.	4.
	1.	12.	8.			
	0.	3.	3 $\frac{1}{2}$.			
	122.	10.	0.			
	14.	14.	0.			
	0.	13.	0 $\frac{1}{2}$.			
	Duc. 137.	17.	0 $\frac{1}{2}$.			

E dicendo, il cantaro del cacio sardo, che è libb. 151. vale lir. 36. fol. 15. si domanda quanto varranno cantara 38. e libb. 136. sbattendo di tara libb. 6. per cantaro. In due modi se ne può cauare la tara, ma il più facile, & accorto è questo, cioè, delle 38. cantara ne farai libbre, multiplicando 38. via 151. fa 5738. & a questi vi aggiungerai le libb. 136. di sopra date, faranno in tutto libb. 5874. dipoi per regola del tre, dirai così; se di libbre 151. cioè d'un cantaro se ne deve cauare di tara libbre 6. quante se ne douerà trarre di libbre 5874? multiplica la terza via la seconda, e parti per la prima, ne verrà 233. & auanzerà 61. il quale auanzo, perche non ascende alla metà d'un cantaro, cioè di libb. 75. lo lasceremo andare, e le libbre 233. che ce n'è venute farà la tara da cauarsi, e perciò caua 233. di 5874. restano libb. 5641. nette di tara, le quali valutarai così dicendo, se libbre 151. nette di tara, costano lir. 36. fol. 15. che costeranno libbre 5641? similmente nette di tara, opera come di sopra, trouarai, che varranno lire 1772. fol. 17. den. 10 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{2}$. E se la vuoi soluere per vn'altro modo, riduci le libbre 5641. nette di tara a cantara, partendole per 151. trouarai, che sonocantara 37. e libbre 54. le quali valutarai a lire 36. foli 15. il cantaro, offeruando i modi da noi di sopra dati, ti verrà il medesimo che ti venne per il primo operare.

E dicendo, il cantaro dello zucchero in casse, che è libbre 151. netto di tara, vale duc. 26. fol. 18. si domanda quanto varranno 8. casse, che pesano cantara 23. e libbre 80. sbattendone libb. 53. per cassa, e di tara libb. 6. per cantaro. Fa così, vedi prima quante libbre bi'ogna cauare a libb. 53. per cassa, multiplica 8. casse via 53. libbre, fa libb. 424. e queste salua; dipoi bisogna trouare quante libbre se ne deve sbattere di tara delle cantara 23. e libb. 80. a libbre 6. per cantaro; se già la proposta non diceffe, che le dette 6. libbre si douessero trarre di quelle cantara, che restassero, doppo che se ne fusse tratto la tara delle casse, che in tal caso bisogna operare secondo le proposte, e conuentioni. Volendo adunque trouare quante libbre se ne douerà trarre di tara a libbre 6. per cantaro, farai così; riduci le sopradette cantara 23. e libbre 80. a libbre, trouarai, che saranno in tutto libb. 3553. dipoi dirai così, se di libb. 151. se ne deve trarre libbre 6. quante se ne trarrà di libb. 3553? multiplica, e parti, trouarai, che ne verrà libb. 141. & auanzerà 27. il quale auanzo lasciarai andare, e le dette libbre 141. le aggiungerai con libb. 424. che saluasti, faranno in tutto libbre 565. e questa sarà tutta la tara, che si deve cauare delle libbre 3553. che restano libbre 2988. nette di tara, e casse; quali, se vuoi ridurre a cantara, trouarai, che sono cantara 19. e libbre 119. Resta hora, che tu le valuti a duc. 26. fol. 18. il cantaro, offeruando quei modi, che più t'aggradano, secondo che da noi sono stati poco prima dimostrati; auuertendoti che nelle solutioni di qualsivoglia proposta, quando ci verrà alle mani più d'un mezzo denaro, lo piglieremo spesse volte per vn denaro intero; doue non faccia bisogno farne le proue, e questa basti per tua intelligenza.

Per altro modo ancora potui trarre di libbre 565. di tara, delle sopradette cantara 23. e libb. 80. facendo così. Delle libbre 565. ne farai cantara, che sono cantara 3. e libbre 112. e queste le cauare di cantara 23. e libbre 80. restano cantara 19. e libbre 119. come restò per il primo operare, offeruando il modo, e dichiarazione, che nel sottrarre de numeri interi, nel principio di questa nostra opera chiaramente dimostrammo, e come ancora qui di sotto potrai ben vedere.

$$\begin{array}{r} 10 \\ 23 \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111 \\ 80 \\ 112 \end{array}$$

Restano cantara 19.

Libb. 119

E dicendo, la libbra de' garofani in Venetia vale 8. grossi, e tiene di fusti saggi 10. e carati 12. per libbra, de' quali per vñanza s'abbatte saggi 2. e del rimanente si caua la metà per consuetudine, & il resto sia la tara, si domanda quanto varranno libb. 2400. abbattendo della valuta 2. per cento di messetaria. A voler soluer questa, & altre simili; bisogna prima che tu noti l'infraferito auuertimento. Sappi, che in Venetia vn ducato vale 24. grossi, & vn grosso vale 22. piccioli, & vna libbra s'intende esser 12. once, & vn' oncia è 6. saggi, & vn saggio è 24. carati. Hora conuien trouare quanto tiene di tara per libbra; perciò caua saggi 2. di saggi 10. e carati 12. restano saggi 8. e carati 12. de' quali si disse, che bisognaua abbatterne la metà per consuetudine, piglia adunque la metà di saggi 8. e carati 12. la quale è saggi 4. e carati 6. e questi tratti di saggi 8. e carati 12. restano saggi 4. e carati 6. e questa è la tara de' garofani, che tiene per libbra. Hora dirai così, se vna libbra di garofani tiene di tara saggi 4. e carati 6. che terrà di tara libb. 2400. multiplica 4. saggi via 2400. libb. fa 9600. saggi, e questi salua; dipoi multiplica 6. carati via 2400. libbre, farà 14400. carati, de' quali ne farai saggi, partendoli per 24. ne viene saggi 600. che aggiunti con saggi 9600. che saluasti, faranno in tutto saggi 10200. de' quali ne farai once, partendoli per 6. ne viene once 1700. delle quali ne farai libbre, sono libbre 141. & once 8. e questa sarà la tara, che si deuè trarre di libbre 2400. restano libbre 2258. & once 4. di garofani, netti di tara, e di questi habbiamo a trouare la valuta a 8. grossi la libbra; multiplica 8. grossi via libbre 2258. $\frac{2}{3}$. farà 18056 $\frac{2}{3}$. e questi sono grossi, de' quali se ne deuè trarre la messetaria, così dicendo, se di 100. grossi s'abbatte 3. grossi, quanti se n'abbatterà di grossi 18056 $\frac{2}{3}$? auuertiti lo che non importa, se ben non son ducati, perche la ragione vien con debita proportion, attesochè, se di 100. ducati s'abbatte 3. ducati, di 100. grossi s'abbatterà 3. grossi, e di 100. piccioli s'abbatterà 3. piccioli, e così di tutti gl'altri; hora tornando alla nostra operatione, multiplica 2. via 18056 $\frac{2}{3}$. farà 54200. e questo parti per 100. ne viene 542. grossi, e tanto si deuè trarre di messetaria, la quale tratta di grossi 18056 $\frac{2}{3}$. restano grossi 17524 $\frac{2}{3}$. de' quali facendone ducati, partendo per 24. ne viene ducati 730. e grossi 4. e piccioli 21 $\frac{1}{2}$. e tanto varranno libbre 2400. di garofani, netti di fusti, e messetaria, come da te stesso operando potrai vedere.

Molte altre propositioni simili si potrebbero formare, ma perche hoggi non ti costuma più tante tare, e messetarie, & vñanze, perciò habbiamo formata questa sola con diuersi casi di tare, acciò che secondo l'vñanze, e costumi de' paesi ti sappi reggere, e gouernare in ogni simil caso, che ti accadesse, o ti fusse proposto, perciò che molte proposte, si pongono più per praticare, e fuggiare le menti degli studiosi, che per proprio bisogno, attesochè si vende, e compra a numero reso, e misura, con tara, e senza, secondo gli accordi, che fanno i compratori con i venditori, e così i patti rompono le leggi.

E dicendo, il marco dell'oro, che è 8. once, vale duc. 65. e fol. 10. si domanda quanto varranno 6. marchi, 3. once, 8. denari, e 6. grani. Sappi, che vn marco d'oro si diuide in 8. once, & vn'oncia si diuide in 24. denari, ouero danapefi, & il danaro si diuide in 24. grani, e per questo ci conuien prima trouare la valuta d'vn oncia, d'vn denaro, e d'vn grano; parti adunque la valuta d'vn marco, cioè duc. 65. soldi 16. per 8. ne viene ducati 8. soldi 4. denari 6. per la valuta d'vn'oncia, dipoi parti la valuta d'vn oncia per 24. ne viene soldi 6. den. 10 $\frac{1}{2}$. per la valuta d'vn denaro, e questo parti per 24. ne viene denari 3 $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{6}$. per la valuta d'vn grano. Fatto questo multiplica 6. grani via la valuta d'vn grano, fanno soldi 1. den. 8 $\frac{1}{3}$. quali segnarai sotto a vna linea; dipoi multiplica 8. denari via la valuta d'vn denaro, fanno duc. 2. fol. 14. den. 10. e questi poni sotto gradatamente; dipoi multiplica 3. once via la valuta d'vn oncia, fanno duc. 24. fol. 12. den. 6. i quali poni sotto alli già posti, col sopradetto ordine, dipoi multiplica 8. marchi via la valuta d'vn marco, fanno ducati 526. soldi 8. e questi poni gradatamente sotto gli altri; dipoi somma insieme questi quattro prodotti, trouarai, che faranno in tutto duc. 553. soldi 18. den. 0 $\frac{1}{3}$. come qui di sotto puoi vedere. Poteuamo ancora cominciare a multiplicare prima dai marchi, poi l'oncia, poi i denari, e poi i grani; ma questo niente importa, perche necessariamente conuien fare tutte quelle multiplicationi, e cominci l'operante da che parte vuole.

8)	Duc.	65.	16.	0.	8	3	8	6
24)		8.	4.	6.				
24)		0.	6.	10 $\frac{1}{2}$.				
		0.	0.	3 $\frac{4}{9}$ $\frac{1}{6}$.				
		0.	1.	8 $\frac{1}{3}$.				
		2.	14.	10.				
		24.	13.	6.				
		526.	8.	0.				
	Duc.	553.	18.	0 $\frac{1}{3}$.				

E dicendo, la libbra dell'oro vale ducati 98. soldi 16. si domanda quanto varranno libbre 7. once 8. denari 13. e grani 15. A voler soluer questa procederai col medesim' ordine, che hai proceduto nella sopradetta, eccetto che doue in quella nel principio dell'operare partisti per 8. in questa bisogna partir per 12. per esser 12. once vna libbra, parti adunque ducati 98. soldi 16. per 12. e l'auuenimento farà la valuta d'vn'oncia, il quale partirai per 24. e quel che ne verrà farà la valuta d'vn danaro, e se questo lo partirai similmente per 24. l'auuenimento farà la valuta d'vn grano; per ilche tu haucrai la valuta d'vn grano, d'vn danaro, d'vn oncia, e d'vna libbra. Multiplica poi 7. libbre via la valuta d'vna libbra, e li 8. once via la valuta d'vn oncia, e li 13. denari via la valuta d'vn denaro, e li 15. grani via la valuta d'vn grano, secondo, che nella proposta del marco dell'oro facesti, e questi quattro prodotti li sommarai insieme, trouarai, che faranno duc. 762. fol. 2. den. 9 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

E se dicessi, l'oncia dell'oro vale ducati 8. soldi 8. si domanda quanto varranno

ranno 7. marchi, 6. on. 8. den. e 10. grani. Prima riduci 7. marchi a once, quali sono once 56. & a queste aggiungi le 6. once, che s'hanno a valutare, faranno intutto once 62. Hora dirai così, se vn'oncia d'oro vale duc. 8. fol. 8. che varranno once 62. den. 8. e grani 10 $\frac{1}{2}$ parti duc. 8. fol. 8. per 24. ne viene fol. 7. a oro, per la valuta del peso d'un danaro d'oro, e questo lo partirai per 24. ne viene den. 3 $\frac{1}{2}$. a oro, per la valuta d'un grano d'oro; dipoi moltiplica 10. grani, che vogliamo valutare via la valuta d'un grano, & il prodotto lo segnarai sotto a vna linea, dipoi moltiplica 8. den. via la valuta d'un denaro, & il prodotto lo segnarai sotto alla valuta de' 10. grani, dipoi moltiplica 62. once, via la valuta d'un'oncia, & il prodotto segnarai sotto gradatamente, fatto questo somma insieme questi tre prodotti, trouarai, che faranno duc. 523. fol. 14. den. 11. per la valuta del sopradetto oro.

24)	8.	8.	o.	62.	8.	10.
24)	o.	7.	o.			
	o.	o.	3 $\frac{1}{2}$.			
	o.	2.	11.			
	2.	16.	o.			
	520.	16.	o.			
	Duc. 523.	14.	11.			

Ma perche molti Autori antichi, vogliono che si riduchino le cose a vn medesimo nome, come per esempio diceuoli così. Il marco dell'oro vale duc. 67. fol. 18. den. 8. si domanda quanto varranno 5. marchi, 3. once, 8. denari, e 15. grani, la qual proposta soluerebbono in questo modo. Prima ridurrebbono la cosa manifesta alla natura, e qualità della minore denominatione che sia nella cosa simile alla manifesta, e per che in questa la minor denominatione della cosa simile alla manifesta, termina in grani, perciò la cosa manifesta, che è vn marco, lo ridurrebbono a grani, che sono grani 4608. dipoi perche il prezzo di essi grani, che è la cosa non si mile, termina in denari, ridurrebbono ducati 67. fol. 18. den. 8. a denari, che sono den. 16304. fatto questo, ridurrebbono a grani tutti quei marchi, once, denari, e grani, che volessero valutare, per hauer vna quantità sola, di nome simile alla cosa manifesta, perche riducendo a grani li 5. marchi, 3. once, 8. den. e 15. grani, trouarai, che faranno grani 24975. e dipoi per regola del tre, direbbono così, se 4608. grani, cioè vn marco d'oro, vagliono den. 16304. quanto varranno 24975. grani, moltiplicando, e partendo secondo la regola, ne viene denari 88366. $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{2}$. che ridotti a ducati, e schifato il rotto, sono duc. 368. fol. 3. den. 10 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. Il qual modo d'operare noi non neghiamo, che non sia buono, e sicuro, ma troppo lungo; laonde a noi par molto più commoio, e maestro uolo a trouar prima la valuta d'un'oncia, d'un denaro, ed'un grano, e poi moltiplicare i grani, i denari, l'oncia, e i marchi via le lor valute separatamente, come di sopra habbiamo dimostrato, e tutti quei prodotti sommarli insieme.

Ma quando le minori denominationi della cosa simile alla manifesta, cioè l'oncia, denari, e grani si riducessero a parte di marco, o di libbra, secondo la qualità della cosa manifesta, sarebbe ancora vn modo d'operare bello, e mac-

e maestreuole, e quando però quelle quantità non producessero tal parte, o vogliamo dir tal rotto tanto difficile, che non hauesse schiso, come interuerrebbe in questa, che volendo ridurre onc. 3. den. 8. e grani 15. a parte d'un marco, sono $\frac{3}{16} \frac{1}{4} \frac{1}{2}$, il qual rotto non ha schiso alcuno, di modo che volendola soluer con quest'ordine di recar a parte, bisogna metterla in regola, dicendo così, se vn marco d'oro vale duc. 67. fol. 18. den. 8. quanto varranno marchi $5 \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4}$. moltiplica $5 \frac{3}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{4}$. via duc. 67. fol. 18. den. 8. secondo gli ammaestramenti da noi già dati, ne verrà duc. 368. fol. 3. den. 10 $\frac{1}{2} \frac{1}{4}$. come per il primo operare ne venne, e questo basti per dimostrare, che in diuersi modi si puole operare, e che tutti alla fine ridondano in vno.

✠ E dicendo la salma del grano, che è staia 11 $\frac{1}{4}$. e vale lir. 45. fol. 16. den. 8. si domanda quanto varranno salme 8. staia 9 $\frac{1}{4}$. Prima troua la valuta d'vno staio partendo lir. 45. fol. 16. den. 8. per 11 $\frac{1}{4}$. ne viene lir. 4. fol. 1. den. 5 $\frac{2}{3}$. per la valuta d'vno staio, e perche noi habbiamo a valutare $\frac{1}{4}$ d'vno staio, fa bisogno ancora trouar la valuta d'vn quarto, perciò, parti lir. 4. fol. 1. den. 5 $\frac{2}{3}$. per 4. ne viene lir. 1. fol. 0. den. 4 $\frac{2}{3}$. per la valuta d'vn quarto. Hora noi habbiamo, che la salma vale lir. 45. fol. 16. den. 8. e lo staio vale lir. 4. fol. 1. den. 5 $\frac{2}{3}$. & vn quarto vale lir. 1. fol. 0. den. 4 $\frac{2}{3}$. Perilche se moltiplicarai 8. salme via la valuta d'vna salma, e le 9. staia via la valuta d'vno staio, e li 3. quarti via la valuta d'vn quarto, e questi tre prodotti li sommarai insieme, faranno lir. 406. fol. 7. den. 9 $\frac{1}{4}$. per tutta la valuta delle sopradette salme, staia, e quarti.

11 $\frac{1}{4}$)	Lire	45.	16.	8.	8	9	$\frac{1}{4}$
		183.	6.	8.			
5)		36.	13.	4.			
9)		4.	1.	5 $\frac{2}{3}$.			
		1.	0.	4 $\frac{2}{3}$.			
		3.	1.	1 $\frac{1}{7}$.			
		36.	13.	4.			
		366.	13.	4.			
	Lire	406.	7.	9 $\frac{1}{4}$.			

Soluila hora in quest'altro modo, riduci 8. salme a staia, sono staia 90. alle quali aggiungerai staia 9 $\frac{1}{4}$. faranno in tutto staia 99 $\frac{1}{4}$. dipoi per regola del tre dirai così; se staia 11 $\frac{1}{4}$. cioè una salma, costano lir. 45. fol. 16. den. 8. quanto costaranno staia 99 $\frac{1}{4}$. moltiplica 99 $\frac{1}{4}$. via lir. 45. fol. 16. den. 8. fanno lir. 4571. fol. 17. den. 6. e queste parti per 11 $\frac{1}{4}$. ne uerrà lir. 406. fol. 7. den. 9 $\frac{1}{4}$. come per la prima operatione.

Per vn'altro modo ancora la sopradetta proposta si poteua soluere, & è questo cioè; riduci staia 9 $\frac{1}{4}$. a parte d'vna salma, trouarai, che sono $\frac{1}{4} \frac{1}{2}$. dipoi dirai così, se una salma, uale lir. 45. fol. 16. den. 8. che varranno salme 8 $\frac{1}{4} \frac{1}{2}$? moltiplica 8 $\frac{1}{4} \frac{1}{2}$. via lir. 45. fol. 16. den. 8. & il prodotto partilo per 11 $\frac{1}{4}$. ne uerrà lir. 406. fol. 7. den. 9 $\frac{1}{4}$. come nel primo, e secondo operare ne venne.

✠ E dicendo, pezze 4. e braccia 12 $\frac{1}{2}$. di panno, che ogni pezza è lunga 48. braccia, costano duc. 130. si domanda quante lire costa un braccio. Prima delle sopradette 4. pezze ne farai braccia, moltiplicando via 48. farà braccia 192. alle quali

quali aggiungi le sopradette braccia $12\frac{1}{4}$. fanno in tutto braccia $204\frac{1}{4}$. dipoi de sopradetti duc. 130. ne farai lire, a lir. 7. per ducato, sono lir. 910. le quali partirai per braccia $204\frac{1}{4}$. riducendo a quarti l'una, e l'altra parte, trouarai che ne viene lir. 4. & auanza lir. 364. delle quali ne farai soldi, moltiplicando via 20. faranno fol. 7280. i quali partirai per il medesimo tuo partitore, ne uerrà fol. 8. & auanzerà fol. 728. de' quali ne farai denari, moltiplicando uia 12. farà den. 8736. i quali similmente partirai per il tuo partitore, ne verrà den. 10. & auanzerà $\frac{2}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$. che schisati sono $\frac{2}{3}$. e così hauerai che vn braccio di detto panno uarrà lir. 4. fol. 8. den. $10\frac{2}{3}$. come di sotto vedi.

	$204\frac{1}{4}$)	Lire	910.	
Partitore	819.)		3640.	
			4.	8. $10\frac{2}{3}$.

E dicendo, moggia 16. staia $6\frac{1}{2}$. di grano, costano duc. 176. fol. 16. den. 8. si domanda quanto uarranno staia $9\frac{1}{4}$. moltiplica $9\frac{1}{4}$. uia duc. 176. fol. 16. den. 8. fanno duc. 1724. fol. 2. den. 6. e queste partirai per le staia $190\frac{1}{2}$. cioè per le sopradette moggia ridotte a staia, trouarai, che ne uerrà duc. 4. fol. 8. den. $3\frac{1}{2}\frac{0}{1}\frac{1}{2}$. a oro, che il soldo a oro, uale tanti soldi i di piccioli (cioè soldi correnti) quante lire uale il ducato, e così un denaro a oro uale tanti denari di piccioli, quante lire uale il ducato, come altra volta in questa nostra opera habbiamo detto.

	$390\frac{1}{2}$)	176.	16.	8.	9	$\frac{1}{4}$.
		44.	4.	2.		
		132.	12.	6.		
		1591.	10.	0.		
partitore 781)		1724.	2.	6.		
		3448.	5.	0.		
		4.	8.	$3\frac{1}{2}\frac{0}{1}\frac{1}{2}$.		

Benigno Lettore, apri l'intelletto, e stà attento a quello, che al presente siamo per dichiararti; perciò che non sempre si propongono le ragioni, che uenghino distesamente in regola, ma l'operante da se stesso ha da procurar di metteruele, quando non ci fussero secondo che richiede la regola, e poi seguir l'ordine da noi dato nella regola del tre; la quale per il gran beneficio che n'apporta al commun uso mercantescò si chiama regola d'oro, per ilche ci siamo mossi nuouamente a lodarla, e darne vn'altra poca di dilucidatione, oltre a quella che di già habbiamo data. Hora diciamo così, che a voler mettere in regola ogni forte di ragione, che per regola del tre vadino solute, tu deuì prima considerate delle tre cose, ouero quantità che ti vengono proposte, qual sia la cosa manifesta, ouero primo agente, dipoi qual sia la cosa non simile, ouero patiente, e dipoi qual sia la cosa simile alla manifesta, ouero secondo agente; perciò che la terza quantità (che farà sempre la domanda) moltiplicata con la cosa non simile, ouero patiente, & il prodotto partito per il primo agente, oue-

re cosa manifesta, ne peruerà vn quarto numero, il quale farì in tal proportion-
ne col terzo numero, ouero quantità, quale farà il secondo al primo, come
per essempio, se la proposta dicesse così, tre Sartori in vn giorno fanno 6 giub-
boni, si domanda 9. sartori nel medesimo tempo, quanti giubboni faranno, tu
hai per il primo numero tre sartori, che è la cosa manifesta, ouero primo agen-
te, i quali fanno 6. giubboni, che è il secondo numero, cioè la cosa non simile,
ouero paziente, dipoi tu hai per terzo numero 9. sartori, che è la cosa simile alla
manifesta, ouero secondo agente, perciò quando tu vorrai metter in regola di-
stefamente qualsiuoglia proposta, studia di metter prima il numero della cosa
manifesta, ouero primo agente, il quale farà sempre tuo part tore, dipoi metti
il secondo numero, che farà la cosa non simile, ouero paziente, appresso a que-
sto verso man destra poni il terzo numero, che farà la cosa simile alla manife-
sta, ouero secondo agente, adunque per la nostra proposta, si dirà, e segnàrà
così, se 3. mi fa 6. quanto mi farà 9. moltiplica 9. via 6. fa 54. e questo parti per
3. ne viene 18. che è in proportion dupla al 9. si come il 6. è in proportion
dupla al 3. e mediante questa studia da te stesso di conoscere la cosa manifesta,
la cosa non simile, e la cosa simile alla manifesta, e dipoi moltiplica, e parti
come in questa habbiamo dimostrato.

$$\begin{array}{r} 3 \qquad 6 \quad \text{---} \quad 9 \\ 54 \\ \hline 18 \end{array}$$

E dicendo, se braccia 10 $\frac{2}{7}$. alla misura di Fiorenza tornassero in Siena di mi-
tura Sanese braccia 11 $\frac{1}{7}$. si domanda alla medesima ragione braccia 24 $\frac{1}{4}$. alla mi-
tura di Fiorenza quante torneranno in Siena. Questa parimente è in regola, e
le braccia 10 $\frac{2}{7}$. di Fiorenza s'intende per il primo agente, le quali tornano in
Siena braccia 11 $\frac{1}{7}$. e queste nō son simili al primo agente, cioè non sono della me-
desima lunghezza, e luogo, e perciò il 10 $\frac{2}{7}$. farà tuo partitore, e per il terzo
numero metterai sempre la dimanda, cioè quella cosa, che ha da produrre vn
quarto numero proportionale; per ilche in questa proposta ci conuien porre
braccia 24 $\frac{1}{4}$. di Firenze. laonde moltiplica 24 $\frac{1}{4}$. via 11 $\frac{1}{7}$. farà 271 $\frac{1}{7}$. e questo
parti per 10 $\frac{2}{7}$. ne viene 25 $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{7}$. e tante braccia torneranno in Siena le sopradet-
te braccia 24 $\frac{1}{4}$. di Fiorenza.

Primo agente.
10 $\frac{2}{7}$

Non simile, ouer paziente.

Secondo agente.

$$\begin{array}{r} 11 \frac{1}{7} \qquad \text{---} \qquad 24 \frac{1}{4} \\ \hline \end{array}$$

Ma pigliala per quest'altro modo assai più commodo, e bello, detto commu-
nemente la Crociata de' rotti. Prima poni la cosa manifesta, cioè 10 $\frac{2}{7}$. ridu-
cendoli a terzi, sono $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{7}$. e vicino a questo da man destra, poni la cosa non si-
mile che è 11 $\frac{1}{7}$. riducendoli a quinti, sono $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$. e vicino a questo pur da man
destra metterai la cosa simile alla manifesta, cioè la dimanda, ouero secondo
agente, che è 24 $\frac{1}{4}$. riducendoli a quarti, sono $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$. quali così posti staranno in
questo modo $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{7}$. $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$. $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$. fatto questo moltiplica sempre il denominante
del secondo agente, via il denominante della cosa non simile, cioè 97. via 56.

fa 5432. e questo prodotto lo moltiplicarai via il denominatore della cosa manifesta, cioè via 3. farà 16296. e questo salua; dipoi moltiplica il denominatore del secondo agente via il denominatore della cosa non simile, cioè 4. via 5. fa 20. e questo prodotto moltiplica sempre via il denominante della cosa manifesta, ouero primo agente, cioè via 32. farà 640. e quest' altro prodotto sarà sempre il partitore di quell' altro numero, che saluasti, il quale ti peruenne dalle prime moltiplicationi, e perciò in questa partirai 16296. per 640. ne verrà $25\frac{1}{2}$. come per il primo operare ne venne.

Ma quando la cosa manifesta, o la cosa non simile, o la simile alla manifesta fusse numero intero, e non accompagnato da rotti, allora segna al suo luogo tal numero intero, ma sotto ad esso segnarai l'vnità, cioè 1. con vn poco di linea in mezzo fra il numero intero, e l'vnità, e poi operarai come di sopra habbiamo detto, e verratti bene. Questo modo d'operare si costuma a stia da ragionieri, per fuggir via le difficoltà, che possono apportare le moltiplicationi, o partitioni de rotti, che con altro modo d'operare potrebbero forse accadere. Auuertendo poi che quando tu hauerai posto per ordine le tre cose, ti conuien tirar le linee da vn numero all'altro, come qui di sotto vedi, le quali linee si chiamano dimostrationi, perche ti dimostrano i numeri che hai a moltiplicare l'vno via l'altro, & anco ti fanno conoscere qual sia il partitore, e similmente il numero, che si deue partire. Studia adunque d'apprender questo modo, che ti sarà di gran giouamenro.

$$\begin{array}{r}
 10\frac{3}{4} \quad 11\frac{1}{2} \quad 24\frac{3}{4} \\
 \hline
 \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \quad \boxed{} \quad \frac{3}{4} \\
 \hline
 \text{partitori} \\
 \hline
 640) \quad 16296. \\
 \underline{25.} \quad \frac{1}{2}\frac{1}{2}
 \end{array}$$

Edicendo così. Se libbre 15. & once 9. al peso di Fiorenza, tornano in Lucca libbre 16. si domanda libb. 80. & once 4. al peso di Lucca quante torneranno in Fiorenza. Questa proposta non è distesa in regola, laonde per tuo auuertimento si dice, che sempre in simili atti concorrono tre cose, delle quali, quelle che vengono nominate due volte, come per essempio due volte Fiorenza, due volte Roma, o Venetia &c. o due volte capitale, o due volte guadagno, o due volte capitale, e guadagno insieme, o due volte ducati, o fiorini, o lire, o libbre, o braccia, o canne, o staia, o moggia, o cantara, o marchi, e così degli altri, allora, & in tal caso vna di quelle due cose, che due volte sarà nominata nelle proposte, sarà per viua forza la domanda, o vogliamo dire la cosa simile alla manifesta, o secondo agente, la quale da te conosciuta deue esser posta nel terzo luogo, e l'altra necessariamente sarà la cosa manifesta, la quale deue esser posta nel primo luogo, e seruirà per partitore; l'altra cosa poi di necessità conuien che sia la cosa non simile, o vogliamo dir patiente, la quale da te deue esser posta nel mezzo tra il primo, e secondo agente, si come in questa nostra proposta auuene, che due volte vien nominata Lucca con vn numero di peso, cioè vna volta con libb. 16. di quel peso, e l'altra con libb. 80. & once 4. le quali son quelle

quelle che cerchiamo sapere quante torneranno in Fiorenza; adunque per le ragioni addotte, le libb. 80. & once 4. vengono ad esser il secondo agente, ouero la cosa simile alla manifesta, e perciò richiedono esser messe nel terzo luogo verso man destra, e l'altra quantità che son libb. 16. di Lucca di necessità conuien che sieno primo agente, e nostro partitore, le quali si deuen metter nel primo luogo verso man sinistra. Resta hora che s'accordi l'altra quantità, ouero cosa che è nominata vna sol volta, cioè libb. 15. & once 9. di Fiorenza, che viene ad esser la cosa non simile, ouero patiente, la quale si deue porre nel mezzo, cioè fra il primo, e secondo agente, e così haueremo riuoltati i numeri, e posta la ragione in regola, la quale dirà così, se libb. 16. al peso di Lucca tornano in Fiorenza libb. 15. & once 9. si domanda libb. 80. & once 4. al peso di Lucca quante libbre torneranno al peso di Fiorenza. Rea a parte di libbra tutte l'once che vengono nominate nella proposta, hauerai per il primo agente $\frac{1}{7}$. e per la cosa non simile hauerai $15\frac{1}{4}$. che ridotti a quarti sono $\frac{6}{7}$. e per il secondo agente hauerai $80\frac{1}{4}$. che ridotti a terzi sono $\frac{2}{7}\frac{1}{4}$, come qui sotto per le figure puoi vedere, con le dimostrazioni, per il che secondo quelle, & i documenti di sopra dati farai le multiplicationi, e partitioni, e quello che ne perucrà per detta partitione saranno libbre al peso di Fiorenza.

$$\begin{array}{r} \frac{1}{7} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{28} \\ \frac{2}{7}\frac{1}{4} = \frac{1}{7} \end{array}$$

Partitore.

192) 15183.
79 $\frac{1}{4}$

E dicendo braccia $570\frac{1}{2}$ alla misura Fiorentina, quanti palmi torneranno in Palermo, essendo le braccia $3\frac{1}{2}$ Fiorentine 8. palmi in Palermo. Perche, questa non è posta in Regola, perciò bisogna metteruela, e dir così, se braccia $3\frac{1}{2}$ Fiorentine tornano in Palermo palmi 8. quanti palmi torneranno le braccia $570\frac{1}{2}$ Fiorentine, moltiplica $570\frac{1}{2}$ via 8. & il prodotto parti per $3\frac{1}{2}$. ne viene 1304. e tanti palmi torneranno le sopradette braccia di Fiorenza in Palermo.

$$\begin{array}{r} 3\frac{1}{2}) 8 \\ \underline{4564.} \\ 9128. \\ 1304. \end{array}$$

7) Palmi.

Canne 160. di panno alla misura Fiorentina, la qual canna è 4. braccia, quanti palmi torneranno in Napoli? essendo la canna di Fiorenza palmi $10\frac{1}{4}$. di Napoli. Fa così, dicendo, se vna canna di misura Fiorentina torna in Napoli palmi $10\frac{1}{4}$. quanti palmi torneranno canne 160. moltiplica 160. via $10\frac{1}{4}$. farà 1710. il qual parti per la cosa manifesta, che è 4. ne verrà il medesimo 1710. e tanti palmi dirai che torneranno in Napoli le sopradette canne 160. di Fiorenza.

$$\begin{array}{r} 1) 10\frac{1}{4} \\ \underline{160} \\ 1710. \end{array}$$

Palmi.

Braccia

#

Braccia $420\frac{1}{4}$. alla misura di Fiorenza, quante torneranno in Venetia, essendo 5. braccia di misura Fiorentina braccia $4\frac{2}{3}$. di misura Venetiana, questa similmente non è in regola, perciò dirai così, se braccia 5. di Firenze sono uguali a braccia $4\frac{2}{3}$. di Venetia, le braccia $420\frac{1}{4}$. Fiorentine, quante faranno Venetiane? multiplica $420\frac{1}{4}$. via $4\frac{2}{3}$. riducendo l'interi a rotti, & il prodotto parti per 5. trouarai che ne verrà $360\frac{3}{4}$. e tante braccia torneranno in Venetia, come qui di sotto potrai vedere.

$$\frac{1}{5} \times \frac{420\frac{1}{4} \times 4\frac{2}{3}}{5} = 360\frac{3}{4}$$

Partitori.

#

E dicendo, libbre 360. & once 4. Venetiane, quante libbre torneranno in Fiorenza, se ogni libbre 25. di Fiorenza sono libbre $28\frac{2}{3}$. Venetiane? Metti in regola la ragione, dicendo così, se libb. $28\frac{2}{3}$. Venetiane tornano in Fiorenza libb. 25. quante torneranno libb. $360\frac{1}{2}$? multiplica $360\frac{1}{2}$. via 25. & il prodotto parti per $28\frac{2}{3}$. ne verrà $315\frac{1}{3}$. e tante libbre torneranno in Fiorenza, come di sotto vedi.

$$\frac{25}{28\frac{2}{3}} \times \frac{360\frac{1}{2}}{1} = 315\frac{1}{3}$$

Partitori.

#

E dicendo, staia $240\frac{1}{2}$. alla misura di Pisa, quante torneranno in Fiorenza, se staia $4\frac{1}{2}$. alla misura di Fiorenza, tornano in Pisa staia $4\frac{1}{2}$? Questa non è in regola, & habbiamo che delle sopradette misure, e quantità ve son due di Pisa, e la prima quantità vien nominata con staia $240\frac{1}{2}$. le quali voliamo commutare in tante staia di Fiorenza, adunque questa vien ad esser la domanda, ouero secondo agente, e perciò le metteremo nel terzo luogo verso man destra, e l'altra quantità di necessità sarà la cosa manifesta, cioè staia $4\frac{1}{2}$. e perciò le metteremo nel primo luogo verso man sinistra. Ci resta poi le staia $4\frac{1}{2}$. di Fiorenza, le quali non son simili, nè al primo, nè al secondo agente, e perciò, come cosa non simile ci conuien metterla nel mezzo, infra il primo, e secondo agente, e poi la ragione verrà distesa così. Se staia $4\frac{1}{2}$. di Pisa tornano staia $4\frac{1}{2}$. in Fiorenza; le staia $240\frac{1}{2}$. di Pisa quante torneranno in Fiorenza? riduci a rotti tutte le quantità, e poi multiplica secondo le dimostrazioni, offeruando l'ordine, e regola da noi data poco inanzi.

$$\frac{4\frac{1}{2}}{4\frac{1}{2}} \times \frac{240\frac{1}{2}}{4\frac{1}{2}} = 254\frac{1}{2}$$

Partitore.

Torneranno in Fiorenza staia $254\frac{1}{2}$.

E di

H E dicendo: Vno ha pagato di gabella lire 20. d'vna balla di filati a ragione di den. 5. per lira della valuta, e la libbra de' detti filati valse lire $8\frac{1}{2}$. si domanda quante libbre pesò la balla. Fa così, di lire 20. ne farai denari, trouarai che faranno den. 4800. dipoi dirai così se 5. den. vengono pagati da vna lira, da quante lire verranno pagati den. 4800? parti 4800. per 5. ne viene 960. e tante lire valse la detta balla, dipoi parti 960. per $8\frac{1}{2}$. cioè per la valuta della libbra, ne viene $112\frac{1}{2}$. e tante libbre diremo, che pesasse la balla.

Parendoci hauer trattato a bastanza del modo che si deue offeruare nelle ragioni, che vanno solute per regola del tre, si per numeri puri senza rotti, come con rotti, e come si deuono mettere in regola di stesamente le propositioni; Perciò volendo noi più oltre procedere con molte domande, che nella Pratica d' Aritmetica occorrono, per instruttione d'infinite, che si posson formare, conuiene hauer a memoria tutto quello che fin qui habbiamo detto, acciò che se nelle suffegueti propositioni, noi non replicaremo (per breuità) alcuni termini, tu possa conoscere l'ordine, che si deue tenere, ancorche non potrà essere, che di quando in quando, alcuna volta non ne diciamo qualche cosa, massimamente in quelle propositioni, che conosceremo, che senza tal dichiarazione potrebbono apportare difficoltà al lettore, o al suo senso giudicaremo essere oscure. E così, senza che più ci dilatiamo a dimostrare la crociata de' rotti, appartenente alla regola del tre, e del cinque, vogliamo che quanto fin qui hauiamo esposto, serua per tua intelligenza in tutte l'altre occorrenze.

Modo dell' inuestire danari.

L 'Inuestir danari in mercantie, non è altro, che vn voler spendere vna quantità determinata di danari in robbe, cioè in panni, seta, cera, zucchini, grani, lane, e lini &c. a tante lire, o ducati, o fiorini, il braccio, o il cento, o il cantaro, o il moggio, o il migliaio &c. e per quella determinata quantità di danari, sapere quanto si douerà hauere di quella tal mercantia che si vuol comprare, come per essempio.

V Quante braccia di panno si comprerà con lire 360. a lir. 5. sol. 16. den. 8. il braccio? Equante libbre di seta con duc. 420. a lir. 15. sol. 13. den. 4. la libbra? valendo il ducato lir. 7. Equante libbre di cera si douerà hauere con duc. 220. a duc. $18\frac{1}{2}$. il cento? E quante cantara di zucchero con duc. 800. a duc. $26\frac{1}{2}$. il cantaro? E quante staia di grano con duc. 3000. a lir. 240. il moggio? E con duc. 320. quante libbre di lana si comprerà a lire 470. il migliaio? e quante libbre di lino si hauerà con 50. scudi d'oro di lire 7. sol. 10. per scudo, a lire 8. sol. 12. il peso? il qual peso s'intende esser di libb. 25. Molte altre cose potremo nominare per inuestir danari, quali per breuità lasceremo, acciò che il Lettore le consideri da se stesso. Hora tornando alla prima nostra richiesta, per vedere quante braccia di panno si comprerà, diremo così, se con lir. $5\frac{1}{2}$. si compra vn braccio di panno, quante braccia se ne comprerà con lir. 360? multiplica 360. via 1. fa pur 360. e questo parti per $5\frac{1}{2}$. ne viene $61\frac{1}{2}$. e tante braccia di panno si comprerà. Hor per la seta diremo così, se con lir. $15\frac{1}{2}$. si compra vna libbra di seta, quante libbre se ne comprerà con duc. 420? riduci prima a lire i detti duc. e poi opera come nella sopradetta, trouarai che si cōprerà libb. $187\frac{1}{2}$. di seta. Dipoi per la cera dirai così, se con duc. $18\frac{1}{2}$. si compra libb. 100. di cera, quante libbre se ne comprerà con duc. 220? multiplica 200. via 100. & il prodotto parti

parti per $18\frac{1}{2}$. ne verrà $1205\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. e tante libbre di cera si comprerà. Dipoi per il zuccaro, dirai così, se con $\text{duc. } 26\frac{1}{2}$. si compra vn cantaro di zuccaro, quante cantara se ne comprerà con $\text{duc. } 800$? multiplica 800 . via 1 . fa pur 800 . il qual parti per $26\frac{1}{2}$. riducendo a mezzi l'vna, e l'altra parte, ne verrà cantara $30\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ che ridotto $\frac{9}{7}\frac{1}{2}$. d'vn cantaro a libbre, faranno libb. $28\frac{1}{2}$. essendo il cantaro libb. 151 . e così diremo, che per i sopradetti $\text{duc. } 800$. si comprerà cantara 30 . e libb. $28\frac{1}{2}$. di zuccaro. Hora per il grano dirai così, se per $\text{li. } 240$. si cōpra staia 24 . di grano, cioè vn moggio, quante staia se ne comprerà con $\text{duc. } 3000$? opera come di sopra, riducendo i ducati a lire, trouarai che si comprerà staia 2100 . di grano. Hor per la lana dirai così, se con $\text{li. } 470$. si compra libb. 1000 . di lana, quante libbre se ne comprerà con $\text{duc. } 320$? recā i duc. a lire , e dipoi opera come di sopra, trouarai che se ne comprerà libb. 4766 . Dipoi per il lino, dirai così se con $\text{li. } 8\frac{1}{2}$. si compra libb. 25 . di lino, cioè vn peso, quante libbre se ne comprerà con scudi 50 . d'oro? riduci li scudi a lire, e dipoi opera in questa, come nell'altre hai fatto, trouarai che per i sopradetti scudi 50 . d'oro, si cōprerà libb. 1090 . di lino, e queste vogliamo che seruino per documento d'altre infinite domande; auuertendo che in alcuna di queste sopradette conclusioni noi habbiamo preso l'auanzo (quando è stato più d'vn mezzo) per intero, e dal mezzo in giù non n'habbiamo tenuto conto alcuno.

Vn Mercante deue hauere da vn'altro Mercante ducati 120 . d'oro, e riceue per pagamento tanto coia me fresco a $\text{fol. } 5$. den. 4 . la libbra, al quale si deue cōceder di tara 8 . per cento, si domanda quante libbre ne douerà hauere. Fa così, prima delli $\text{duc. } 120$. d'oro ne farai soldi, che sono $\text{li. } 19500$. dipoi dirai così, se con $\text{fol. } 5\frac{1}{2}$. si deue hauere vna libbra di corame, quante libbre se ne douerà hauere per $\text{fol. } 19500$? parti 19500 . per $5\frac{1}{2}$. ne viene $3656\frac{1}{2}$. e tante libbre di corame douerà hauere a pagamento, ma perche s'è detto, che deue hauer di tara 8 . per 100 . ne segue, che ogni libb. 100 . nette, deuono esser libb. 108 . brutte, cioè con la tara, perche dirai così, se per libb. 100 . nette se ne deue hauere libb. 108 . lorde, quante se ne douerà hauere per libb. 3656 . multiplica 3656 . via 108 . & il prodotto parti per 100 . ne viene 3948 . e tante libbre di corame fresco douerà hauere.

Vn Mercante deue hauere da vn'altro Mercante lire 800 . e riceue per pagamento tanta rascia a $\text{li. } 30$. $\text{fol. } 12$. la canna, si domanda quante canne ne douerà hauere. Fa così, dicendo, se per $\text{li. } 30\frac{1}{2}$. mi deue dare vna canna di rascia, quante canne me ne douerà dare per $\text{li. } 800$? parti lire 800 . per $30\frac{1}{2}$. ne viene $26\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. e tante canne di rascia douerà hauere, ma perche $\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. d'vna canna non si possono misurare per appunto, senza gran perdimento di tempo, col compasso, perciò diremo che gli douerà dare canne 26 . di rascia, le quali valgono $\text{li. } 795$. $\text{fol. } 12$. & il resto fino in $\text{li. } 800$. che v'è $\text{li. } 4$. $\text{fol. } 8$. gli douerà dare in denari contanti, e così concluderemo che gli douerà canne 26 . di rascia, e $\text{li. } 4$. $\text{fol. } 8$.

Vn Mercante deue hauere da vn'altro mercante $\text{duc. } 2395$. d'oro, il quale riceue per pagamento tanti barili di salumi a $\text{li. } 26$. $\text{fol. } 15$. il barile, si domanda quanti barili ne douerà hauere. Fa così: Prima delli $\text{duc. } 2395$. d'oro ne farai lire, i quali sono lire $17962\frac{1}{2}$. con le quali comprerai tanti barili di salumi a $\text{li. } 26$. $\text{fol. } 15$. il barile, trouarai che douerà hauere barili $671\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. ma perche nō si può confignare $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. d'vn barile, perciò conuiene che il debitore renda indietro tanti denari quanto monta $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. d'vn barile, perche piglia $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. di lire

lire 26. sol. 15. ne viene lir. 13. sol. 5. ouero troua la valuta di 671. barili, i quali montano lire 17949. sol. 5. che tratte di lir. 17962. sol. 10. restano lir. 13. sol. 5. e così concluderemo, che il debitore, douerà consegnare al creditore barili 671. di salumi, e lire 13. sol. 5.

Vn mercante deue hauere da vn'altro mercante in Fiorenza la valuta di cāne 127 $\frac{1}{2}$. di rascia a lir. 31. sol. 16. la canna, delle quali riceue il pagamento in Bologna in tanto garzuolo a lir. 13 $\frac{1}{2}$. il cento di quella moneta, si domanda quante libbre ne douerà hauere, essendo che vna lira Fiorentina vale in Bologna 11. bolognini. Prima conuiuen trouare la valuta della rascia a lir. 31. sol. 16. di moneta Fiorentina la canna, trouarai, che varrà lir. 4054 $\frac{1}{2}$. di Fiorenza, delle quali volendone far lire di Bologna, dirai così, se lir. 20. di Fiorenza sono lir. 11. in Bologna, le lir. 4054 $\frac{1}{2}$. di Fiorenza, quante faranno in Bologna? opera, farāno lir. 2229. sol. 19. den. 6. delle quali comprari tanto garzuolo a lir. 13 $\frac{1}{2}$. il cēto, dicendo, se con lir. 13 $\frac{1}{2}$. si riceue lib. 100. di garzuolo, quante lib. se ne riceuerà per lir. 2229. sol. 19. den. 6? opera, trouarai che ne douerà hauere lib. 16515 $\frac{1}{2}$.

Vn mercante deue hauere da vn'altro mercante in Bologna lir. 457 $\frac{1}{2}$. di bolognini, e riceue il pagamento in Fiorenza in tanta rascia a lir. 31 $\frac{1}{2}$. la canna, si domanda quante canne ne douerà hauere. Fa così prima le lir. 457 $\frac{1}{2}$. di Bologna le ridurrai a lire Fiorentine, dicendo così, se lir. 11. di Bologna, sono lir. 20. di Fiorenza, le lir. 457 $\frac{1}{2}$. di Bologna quante lire Fiorentine faranno? opera trouarai, che faranno lir. 831. sol. 16. den. 4. per le quali si douerà riceuere tāta rascia a lir. 31 $\frac{1}{2}$ la canna, parti adunque lir. 831. sol. 16. den. 4. per 31 $\frac{1}{2}$. ne viene canne 26. bracc. 1 $\frac{1}{2}$. e tanta rascia diremo, che douerà hauere.

Vn mercante deue hauere da vn'altro in Roma duc. 230. di Camera, de' quali riceue il pagamento in Fiorenza in tanta rascia a lir. 31. sol. 13. den. 4. la canna, si domanda quante canne ne douerà hauere, essendo 100. ducati di camera, vguai a duc. 102 $\frac{1}{2}$ d'oro di Fiorenza; Prima ridurrai i ducati di Camera à scudi d'oro di Fiorenza, dicendo così, se duc. 100. di camera sono scudi 102 $\frac{1}{2}$. di Fiorenza, li duc. 230. di camera quanti scudi d'oro faranno? moltiplica 230. via 102 $\frac{1}{2}$. & il prodotto parti per 100. ne verrà scudi 235 $\frac{1}{4}$. di Fiorenza, per i quali conuiē riceuere tanta rascia a lir. 31. sol. 13. den. 4. la canna, ouero a duc. 4 $\frac{2}{3}$. d'oro la canna, parti adunque duc. 235 $\frac{1}{4}$. per 4 $\frac{2}{3}$. ne viene canne 55. bracc. 3 $\frac{1}{4}$. e tante canne di rascia douerà hauere.

Vn Mercante ha fatto vn fallimento di duc. 27240. dipoi s'è accordato con i creditori di pagarli a ragione di sol. 8. den. 8. per lira, si domanda quanti ducati douerà pagare, fa così, dicendo, se di 20. si paga 8 $\frac{2}{3}$. quanto si pagará di 27240. opera trouarai, che douerà pagare duc. 11804.

E dicendo, vno deue hauere da vn'altro duc. 330. & il debitore per non hauer denari gli vuol consegnare tanta terra a duc. 28 $\frac{1}{4}$. il quartiere, si domanda, quanti quartieri se li douerà consegnare. E' da sapere, come in questa parte di Toscana detta Valdiniuole patria nostra, si costuma comprare, e vendere le terre a misura di coltre, quartieri, scale, e pertiche, doue la maggior denominatione si dice coltra, & vna coltra è 4. quartieri, & vn quartiere è 30. scale, & vna scala è 4. pertiche, e la pertica è 5. braccia da terra, per ilche volendo soluer la sopradetta propōsta dirai così, se per duc. 28 $\frac{1}{4}$. gli deue consegnare vn quartiere di terra, quanti quartieri gli douerà consegnare per duc. 330. moltiplica 330. via 1. fà pur 330. il qual parti per 28 $\frac{1}{4}$. riducendo a quarti l'vna, e l'altra parte, trouarai, che ne verrà quartieri 11. scale 2. e pertiche 2. pigliando il resto per intero.

E di-

E dicendo la balla de' cordouani vale duc. 45. e la balla de' montoni vale ducati 24. & vno si troua duc. 621. e vuol comprare tante balle di cordouani, quante di montoni, si domanda quante balle ne comprará di ciascuna sorte. Fà così, somma insieme duc. 45. con duc. 24. faranno duc. 69. con i quali si compra due balle, cioè vna di cordouani, & vna di montoni, e perciò dirai così, se con duc. 69. si compra due balle tra cordouani, e montoni, quante balle se ne comprará con duc. 621? opera, trouarai che se ne comprará balle 18. cioè balle 9. di ciascuna sorte.

Vno si troua lir. 760. e vuol comprare saia a lir. 6. il braccio, e rascia a lir. 8. il braccio, e lino a lir. 40. il cento, e zuccaro a lir. 180. il cantaro, e per ogni 100. libbre di lino vuole vn cantaro di zuccaro, e braccia 10. di saia, e braccia 10. di rascia, si domanda quante braccia, e libbre hauerà di ciascuna sorte. Fà così valuta braccia 10. di saia a lir. 6. il braccio, varranno lir. 60. e braccia 10. di rascia a lir. 8. il braccio varranno lir. 80. e libb. 100. di lino vagliono lir. 40. e libb. 151. di zuccaro, cioè vn cantaro, vale lir. 180. somma insieme tutte queste valute, faranno lir. 360. e questo farà partitore di lire 760. che vuole spendere; ne verrà $2\frac{1}{3}$. e così diremo, che comprará decine $2\frac{1}{3}$. di braccia di saia, che sono braccia $21\frac{1}{3}$. e braccia $21\frac{1}{3}$. di rascia, e centinaia $2\frac{1}{3}$. di lino, cioè libb. $211\frac{1}{3}$. e cantara $2\frac{1}{3}$. di zuccaro, cioè libb. $318\frac{2}{3}$. e così farai le simili.

E dicendo, il cento della lana Spagnuola vale duc. 12. e 200. della matricina vale lir. $58\frac{1}{2}$. & il cento della lana Barbarefca vale lir. 46. fol. 15. si domanda per duc. 560. quante libbre se n' hauerà di ciascuna sorte, volendone tanto dell' vna, quanto dell' altra. Fà così, somma insieme le valute del cento di ciascuna sorte, cioè duc. 12. che ridotti a lire sono lir. 84. le quali sommate con lir. $58\frac{1}{2}$. e con lir. 46. fol. 15. fanno in tutto lir. 189. fol. 5. e queste chiaramente si vede che sono la valuta di libb. 300. di lana di tre forti, perche dirai così, se con lire 189. si compra libbre 300. di lana, cioè libb. 100. d' ogni sorte, quante libbre se ne comprará con duc. 560? riducendoli prima a lire, che sono lire 3920. moltiplica 3920. via 300. & il prodotto parti per $189\frac{1}{2}$. ne viene libb. 6214. tra Spagnuola, matricina, e barbarefca; la quale volendola separare la partirai per 3. perche sono tre forti di lana, ne verrà libb. $2071\frac{1}{3}$. di ciascuna sorte. Volendone far la proua, troua la valuta di libb. $2071\frac{1}{3}$. a lir. 84. il cento, & a lire $58\frac{1}{2}$. & a lir. 46. fol. 15. e quelle tre valute che ti perueranno le sommarai insieme, e doueranno fare la somma di lire 3920. le quali ridotte a ducati sono duc. 560. vguale alla quantità, che si spese più, o meno, che ne venisse starebbe male la ragione.

84.	189 $\frac{1}{2}$.	300.	3920.
58. 10.			
46. 15.			
189.	5.		

Vno ha comprato vn braccio di saia, vn braccio di perpignano, vn braccio d' ermesino, & vn braccio di rascia, & il braccio del perpignano li costò fol. 30. più della saia, & il braccio dell' ermesino li costò fol. 36. più della detta saia, & il braccio della rascia similmente li costò fol. 5. più della saia, & in tutto spese lir. 20. si domanda quanto spese nel braccio di ciascuna sorte. Fà così, somma insieme

insieme le differenze del prezzo, che è da vna sorte all'altra, cioè fol. 30. fol. 36. e fol. 5. fanno in tutto lir. 8. fol. 6. le quali traite di lir. 20. che è la valuta di tutta quattro le braccia, restano lir. 11. fol. 14. e queste le partirai per 4. cioè per le quattro sorti di braccia, ne verrà lir. 2. fol. 18. den. 6. et tanto diremo che spendesse nel braccio della saia, e perche nel braccio del perpignano, dice che spendesse soldi 30. più: adunque li costò lir. 4. fol. 8. den. 6. & il braccio dell'ermefino dice che li costò fol. 36. più della saia, perciò aggiungi fol. 36. a lir. 2. fol. 18. den. 6. faranno lir. 4. fol. 14. den. 6. e tanto li costò il braccio dell'ermefino; e se aggiungerai lir. 5. a lir. 2. fol. 18. den. 6. farà lir. 7. fol. 18. den. 6. e tanto li costò il braccio della rascia. fanno proua, sommando insieme questi quattro prezzi, faranno lire 20. appunto.

Vno compra vna pezza di panno, lunga braccia 42. e larga braccia $1\frac{1}{2}$. per duc. 30. si domanda quanto costerà vn'altra pezza d'vqual bontà, che è lunga bracc. 36. e larga $2\frac{1}{2}$. Fa così moltiplica la lunghezza della prima via la sua larghezza, cioè 42. via $1\frac{1}{2}$. farà 56. e tante braccia quadre farà la prima pezza; Resta a vedere quante braccia quadre sia la seconda pezza, perciò moltiplica la sua lunghezza, via la larghezza, cioè 36. via $2\frac{1}{2}$. farà $76\frac{1}{2}$. e tante braccia quadre farà la seconda pezza. Fatto questo dirai così, se bracc. 56. della prima pezza, costano duc. 30. quanto costaranno bracc. $76\frac{1}{2}$. della seconda pezza, moltiplica $76\frac{1}{2}$. via 30. & il prodotto parti per 56. ne verrà duc. 40. fol. 19. den. 7. $\frac{1}{2}$. e tanti ducati diremo, che costerà la seconda pezza.

Vno tolse in preſto da vn'altro ducati 4000. per 3. anni, e quando gli restitui il creditore non volse merito alcuno, ma richiese il debitore a douer prestare a lui duc. 7480. si domanda quanto tempo li douerà tenere, acciò che venga satisfatto del seruitio, che fece all'amico. Chiara cosa è che li duc. 7480. faranno più frutto, che li duc. 4000. in egual tempo, e per questo conuiene che li tenga meno di tre anni, per guadagnare il medesimo frutto, che si deuè a 4000. duc. in 3. anni, e perciò dirai così, se duc. 7480. fussero duc. 4000. che farebbono anni 3. moltiplica 3. via 4000. fa 12000. il qual parti per 7480. ne viene anni 1. mesi 7. e giorni 8. scarsi, e tanto tempo li douerà tenere, e verrà satisfatto del commodò che fece all'amico.

Trenta lauoranti fanno vn lauoro in 4. anni, si domanda in quanto tempo 50. lauoranti finirebbono vn lauoro simile? ouero quanti lauoranti finirebbono il detto lauoro in 2. anni. Questa proposta contiene due domande, e per la prima si deuè considerare, che quanti più lauoranti sono, tanto inanco tempo bisogna; e per la seconda quanto manco tempo è, tanti più lauoranti bisogna; adunque secondo la regola del tre, o delle proportioni, dirai così (riuoltando i numeri) se 50. fusse 30. che farebbono 4. anni, moltiplica 4. via 30. fa 120. il qual parti per 50. ne viene $2\frac{2}{5}$. & in anni $2\frac{2}{5}$. diremo che 50. lauoranti farebbono il medesimo lauoro. Dipoi per la seconda domanda, la quale richiede quanti lauoranti farebbono il detto lauoro in 2. anni, dirai così (riuoltando i numeri) se 2. anni fussero 4. che farebbono 30. lauoranti, moltiplica 30. via 4. fa 120. il qual parti per 2. ne viene 60. e tanti lauoranti conuerrebbe hauere a voler finire in 2. anni il detto lauoro.

De' Guadagni, e perdite.

E' Cosa necessaria al Mercante saper conoscere i guadagni, e le perdite, che si possono fare nel traffico mercantile, per darne conto a se medesimo; Perciò che ritrouandosi fu le Fiere per inuestir denari in panni, o drappi, o lane, o altre mercantie; sapendo egli il primo costo, al quale deue aggiungere tutte le spese, che per tal conto potesse fare, tanto di vetture, come di gabelle, e datij, e vitto di sua persona, finche ha condotto dette mercantie doue vuole, possa subito considerare in quanto gli starebbe il braccio, o il cento di quella tal cosa &c. acciò che riuendendo a minuto quelle tali mercantie a tante libbre, o soldi il braccio, o la libbra, secondo che è il corso commune, doue le vuol riuendere, conosca se puol guadagnare, o perdere, e quanto per cento, acciò che non habbia a comprar caro, e vender vile; ma quelli che non fanno far così minutamente quesli conti, o se gli fanno fare gli paion troppo fastidiosi; n'hanno imparato vn'altro che è più breue de' sopradetti, il quale è questo. Compra vno, e vendi tre, se fallisce incolpa me.

Vno compra il cento della cera ducati 14. e la riuede duc. 16. si domanda quanto guadagna per cento. Dirai così, se di 14. si fa 16. che si farà di 100? multiplica 100. via 16. & il prodotto parti per 14. ne viene 114 $\frac{2}{7}$. fra capitale, e guadagno, cauane adunque 100. di capitale, resta 14 $\frac{2}{7}$. di netto guadagno per cento. Per altro modo poteui far così: caua 14. ducati, che comprasti il cento della cera, di 16. ducati, che la riuede resta duc. 2. e poi dirai così, se duc. 14. mi danno di guadagno duc. 2. quanto mi daranno di guadagno duc. 100? opera, ti daranno di guadagno 14 $\frac{2}{7}$. che l'vno, e l'altro modo puoi usare. Ma guarda, che non ti venisse detto, come dicono molti ignoranti, e grossolani, i quali non son mercanti, nè fanno, che cosa sia traffico mercantile; Perciò che questi tali, intendono che il guadagno di tanto per cento, sia per cento braccia, o per cento libbre, &c. d'alcuna mercantia; la qual cosa è falsa, ma noi intendiamo, & intender si deue, che a guadagnar tanto per cento, sia sopra 100. ducati, o 100. lire &c. perchè quando tra i mercanti si dice, io guadagno 10. per cento, s'intende in qualunque sorte di moneta, o valuta di robba, cioè che di cento ducati, ne fa 110. e di cento lire ne fa 110. e di cento soldi ne fa 110. e di cento denari, ne fa 110. &c. di maniera che quando vno dice, io ho guadagnato 10. per cento, altro non vuol dire, se non che con 100. ducati ha guadagnato 10. ducati, e non che sopra 100. libbre, o cento braccia, o cento staja habbia guadagnato 10. scudi, o 10. libbre, o 10. soldi; ma quando si dicesse, braccia 100. di panno, mi son tornate bracc. 110. allora la mercantia guadagnerebbe 10. per cento.

E dicendo, vno compra la libbra della seta lir. 14. sol. 13. den. 4. e la riuede lir. 16. sol. 16. den. 8. si domanda quanto guadagna per cento. Farai come nella sopradetta, dicendo, se di lir. 14 $\frac{3}{4}$. si fa lir. 16 $\frac{2}{3}$. che si farà di lire 100? opera per la crociata de' rotti, ouero multiplica la terza cosa via la seconda, & il prodotto parti per la prima, trouarai che di cento si farà 114 $\frac{2}{3}$. del quale cauane il capitale, che è cento, resta 14 $\frac{2}{3}$. e questo sarà il guadagno, che si farà per cento. E volendo trouare il guadagno medesimo per altro modo, farai così, caua lire 14. sol. 13. den. 4. di lir. 16. sol. 16. den. 8. resta lir. 2. sol. 3. den. 4. e questo è il guadagno, che si fa con lir. 14. sol. 13. den. 4. e perciò dirai così, se
lire

lire $14\frac{2}{3}$. mi danno di guadagno lir. $2\frac{1}{3}$. quanto mi daranno di guadagno lire 100? multiplica, e parti, secondo le regole date; trouarai, che ti daranno di guadagno lir. $14\frac{1}{3}\frac{2}{3}$. che è uguale a quel che ne venne per il primo operare.

E dicendo, vno compra il cento della cera lir. 140. e la riuende lire 124. si domanda quanto perde per cento. Fà così, cauà 124. di 140. resta 16. dipoi dirai in questo modo, se di lire 140. io perdo lir. 16. quanto perderò di lir. 100? multiplica, e parti, ne verrà $11\frac{1}{2}$. e tanto perderà per cento. E volendola soldare per vn' altro modo, dirai così, se le lir. 140. che io ho spese, mi son tornate ir. 124. quanto mi tornerebbono lir. 100? opera, tornerebbono lir. $88\frac{2}{3}$. le quali cauà di lir. 100. restano lir. $11\frac{1}{2}$. e tanto si venne a perder per cento.

A conoscere se si guadagna, o perde, e quanto per cento.

HAuendo noi dimostrato il modo di saper conoscere il guadagno, e la perdita che si può fare per cento; Resta hora che dimostriamo il modo da saper conoscere se si guadagna, o perde, e quanto per cento; e questi casi si coturno proporli così.

Io compro il cento de' eordouani lir. 130. e riuendo la libbra soldi 28. domando s'io guadagno, o perdo, e quanto per cento. Queste propositioni sono in arte simili alle sopradette, & in parte differenti; percioche nelle prime a noi ra noto il guadagno, o la perdita; ma in queste creconuien ritrouare i guadagni, o le perdite; laonde per venirne in cognitione farai così, troua la valuta vna libbra a lir. 130. il cento, trouarai, che varrà soldi 26. e noi diciamo, che ti riuenduta soldi 28. per il che tu vedi, che si guadagna sol. 2. e così dirai, se sol. 6. ne danno di guadagno sol. 2. che mi daranno sol. 100? opera, trouarai, che si guadagnerà a ragione di $7\frac{1}{3}\frac{2}{3}$. per cento. Sappi che la medesima proportione è da soldi a soldi, che è da feudi a feudi, e da lire a lire, e da piccioli a piccioli; laonde se per cento soldi si guadagna sol. $7\frac{1}{3}\frac{2}{3}$. similmente per cento feudi si guadagnerà feudi $7\frac{1}{3}\frac{2}{3}$. e per 100. lir. si guadagnerà lir. $7\frac{1}{3}\frac{2}{3}$. e così ogn'altra qualità di monete, o pesi, o misure.

Soluila hora per quest' altro; guarda quanto rinenderà il cento de' eordouani soldi 28. la libbra, trouarai, che lo riuenderà lire 140. & a lui costò lir. 130. eri il che tu vedi che si guadagna lir. 10. il qual guadagno te lo danno le lir. 130. erò dirai così, se lir. 130. guadagnano lir. 10. quanto guadagneranno lir. 100? pera, trouarai che si guadagnerà $7\frac{1}{3}\frac{2}{3}$. per cento, come nella sopradetta, e questo modo d'operare potrai sempre offeruare in molte altre; quando nel cercare qualche viene la libbra; o l'oncia, o il braccio d'alcuna cosa, tu trouassi he costasse lire, soldi, e denari con auanzi, e rotti fallidiosi, per fuggir quel nauaglio, ma essendo tu esperto nelle regole de' rotti, soluile per qual modo ti piace.


Vno ha compro da vn' altro libb. 1250. di seta per temro di 18. mesi a lir. 21. a libbra, e lui l'ha riuenduta per danari contanti lir. $17\frac{1}{2}$. la libbra, si domanda quanto verrebbe a perdere per cento l'anno. Altri la risoluono così, dicendolo, se lir. $17\frac{1}{2}$. mi danno di perdita lir. $3\frac{1}{2}$. quanto mi dara 100? per la qual cosa gli dà di perdita 20. e tanto dice che perderebbe per 100. in 18. mesi, dipoi lice così, se in 18. mesi si perde 20. quanto si perderà in 12. mesi? per il che si verrebbe a ragione di $13\frac{1}{3}$. per cento, la qual cosa è falsissima, perche non è vero che le lire $17\frac{1}{2}$. gli diano di perdita lir. $3\frac{1}{2}$. e che questa loro opinione sia

H

falsa

falsa si manifeſta e così, cioè, se il compratore paga *lir. 21.* esso ne riceue solamente *lir. 17 $\frac{1}{2}$.* adunque d'ogni *21.* fa *17 $\frac{1}{2}$.* Laonde volendo soluere la sopradetta proposta, dirai così, se *lir. 21.* mi danno di perdita *lir. 3 $\frac{1}{2}$.* quanto mi darà di perdita 100? multiplica 100. via *3 $\frac{1}{2}$.* & il prodotto parti per *21.* ne viene *16 $\frac{2}{3}$.* e tanto perderebbe per cento in 18. mesi, dipoi dirai così, se in 18. mesi si perde *16 $\frac{2}{3}$.* quanto si perderà in 12. mesi? opera, trouarai, che si perderà a ragione di *11 $\frac{1}{3}$.* per cento l'anno.

Potenasi soluere ancora per via delle proporzioni, trouando prima quanto compra tutta la detta seta a *lir. 21.* la libbra; trouarai che li costa *lir. 26250.* & esso la riuede *lir. 21875.* le quali tratte di *lir. 26250.* restano *lir. 4375.* e tanto perde in tutto, dipoi dirai così, se *lir. 26250.* in 18. mesi mi danno di perdita *lir. 4375.* le *lir. 100.* in 12. mesi quanto mi daranno di perdita? multiplica *26250.* via 18. fa *472500.* qual salua per partitore, dipoi multiplica *4375.* via 100. & il prodotto multiplica via 12. mesi, farà in tutto *525000.* il qual partirai per *472500.* ne verrà *11 $\frac{1}{3}$.* e tanto perderà per cento l'anno.



Vno hauendo bisogno d'vna quantita di denari, andò da vn Mercante, e li disse, accomodatemi di tante mercantie per tempo di 10. mesi, che riuendendole io al presente non perda più che a ragione di 12. per cento l'anno, e così gli dice tanto piombo a scudi 19. il cento, si domanda quanto lo douerà riuendere. Ancor questa vn Maestro di Pisa la pone in vn suo libro scritto a mano. La qual proposta da lui e mal soluta, e dice così se in 12. mesi perde 12. per cento, quanto perderà in 10. mesi? tu vedi che perde 10. dipoi dice, se 110. mi torna 100. che mirtornarà 19? il qual gli torna scudi 17. sol. 5. den. *57 $\frac{1}{2}$.* e tanto dice che douerà riuendere il cento del piombo, il che e falsissimo, perche chi perde 12. per cento, diceſi che di 100. fa 88. attesoche altro e la perdita, & altra cosa e lo sconto che si fa per cento, e perciò conuien dir così, se di 100. si fa 88. che si farà di 19? opera, si farà *16 $\frac{2}{3}$.* che tratto di 19. resta *2 $\frac{2}{3}$.* e tanto perde in vn'anno, perche in 10. mesi perderà *17 $\frac{1}{3}$.* che tratto di 19. resterà *17 $\frac{1}{3}$.* e tanto douerà riuendere il cento del piombo, e perderà a ragione di 12. per cento l'anno, comprandolo scudi 19.

Hanne proua, dicendo così, se di ducati 19. in 10. mesi si perde duc. *17 $\frac{1}{3}$.* di ducati 100. in 12. mesi, quanti se ne perderà? multiplica 19. via 10. fa 190. e questo salua per partitore, dipoi multiplica *17 $\frac{1}{3}$.* via 100. fa 190. il qual multiplica via 12. mesi farà 2280. e questo parti per 190. che saluaſſi, ne viene 12. apunto, e tanto perderebbe per cento l'anno.



E dicendo, vno compra il cantaro del zuccaro, che pesa libb. 151. per scudi 25. sol. 3. den. 4. d'oro, di *lir. 7.* sol. 10. per scudo, e riuede l'oncia sol. 2. den. 8. si domanda se guadagna, o perde, e quanto per cento. Prima troua quanto compra

compra l'oncia, trouarai che gli costa fol. 2. den. 1. e la riuede fol. 2. den. 8. per a qual cosa tu vedi che guadagna 7. denari per oncia, e questo guadagno gli lo dà fol. 2. den. 1. cioè den. 25. e perciò dirai così, se den. 25. mi danno di guadagno den. 7. quanto mi daranno den. 100? opera, ti daranno di guadagno den. 28. così diremo che guadagnerà 28. den. per cento den. e 28. soldi per cento soldi, e 28. lire, o scudi, o fiorini, per cento lire, o per cento scudi, o per cento fiorini. Ma quando tu trouassi che la libbra, o l'oncia, o il braccio di quella mercantia, che ha compro, costasse più che non si riuede; allora potrai dire assolutamente che perde: come per essempio, se tu trouassi che gli costasse la libbra fol. 20. e la riuedesse fol. 18. perderebbe fol. 2. di quei fol. 20. di maniera che la differenza qual farà da quel che la compra, a quel che la vende, sarà il guadagno, o la perdita, che farà in detta cosa, e tal guadagno, o perdita, te la darà sempre il tuo capitale, cioè quel tanto che ti costerà quella tal cosa, e volendo saper poi quanto perde, o guadagna per cento, dirai così, se fol. 20. mi danno di perdita fol. 2. quanto mi darà di perdita fol. 100? opera, trouarai che ti darà di perdita 10. per cento, ma se quella tal cosa costasse fol. 16. e tu la riuedessi fol. 18. diresti così, se fol. 16. mi danno di guadagno fol. 2. quanto mi daranno di guadagno fol. 100? opera, trouarai che ti daranno di guadagno 12 $\frac{1}{2}$. per cento.

Solui la sopradetta proposta in quest'altro modo: Perche dice, che riuede l'oncia del zuccaro fol. 2. den. 8. troua quanto riuederà il cantaro, vedrai che o riuederà lir. 241. fol. 12. & esso lo compra scudi 25. fol. 3. den. 4. d'oro, cioè lir. 188. fol. 15. tra li lir. 188. fol. 15. di lir. 241. fol. 12. Restano lir. 52. fol. 17. di netto guadagno, per il che dirai così, se lir. 188 $\frac{1}{2}$. mi danno di guadagno lir. 52. fol. 17. che mi darà 100. ouero senza trarre quel che lo compra di quel che lo riuede, si puol dir così, se lir. 188 $\frac{1}{2}$. di capitale mi tornano tra capitale, e guadagno lir. 241 $\frac{1}{2}$. che mi tornerà 100? opera per il crociamento de' rotoli vna, e l'altra, trouarai che nel primo operare ti darà di guadagno 28. e nel secondo nodo d'operare ti tornerà 128. fra capitale, e guadagno, del quale cauane 100. li capitale, resterà 28. di netto guadagno per cento.

E dicendo, vno compra il cento della lana lir. 55. e riuede la libbra fol. 10. e rep. 4. si domanda se guadagna, o perde, e quanto per cento. Troua prima quanto gli costa la libbra a lir. 55. il cento, trouarai che gli costa fol. 11. & esso la riuede fol. 10. den. 4. per la qual cosa tu vedi che perde 8. den. laonde dirai così, se di fol. 11. si perde 8. den. che si perderà di soldi 100. moltiplica, e parti, te ne verrà den. 72 $\frac{1}{4}$. che ridotti a soldi sono fol. 6 $\frac{3}{4}$. e tanto si perderebbe per 100.

E per altro modo dirai così, se fol. 11. mi danno di perdita $\frac{8}{100}$. d'un soldo, che perdita mi daranno fol. 100. opera, ne verrà fol. 6 $\frac{3}{4}$.

E per vn'altro modo dirai così, se di fol. 11. io perdo tanto che mi tornano fol. 10 $\frac{1}{4}$. quanti mi torneranno fol. 100. opera torneranno fol. 93 $\frac{1}{4}$. che per fino in 100. v'è 6 $\frac{3}{4}$. per la perdita di cento.

E per vn'altro modo potrei far così, cioè, a fol. 10. den. 4. la lib. guarda quanto riuederà il cento, trouarai che lo riuederà lir. 51. fol. 13. den. 4. e lui lo compra lir. 55. caua adunque lir. 51. fol. 13. den. 4. di lir. 55. restano lir. 3. fol. 6. den. 8. e questa è la perdita che fa di lir. 55. perciò dirai così, se di lire 55. si perde lir. 3. fol. 6. den. 8. quanto si perderà di lir. 100. opera si perderà lir. 6 $\frac{3}{4}$.

Solui la per quest'altro modo, così dicendo, se di lir. 55. se ne perde tante, che tornano lir. 51. fol. 13. den. 4. quante torneranno lir. 100. perdendo alla medesima ragione; opera, torneranno lir. 93 $\frac{1}{4}$. le quali caua di lire 100. restano

lir. $67\frac{2}{3}$. per la perdita di 100. e questo ti basti, quanto alla dichiarazione, & il modo da ritrouare i guadagni, e le perdite che si fanno per cento, o per qualsiuoglia altra quantita.

Nota, che di tutte le ragioni si puol far le proue; ma non ti affidare nelle proue del 7. o del 9. come erronee, & in simili casi poco usate, ma affidati nella buona pratica, che quella ti varrà per mille proue, perche si puol così pigliare errore nel far delle proue, come nell'operare intorno alla solutione delle propositioni; nientedimeno per sodisfazione degli studiosi di queste scienze daremo qui l'esempio di due proue Reali; la prima delle quali si fa col riuoltare le ragioni, si come volendo noi prouare l'ultima sopradetta propositione, qual dice così, se lir. 55. mi tornano lir. $51\frac{2}{3}$. quante mi torneranno lir. 100. per il che si trouò che tornauano lir. $93\frac{2}{3}$. hora per farne proua, riuolta la ragione, così dicendo, se il capitale di lir. $93\frac{2}{3}$. prima che si perdesse era 100. che capitale era quello di lir. $51\frac{2}{3}$. prima che si perdesse? opera, trouarai che il suo capitale sarà lir. 55. più o meno, che venisse staria male, & ancora se ne potrebbe hauere la proua per 7. e per 9. ma per esser cosa alquanto tediosa la lasceremo pendente.

Vn'altra proua Reale vogliamo ancora dimostrare tratta da Euclide, quando dice, se faranno quattro linee proportionali, quel rettangolo che si contiene sotto la prima, e l'altra, sarà vguale a quello il quale peruene dell'altre due. Che riducendola alla nostra Pratica, non vuol dir altro che questo, cioè, che tanto deuè fare il multiplicato della prima cosa nella quarta, quanto il multiplicato della seconda nella terza; come nel preallegato esemplo, noi hauemmo che la prima cosa fu lir. 55. e la seconda lir. $51\frac{2}{3}$. e la terza fu lir. 100. e la quarta fu lir. $93\frac{2}{3}$. noi diciamo così, che se si multiplica la prima via la quarta, cioè lir. 55. via lir. $93\frac{2}{3}$. farà lir. 5166 $\frac{2}{3}$. dipoi se si multiplica la seconda via la terza, cioè lir. $51\frac{2}{3}$. via lir. 100. farà similmete lir. 5166 $\frac{2}{3}$. come desiderauamo.

Regola d'investir denari con limitatione di guadagni, e perdite.

Resta hora che dimostriamo il modo dell'investir danari con limitatione di guadagni, o perdite, a tanto per cento, o per ducato, o per lira, o per soldo &c. Nessun si ammiri, se noi esemplifichiamo con proposte del guadagno, o perdita che si fa per cento, più che non facciamo sopra ad altro numero, perciò che così facendo s'offerua l'uso de' Mercanti; ma l'operante, e studioso puol applicarlo a tanto per decina, o dozzina, o ducato, o lira, come più gli piace; che offeruando i nostri documenti, gli faranno lume a tutte l'altre, e costumansi propor così.

Per quanto douerò cōprare il cento de' cordouani, che riuendendolo poi duc. 20. guadagni 15. per cento. Queste si fanno così, arguendo che chi vuol guadagnare 15. per cento, vuol di cento far 115. e questo vuol fare rata portione, col prezzo di 20. perche in questo 20. è incorporato il capitale, e guadagno, e volendo ritrouare quanto sia separatamente il capitale di detto 20. ci conueni aggiungere il guadagno che si vuol far per 100. al detto 100. che in questa cōuerrà aggiunger 15. farà 115. dipoi dirai così, se 115. prima che guadagnasse era 100. che douerà esser 20. multiplica, e parti, ne verrà $17\frac{2}{3}$. e tanto si douerà cōprare il cento de' cordouani, e volendola prouare, opera per contrario modo dicendo, se di $17\frac{2}{3}$. si fa 20. che si farà di 100. opera, trouarai, che si farà 115. del quale cauare il capitale, che è 100. resta 15. di netto guadagno per cento, più, o meno che venisse staria male.

Per.

Per quanto si douerà comprare il cantaro del zuccaro di libb. 151. accioche riuendendo poi l'onzia fol. 2. den. 8. si guadagni 20. per cento. Troua prima quanto si deue comprar l'onzia; aggiungi 20. che vuol guadagnare per cento, a esso 100. farà 120. dipoi dirai così: se 120. guadagno, e capitale vien da 100. puro capitale, da che capitale verrà fol. 2. den. 8. trouarai che verrà da capitale di fol. 2. den. 2 $\frac{2}{3}$. e tanto si deue comprar l'onzia; hora da te stesso troua quanto si douerà comprare il cantaro, a fol. 2. den. 2 $\frac{2}{3}$. l'onzia, trouarai che il cantaro si douerà comprare lir. 201. fol. 6. den. 8. a voler riuendere l'onzia fol. 2. den. 8. e guadagnar 20. per cento.

Pigliala per quest'altro modo, guarda quanto riuenderà il cantaro a fol. 2. den. 8. l'onzia, trouarai che lo riuenderà lire 241. fol. 12. nel qual prezzo c'è incorporato il guadagno, & il capitale, per il che dirai così: se 120. capitale, e guadagno insieme, vien da 100. puro capitale, da che capitale verrà lir. 241 $\frac{1}{2}$, opera trouarai che verrà da capitale di lir. 201. fol. 6. den. 8. come ci venne per la prima operatione. Le proue si fanno al contrario, riuolgendo le ragioni, come di sopra s'è detto: ouero per via di proportioni, come poco inanzi habbiamo dimostrato, ma quella del riuoltar le ragioni, pare a gli operanti più facile, e capace.

E dicendo, quanto si viene a pagare il braccio del panno di prima compra, che riuendendosi poi la pezza di braccia 60. per duc. 40. si guadagna a ragione di 20. per cento. Fà così, aggiungi prima il guadagno che vuol far per cento a esso cento farà 120. dipoi dirai così, se 120. guadagno, e capitale, vien da 100. puro capitale, da che capitale verrà 40? trouarai che verrà da capitale di duc. 33. fol. 6. den. 8. e tanto costò la pezza di braccia 60. troua hora la valuta d'un braccio, partendo duc. 33. fol. 6. den. 8. per 60. ne viene fol. 11. den. 1 $\frac{1}{2}$. a oro, che se il duc. vale lir. 7. li detti fol. 11. de n. 1 $\frac{1}{2}$. varranno lir. 3. fol. 17. den. 9 $\frac{1}{2}$. di moneta corrente, e tanto si viene a pagare il braccio di prima compra.

E dicendo, vno hà compro la libbra della seta vna quantità di lire, e l'ha riuenduta lir. 16. fol. 16. den. 8. e nel far de' conti troua che ha perso a ragione di 16. per cento, si domanda quanto la comprò. E' cosa manifesta, che colui, il quale perde 10. per cento, d'ogni 100. viene a far 90. per tanto dirai così, se 90. inanzi che perdesse era 100. che doueua esser 16 $\frac{2}{3}$? trouarai che doueua essere lir. 18. fol. 14. den. 0 $\frac{1}{2}$. e tanto diremo che comprò la libbra, fanne proua riuoltando la ragione, dicendo così, se lir. 100. (perdendo) mi tornano lire 90. quante mi torneranno lir. 18. fol. 14. den. 0 $\frac{1}{2}$. opera torneranno lir. 16. fol. 17. den. 8. più o meno, che ne venisse staria male.

E dicendo. Vno compra la canna del panno per lire non sò quante, e fa suo conto, che se riuede il braccio lir. 5. fol. 10. perde a ragione di 20. per cento, si domanda quanto li costò la canna. Troua prima a lir. 5. fol. 10. il braccio quanto riuenderebbe la canna, multiplica lir. 5. fol. 10. via 4. farà lir. 22. e tanto riuenderebbe la canna, e perderebbe a ragione di 20. per cento, caua hora 20. di 100. resta 80. dipoi dirai così, se 80. inanzi che si perdesse era 100. che doueua esser 22? multiplica 22. via 100. & il prodotto parti per 80. ne viene 27 $\frac{1}{2}$. e tante libbre diremo che comprò la canna.

Per vn'altro modo breue, vogliamo dimostrare la medesima solutione, e diciamo così, chi guadagna 20. per cento, guadagna il quinto del suo capitale, e chi perde 20. per cento, perde quanto il quarto di quel che gli resta, adunque chi perde 20. per cento d'ogni cento, viene a far 80. del qual 20. n'è il quarto;

Laonde se tu aggiungi il quarto di quel che ti resta al detto rimanente ti rifarà il primo capitale, come se tu aggiungerai il quarto d'80. che è 20. al detto 80. ti rifarà cento primo capitale. Tornando hora alla sopradetta proposta, guarda quanto riuenderà la canna a lire $5\frac{1}{2}$. il braccio tu sai che la riuenderà lir. 22. e questo gli restarà quando hauerà perso a ragione di 20. per cento. Volendo noi sapere quanto fusse 22. inanzi alla perdita, aggiungi il quarto di 22. che è $5\frac{1}{2}$. al detto 22. farà $27\frac{1}{2}$. per la prima compra d'vna canna. Molte altre proposte potremo addurre, che per breuità le lasciamo, e mediante questi nostri documenti, l'operante potrà da se stesso più altamente considerare, & operare.

E dicendo vno ha comprò il moggio del grano vna quantità di lire, e l'ha riuenduto tanto, che ha guadagnato lir. 54. & i suoi denari hanno guadagnato a ragione di 30. per cento, si domanda quanto lo comprò, e quanto lo vendè. In questa ci conuiene inuestigare quanto fù il capitale, che deuè di guadagno lir. 54. e volendolo trouare diremo così. se lir. 30. di netto guadagno vogliono lir. 100. di capitale, che capitale vorranno lir. 54. moltiplica, e parti, trouarai che vorranno lir. 180. di capitale, e tante lire diremo che comprò il moggio del grano, e se alle lir. 180. aggiungeremo le lir. 54. che dice hauer guadagnato, faranno lir. 234. e tanto lo vendè.

Vno compra vna Mercantia vna quantità di scudi, e fa suo conto che se la riuende scudi 4. più che non gli costò, guadagna a ragione di 18. per cento, si domanda quanto la comprò. Opera come nella sopradetta, dicendo, se 18. di guadagno vien da 100. di capitale, da che capitale verrà 4. opera trouarai che verrà da capitale di scudi $22\frac{2}{3}$. e tanti scudi diremo che li costò la sopradetta mercantia.

Vno ha comprò vna mercantia vna quantità di ducati, e per bisogno l'ha riuenduta 4. ducati meno che non gli costò, e fa conto, che ha perso a ragione di 18. per cento, si domanda quanto li costò, e quanto la vendè. Noi habbiamo che li sopradetti 4. ducati è perdita manifesta, e similmente li 18. ducati è perdita manifesta di 100. perciò dirai così, se 18. duc. di perdita, vengono da 100. ducati di capitale, da che capitale verranno 4. ducati di perdita? opera, verranno da capitale di duc. $22\frac{2}{3}$. e tanto li costò la sopradetta mercantia, e se di duc. $22\frac{2}{3}$. ne trarrai duc. 4. restaranno duc. $18\frac{2}{3}$. e tanto la vendè. In altro modo ancor poteui dir così; se quando io ho perso 18. ducati, m'è restato duc. 82. (il che si troua cauando 18. di cento) quanto mi restarà quando io haurò perso duc. 4. opera ti restarà duc. $18\frac{2}{3}$. come nella sopradetta.

Vno compra il migliaio delle spille sol. 13. den. 4. e poi le riuende, e ne dà 5. meno al quattrino, si domanda quanto guadagna per cento. Troua prima a sol. 13. den. 4. il migliaio quante spille viene al quattrino, trouarai che ne viene 25. ma perche dice che le riuende, e ne dà 5. meno al quattrino, adunque ne darà 20. & vn migliaio di esse a 20. al quattrino varranno 50. quattrini, e lui le compra 30. quattrini, doue chiaramente si conosce che guadagna 10. quattrini, e volendo sapere quanto guadagna per cento, dirai così; se 40. mi dà di guadagno 10. quanto mi darà 100? opera, trouarai che ti darà di guadagno 25. per cento.

E dicendo, vno compra il migliaio delle spille vna quantità di soldi, e le riuende, e ne dà 20. al quattrino, e guadagna 25. per cento, si domanda quanto comprò il migliaio. Chiara cosa è, che se le vende, e ne dà 20. al quattrino, venderà il migliaio 50. quattrini, & in questi 50. quattrini v'è il guadagno di

15. per cento, perliche volendo trouare il capitale di detti 50. quattrini, aggi-
gi 25. a cento, farà 125. di poi dirai così; se 125. guadagno e capitale, vien da
100. puro capitale, da che capitale verrà 50. che è similmente guadagno, e ca-
pitale, n. moltiplica 50. via 100. & il prodotto parti per 125. ne verrà 40. appun-
to, e tanti quattrini diremo, che comprasse il migliaio delle spille.

Vno compra il cento della lana per denari contanti lir. 48. e le riuede per
tempo di mesi 8. lir. 54. domando quanto guadagnorno i suoi denari per cento
l'anno, fa così, caua lire 48. di lir. 54. resta lir. 6. e questo è il guadagno che fa
n. 8. mesi con lir. 48. perliche dirai così, se in 8. mesi si guadagna lir. 6. quanto
guadagnerà in 12. mesi? opera, si guadagnerà lir. 9. di poi dirai così, se lir. 48.
guadagnano lir. 9. (che è il guadagno, che fanno in vn'anno) quanto guadagna-
ranno lir. 100? moltiplica 100. via 9. & il prodotto parti per 48. trouarai che ne
errà lir. 18 $\frac{1}{2}$. e tanto guadagneranno i suoi denari per cento l'anno.

Vno ha conpro la balla della lana due. 30. per tempo di mesi 4 $\frac{1}{2}$. e l'ha ri-
uenduto per denari contanti due. 28. si domanda quanto vengono a perdere per
cento l'anno i suoi denari. Prima caua qualche la riuede di qualche la com-
pra, cioè caua due. 28. di due. 30. restano due. 2. e questo è qualche perde in mesi
4 $\frac{1}{2}$. Laonde dirai così, se in mesi 4 $\frac{1}{2}$. si perde due. 2. quanto si perderà in 12.
mesi? opera si perderà due. 5. fol. 6. den. 8. e questa sia la perdita di due. 30. in
n'anno; ma perche noi desideriamo sapere quanto si perderà per cento l'anno,
erciò dirai così; se due. 30. mi danno di perdita due. 5. fol. 6. den. 8. che perdita
mi daranno due. 100? moltiplica 100. via due. 5. fol. 6. den. 8. & il prodotto
parti per 30. trouarai, che ne verrà due. 17. fol. 15. den. 6 $\frac{1}{2}$. e tanto diremo che
inghino a perder per cento l'anno i suoi danari.

Vno ha venduto vn braccio di panno lir. 5 $\frac{1}{2}$. e troua che ha guadagnato a ra-
one di 4. per decina, si domanda se l'haueffe venduto lir. 9. quanto hauerebbe
guadagnato per decina? Prima bisogna trouare il suo capitale, cioè quanto li
costò il braccio, e perche dice che guadagna 4. per decina, adunque d'ogni 10.
ene a far 14. perciò dirai così, se lir. 14. fra guadagno, e capitale, vengono
lir. 10. di puro capitale, da che capitale verranno lir. 5 $\frac{1}{2}$? opera te ne verrà
3 $\frac{1}{2}$. e tanto li costò il braccio, ma perche noi vogliano sapere, se l'haueffe
venduto lir. 9. quanto guadagnerebbe per decina, caua adunque lir. 3 $\frac{1}{2}$. che
compra di lir. 9. che lo vuol riuendere, resta lir. 5 $\frac{1}{2}$. e questo guadagna-
bbe col capital d'un braccio; perciò dirai così, se lir. 3 $\frac{1}{2}$. n. i guadagnasse
lir. 5 $\frac{1}{2}$. quanto mi guadagnerebbe lir. 10. opera, te ne verrà lir. 12 $\frac{1}{2}$. e
n. lire guadagnerebbe per decina, se haueffe riuenduto lir. 9. il braccio.

E dicendo. lo comprai il cento del lino per tante lire, che se io l'haueffi pa-
tato lir. 4. piu ch'io non feci, e riuendutolo poi lir. 50. hauerei guadagnato a ra-
one di 20. per cento, si domanda quanto mi costò. Prima bisogna trouare
capitale di lir. 50. aggiungi 20. che hauerebbe guadagnato per cento a esso
10. farà 120. di poi dirai così, se 120. guadagno, e capitale era 100. prima che
guadagnasse, che douea esser 50? opera, farà 41 $\frac{1}{2}$. e questo è il capitale di lir.
50. Ma perche dice, che se l'haueffe pagato lir. 4. piu che non fece, e riundu-
lo poi lir. 50. allora hauerebbe guadagnato 20. per cento. Chiara cosa è adu-
nto, che lo pagò lir. 4. meno, e perciò caua lir. 4. di lir. 41 $\frac{1}{2}$, restano lir. 37 $\frac{1}{2}$. e
n. lire li costò il cento.

Vno ha conpro il cento de' cordouani per tanti scudi, che se l'haueffe pagati
udi 4. men che non fece, e riuenduti per scudi 18. hauerebbe guadagnato 20.

cento, domando quanto li costò. Questa farai come la sopradetta, trouando il capitale di scudi 18. dicendo così, se scudi 120. fra guadagno, e capitale, vengono da scudi 100. puro capitale, da che capitale verranno scudi 18. opera, trouarai, che il capitale di scudi 18. douerebbe essere scudi 15. non facendo altra mentione. Ma perche s'è detto, che se l'hauessè pagato scudi 4. meno che non fece, e riuendutolo poi scudi 18. allora hauerebbe guadagnato 20. per cento; adunque questo è segno manifesto, che lo pagò scudi 4. più, laonde, se tu aggiungi scudi 4. a scudi 15. faranno scudi 19. e tanto comprò il cento.

E dicendo, vno ha compro da vn Bottegaio vna canna di panno lir. 16. per tempo di mesi 3. e l'ha riuenduta per tempo di mesi 10. lir. 18. si domanda quanto hanno guadagnato per cento l'anno i suoi denari. Prima caua lir. 16. che compra la canna, di lir. 18. che la riuende, resta lir. 2. e questo guadagnarebbe il compratore in 10. mesi con lir. 16. se l'hauessè pagata a denari contanti; ma perche a lui gli è fatto tempo 3. mesi dal bottegaio, perciò non paga le lir. 16. se non in capo a 3. mesi, & allora egli comincia a far credenza a quel che la compra lir. 18. per la qual cosa si considera, che il pagamento di lir. 18. si deue fare dalla fine de' 3. mesi in capo a 7. mesi, adunque caua 3. mesi di 10. mesi, restano mesi 7. & in questi 7. mesi viene a guadagnare lir. 2. con lir. 16. che sborsò in capo di 3. mesi sopradetti. Laonde dirai così, se in 7. mesi si guadagna lir. 2. che si guadagnerà in 12. mesi? cioè in vn'anno, opera, si guadagnerà lir. $3\frac{1}{3}$. e poi dirai così, se lire 16. hanno guadagnato lir. $3\frac{1}{3}$. quanto guadagneranno lir. 100? multiplica, e parti, ne verrà lir. $21\frac{1}{3}$. e tanto guadagnorno per cento l'anno i suoi denari.

Vno ha compro vna mercantia per tanti scudi, che se l'hauessè pagata scudi 3. meno che non fece, e riuendutala poi scudi 36. hauerebbe guadagnato a ragione di 10. per cento, si domanda quanto la pagò. Troua hora il capitale di scudi 36. ma prima aggiungi 10. di guadagno a 100. di capitale farà 110. dipoi dirai così, se 110. prima che vi fusse il guadagno era 100. che douea esser 36? multiplica e parti, ne verrà $32\frac{1}{3}$. e tanto farebbe il capitale di scudi 36. se altro non dicesse, ma lui dice, che se l'hauessè pagata scudi 3. men che non fece, hauerebbe il detto guadagno riuendendola poi scudi 36. per il che ne segue, che la pagasse 3. scudi più, perciò aggiungi scudi 3. a scudi $32\frac{1}{3}$. fanno scudi $35\frac{1}{3}$. e tanto la detta mercantia.

$$\begin{array}{r}
 110. \qquad 100. \qquad 36 \\
 \hline
 3600. \\
 32\frac{1}{3} \\
 3. \\
 \hline
 \end{array}$$

La pagò Scudi $35\frac{1}{3}$.

Vno compra lo staio del grano per tanti soldi, che se lo pagasse soldi 4. più che non fa, e lo riuendesse poi sol. 60. perderebbe a ragione di 10. per cento, domando quanto lo compra. Fa come nella sopradetta, troua il capitale di sol. 60. ma con altro modo, perche chi perde 10. per cento, di 100. viene a far 90. e perciò dirai, se 90. inanzi che si perdesse era 100. che douea esser 60? multiplica, e parti ne viene $66\frac{2}{3}$. e tanti soldi conueniua che lo pagasse, acciò che riuendendolo

uendendolo poi sol. 60. perdesse 10. per cento. Ma soggiunge questo, che se l'haueffe pagato sol. 4. piu che non fece, e riuenduto poi sol. 60. allora hauerebbe fatto la detta perdita; adunque lo venne a pagare sol. 4. meno, per tanto caua sol. 4. di sol. 66 $\frac{2}{3}$. restano sol. 62 $\frac{2}{3}$. e tanto lo compra lo staio.

$$\begin{array}{r}
 90. \qquad 100. \qquad 60. \\
 \hline
 6000. \\
 66\frac{2}{3} \\
 4. \\
 \hline
 \end{array}$$

Compra lo staio sol. 62 $\frac{2}{3}$.

Vno compra il barile del vino per tante lire, che se lo pagasse lir. 2. men che non fa, e lo riuendesse poi lir. 8. perderebbe a ragione di 20. per cento, domando quanto li costa. Fa come nella sopradetta, troua il capitale di lir. 8. dicendo cosi, se 80. prima che si perdesse era 100. che era 8? multiplica 8. via 100. fa 800. e questo parti per 80. ne viene 10. e tante lire farebbe il capitale, acciò che riuendendolo lir. 8. si perdesse 20. per cento; ma esso dice, che se l'haueffe pagato lire 2. meno che non fece, allora faceua tal perdita, adunque è segno manifesto che lo pagò lir. 2. piu, e perciò aggiungi lir. 2. a lir. 10. fanno lir. 12. e tante lire comprò il barile.

$$\begin{array}{r}
 80. \qquad 100. \qquad 8. \\
 \hline
 800. \\
 10. \\
 2. \\
 \hline
 \end{array}$$

Comprò il barile lir. 12.

Vno vende vna mercantia 8. scudi, e troua che guadagna a ragione di 10. per cento, domando vendendola scudi 10. quanto guadagnarebbe per 100. Molti a soluer questa, direbbono cosi; se 8. mi dà 10. di guadagno per cento, che mi darà 10? Laonde ne verrebbe a modo loro lir. 12 $\frac{1}{2}$. e tanto direbbono che si guadagnasse per cento; ma non è cosi; Perciò che doue si propon guadagno, o perdita, bisogna prima trouare i capitali, e quelli trouati accomodarli secondo la domanda. Hora in questa nostra proposta, troua prima il capitale di scudi 8. dentro ai quali c'è incorporato il guadagno che si fa a ragione di 10. per cento, e per trouar detto capitale dirai cosi, se scudi 110. fra guadagno, e capitale vengono da capitale di 100. scudi, da che capitale verranno scudi 8. multiplica 8. via 100. & il prodotto parti per 110. ne verrà 7 $\frac{2}{11}$. e tanto costa a lui la detta mercantia, ma nuouamente si domanda se la vendesse scudi 10. quanto guadagnarebbe per cento, per il che si conosce che di scudi 7 $\frac{2}{11}$. che gli costa detta mercantia, ne vorrebbe fare scudi 10. che farebbe egli adunque di scudi 100. multiplica 100. via 10. & il prodotto parti per 7 $\frac{2}{11}$. te ne verrà 137 $\frac{1}{11}$. fra guadagno, e capitale, del quale cauaue 100. che è il capitale resta 37 $\frac{1}{11}$. e tanto si direbbe, che si guadagnasse per cento.

Soluila

$$\begin{array}{r}
 110 \quad 100 \quad 8 \quad 7\frac{1}{4} \quad 10 \quad 100 \\
 800 \quad 1000 \\
 7\frac{1}{4} \quad 11000 \\
 80) \quad 137\frac{1}{2} \\
 100
 \end{array}$$

Si guadagnarebbe $37\frac{1}{2}$. per cento.

Solui la per quest'altro modo, che è breue, e bello senz'hauer a trouare i capitali, aggiungi sempre il guadagno, che dice voler fare per cento, a esso 100. e la somma parti per quel che dice che vende tal mercantia, aggiungi adunque 10. a 100. fa 110. e questo parti per 8. che vende tal mercantia ne vien $13\frac{1}{4}$. e questo multiplica sempre via quel che dice voler ritouare, cioè via il prezzo, che vuol commutare, che in questa è scudi 10. farà $137\frac{1}{2}$. fra capitale, e guadagno, e di questo cauane 100. di capitale, resta $37\frac{1}{2}$. di guadagno per cento.

$$\begin{array}{r}
 100 \quad 137\frac{1}{2} \\
 10 \quad 100 \\
 8) \quad 110 \quad 10 \\
 13\frac{1}{4} \quad \text{guadagna } 37\frac{1}{2} \text{ per cento.}
 \end{array}$$

La sopradetta regola, non solamente serue a ritrouare quanto si guadagna per cento, ma anco la puoi applicare a tanto per decina, o ventina, come a te piace, si come se dicessi così. Vendendo per 5. si guadagna $1\frac{1}{2}$. per decina, domando vendendo per 7. quanto si dice guadagnarebbe per decina? farai come nella sopradetta, aggiungi quel che dice che guadagna per decina a essa decina, farà $11\frac{1}{2}$. e questo parti per il prezzo che vede, cioè per 5. ne viene $2\frac{1}{4}$. e questo multiplica via il prezzo, che vuol mutare, che è 7. ti farà $16\frac{1}{2}$. fra capitale, e guadagno, del quale cauane 10. di capitale, resta $6\frac{1}{2}$. di netto guadagno per decina.

E se tu vuoi sapere d'onde tal regola procede, sappi che è fondata su l'vnità, e per dimostrarla diremo così; poniamo caso, che il 5. sopranominato habbi di capitale l'vnità, cioè 1. che capitale adunque douerà hauere $11\frac{1}{2}$. fra capitale, e guadagno (come di sopra s'è posto) alla medesima ragione? multiplica $11\frac{1}{2}$. via 1. e parli per 5. ne viene $2\frac{1}{4}$. e questo conuerrebbe che fusse il capitale d' $11\frac{1}{2}$. Hora con questa proportionione, vedi (mutando prezzo) quanto doueria tornare 7. il che trouarai dicendo così, se d' 1. io fo $2\frac{1}{4}$. che farò di 7? multiplica 7. via $2\frac{1}{4}$. fa $16\frac{1}{2}$. che partito per l'vnità, ne viene il medesimo $16\frac{1}{2}$. fra capitale, e guadagno, cauane 10. di capitale, resta $6\frac{1}{2}$. per il guadagno della decina, & ancora quella del cento è fondata su l'vnità, fanno proua, e lo vedrai.

Vendendo per 6. si perde 20. per cento, domando vendendo per 4. quanto si perderà? Prima troua qual sia il capitale di 6. perdendosi a ragione di 20. per cento, dicendo così, se 80. inanzi che si perdesse era 100. che doueu esser 6? multiplica, e partite ne verrà $7\frac{1}{2}$. e questo farà il capitale di 6. Hora tu vedi, che quel che costa lir. $7\frac{1}{2}$. si presuppone di darlo per 4. perciò dirai così, se $7\frac{1}{2}$. mi tornasse 4. che mi tornerebbe 100? n. multiplica, e parti, te ne verrà $5\frac{1}{2}$. & il suo capitale

cra

era 100. che da $53\frac{1}{2}$. fino in 100. si viene a perdere, cauau dunque $53\frac{1}{2}$. di 100. resta $46\frac{1}{2}$. e tanto si perderebbe per cento.

Vno compra vna quantità di libbre di lana, e paga il ceto tante lire, che se lo pagasse lir. 3. più che non fa, e ne riuendesse poi lib. 130. per lir. 64. guadagnerebbe a ragione di 10. per cento, si domanda quanto pagò il cento. Prima bisogna trovare quanto gli costano libb. 130. cioè il capitale di lir. 64. dicèdo così; se 110. fra capitale, e guadagno, viene da 100. capitale, da che capitale verrà 64? moltiplica, e parti, ne verrà $58\frac{1}{2}$. e tãto li costorno le 130. libb. hora per trovare quanto li costorno libb. 100? moltiplica, e parti, costaranno lir. 44. fol. 15. den. 1. $\frac{1}{2}$. ma lui dice, che se l'hauesse pagato lir. 3. più che nõ fece hauerebbe fatto il detto guadagno di 10. per cento, adunque lo pagò lir. 3. meno, perciò cauane lir. 3. restano lir. 41. fol. 15. den. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$. e tanto li costò il cento.

110	100	64	Libb. 130.	Lir. $58\frac{1}{2}$.	Libb. 100.
	6400				
	$58\frac{1}{2}$.			5818	3
				44	15
				men	3
			Li costò il cento	Lir. 41.	15.
					$1\frac{1}{2}$.

Vno compra il braccio del panno vna quantità di lire, e lo riuende $\frac{1}{2}$. di lira più che non gli costa, e guadagna a ragione di 10. per cento, domando quanto lo cõpra; Chiara cosa è, che quel più, che lo riuende di quel che gli costa, viene a essere guadagno, e chi guadagna 10. per cento, altro non fa, se non che quel che compra 100. lo riuende più 10. e questo 10. è similmente guadagno assoluto di 100. Onde dirai così, se 10. di guadagno vien da 100. di capitale, da che capitale verrà $\frac{1}{2}$. che è pur guadagno; opera moltiplicando $\frac{1}{2}$. via 100. fa $33\frac{1}{2}$. e questo parti per 10. ne viene $3\frac{1}{2}$. e tanto gli costò, e perche dice che lo riuende $\frac{1}{2}$. di lira più che non gli costò, adunque lo riuende lir. $3\frac{1}{2}$. E volendone far proua dirai così, se di lir. $3\frac{1}{2}$. che mi costa il braccio del panno, ne fò lire $3\frac{1}{2}$. che douerò far di 100? moltiplica, e parti, te ne verrà 110. fra guadagno, e capitale, per la qual cosa tu vedi, che ritorna il guadagno di 10. per cento.

S'io vendessi la libbra del zafferano $\frac{1}{2}$. di scudo, men che non mi costò, io perderei a ragione d'8. per cento, domando quanto mi costò. Fa come nella precedente, dicendo, se 8. di perdita vien da 100. di capitale, da che capitale verrà $\frac{1}{2}$. di perdita? opera verrà da $4\frac{1}{2}$. e tanto gli costò, & egli la riuende $\frac{1}{2}$. meno cioè $3\frac{1}{2}$. appunto. Fanne proua, dicèdo, se di $4\frac{1}{2}$. che mi costa, io perdo $\frac{1}{2}$. che perderò di 100. moltiplica, e parti, te ne verrà la perdita d'8. per cento.

Vno ha compro vna quantità di spille per 90. quattrini, dipoi n'ha riuendute la quinta parte, e 60. spille più per 21. quattrini, e troua che non guadagna, nè perde, domando quante ne comprò. Fa così, tu vedi che ha speso 90. quattrini, hor poni che habbia compro 90. spille, le quali gli verrebbero a questo conto) vn quattrino l'vna; piglia $\frac{1}{5}$. di 90. spille, che è 18. & a questo aggiungi 60. più fa 78. e queste dice, che le riuende 21. quattrini, e perche le 18. spille a vn quattrin l'vna (come ponemmo) gli costerebbono 18. quattrini, di qui è, che le 60. spille li vengono vendute 3. quattrini, delle quali ne vié 20. al quattrino, adunque con 90. quattrini ne comprerà 1800. e tante ne cõprò. Fanne proua, piglia il $\frac{1}{5}$. di 1800. che è 360. & a questo aggiungi 60. fa 420. e queste si vendono 21. quattrini,

ni, perliche dirai cési, se 420. spille costano 21. quattrini, che costaranno 1800. opera, trouarai, che costaranno 50. quattrini; come voleuamo.


Vno compra vna pezza di panno, che è lunga bracc. 60. e gli costa scudi 44 $\frac{1}{2}$. d'oro di lire 7. sol. 10. per scudo, domando quante lire riuenderà il braccio, a voler guadagnare 20. per cento. Prima bisogna trovare quanto riuende tutta la pezza col g: adagno di 20. per cento; E dirai così, se di 100. io ne fò 120. che farò di 44 $\frac{1}{2}$. opera, farà scudi 53. sol. 2. e tanti scudi riuenderà tutta la pezza, col guadagno di 20. per cento, fra perche domàda quante lire riuenderà il braccio, perciò fa bisogno ridurre li scudi 53. sol. 2. d'oro, a lire, i quali sono lir. 398. sol. 5. e queste parti per la lunghezza della pezza del panno, che è bracc. 60. ne viene lir. 6. sol. 12. den. 9. e tante lire due riuenderà il braccio, e guadagnerà 20. per cento.

Vno ha compro vna mercantia scudi 16 $\frac{1}{2}$. e l'ha riuenduta tanto, che ha guadagnato scudi 2 $\frac{1}{2}$. si domanda quanto guadagnorno per cento i suoi denari. Dirai così, se scudi 16 $\frac{1}{2}$. guadagnano scudi 2 $\frac{1}{2}$. quanto guadagneranno scudi 100. multiplica 100. via 2 $\frac{1}{2}$. & il prodotto parti per 16 $\frac{1}{2}$. ne verrà scudi 13 $\frac{7}{11}$. e tanto guadagnano per cento i suoi denari.

Vno compra il cento della lana fucida, ouero brutta lir. 44 $\frac{1}{2}$. dipoi la fa lauare, e rasciugare, e cala libbre 19. si domanda quanto li viene a costare il cento della lana lauata, e netta. Perche dice che gli cala libb. 19. caua adunque 19. di cento; resta 81. e così dirai, se libb. 81. di lana lauata, e netta mi costano lir. 44. sol. 10. che mi costaranno libb. 100. multiplica 100. via 44 $\frac{1}{2}$. & il prodotto parti per 81. ne viene lir. 54. sol. 18. den. 9 $\frac{3}{4}$. e tante lire li viene a costare il cento della lana lauata, netta, e rasciutta.

Vno ha compro in Fiorenza bracc. 12. di rascia, e la porta in Siena, e troua che gli cala alla misura Sanese tra il quarto, & il quinto, domando quante braccia gli tornò in Siena. Prima bisogna trovare la metà, che è tra $\frac{1}{4}$. & $\frac{1}{5}$. somma, adunque questi due rotti insieme, fanno $\frac{9}{20}$. e di questo piglia la metà, che è $\frac{9}{40}$. e questa sarà la metà che si troua fra vna parte, e l'altra, e perciò diciamo, che gli viene a calare $\frac{9}{40}$. di tutta quella quantità, perliche piglia $\frac{9}{40}$. di 12. ne viene $\frac{27}{10}$. che tratto di 12. resta 9 $\frac{3}{10}$. e tante braccia gli tornò in Siena a quella misura.

Se il terzo di 3. manco $\frac{1}{7}$. valesse il quarto di 4. manco $\frac{1}{4}$. che varrebbe il quinto di 5. manco $\frac{1}{5}$. Tu vedi, che il terzo di 3. manco $\frac{1}{7}$. sono $\frac{2}{7}$. & il quarto di 4. manco $\frac{1}{4}$. sono $\frac{3}{4}$. & il quinto di 5. manco $\frac{1}{5}$. sono $\frac{4}{5}$. e però dirai così per regola del 3: se $\frac{2}{7}$. valesino $\frac{3}{4}$. che varrebbero $\frac{4}{5}$. multiplica i denominatori, e i denominatori secondo che vedi le dimostrazioni, e partirai secondo che conueni, e trouarai che varranno $\frac{15}{7}$.

 $\frac{2}{7}$ $\times$ 

Partitori.

Vno compra lana, e cera per duc. 124. e la lana la paga duc. 7. il cento, e la cera duc. 14. il cento, e vuole la metà più lana, che cera, domando quante libbre comprerà di ciascuna sorte. Chiara cosa è, che volendo la metà più lana che cera, hauerà libbre 150. di lana, quando libb. 100. di cera, e le libb. 150. di lana

Lana, tu vedi che vagliono $\text{duc. } 10\frac{1}{2}$. di manierache quando spenderà $\text{duc. } 10\frac{1}{2}$. in lana, bisognerà che spenda $\text{duc. } 14$. in cera, cioè il terzo più, per il che ti conuiene far di 124 . due parti, che vna sia il terzo più dell'altra. Ma soluila in vna volta sola, in questo modo cioè, somma insieme $\text{duc. } 10\frac{1}{2}$. con $\text{duc. } 14$. fanno $\text{duc. } 24\frac{1}{2}$. di poi dirai così, se con $\text{duc. } 24\frac{1}{2}$. si compra libb. 100 . di cera, quando libb. 150 . di lana, con li $\text{duc. } 124$. quanta cera, e lana si douerà comprare, multipl. ca 124 . via 100 . & il prodotto parti per $24\frac{1}{2}$. ne verrà $506\frac{1}{2}$. e tante libb. di cera si comprerà, ma perche dice che vuole la metà più lana, perciò piglia la metà di $506\frac{1}{2}$. qual'è $253\frac{1}{4}$. che aggiūta al detto $506\frac{1}{2}$. farāno $759\frac{1}{4}$. e tante libbre di lana douerà comprare. Fanne proua, valuta la lana, e la cera separatamente, trouarai che la cera varrà il terzo più della lana, adunque diremo, che spenderà $\text{duc. } 53\frac{1}{2}$. in lana, e $\text{duc. } 70\frac{1}{2}$. in cera.

Vno ha compro non so quante braccia di panno, in questo modo, cioè, che le 5 . brac. le pagò 7 . duc. e riuendè 7 . brac. per 11 . duc. e ne comprò, e riuendè tante braccia, che guadagnò $\text{duc. } 100$. domando quante braccia ne comprò, e vendè. Fà così, vedi prima quanto guadagna sopra 7 . bracc. dicendo, le brac. 5 . gli costano $\text{duc. } 7$. le 7 . braccia quanto gli costaranno? opera, trouarai che gli costaranno $\text{duc. } 9\frac{1}{2}$. e lui le riuendè $\text{duc. } 11$. laonde tu vedi che guadagna $\text{duc. } 1\frac{1}{2}$. di poi dirai così, se $\text{duc. } 1\frac{1}{2}$. vien guadagnato dalla vendita di 7 . bracc. di panno, da quante braccia verranno guadagnati 100 . ducati? opera, trouarai venir guadagnati da brac. $583\frac{1}{2}$. di panno; e tante braccia ne comprò, e vendè.

Vno ha compro brac. $4\frac{1}{2}$. di panno, alto brao. $1\frac{1}{2}$. e lo vorrebbe foderare di rovescio, che è alto brac. $1\frac{1}{2}$. si domanda quante braccia gliene bisognerà; fà così, multiplica brac. $4\frac{1}{2}$. via quanto è alto il panno, cioè via $1\frac{1}{2}$. & il prodotto parti per quanto è largo il rovescio, cioè per $1\frac{1}{2}$. ne verrà bracc. 3 . apunto, e tante braccia di rovescio gli bisognerà.

Vno ha compro vna pezza di velluto per $\text{duc. } 160$. e n'ha riuenduto il quarto, & 8 . brac. più per $\text{duc. } 60$. e non guadagna nè perde, si domanda quante braccia era lunga. Fà così, poni che fusse lunga brac. 160 . adunque gli costarebbe vn ducato il braccio, ma perche dice che ne vendè il quarto, piglia il $\frac{1}{4}$. di 160 . che è 40 . & 8 . bracc. più fanno brac. 48 . quali le riuendè per $\text{duc. } 60$. ma hauendo noi posto che gli costi vn ducato il braccio, chiara cosa farà, che il quarto di tutta la pezza, cioè le braccia 40 . gli costino $\text{duc. } 40$. ma riuendendone poi brac. 48 . per $\text{duc. } 60$. ne segue, che le brac. 8 . vaglino $\text{duc. } 20$. per il che dirai così, se $\text{duc. } 20$. son la valuta di brac. 8 . di velluto, di quante bracc. farāno la valuta $\text{duc. } 160$. multiplica 160 . via 8 . fà 1280 . e questo parti per 20 . ne viene 64 . e tante braccia diremo, che fusse lunga la pezza. Fanne proua, prendi il $\frac{1}{4}$. di 64 . che è 16 . & 8 . più fà 24 . e tante braccia ne vende per $\text{duc. } 60$. e non guadagna, nè perde, per il che dirai così, se brac. 24 . vagliono $\text{duc. } 60$. quanto varranno brac. 64 ? multiplica, e parti, trouarai che varranno $\text{duc. } 160$. come c'è.

È dicendo brac. $9\frac{1}{2}$. di rascia alla misura di Siena, quante braccia mi ritorneranno in Fiorenza, calando da Fiorenza a Siena, tra il quarto, & il quinto? Poniamo caso, che vno si troui in Fiorenza, e voglia portare vn braccio di rascia a Siena, calando tra il quarto, & il quinto, come s'è detto, cala $\frac{1}{4}$. di $9\frac{1}{2}$. che gli tornerà in Siena $\frac{1}{4}$. & perciò dirai così, se $\frac{1}{4}$. di vn braccio alla misura di Siena tornano in Fiorenza brac. 1 . quante torneranno brac. $9\frac{1}{2}$. multiplica $9\frac{1}{2}$. via 1 . e parti per $\frac{1}{4}$. ne vien 12 . e così haucremo, che le dette brac. $9\frac{1}{2}$. alla misura Saneſe torneranno brac. 12 . alla misura Fiorentina. Vno

¶ Vn' ha compro braccia 8. di panno, il qual'è largo brac. $2\frac{1}{2}$. per lir. 60. si domanda, comprandone brac. 15. d'vn'altra sorte, che è largo brac. $2\frac{1}{4}$. quanto costerà alla medesima ragione. Prima, bisogna trouare quante braccia quadre sono della prima sorte, che le trouarai multiplicando 8. (che è la sua larghezza) via $2\frac{1}{2}$. ch'è la larghezza, fanno 17. e questo salua. Dipoi troua quante braccia quadre sono della seconda sorte, multiplica 15. via $2\frac{1}{4}$. fanno 39. Fatto questo dirai così, se 17. braccia quadre della prima sorte, costano lin. 60. quanto costeranno brac. 39. quadre della seconda sorte? multiplica 39. via 60. & il prodotto partilo per 17. ne viene lir. 137. sol. 12. den. $11\frac{1}{2}$. & tanto costerà il panno della seconda sorte, alla medesima ragione del primo.

Hauendo sin qui dimostrato il modo, e l'ordine, che si deue tenere nel traffico mercantile, per voler trouare le valute delle cose, & ancora a saper conoscere i guadagni, e perdite: e mediante i guadagni, e perdite a saper ritrouare ancora i capitali, con tutte quelle dichiarazioni, che a noi è stato possibile produrre, e che ci son parse a proposito. Resta hora che dimostriamo come si costuma nel proporre, e nel soluere le ragioni, nelle quali molte cose si ricerca massimamente nel commutar pesi, misure, e monete di diuersi luoghi; e saperle ridurre a pesi, misure, e valute, che l'huomo vuole. Son queste ragioni le più lunghe, che in pratica si possin dare; rispetto a i molti casi, che in diuersi viaggi possono occorrere: le quali volendo condurre a fine, e saper se si guadagna, o perde, e quanto per cento, ouero se si stà in capitale &c. fa bisogno che l'operante stia molto in ceruello. Ma innanzi che da noi si proponga alcune ragioni di viaggi, non ci par fuor di proposito dimostrar prima la diuersità de pesi, misure, e monete, che s'usa in due, o tre luoghi, accioche mediante la cognitione di esse, fondando noi le nostre ragioni sopra i viaggi di detti luoghi, si possino applicare a tutte l'altre, che potessero occorrere; e si ancora per non hauer ogni volta a esser tediosi, o apportar confusione nel dichiarare le commutationi di pesi, misure, e valute di monete, che nelle ragioni de viaggi siamo per proporre, e questa nostra instructione seruirà ancora a parte per tariffa; dinnamierache col documento di due, o tre proposizioni, che da noi sieno dimostrate, potrà ciascuno da sè stesso applicarle ad ogn'altra; percioche tutte vanno solute col medesim' ordine.

Valutationi di Venetia.

IL ducato di Venetia corrente vale lire 6. sol. 4., e la lira vale soldi 20. & il soldo vale 12. denari.

Il sopradetto ducato vale 24. grossi, & il grosso vale soldi 5. denari 2. & il medesimo grosso vale 32. piccioli.

E dicendo duc. 212. e grossi 22. di Venetia, quante lire sono? Prima multiplica ducati 212. via lire $6\frac{1}{2}$. fanno lire 1314. sol. 8. dipoi multiplica 22. grossi via sol. 5. den. 2. fanno lire 5. sol. 13. den. 8. le quali aggiungerai a lire 1314. sol. 8. fanno in tutto lire 1320. soldi 1. den. 8. e tante lire saranno i sopradetti ducati, e grossi.

Potrai ancora li sopradetti grossi recare a parte di ducato, che sono $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. e poi multiplicare ducati 212 $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. via lire $6\frac{1}{2}$. per via di rotte; riducendoli adunque a totti, haurai a multiplicare $\frac{2}{1}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. che osservando i modi dati

dati nel multiplicar de' rotti trouerai che farà lire 1320 $\frac{1}{2}$ il qual dodicesimo ridotto a soldi, e denari, farà soldi 1. denari 8. come nell'operatione di sopra.

E dicendo, lire 1320. sol. 1. den. 8. quanti ducati, e grossi di Venetia sono a lire 6. sol. 4. il ducato prima reca soldi 1. den. 8. a parte di lira, sono $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$. dipoi reca sol. 4. a parte di lira, sono $\frac{1}{2}$. fatto questo partirai lire 1320 $\frac{1}{2}$ per 6 $\frac{1}{2}$. come nel partir de' rotti habbiamo dimostrato, te ne verrà ducati 212. & auanzerà 341. il qual auanzo multiplica via 24., & prodotto parti per il medesimo partitore te ne verrà 22. grossi appunto, e non auanzerà cosa alcuna, ma se auanzasse qualche cosa, il detto auanzo l'haueresti a multiplicare via 32. & il prodotto partire per il medesimo partitore, e quel che te ne venisse, farebbono piccioli, il qual auanzo non si tenerebbe conto. Per altro modo ancora si poteua peruenire alla medesima solutione, ma per esser più tediosa, la sciammo il dartenne dimostrazione, dicendo appresso, che chiunque sà maneggiare sicuramente i rotti, cauerà sempre le mani di qualsiuoglia trauagliato intrico.

Ma quando fusse vna quantità di lire, senza accompagnatura di soldi, e denari, e tu ne volessi far ducati, farai così, e sia per esempio che volessimo sapere lire 1864. quanti ducati sono. Perche dopo i ducati si parla a grossi, a piccioli, perciò quel che auanza al partir delle lire, si multiplica via 24., & il prodotto si parte per il medesimo partitore, e quel che ne viene, son grossi, e l'auanzo si multiplica 32., & il prodotto si parte per il medesimo partitore, e quel che ne viene, son piccioli, e dell'ultimo auanzo (come di sopra s'è detto) non si tien conto. Parti adunque lire 1864. per 6 $\frac{1}{2}$. recando a quanti le parti ne verrà ducati 300. grossi 15. pic. 15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

E volendo di soldi far ducati, a soldi 124. per ducato, parti quella quantità di soldi, che vuoi ridurre a ducati per 124., e quel che te ne verrà, saranno ducati, e l'auanzo multiplica via 24. & il prodotto parti per 124. e te ne verrà grossi, e l'auanzo multiplica via 32. & il prodotto parti per 124. ne verrà piccioli, come se ti fusse detto così, soldi 7840. quanti ducati, grossi, e piccioli sono? parti 7840. per 124. nel modo che s'è detto, ne verrà ducati 63. grossi 5. e pic. 15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. e se quell'auanzo, che tu multiplichì via 24. e lo porti per 124. tu lo multiplicassi via 6. e lo partissi per 31. te ne verrebbe i medesimi grossi, e l'auanzo poi, se lo multiplicassi via 32. e partissi per 31. te ne verrebbe i medesimi piccioli; e questo si può fare per hauer minori numeri alle mani, per venir più presto alla fine dell'operatione.

Sappi che vna lira di grossi di Venetia vale duc. 10. & vn soldo di tal lira vale 12. grossi, & ogni grosso habbiamo detto che vale soldi 5. pic. 2. correnti, perche ne fegue, che vn soldo di grossi vaglia soldi 62. correnti, adunque sol. 20. cioè vna lira di grossi varrà lire 62. correnti, e perche ogni lire 6. sol. 4. fanno vn ducato, perciò se partirai lire 62. per 6 $\frac{1}{2}$. ne verrà 10. ducati appunto, che tanto vale vna lira di grossi.

E se di scudi d'oro Italiani ne volessimo far ducati di camera, per esempio si dicesse scudi 2300. d'oro quanti ducati di Camera sono, valendo il ducato di Camera lire 7. sol. 13. pic. 9. cioè ogni 100. ducati di Camera sono scudi 102 $\frac{1}{2}$. d'oro, ouer ogni 40. ducati sono sc. 41. fa così, parti sc. 2300. d'oro per 41. ne viene 56 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$. e questo lo trarrai di sc. 2300. resterà duc. 2243 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$. di Camera.

E se di ducati di Camera ne vorremo fare sc. d'oro di lir. 7 $\frac{1}{2}$. per scudo come se dicesse, duc. 2243 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$. di Camera quanti scudi d'oro sono. Fa così parti duc. 2243 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$. per 40. ne viene 56 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$. e questo aggiungi con i detti ducati, saranno in tutto sc. 2300. d'oro.

Valutationi di Palermo.

IN Palermo, e per tutta Sicilia si tengono le scritture a onces, tari, grani, e piccioli.

Vn' oncia vale 30. tari di Sicilia, cioè scudi $2\frac{1}{2}$. d'oro, che sono lire 18. fol. 15. di nostra moneta Fiorentina.

Vn tari val 20. grani, & il grano vale den. $7\frac{1}{2}$. di nostra moneta Fiorentina, ma di quella moneta vn grano val 6. piccioli.

Vn tari val 2. carlini, & il carlino vale fol. 6. den. 3. di nostra moneta.

Vn ducato val 13. tari, e lo scudo d'oro di Sicilia vale 12. tari, e lo scudo di moneta vale solamente 10. tari, & vn tari vale fol. $12\frac{1}{2}$. di nostra moneta.

La salma di Palermo è tomoli 16. torna in Pisa staia $11\frac{1}{4}$.

Il cantaro è ruotoli 100. di libra $2\frac{1}{2}$. per ruotolo.

La Canna è 8. palmi, de' quali ne v'è 2. al braccio.

Si batte l'infrastrate monete cioè

Vn picciolo.

Tre piccioli che sono vn mezzo grano.

Sei piccioli che sono vn grano.

Il Carlino, che son dieci grani, ouer mezzo tari.

Il tari che è 20. grani.

Volendo sapere onces 360. tari 24. e grani 16. quanti scudi d'oro sono, noi habbiamo detto di sopra che l'oncia vale scudi $2\frac{1}{2}$. d'oro, perciò moltiplica 360. via $2\frac{1}{2}$. fa scudi 900. d'oro, dipoi habbiamo detto, che il tari val fol. $12\frac{1}{2}$. perciò moltiplica $12\frac{1}{2}$. via tari 24. fanno fol. 300. che sono lire 15. cioè scudi 2. d'oro, aggiungili a 900. fanno 902. dipoi habbiamo detto che vn grano vale denari $7\frac{1}{2}$. e perciò bisogna moltiplicare $7\frac{1}{2}$. via 16. grani; fanno den. 120. che sono fol. 10. di piccioli, e così diremo, che le sopradette onces, tari e grani; faranno di moneta Fiorentina scudi 902. d'oro, e fol. 16. di piccioli, cioè soldi correnti, e che vagliono tre quattrini l'vno.

Vno ha comprato in Sicilia nella città di Palermo salme 800. di grano, tutto per prezzo di onces 860. di quella moneta, dipoi spende in gabella per ogni 40. tomola 4. tari; & a facchini per farlo portare alla naue spende 8. grani per salma, e per bolletta, e fede onces $3\frac{1}{2}$. in tutto, e per le spese fra esso, & il garzone per due mesi onces 8. e per nolo, e passaggio al padroa del nauilio fino a Liorno in tutto onces 45. e per gabella all'entrata del porto lir. 1. fol. 10. per salma di nostra moneta Fiorentina, e per farlo scaricare, e portare al magazzino den. 6. per sacco di nostra moneta, e per la pigione di detto magazzino lire 80. dipoi fa suo conto, e troua che ogni 16. tomola di Sicilia gli tornano in Liorno staia $11\frac{1}{4}$. si domanda quanto douerà riuendere lo staio del grano in Liorno di nostra moneta Fiorentina a misura di Liorno, acciò che i suoi denari guadagnino a ragione di 20. per cento. Volendo tu soluere questa proposta, & altre simili, primi hai da trouare, e cauar fuori al netto tutte le spese, che in detta mercanzia, e viaggio si son fatte, e metterle ordinatamente l'vna sotto l'altra per non generar confusione, e dipoi sommarle, e dipoi

e dipoi ridurre tutte le spese alla natura, e prezzo di quella moneta, che vuoi riuerder tal mercanzia; e così la mercanzia la ridurrà al peso, o misura di quel luogo, doue intendi rifinirla. Vediamo adunque quanto ti spende in 800. salme di grano con tutte le spese, noi habbiamo che di prima compra, spende onçe 860. dipoi spende in gabella 4. tari per ogni 40. to. nola, la qual spesa vien a essere onçe 42. e tari 20. queste poni sotto a onçe 860. poi guarda quanto spende a farlo condurre alla naue, che è 8. grani per salma; ma spenderà onçe 10. e tari 20. e queste poni sotto all'altre onçe; dipoi poni sotto onçe $3\frac{1}{2}$. che spende nella bolletta, e fede, dipoi metti sotto onçe 8. che spende nel vitto per se, & il garzone; dipoi metti sotto onçe 46. che spende di nolo al padron del nauilio; e qui fa fine, perche non spende più moneta di Sicilia; ma spende moneta Fiorentina; Hora metti da parte tutte le spese, che fa di nostra moneta l'vna sotto l'altra, e perche dice, spende in gabella all'entrata del porto lire 1. sol. 10. per salma? viene a spendere in tutto lire 2200. dipoi spende den. 6. per sacco; nelle quali spenderà lire 75. e queste poni sotto alle lire 2200. dipoi metti sotto lire 80. che spende per la pigione del magazzino, e perche fin qui non ha fatto altre spese, sommerai l'onçe, e tarsi paratamente dalle lire, e le ire parimente le sommerai separate dall'onçe, e se altre dinrenti monete vi ussero corse in dette spese, bisognerebbe ancor quelle sommar da se, e poi ridurre tutte a vna sol moneta, hora noi habbiamo che il sopradetto grano costa con tutte le spese condotto in Liorno onçe 970., e tari 25. e lire 1255. per che le sopradette onçe 970. e tari 25. le ridurrà a lire, cioè a moneta Fiorentina; le quali sono lire 18202. sol. 2. den. 6. alle quali aggiuntoui lire 1255. inno in tutto lire 19558. sol. 2. den. 6. tra la prima compra, e le spese; hora ifogna vedere quanto staia torneranno in Liorno le dette 800. salme; e perche poco innanzi noi habbiamo detto che la salma generale di Palermo torna a Pisa staia $11\frac{1}{4}$. & essendo che Pisa, e Liorno hanno vna medesima misura, erciò noi haueremo, che torneranno staia 9000., le quali costano condotte a Liorno con tutte le spese, come di sopra habbiamo detto lire 19558. sol. 2. den. 6. per il che troua quanto li costa lo staio, partendo lire 19558. sol. 2. den. 6. per 9000. ne viene lire 2. sol. 2. den. 5. ma perche quanza tanto che farebbe in di mezzo denaro; perciò diremo denari 6. in cambio di denari 5. e tanto li osta lo staio condotto in Liorno, ma lui dice, che lo vuol riuerder tanto, he guadagni a ragione di 20. per cento, perciò dirai così; se di 100. io uoglio a 120. che farò di lire 21. sol. 3. den. 6. multiplica, e parti, te ne verrà lire 2. sol. 2. den. 2. e tanto douerà riuerder lo staio in Liorno, a misura, e moneta nostra, a voler che i suoi denari guadagnino a ragione di 20. per cento,

lire 22. che spende di moneta Bolognese, ma prima le ridurrai a lire Fiorentine, dicendo così, se lire 11. Bolognese sono lire 20. Fiorentine, le lire 22. di Bologna, quante faranno in Firenze? opera, faranno lire 40., le quali aggiungerai a lire 4727. fol. 10. & ancora vi aggiungerai lire 70. e di più lire 192. fol. 5. d. 7. che spende in dogana di Firenze, ma prima per ritrovar questa, bisogna ridurre le libbre di Venetia a libbre di Firenze, dicendo così, se libbre 100. di Venetia tornano libbre 88. in Firenze, le libbre 4600. di Venetia quante torneranno in Firenze? opera, torneranno libbre 4048. al peso Fiorentino, delle quali pagando di gabella in dogana lire 4. fol. 15. per cento, viene a pagare le lire 192. fol. 5. den. 7. che di sopra s'è detto. Hora somma insieme tutto quello, che ha speso per conto di detta cera, fino che l'ha condotta alla bottega, doue la vuol vendere, trouerai che faranno lire 5029. fol. 15. auuertendo che non vogliamo tener conto di certi denari, ouero piccioli, che sono occorsi in dette spese, per render più breue, e facile la dichiarazione, atteso che non ci apportano vtile alcuno, ma solamente fastidio nell'operare, e così diremo che la sopradetta cera torni in Firenze libbre 4048., e che quiui condotta, gli costi in tutto lire 5029. fol. 15. di nostra moneta. Resta hora a trouare se guadagna, o perde; e perche s'è detto, che riucdeua la libra fol. 35. vediamo adunque quanto la riucderà tutta, multiplica libbre 4048. via fol. 35. fanno lire 7084., & a lui gli sta in lire 5029. fol. 15., per la qual cosa si conosce manifestamente che guadagna, & a voler saper quanto per cento, caua lire 5029. fol. 15. di lire 7084. restano lire 2054. fol. 5., le quali rappresentano il guadagno, che farà in tutto, fatto questo dirai così, se lire 5029. $\frac{1}{4}$. mi danno di guadagno lire 2054. fol. 5. quanto mi daranno di guadagno lire 100. multiplica, e parti, te ne verrà lire 40. fol. 16. den. 16. e tanto guadagnerà per cento. Potetasi proporre ancora più intricata, ma per non generar confusione, l'habbiamo formata con quei numeri, e modi più facili che s'è possuto, la qual cosa, se ben comprenderai, ti sarà render capace d'ogn' altra proposta simile, ancorche intricatissima.

In tutto duc. 762. grossi 12.

Sono Lir. 4727. 10.

Libb. 4048. Lir. $\frac{1}{4}$.

40.

70.

192.

5.

monta lir. 7084.

5029.

15.

Caua 5029.

15.

Resta lir. 2054.

5.

5029 $\frac{1}{4}$.

2054.

5.

100.

20119)

205425.

40.

16.

10.

Guadagna per cento Lir. 40.

16.

10.

Vi oia ha comprou in Lucca due pezze di drappi, che pesano libre 17. & once 3. per lire 29. fol. 15. la libra, di poi porta i detti drappi in Pisa, doue torna lib. 16. once 10. e braccia 57 $\frac{1}{2}$. alla misura di Pisa, si domanda in quante gli stà il braccio, e la libra al peso, e misura di Pisa. Fa così, troua la valuta di libre 17. once 3. a lire 29. fol. 15. la libra, trouerai che varranno lire 514. fol. 1. e tanto li costerà in Lucca; hor per veder quanto li costa la libra in Pisa, parti lire 514. fol. 1. per libre 16 $\frac{1}{2}$. ne viene lire 30. fol. 10. den. 9., & in tante lire gli stà la libra, hor per vedere in quanto gli stà il braccio, parti le sopradette lire 514. fol. 1. per bracc. 57 $\frac{1}{2}$. ne viene lire 8. fol. 8., & in tante lire gli stà il braccio in Pisa.

Vno ha comprou in Siuiglia di Spagna Aroue 2240. di zuccheri, per reali 30. l'Aroua, & ha fatto portare i detti zuccheri in Pisa, doue ha di spesa scudi 980. d'oro Italiani, & ha speso lo scudo d'oro per reali 11 $\frac{1}{2}$. & ogni Aroua li torna in Pisa lib. 33 $\frac{1}{2}$. si domanda in quanto gli stà il cantaro posto in Pisa. Fa così, vedi prima quanti scudi d'oro ha speso in Siuiglia in detti zuccheri, multiplica 30. reali via 2240. aroue, faranno 70200. reali, de' quali ne farai scudi d'oro, partendoli per 11 $\frac{1}{2}$. ne viene scudi 6104. e fol. 7. scarsi, & a questi aggiungerai scudi 980. d'oro, che ha hauuto di spesa, faranno in tutto scudi 7084. fol. 7. e tanto li costano tutti i detti zuccheri posti in Pisa, hor per vedere in quanto gli stà il cantaro, farai libre di dette Aroue, multiplicando 2240. via 33 $\frac{1}{2}$. faranno libre 78000. di poi dirai così, se libre 78000. di zuccheri costano scudi 7084. fol. 7. quanto costeranno libbre 151. ? cioè vn cantaro, opera trouerai che costerà scudi 12. fol. 14. den. 4. a oro & in tanto gli stà il cantaro de detti zuccheri posto in Pisa.

Vn mercante ha comprou in Firenze canne 350. di rasce a lire 31. fol. 16. la canna; le fa portar in Venetia, e spende lire 420. e troua che la canna di Firenze torna in Venetia braccia 3 $\frac{1}{2}$. e lo scudo d'oro di Firenze vale in Venetia lire 7. di quella moneta; domanda in quanto gli stà la canna a moneta, e misura di Venetia. Prima troua quanto gli costa la detta rasceia in Firenze a lire 31. fol. 16. la canna, trouerai che li costerà lire 11130. & a queste aggiungiui la spesa, cioè lire 420. faranno in tutto lire 11550., le quali ridurrai a moneta di Venetia: dicendo così, se lire 7 $\frac{1}{2}$. di Firenze tornano in Venetia lire 7. le lire 11550. Fiorentine quante faranno in Venetia; opera trouerai, che faranno lire 10780. et tanto li costa la detta rasceia condotta in Venetia. Fatto questo, bisogna trouare le canne 350. di rasce, quante torneranno alla misura di Venetia, e dirai così, se braccia 4. di Firenze tornano in Venetia braccia 3 $\frac{1}{2}$. le canne 350. di Firenze quante torneranno in Venetia? opera, torneranno canne 306 $\frac{1}{2}$. hor per vedere in quanto li stà la canna, parti lire 10780. per 306 $\frac{1}{2}$. ne viene lire 35. fol. 5. den. 7 $\frac{1}{2}$. e tanto varrà la canna di quella moneta, e misura.

Vn mercante ha comprou in Inghilterra sacca 1150. di lana per scudi 47 $\frac{1}{2}$. d'oro Italiani il sacco, & ogni sacco in tal luogo è chiodi 52. & ogni chiodo è libb. 7. d'Inghilt. & ogni lib. è once 16. di Fiorenza; di poi ha fatto portare dd. lane in Fiorenza, & ha speso scudi 3500. d'oro, si domanda quanto li stà il cento fosse in Fiorenza. Prima conuien vedere quanto li costa la detta lana in Inghilterra, e perciò multiplica sacca 1150. via scudi 47. d'oro, farà scudi 54625. & a questi vi aggiungerai la spesa, cioè scudi 3500. faranno in tutto scudi 58125. e tanto li costerà tutta la sopradetta lana posta in Fiorenza, fatto questo bisogna vedere quante libbre torna la detta lana in Fiorenza, perche multiplica 1150

sacca

facea via 52. chiodi, faranno chiodi 9800. e perche ogni chiodo è libb. 7. di quelle, le quali vengono a essere libb. 9 $\frac{1}{2}$. di Fiorenza, moltiplica adunque 9 $\frac{1}{2}$. via 9800. farà 95133 $\frac{1}{2}$. e tante libbre li tornerà in Fiorenza, hor per vedere quanto li stà il cento, farai così, dicendo, se libb. 95133 $\frac{1}{2}$. costano scudi 58125. quanto costaranno libb. 100. opera, trouarai, che costaranno scudi 10. fol. 8. den. 3. & tanti scudi gli stà il cento della lana posta in Fiorenza.

Vn Mercante ha comprato in Pisa 250. dozine di berrette a lir. 26. fol. 15. la dozzina, l'ha fatto portare in Palermo, & ha speso far nolo, & abella scudi 67 $\frac{1}{2}$. d'oro, si domanda quanti tari gli stà l'vna delle berrette poste in Palermo. Prima bisogna vedere quanti scudi d'oro li costano in Pisa, moltiplica 250. dozine via lir. 26. fol. 15. che è la valuta d'vna dozzina, trouarai che varranno lire 5687 $\frac{1}{2}$. che sono scudi 891 $\frac{1}{2}$. d'oro, & a questi aggiungerai le spese fatte, cioè scudi 67 $\frac{1}{2}$. faranno in tutto scudi 959 $\frac{1}{2}$. d'oro, e tanto li costano le dette berrette poste in Palermo. Hora de sopradetti scudi bisogna farne once, e perche vn' oncia è scudi 2 $\frac{1}{2}$. d'oro, però parti per 959 $\frac{1}{2}$. per 2 $\frac{1}{2}$. ne viene once 383 $\frac{1}{2}$. delle quali farai tari, moltiplicando le dette once via 30. trouarai che saranno tari 11510. e questi li partirai per 250. dozine, che sono 3000. berrette, parti adunque 11510. tari per 3000. berrette, ne viene tari 3. grani 16. e piccioli 4 $\frac{1}{2}$. andando 20. grani a vn tari, e 6. piccioli a vn grano, e tanto gli stà vna berretta li quelle in Palermo.

Vn Mercante ha comprato in Puglia carra 350. di grano a scudi 18 $\frac{1}{2}$. d'oro Italiani il carro, e l'ha fatto condurre nel Porto di Liorno, & ha speso a farlo condurre scudi 2920. d'oro simili, e dice, che ogni carro di Puglia è 36. tomola, & ogni tomolo torna in Liorno stia 2. si domanda quanto li stà la salma posta in Porto di Liorno. prima moltiplica 350. carra via scudi 18 $\frac{1}{2}$. farà 6475. & a questi aggiungi la spesa, cioè scudi 2920. faranno in tutto scudi 9405. l'oro, e tanto li costerà tutto il grano posto in Porto. Hora volendo vedere, quanto gli stà la salma, noi habbiamo che ogni 36. tomola sono vn carro, & ogni onolo è 2. stia, adunque ogni carro sarà 72. stia, che sono salme 6 $\frac{1}{2}$. Laonde moltiplica 350. via 6 $\frac{1}{2}$. farà salme 2240. le quali costano scudi 9405. d'oro, parti adunque scudi 9405. per 2240. ne viene scudi 4. fol. 4. scarfi, & tanti scudi li stà la salma posta in Liorno.

Vno ha comprato in Fiorenza vna quantità di pezze di rascia, di braccia 60. a pezza alla misura fiorentina, & ha speso nelle pezze scudi 75. hora vuol mandare le dette rascie in Venetia, & ha di spesa da Fiorenza a Venetia, tra gabelle, tati, vetture, e passaggi scudi 5. simili per pezza; dipoi hauendo condotto le dette rascie in Venetia, troua che a quella misura li cala a ragione di 13 $\frac{1}{4}$. per cento, domando quanto riuerderà la canha in Venetia di quella moneta, e misura, acciò che i suoi denari guadagnino a ragione di 20. per cento. Prima bisogna vedere quanto gli stà la pezza della rascia posta in Venetia, la quale tu sai che di prima compra la paga in Fiorenza scudi 75. dipoi dice che spende scudi per pezza a farla condurre in Venetia, i quali aggiunti a scudi 75. fanno scudi 80. che sono lir. 560. di nostra moneta, le quali ridotte a ducati di Venetia a lir. 1. fol. 4. per ducato, sono due. 90. e 7. grossi, e 24. piccioli, & in tanti ducati gli stà la pezza condotta in Venetia; hora bisogna vedere quante braccia gli torna a pezza in Venetia, e perche dice che gli cala a ragione di 13 $\frac{1}{4}$. per cento, adunque ogni 100. braccia di Fiorenza tornano in Venetia braccia 86 $\frac{1}{4}$. perche alla medesima ragione guarda quanti li torneranno braccia 60? opera, trouarai che

tornaranno braccia $51\frac{1}{2}$. dipoi fatto questo dirai così, se braccia $51\frac{1}{2}$. alla misura di Venetia, mi costano condotte in quella Città ducati 90. e 7. grossi, e vintiquattro denari, che mi costerà vna canna? cioè 4. braccia; moltiplica, e parti, te ne verrà 6. duc. e 23. grossi, & in tanti ducati li starà la canna di quella misura; ma perche dice, che la vuol riuendere tanto che guadagni a ragione di 20. per cento, perciò piglia il quinto di quel che gli costa la canna in Venetia, & aggiungilo al detto costo, perche chi guadagna 20. per cento, viene a guadagnare il quinto del suo capitale, piglia adunque il quinto di duc. 6. e grossi 23. hauerai che farà vn ducato, e 9. grossi, e den. 12 $\frac{1}{2}$. che aggiunti al suo capitale faranno in tutto duc. 8. grossi 8. e den. 12 $\frac{1}{2}$. e tanto riuenderà la canna di quella misura, e moneta, e guadagnerà 20. per cento.

00 — 86 $\frac{1}{2}$ — 60.		scudi 5.	
5190.		80. — lir. 7.	
51.		560 —	
$\frac{1}{10}$.		100. — 7 — 24.	
bracc. $51\frac{1}{2}$.	duc. 90.	grossi 7.	den. 24.
	361.	7.	0.
	3611.	22.	0.
	6.	23.	0.
	1.	9.	12 $\frac{1}{2}$.

Riuenderà la canna in Venetia duc. 8. grossi 8. den. 12 $\frac{1}{2}$.

Vno ha compro in Fiorenza vna quantità di pezze di drappi, di bracc. 56. la pezza per prezzo di scudi 52. l'vna, dipoi manda i detti drappi in Bologna, e spende tra vetture, e gabelle scudi 3. simili per pezza, e troua che la canna di Fiorenza, la qual'è 4. braccia, torna in Bologna bracc. $3\frac{1}{2}$. a quella misura; ma perche non trouò da riuendere i detti drappi con quel guadagno che pensaua, fece risoluzione di farli portare a Milano, e spese a farli condurre scudi 4. per pezza, e la canna di Bologna che è bracc. 4. li tornò in Milano bracc. $3\frac{1}{2}$. e lo scudo di Fiorenza trouò che in Milano valeua lir. 5. fol. 14. di quella moneta, giunto in Milano trouò da vender tutti quei drappi con guadagno di 20. per cento, domando quante lire vendè il piaccio. Prima bisogna vedere quante lire gli stà la pezza del drappo posta in Milano; la quale in Fiorenza di prima compra gli costa scudi 52. dipoi fino a Bologna spende scudi 3. per pezza, dipoi da Bologna a Milano spende scudi 4. che in tutto fanno scudi 59. quali ridurrà a lire di Milano, e perche s'è detto che lo scudo di Fiorenza di lir. 7. vale in Milano lir. 5. fol. 14. di quella moneta, perciò moltiplica scudi 59. via lir. 5. fol. 14. faranno lir. 336. fol. 6. di Milano. Resta hora a trouare quante braccia gli torna la pezza del detto drappo in Milano, e perche dice che la canna di Fiorenza torna in Bologna bracc. $3\frac{1}{2}$. ne seguirà, che alla medesima ragione, le bracc. 56. di Fiorenza, tornino in Bologna bracc. $51\frac{1}{2}$. la qual cosa trouarai, dicendo così se bracc. 4. cioè vna canna di Fiorenza torna in Bologna bracc. $3\frac{1}{2}$. le bracc. 56. di Fiorenza quante torneranno in Bologna? opera, trouarai, che torneranno bracc.

brac. $51\frac{1}{2}\frac{2}{3}$. dipoi bisogna trouare quante braccia tornano in Milano; perche dirai così, se bracc. 4. di Bologna tornano in Milano bracc. $3\frac{2}{3}$. quanti torneranno bracc. $51\frac{1}{2}\frac{2}{3}$? opera, trouarai che torneranno bracc. 50. appunto, e così vna pezza di drappo alla misura di Fiorenza gli farà tornata in Milano bracc. 50. e gli farà lir. 336. fol. 6. di quella moneta; hora conuiene trouare quanto gli stà il braccio, laonde partirai lir. 336. fol. 6. per bracc. 50. ne viene lir. 6. fol. 14. den. 6. $\frac{2}{3}\frac{2}{3}$. ma perche lo riuende tanto che guadagna a ragione di 20. per cento, perciò piglia il quinto di lir. 6. fol. 14. den. 6. $\frac{2}{3}\frac{2}{3}$. & aggiungilo alle dette lir. 6. fol. 14. den. 6. $\frac{2}{3}\frac{2}{3}$. trouarai che faranno in tutto lir. 8. fol. 1. den. 5. $\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{2}{3}$. e tanto riuendè il braccio del drappo in Milano, e guadagna 20. per cento.

Vno ha compro in Perugia la libra del zaffirano scudi 3. cioè 30. giuli, e lo porta a Venetia, e troua che once $11\frac{1}{2}$. di Perugia tornano in Venetia once 12. & ogni 3. giuli di Perugia tornano in Venetia 7. grossi, e 20. piccioli, di fol. 4. pic. 2. il grosso di moneta Venetiana, si domanda quanto debbe vender la libra in Venetia, accioche guadagni a ragione di 20. per cento. Dirai così, se once 12. di Perugia costano 30. giuli, che costeranno once $11\frac{1}{2}$? trouerai che costeranno giuli 28. $\frac{1}{4}$. et tanto costano on. $11\frac{1}{2}$. di Perugia, ma perche dice che on. $11\frac{1}{2}$. al peso di Perugia, tornano on. 12. in Venetia; ne segue che la libra di Venetia costi in Perugia giuli 28. $\frac{1}{4}$. hora è da vedere giuli 28. $\frac{1}{4}$. di Perugia, quanti ducati tornano in Venetia a lire 6. fol. 4. il ducato, come altre volte habbiamo detto, e dirai così, se 3. giuli di Perugia, sono in Venetia 7. grossi, e 20. piccioli, quanti faranno giuli 28. $\frac{1}{4}$? trouerai che faranno 3. ducati, 1. grosso, e 3. piccioli; ma perche dice voler riuender tanto la libra, che guadagni 20 per cento, perciò dirai così, se di 100. si fa 120. che si farà di ducati 3. grossi 1. e piccioli 3. ouero piglia il $\frac{2}{5}$. e raggiungilo come nella sopradetta si disse, e verrai in tutto duc. 3. grossi 15. e piccioli 22. $\frac{1}{2}$. e tanto diremo che douerà riuender la libra in Venetia, a voler guadagnare 20. per cento.

È dicendo, che la libra di Venetia, che è once 12. tornasse in Firenze once $11\frac{1}{4}$. & il ducato di Venetia, che vale lire 6. fol. 4. di quella moneta tornassu in Firenze lire 6. fol. 15. si domanda quanto si douerebbe comprare la libra del Reubarbaro in Venetia, accioche riuendendo la libra in Firenze lire 34. di moneta Fiorentina si guadagnasse a ragione di 20. per cento. Prima bisogna vedere la libra di Firenze quant'once torna in Venetia, e per saperlo, dirai così, se once $11\frac{1}{4}$. di Firenze, tornano in Venetia once 12. quante torneranno once 12. di Firenze in Venetia? opera, trouerai, che torneranno on. $12\frac{2}{3}$. ma perche dice che vorrebbe riuender la libra lire 34. e guadagnar 20. per cento, adunque in lire 34. c'è incorporato il guadagno, che vuol fare a ragione di 20. per cento, per la qual cosa fa bisogno trouare il capitale di lire 34. e dirai così, se 120. innanzi che si guadagnasse, era 100. che douerà essere 34. opera, trouerai che douerà essere lire 28. $\frac{1}{4}$. e tante lire di moneta Fiorentina costano on. $12\frac{2}{3}$. li Venetia; Riduci hora lire 28. $\frac{1}{4}$. di Firenze a moneta Venetia, dicendo, se lire 5. $\frac{1}{2}$. di Firenze tornano lire 6. fol. 4. in Venetia, le lire 28. $\frac{1}{4}$. di Firenze, quanto torneranno in Venetia? opera, torneranno lire 26. fol. 0. den. 6. pigliando il lenaro rotto per integro. Hora tu hai che on. $12\frac{2}{3}$. di Venetia costano lire 26. fol. 0. den. 6. di moneta Venetiana, e noi cerchiamo di sapere quanto vien la libra; perche dirai così, se once $12\frac{2}{3}$. costano lire 26. fol. 0. den. 6. quanto costeranno on 12? trouerai che costeranno lire 24. fol. 7. den. $11\frac{1}{4}$. di moneta Venetiana, e tanto si douerà comprare la lib. del Reubarbaro in Venetia, accio-

che riucendo poi la libra in Firenze dire 74: si guadagnasse a ragione di 200 per cento, e così procederai in altre simili, e questo basterà quanto alle commutazioni di mercantie.

Parendoci fin qui hauer trattato a bastanza della diuersità de pesi, misure, e monete, che in alcuni luoghi si costuma, ci rende più facile il credere, che a chiunque andrà ben considerando le regole, & il modo, che habbiamo osservato nel soluere le sopradette propositioni, gli sia per essere scorta, e guida in tutte l'altre occorrenze simili. E se bene i pesi, o misura, o valute di monete da noi addutte, o da addursi non corrispondessero precisamente in dette Città, e luoghi, come habbiamo detto nelle nostre proposte, attendi solo alle regole date, e non a voler considerare se habbiamo fatto commutare le mercantie più in vn luogo che in vn'altro, con misure, o spese ingorde, o scarse, ouero non solite farli; ma seruiti solo del modo dell'operare, al quale ti farà condurre le ragioni a ogni peso, misura, e valuta di monete che starà bisogno, e così con l'aiuto di Dio (facendo fine al secondo libro) daremo principio alla diuersità delle compagnie.

Il fine del Secondo Libro.

LIBRO TERZO¹³⁷

Delle Compagnie.



Ostumanfi le Compagnie fra i Mercanti in diuersi modi, perciòche chi mette danari, chi robbe, chi le proprie persone, di manierache i guadagni, o perdite che fanno si diuidono per rata del capitale, e questa è la più schietta, e reale che faccino, ma alle volte vno mette denari, e l'altro robbe con stima della valuta, altri mettono denari, e robbe, altri denari, e la persona; & altri robbe, denari, e la persona, ma in qualunque modo si sia, sempre si deue siguar dare ai patti, e conuentioni che fanno fra loro per fede, o testimonio, o scritto, o altro instrumento; e secondo quelli si deue partire i guadagni, o perdite. E sempre si deue sommare insieme tutte le quantità de' denari, che mette ciascuno, il quale poi si chiama corpo, o monte, e quella somma ouero corpo sarà sempre partitore di detta compagnia, e non facendosi altri patti, s'intende che ciascuno sia pa riceire del guadagno per rata di quel che mette, cioè, chi mette la metà del monte, deue tirare ancora la metà del guadagno, e chi mette li $\frac{2}{3}$. del monte, similmente deue tirare li $\frac{2}{3}$. del guadagno; ma se altri patti fussero tra loro, attendasi ai patti, e conuentioni, come nei seguenti casi di compagnie, per ammaestramento di ciascuno andaremo dichiarando.

Propositione Prima.

DVe hanno fatto compagnia, & il primo messè duc. 40. & il secondo messè duc. 60. & hanno guadagnato duc. 120. domando qu anti ne toccherà per vno. Per soluer questa propolla, somma insieme i capitali di ciascuno, cioè duc. duc. 40. del primo, e duc. 60. del secondo, fanno duc. 100. e con questo capitale di cento duc. s'è guadagnato duc. 120. e perche ciascuno deue partecipare di questo guadagno per rata di quel che messè, dirai così, se duc. 100. di capitale hanno guadagnato duc. 120. quanto guadagneranno duc. 40. del primo? opera, multiplicando duc. 40. via 120. & il prodotto parti per cento, ne viene duc. 48. e tanti ducati diremo che toccherà al primo, e per vedere qualche tocca al secondo, dirai così, se duc. cento di capitale guadagnano duc. 120. che guadagneranno duc. 60. del secondo? multiplica 6. via 120. & il prodotto parti per cento ne viene duc. 72. e tanti ne toccherà al secondo. Hor per vedere se il guadagno è diuiso giustamente, somma duc. 48. che tocca al primo con duc. 72. che tocca

tocca al secondo, fanno duc. 120. i quali sono vguali alla medesima quantita del guadagno, che tra loro si diuiso; piu, o meno, che venisse staria male.

	40.			4800.
	60.	<	120.	48.
Partitore.	100.		Primo.	
			Secondo.	7200.
				72.

Ma perche la sopradetta proua, cioè, sommando i guadagni di ciascuno insieme, acciò che rifaccino la medesima quantita diuisa, si puol falsificare, col trouare due altri numeri differenti, o volontariamente, o accidentalmente, che sommati insieme rifaccino i medesimi duc. 120. perciò con breuità vogliamo dimostrare la proua reale: per il che dirai così, se ducati 120. di guadagno, vengono da ducati cento di capitale, da che capitale verrà ducati 48. che è il guadagno del primo? multiplica 48. via cento, & il prodotto parti per 120. ne verrà ducati 40. per il capitale del primo, che tanto mette nella compagnia; e per il secondo medesimamente dirai così, se ducati 120. di guadagno vengono da ducati 100. di capitale, da che capitale verranno ducati 72. che è il guadagno del secondo? multiplica 72. via 100. & il prodotto parti per 120. ne verrà ducati 60. per il capitale del secondo, che tanto mette nella compagnia; e così con il guadagno di ciascheduno si deue ritrouare il capitale di ciascheduno, e quando col detto ordine non ritornasse il capitale di ciascheduno separatamente (stando bene il conto della proua) assolutamente si può dire, che l'operatione fatta in detta compagnia stia male.

Resta che dichiariamo quello, che poco inanzi habbiamo detto, cioè che tal parte deue tirar ciascuno del guadagno, qual mette nella compagnia, cioè nel monte, e con la sopradetta proposta lo vogliamo dimostrare, e prouare, e prima. Noi habbiamo che il primo mette duc. 40. & il secondo mette duc. 60. e fra tutti due mettono ducati cento, adunque mette il primo $\frac{40}{100}$ di tutto il monte, che schisati sono $\frac{2}{5}$. e così per li $\frac{3}{5}$. deue tirare del guadagno. Piglia $\frac{3}{5}$. di ducati 120. ne viene duc. 48. per la parte del primo, hora per il secondo, noi habbiamo che mette duc. 60. adunque mette $\frac{60}{100}$ di tutto il monte, che schisati sono $\frac{3}{5}$. e per li $\frac{2}{5}$. deue tirare del guadagno; piglia $\frac{2}{5}$. di ducati 120. ne viene duc. 72. per la parte del guadagno del secondo; laonde si vede chiaramente, che ne viene il medesimo, come per il primo operare.

E volendo di questo far la proua reale, dirai così, se ducati 120. di guadagno commune fra il primo, e secondo, vengono da capitale d'vna cosa, cioè dal capitale del primo, e secondo giunti insieme (perche il primo mette $\frac{2}{5}$. & il secondo mette $\frac{3}{5}$. che sommati insieme fanno 1. e perciò bisogna dire, che il capitale sia vna cosa) da che capitale verrà 48. guadagno del primo? multiplica 48. via 1. fa 48. parti per 120. ne viene $\frac{2}{5}$. che è la parte, che mette il primo del monte, e per il secondo dirai così, se duc. 120. di guadagno commune, vengono da vna cosa; cioè dal medesimo capitale, da che capitale verranno ducati 72. guadagno del secondo; multiplica 72. via 1. fa 72. il qual parti per 120. ne viene $\frac{3}{5}$. per la parte che mette il secondo nella Compagnia; e questa si seruirà per instruzione di molte altre.

- *Proposizione 2.*

TRe fanno compagnia con questi patti, che per rata di quello che ciascuno mette, per quella debba trarre. Il primo mette duc. 50. il secondo ducati 64. & il terzo duc. 86. di maniera che fra tutti messero duc. 200. & alla fine della compagnia trouorno hauer perso, e ritrassero solamente del lor capitale duc. 160. domando quanti ne toccherà per vno. Accade molte volte, che vno pensa di guadagnare, e perde, come interuiene hora in questa compagnia, perciò che fra tutti messero duc. 200. e non ne ritraggono più che duc. 160. che fra tutti vengono a scapitare duc. 40. laonde volendo sapere quanti ducati toccherà a ciascuno di quelli che son loro restati, dirai così, se duc. 200. di capitale tornano duc. 160. quanti torneranno duc. 50. del primo? moltiplica 50. via 160. & il prodotto parti per 200. ne viene duc. 40. per il primo, e per il secondo, moltiplica 64. via 160. & il prodotto parti per 200. ne viene duc. 51. $\frac{7}{10}$. dipoi per il terzo moltiplica duc. 86. via 160. & il prodotto parti per 200. ne viene duc. 68 $\frac{7}{10}$. e tanto tocca al terzo; fanne proua sommando quel che tocca al primo, secondo, e terzo, trouarai che faranno duc. 160. e se altra proua ne vuoi fare, seruiti de modi, che poco prima habbiamo dimostrato.

$$\begin{array}{r} 50 \\ 64 \\ 86 \\ \hline \end{array} \} 160.$$

Partitore 200.

Quando nelle compagnie interuengono altri patti, che trarre per rata di quel che si mette; somma sempre i capitali di quanti compagni sono, e quella tal somma saluala per partitore. Dipoi moltiplica il capitale del primo via quello che in vltimo si trouano; e che vogliono diuidere, tanto guadagno, come perdita, e siano denari, o robbe non importa, e quel tal prodotto parti per la somma de' capitali, che saluasti, e quel che ne verra sarà la parte che tocca al primo. Dipoi per vedere quel che tocca al secondo, moltiplica quel che mette, via quel che vogliono diuidere, & il prodotto lo partirai per la somma dei capitali, e l'auuenimento sarà quel che tocca al secondo, e così farai al terzo compagno, & a quanti compagni fusiero, di maniera che sapre douerai moltiplicare il capitale di ciascuno da per se, via quel che vogliono diuidere, e ciaschedun prodotto separatamente partire per la somma di tutto il lor capitale, e gli auuenimenti faranno le quantità, che toccheranno a ciascuno; e questo nostro ordine lo mandarai a memoria, acciò che noi non habbiamo a dirti ad ogni proposizione; se tanto capitale mi dà tanto guadagno, che mi darà il tal capitale. Dicendo ancora, che nelle proposte, che siamo per fare, procureremo di porle con manco compagni, che sia possibile, perciò che di quanti più compagni le proponessimo, tanto più crescerebbe briga, e non sapere.

Proposizione 3.

TRe fanno compagnia, con patti che del guadagno che faranno il primo ne deua hauere a ragione di soldi dieci per lira, & il secondo a ragione di sol. 6. per lira, & il terzo a ragione di sol. 4. per lira, & hanno guadagnato lir. 300. si domanda quante ne toccherà per vno. Somma insieme tutti quei soldi, che ciascuno deue hauere per lira, fanno sol. 20. e questi salua per partitore, dipoi multiplica sol. 10. (che deue hauere il primo per lira) via lir. 300. & il prodotto parti per 20. ne verrà lir. 150. per la parte del primo, dipoi multiplica sol. 6. via lir. 300. & il prodotto parti per 20. ne verrà 90. e tante ne toccherà al secondo; opera per il terzo, ne verrà lir. 60. e quando fussero patti trà loro, che il primo douesse hauere a ragione di tanti, che sommati insieme faceffero più di sol. 20. cioè, più o meno d'vna lira, opera nel medesimo modo, perche altro non vuole inferire, chi domanda (exempligratia) sol. 10. per lira, se non che mette 10. e per 10. deue tirare del guadagno, e così in ogn'altra simile.

$$\begin{array}{r} 10 \\ 6 \\ 4 \\ \hline 20. \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 300.$$

Proposizione 4.

TRe fanno compagnia, con patti, che il primo tragga per quel che mette, e'l secondo tragga per $\frac{2}{3}$. di quel che mette, e'l terzo tragga per $\frac{1}{3}$. di quanto mette. Il primo mette duc. 120. & il secondo mette duc. 120. & il terzo mette duc. 120. & hanno guadagnato duc. 100. si domanda quanti ne toccherà per vno; Non ha dubbio alcuno, che mettendo ciascun di loro, qu'antità vguale, douerebbono ancora trarre del guadagno vguale quantità; e questo seguirebbe quando fra di loro non ci fusse altri patti; ma perche i patti rompono le leggi, perciò bisogna attendere ai patti, come altre volte habbiamo detto. Ritornando hora al proposito nostro, noi habbiamo, che se il primo deue trarre per quel che mette, trarrà duc. 120. ma il secondo dice che se deue trarre per $\frac{2}{3}$. di quel che mette, adunque trarrà per $\frac{2}{3}$. di duc. 120. che sono duc. 80. e se il terzo deue trarre per $\frac{1}{3}$. di quel che mette, ne segue che tragga per $\frac{1}{3}$. di 120. che sono duc. 90. Hora noi habbiamo che il primo mette duc. 120. e per tanti deue trarre, & il secondo deue trarre per duc. 80. & il terzo per duc. 90. & hanno a partire duc. 100. di guadagno, opera, trouarai che al primo toccherà duc. 41. $\frac{2}{3}$. al secondo duc. 27. $\frac{2}{3}$. & al terzo duc. 31. $\frac{1}{3}$. fanno proua, sommando insieme quel che tocca a ciascuno; faranno duc. 100. apunto.

$$\begin{array}{r} 120. \\ 80. \\ 90. \\ \hline \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} 100.$$

Proposizione 5.

DVe fanno compagnia, con patti che ciascuno debba trarre del guadagno per quel che mette. Il primo mette duc. 600. & il secondo mette duc. 200. e la persona, che si stimata duc. 220. si domanda, che parte trarrà ciascuno del guadagno. Noi habbiamo, che il primo mette duc. 600. & il secondo mette tra la persona, & in denari contanti duc. 480. che sommati con quelli che mette il primo, fanno duc. 1080. e questo è il loro monte, ouero capitale, e perche il primo mette duc. 600. viene a mettere $\frac{5}{9}$ del monte, che schisati sono $\frac{5}{9}$. e per $\frac{5}{9}$. deue trarre del guadagno, & il secondo mettendo duc. 480. viene a mettere $\frac{4}{9}$ del capitale, che schisati sono $\frac{4}{9}$. e per $\frac{4}{9}$. deue tirare del

$$\begin{array}{r} 600. \\ 480. \\ \hline 1080. \end{array}$$

$$\frac{5}{9} \frac{0}{9} \frac{0}{9}$$

$$\frac{4}{9} \frac{0}{9} \frac{0}{9}$$

Primo $\frac{5}{9}$.Secondo $\frac{4}{9}$.*Proposizione 6.*

DVe fanno compagnia, il primo mette duc. 600. e del guadagno deue trarre $\frac{5}{9}$. & il secondo mette la persona, e duc. 260. e deue trarre $\frac{4}{9}$. del guadagno, si domanda quanto si stimata la persona del secondo. Prima, bisogna vedere $\frac{5}{9}$. (che deue trarre il secondo) che parte sono di $\frac{5}{9}$. che deue trarre il primo, che offeruato il modo del recare a parte, come nelle ragioni de' rotti habbiamo dimostrato, trouarai che $\frac{4}{9}$. sono $\frac{5}{9}$. di $\frac{5}{9}$. e così diremo, che il secondo tra la persona, & in denari contanti mettesse $\frac{4}{9}$. di quel che mette il primo, cioè $\frac{5}{9}$. di duc. 600. che sono duc. 480. e questo mette il secondo tra la persona, & in denari, ma perche si disse, che in denari mette duc. 260. ne segue che la differenza, che è da duc. 260. fino in ducati 480. serua per la stima della persona, caua adunque 260. di 480. resta duc. 220. e tanto si stimata la persona del secondo.

Proposizione 7.

DVe fanno compagnia, con patti, che il primo metta duc. 870. e tragga $\frac{5}{9}$. del guadagno, & il secondo metta solo la persona, e tragga il resto, cioè $\frac{4}{9}$. si domanda quanto sarà stimata la persona del secondo. Questa è simile alla sopradetta, perciò bisogna vedere $\frac{5}{9}$. che vuol trarre il secondo, che parte sono di $\frac{5}{9}$. che vuol trarre il primo, opera nel modo sopradetto, trouarai che faranno $\frac{4}{9}$. e così diremo, che il secondo mettendo la persona sola metterà li $\frac{4}{9}$. di quel che mette il primo, per la qual cosa bisogna pigliare $\frac{5}{9}$. di duc. 870. che sono duc. 480. e tanto sarà stimata la persona del secondo.

$$\frac{5}{9}$$

$$\times$$

$$\frac{4}{9} \frac{0}{9} \frac{0}{9}$$

$$\frac{5}{9} \frac{0}{9} \frac{0}{9} \text{ schisati sono } \frac{5}{9}$$

Volendone

Volendone far la proua, somma duc. 870. che mette il primo, con duc. 580. che mette il secondo, cioè la stima della sua persona, fanno duc. 1450. la onde, il primo mettendo duc. 870. viene a mettere $\frac{1}{4} \frac{2}{5} \frac{0}{10}$. del monte, che schifati sono $\frac{1}{7}$. & il secondo mettendo duc. 580. viene a mettere $\frac{1}{4} \frac{1}{7} \frac{0}{10}$. del monte, che schifati sono $\frac{2}{7}$. adunque il primo mette $\frac{1}{7}$. del monte, e per $\frac{1}{7}$. tira del guadagno, & il secondo mette $\frac{2}{7}$. del monte, e per $\frac{2}{7}$. trae del guadagno, che è quanto ci occorre a dimostrare.

Proposizione 8.

DVe fanno compagnia, con patti, che per quello, che ciaſcun mette, per quello deua trarre, il primo mette duc. 200. & il secondo mette duc. 340. ſi domanda quanti ſoldi trarrà ciaſcuno per lira. Dirai così, il primo mette duc. 200. & il secondo duc. 340. & hanno a partire ſol. 20. offerua la regola già data, trouarai che il primo trarrà ſol. $7 \frac{1}{2} \frac{1}{2}$. & il secondo ſol. $12 \frac{1}{2} \frac{1}{2}$. per lira.

Proposizione 9.

DVe fanno compagnia, con patti, che il primo metta duc. 3600. e tragga del guadagno $\frac{1}{7}$. & il secondo metta duc. 1160. & la persona, e tragga del guadagno $\frac{1}{7}$. e mettendo più, o meno, traghino per rata di quel che mettono, accade che il secondo non offeruò i patti, e mette ſolo duc. 800. & la persona, & il primo mette quanto prometteſſe, ſi domanda che parte douerà trarre ciaſcuno del guadagno. Prima biſogna trouare quanto ſi ſtimata la persona del ſecondo, e per trouare tal coſa dirai così $\frac{1}{7}$. che vuol trarre il ſecondo, che parte ſono di $\frac{1}{7}$. che vuol trarre il primo? opera, ſono $\frac{1}{7}$. e così habbiamo che il ſecondo douerà mettere tra la persona, & in denari (ſtante i primi patti) $\frac{1}{7}$. di quel che mette il primo, cioè li $\frac{1}{7}$. di duc. 3600. che ſono duc. 2160. e perché in denari contanti doueua mettere duc. 1160. ne ſegue che la ſtima della persona ſia la differenza, che è da duc. 1160. fino a duc. 2160. che ſono duc. mille. Hora queſto ſecondo compagno mettendo la persona, la qual ſi conta per 1 duc. mill e, e di più diciamo, che mette duc. 800. noi habbiamo che in tutto viene a mettere duc. 1800. & il primo mette duc. 3600. che fra ambedue mettono duc. 5400. adique il primo viene a mettere $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{0}{10}$. di tutto il monte, che ſchifati ſono $\frac{1}{7}$. e per $\frac{1}{7}$. deue trarre del guadagno, & il ſecondo mette $\frac{1}{4} \frac{1}{4} \frac{0}{10}$. del monte, che ſchifati ſono $\frac{2}{7}$. e per $\frac{2}{7}$. deue trarre del guadagno, e così habbiamo reſoluta la preſente domanda.

Primo 3600. $\frac{1}{7}$.

Secondo 1160. $\frac{1}{7}$.

$\frac{1}{7} \times \frac{1}{7}$.

800.
1000.

5) 10800.
2160.
1160.

Primo 1800.
Secondo 3600.
monte. 5400.

1000.

Il primo traſrà del guadagno $\frac{1}{7}$. & il ſecondo $\frac{2}{7}$.

Prope-

Proposizione 10.

DVe fanno compagnia, con patti, che il primo metta duc. 50. e del guadagno tragga $\frac{2}{7}$. & il secondo metta duc. 10. e la persona, e del guadagno tragga $\frac{3}{7}$. e mettendo più, o meno tragghino per rata di quel che mettono; Il primo sopramette duc. 30. domando che parte trarrà ciascuno del guadagno. Questa è simile alla sopradetta; troua prima quanto mette il secondo tra la persona, & in denari, dicendo così $\frac{2}{7}$. che parte sono di $\frac{2}{7}$? opera nei modi dati, sono $\frac{2}{7}$. e così habbiamo che il secondo tra la persona, & in denari mette $\frac{2}{7}$. di quel che mette il primo, cioè li $\frac{2}{7}$. di duc. 50. che sono duc. 20. di poi habbiamo che il primo sopramette duc. 30. che giunti con duc. 50. che prima haueua messo, fanno duc. 80. i quali aggiunti a duc. 20. che mette il secondo tra la persona, & in denari, fanno duc. 100. è questo è quanto mettono tra tutti due, e perche il primo mette duc. 80. viene a mettere $\frac{4}{7}$ del monte, che schisati sono $\frac{2}{7}$. e tal parte trarrà il primo del guadagno, e perche il secondo mette duc. 20. viene a mettere $\frac{2}{7}$ del monte, che schisati sono $\frac{2}{7}$. e tanto trarrà il secondo del guadagno.

Primo. $\frac{50 \frac{2}{7}}{30}$

Secondo. $\frac{10 \frac{3}{7}}{20}$

$\frac{2}{7} \times \frac{3}{7}$

Primo. 30.

Secondo. 20.

$\frac{2}{7}$

Monte. 100.

$\frac{4}{7} \frac{2}{7}$

$\frac{2}{7} \frac{3}{7}$

Il primo trarrà $\frac{4}{7}$ del guadagno, & il secondo ne trarrà $\frac{2}{7}$.

Proposizione 11.

DVe hanno fatto compagnia, con patti che il primo metta duc. 400. e tragga $\frac{1}{4}$ del guadagno, & il secondo metta duc. 50. e la persona, e tragga $\frac{1}{4}$ del guadagno, e mettendo più, o meno, tragghino per rata di quel che mettono, accade che il primo sopramette duc. 200. & il secondo sopramette duc. 100. si domanda che parte trarrà ciascuno del guadagno. Procura prima di trouare quanto mette il secondo tra la persona, & in denari, innanzi che soprametta duc. 100. la qual cosa trouerai, dicendo così $\frac{1}{4}$. che parte è di $\frac{1}{4}$? opera, trouerai che farà $\frac{1}{4}$. e così diremo che il secondo tra la persona, & in denari venisse a mettere $\frac{1}{4}$ di quel che misse il primo, innanzi che il primo sopramettesse 200. ducati. Piglia adunque $\frac{1}{4}$ di duc. 400. che mette il primo, sono duc. 100. e tanti ducati venne a mettere il secondo tra la persona, & in denari (stante la prima conuenzione) ma perche s'è detto che sopramettesse duc. 100. aggiungi questi, che sopramette a ducati 100. che mette tra la persona, & in contanti, faranno ducati 200. in tutto, e questo è quel che mette nel corpo della compagnia il secondo. Hora per il primo, noi habbiamo che la prima volta mette duc.

duc. 400. e dipoi ne rimette 200. che in tutto viene a mettere nel corpo della compagnia duc. 600. i quali aggiunti insieme con duc. 200. che mette il secondo, fanno duc. 800. e questo è il lor capitale, ouero monte, del quale il primo vn'hà $\frac{2}{3}$ che schisati son $\frac{1}{3}$. e questa è la parte che trarrà il primo del guadagno, hora per il secondo tu vedi che nel monte v'hà ducati 200. che sono $\frac{1}{4}$ che schisati sono $\frac{1}{4}$. e tal parte trarrà il secondo del guadagno.

400.	$\frac{2}{3}$	50	$\frac{1}{4}$	
200.				
Primo.	600.	$\frac{2}{3}$	$\times$	$\frac{1}{4}$
				$\frac{1}{2}$
				$\frac{1}{2}$
				$\frac{1}{2}$
	4)	400.		
		100.		
		100.		
		200.		
	Secondo.	200.		

Il primo trarrà $\frac{1}{3}$ del guadagno, & il secondo $\frac{1}{4}$.

Proposizione 12.

DVe fanno compagnia con patti che il primo metta duc. 680. e tragga dal guadagno $\frac{2}{3}$. & il secondo metta duc. 210. e la persona, e tragga del guadagno $\frac{1}{4}$. e mettendo più, o meno traghino del guadagno per rata di quel che mettono; accade che il primo mette duc. 400. & il secondo mette duc. 100. e la persona, si domanda che parte douerà trarre ciascuno del guadagno. Trouisi prima quanto mette il secondo tra la persona, & in denari. Vedi $\frac{1}{4}$. che parte sono di $\frac{2}{3}$. trouerai che faranno $\frac{1}{6}$. e così il secondo tra la persona, & in denari verrebbe a mettere $\frac{1}{6}$. di quel che mette il primo, piglia adunque $\frac{1}{6}$. di duc. 680. ne viene duc. 113. e tanto metterebbe il secondo tra la persona, & in denari se mettesse duc. 210. come si disse, ma perche non mette tal quantità, perciò caua duc. 210. di duc. 510. restano duc. 300. per la sola stima della persona, & a questi duc. 300. si debbe aggiungere duc. 100. che realmente mette il secondo, faranno duc. 400. è tanto viene a mettere ultimamente il secondo tra la persona, & in denari, hora per il primo noi habbiamo che non mette altro che ducati 400. i quali sommati con duc. 400. che mette il secondo, fanno ducati 800. per tutto il corpo della compagnia, e perche ciascun di loro mette duc. 400. ne segue che ogn'vn di loro metta la metà del monte, e conseguentemente ogn'vn tragga del guadagno per metà,

	680.	$\frac{2}{3}$.		210.	$\frac{1}{3}$.	
		$\frac{2}{3}$.	$\times$	$\frac{1}{3}$.		
4)	2040.					
	<u>510.</u>					
	210.					
	<u>300.</u>					
	100.			$\frac{4}{3} \frac{8}{3} \frac{2}{3}$.		$\frac{4}{3} \frac{8}{3} \frac{2}{3}$.
Secondo.	400.			$\frac{1}{3}$.		$\frac{1}{3}$.
Primo.	<u>400.</u>					
	800.					

Trarrà ciascuno di loro la metà del guadagno.

Proposizione 13.

DVe fanno compagnia con patti che il primo metta duc. 4000. e caui del guadagno $\frac{1}{3}$. & il secondo metta duc. 2000. e la persona, e del guadagno tiri $\frac{1}{3}$. accade che il primo sopramette tanto, che del guadagno trasle $\frac{1}{3}$. & il secondo $\frac{2}{3}$. si domanda quanto sopramette il primo. Prima bisogna trovare, quanto doueria mettere il secondo non volendo mettere la persona. Vedi $\frac{1}{3}$. che parte sono di $\frac{1}{3}$. trouerai che son $\frac{1}{3}$. adunque il secondo doueria mettere li $\frac{1}{3}$. di quel che misse il primo, cioè li $\frac{1}{3}$. di ducati 4000. che sono ducati 2400. e tanto messe il secondo tra la persona, & in denari; cauane adunque duc. 2000. che mette in denari contanti, restano duc. 400. per la sola stima della persona, ma per che dice che il primo sopran misse tanto che tirò $\frac{1}{3}$. del guadagno, adunque il secondo tirò $\frac{2}{3}$. Hora vedi $\frac{2}{3}$. che parte sono di $\frac{1}{3}$. trouerai che sono $\frac{2}{3}$. adunque 2400. ducati, che mette il secondo tra la persona, & in denari, sono vguai all'i $\frac{2}{3}$. di quel che debbe mettere il primo, e perciò vedi duc. 2400. di che numero sono li $\frac{2}{3}$. pari 2400. per $\frac{2}{3}$. ne vien ducati 600. e tanto conuien che metta il primo a voler trarre li $\frac{1}{3}$. del guadagno, ha per veder quanto sopramette, caua duc. 4000. (che misse da prima) di duc. 6000. restano duc. 2000. e tanti ducati sopramette il primo.

	4000	$\frac{1}{3}$.		2000	$\frac{1}{3}$.		$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$.	
		$\frac{1}{3}$.	$\times$	$\frac{1}{3}$.			$\frac{2}{3}$	2400.
5)	12000.							<u>12000.</u>
	2400.							6000.
	2000.							<u>4000.</u>
								2000.

Stima della persona. 400.

Il primo sopramette ducati 2000.

K

Proposizione

Proposizione 14.

DVe fanno compagnia, con patto che il primo metta lire 6000. e tiri $\frac{1}{4}$. del guadagno, & il secondo metta lire 1900. e la persona, e del guadagno tiri li $\frac{1}{4}$. viene vn loro amico, e s'accorda con loro d'entrare in detta compagnia, e mette lire 4000. si domanda quanto fu stimata la persona del secondo, cioè quel che douerebbe mettere in denar contanti, se non mettesse la persona, vedi $\frac{1}{4}$. che parte sono di $\frac{1}{4}$. opera, sono $\frac{1}{4}$. adunque il secondo douerebbe mettere $\frac{1}{4}$. di quel che mette il primo, cioè $\frac{1}{4}$. di lire 6000. che sono lire 3600. e queste mette il secondo tra la persona, & in denari, e di sopra si disse che in denari messe lire 1900. le quali tratte di lire 3600. restano lire 1700. per la sola stima della persona. Hora per veder che parte tocca al terzo compagno, somma insieme quel che misse il primo, e quel che misse il secondo computando la persona; e quel che misse il terzo, cioè 6000. del primo, lire 3600. del secondo, e lire 4000. del terzo, fanno lire 13600. e questo è tutto il corpo della compagnia. Resta hora a vedere che parte debbe trarre ciascuno, e perche il primo mette $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. del monte, & il secondo $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. & il terzo $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. che schisati, per il primo ne viene $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. per il secondo $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. e per il terzo $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. e tal parte douerà trarre ciascuno del guadagno.

	6000	$\frac{1}{4}$.		1900	$\frac{1}{4}$.	
			$\frac{1}{4}$.	$\times$	$\frac{1}{4}$.	6000.
s)	18000.					3600.
	3600.		$\frac{1}{4}$.			4000.
	1900.					
						13600. Monte.

Stima della persona. 1700.

La persona del secondo fu stimata lire 1700. & il primo deue trarre del guadagno $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. & il secondo $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$. & il terzo $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{4}$.

Proposizione 15.

DVe fanno compagnia, con patti, che'l primo metta lire 1600. e del guadagno caui $\frac{1}{4}$. e'l secondo metta lire 700. e la persona, e tiri $\frac{1}{4}$. del guadagno. Dipoi viene vn terzo compagno, e s'accorda con loro d'entrare a compagnia, e mette lire 1400. dipoi viene vn quarto compagno lor amico, e dice a questi tre, se volete ch'io entri con voi a compagnia, metterò tanti denari, che del guadagno ne trarrò $\frac{1}{4}$. & essi l'accettorno, si domanda che parte douerà trarre ciascuno del guadagno, e quanti denari conuerà che metta il quarto compagno, acciò che caui $\frac{1}{4}$. del guadagno come s'è detto. Troua prima il capitale del secondo, computandoci la persona. Vedi $\frac{1}{4}$. che parte sono di $\frac{1}{4}$. opera sono $\frac{1}{4}$. adunque il secondo metterà $\frac{1}{4}$. di quanto mette il primo, piglia $\frac{1}{4}$. di lire 1600. che sono lire 1200. e tante lire douerà mettere il secondo, e già sappiamo

sappiamo che mette lire 700. adunque la persona valse il resto fino in lire 1200. che sono lire 500. hora perche soprauene il terzo compagno, somma quel che che mette il primo, cioè lire 1600. con quel che mette il secondo (computato la persona) che sono lire 1200. e con quel che mette il terzo, fanno in tutto lire 4200. e perche dice che viene il quarto compagno, e vuol mettere tante lire che caui $\frac{1}{2}$. del guadagno, ne segue, che infra il primo, secondo, e terzo deuino cauare li $\frac{3}{4}$. del guadagno, perciò vedi $\frac{3}{4}$. che parte sia di $\frac{3}{4}$. opera, sarà $\frac{3}{4}$. adunque il quarto compagno bisogna, che metta la metà di quanto mettono gli altri tre insieme. E perche tutti tre mettono lit. 4200. Il quarto compagno conuerà che metta la metà, che è 2100. Hora per vedere che parte trarrà ciascuno, somma lit. 1600. del primo, e lit. 1200. del secondo, e 1400. del terzo, e 2100. del quarto, fanno in tutto lit. 6300. e questo sarà tutto il corpo della compagnia, doue ciascun di loro ha la parte. Fatto questo, vedi lit. 1600. che mette il primo, che parte sono di lire 6300. che schisati faranno $\frac{16}{63}$. e per il secondo hauerai $\frac{12}{63}$. e per il terzo $\frac{14}{63}$. e per il quarto $\frac{21}{63}$. e così habbiamo dimostrato qual parte douerà trarre ciascuno del guadagno.

	1600.	$\frac{4}{7}$	700 $\frac{1}{2}$	Primo.	1600.
					1200.
					1400.
4)	4800.	$\frac{4}{7}$	$\times \frac{1}{2}$		
	1200.		$\frac{1}{4}$		
	700.			2)	4200.
					2100.
Stima della persona	500.				6300.

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

Il primo douerà trarre del guadagno $\frac{16}{63}$. Il secondo $\frac{12}{63}$. e per il terzo $\frac{14}{63}$. & il quarto $\frac{21}{63}$. & il quarto compagno conuerà che metta lit. 2100.

Proposizione 16.

DVe fanno compagnia, e fra tutti due mettono duc. 120. & in vltimo si trouano di guadagno duc. 70. & al primo toccò fra capitale, e guadagno ducati 70. & al secondo duc. 120. si domanda quanti messè ciascuno da per se; fà così aggiunti duc. 70. di guadagno con duc. 120. di capitale, fanno duc. 190. di poi dirai così, se duc. 190. fra capitale, e guadagno, son venuti da capitale di duc. 120. da che capitale saranno venuti duc. 70. fra capitale, e guadagno, che toccorno al primo? moltiplica, e parti, te ne verrà duc. $44\frac{2}{5}$. e tanto messè il primo; e per il secondo dirai in questo modo, se duc. 190. fra capitale, e guadagno son venuti da duc. 120. di capitale, da che capitale saranno venuti duc. 120. che toccorno al secondo fra capitale, e guadagno? opera, te ne verrà duc. $75\frac{1}{5}$. e tanto messè nella compagnia il secondo. Fanne proua, dicendo.

Due fanno compagnia, il primo mette duc. $44\frac{2}{5}$. & il secondo mette duc. $75\frac{1}{5}$. & hanno guadagnato duc. 70. domando, quanti ne toccherà per vno, opera, trouarai che al primo toccherà duc. $25\frac{1}{5}$. che sommati con duc. $44\frac{2}{5}$. di suo capitale, fanno duc. 70. quali gli toccorno fra capitale, e guadagno, &

al secondo toccherà duc. 120. $\frac{1}{2}$. che aggiunti con duc. 75 $\frac{1}{2}$. che mette nella compagnia, fanno duc. 120. i quali gli toccorno fra capitale, e guadagno.

Proposizione 17.

TRe fanno compagnia, e mettono fra tutti duc. 800. & hanno guadagnato duc. 360. al primo toccò di guadagno duc. 120. al secondo duc. 130. si domanda quanto toccherà al terzo, e quanto messè ciascuno da per se. Per sapere qualche toccherà di guadagno al terzo è cosa da non domandarne, perciò che se infra il primo, e secondo toccano duc. 250. è cosa notissima, che il resto fino in duc. 360. che son duc. 110. toccheranno al terzo; nientedimeno per soddisfare alla proposta, ancor che sia cosa sciocca, l'habbiamo deferita. Hora per trovare quanto messè ciascuno nella compagnia, dirai così. Se duc. 360. di guadagno son venuti da capitale di duc. 800. da che capitale verranno duc. 120. di guadagno, che toccorno al primo? moltiplica, e parti, ne verrà duc. 266 $\frac{2}{3}$. e tanto messè il primo, offerua il medesimo modo per il secondo, e terzo, trouarai che il secondo messè duc. 288 $\frac{2}{3}$. & il terzo duc. 244 $\frac{2}{3}$. e così farai in altre simili.

	Partitore.				
120.	360.	800.	120.	130.	110.
130.					
110.					
360.					

Il primo messè ducati 266 $\frac{2}{3}$. Il secondo duc. 288 $\frac{2}{3}$. & il terzo duc. 244 $\frac{2}{3}$.

Proposizione 18.

TRe fanno compagnia, il primo mette ducati 40. il secondo duc. 65. & il terzo messè ducati non sò quanti, & hanno guadagnato ducati 300. de quali ne toccò al terzo ducati 120. si domanda quanto messè nella compagnia, e quanto toccò a ciascuno degli altri due. Prima, caua ducati 120. che toccò di guadagno al terzo di ducati 300. restano ducati 180. e questi toccano infra il primo, e secondo del guadagno, e perche noi habbiamo detto, che fra il primo, e secondo mettono duc. 105. perciò dirai così, se duc. 180. di guadagno, son venuti da ducati 105. di capitale, da che capitale faranno venuti ducati 120. che toccorno al terzo? opera, verranno da capitale di ducati 70. e tanto messè il terzo con pagno: dipoi per sapere qualche tocca di guadagno al primo, & al secondo separatamente, dirai così; se con ducati 105. di capitale, si guadagna duc. 120. quanto si guadagnerà con duc. 40. che mette il primo, e con ducati 65. del secondo: opera separatamente, trouarai, che per il primo si guadagnerà duc. 68 $\frac{2}{3}$. e tanti gliene toccherà; & al secondo gli toccherà duc. 111 $\frac{2}{3}$.

	300. 120.	40. 65.		
Partitore.	180.	105.	120.	
Partitore.	105)	180	40	65.
			7200.	11700.
			687.	1117.

Il terzo mese nella compagnia ducati 70. & al primo toccò di guadagno duc. 687. & al secondo duc. 1117.

Proposizione 19.

VN Signore venendo a morte, fece testamento, e lasciò heredi tre figliuoli di ducati venti mila, con patto, che il primo ne douesse hauere la quarta parte, & il secondo ne douesse hauere la terza parte, & il minore, & vltimo ne douesse hauere la metà, si domanda quanti ducati toccherà per vno. Questa è simile a vna ragione di compagnie, ma volendone dare al primo la quarta parte, che farebbe duc. 5000. & al secondo la terza parte, che farebbe duc. 6666 $\frac{2}{3}$. & al terzo la metà, che farebbe duc. 10000. sommate tutte queste parti insieme, fanno duc. 21666 $\frac{2}{3}$. dimanierache verrebbero a diuidere più che non lasciò il padre; ma perche nel principio delle compagnie si disse, che tal parte si trarrà di tutto il guadagno, qual parte si metterà di tutto il monte, perciò diremo così che il primo metta $\frac{1}{4}$. per la quarta parte, che deue hauere, & il secondo metta $\frac{1}{3}$. & il terzo metta $\frac{1}{2}$. che sommate tutte queste parti fanno $1\frac{1}{4}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$. e questo viene a essere il capitale, ouero monte di tutti. E perche il primo mette $\frac{1}{4}$. vedi adunque $\frac{1}{4}$. che parte sia di tutto il monte, cioè di $1\frac{1}{4}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$. che lo trouarai partendo $\frac{1}{4}$. per $1\frac{1}{4}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$. ne viene $\frac{1}{7}$. e tal parte deue tirare il primo del guadagno, e per il secondo, vedi $\frac{1}{3}$. che mette, che parte sia di $1\frac{1}{4}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$. trouarai che sarà $\frac{1}{7}$. e tal parte deue tirare il secondo, di poi per il terzo, vedi $\frac{1}{2}$. che parte sia di $1\frac{1}{4}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$. trouarai che sarà $\frac{1}{7}$. e tal parte deue tirare il terzo. Piglia adunque per il primo $\frac{1}{7}$. di duc. 20000. ne viene duc. 2857 $\frac{1}{7}$. e tanti ne toccò al primo, e per il secondo, piglia $\frac{1}{7}$. di duc. 20000. ne viene duc. 2857 $\frac{1}{7}$. e tanti ne toccò al secondo, di poi per il terzo, piglia $\frac{1}{7}$. di duc. 20000. ne viene duc. 2857 $\frac{1}{7}$. e tanti ne toccò al terzo.

E quando tu operasse per regola del tre, dicendo così, se $1\frac{1}{4}\frac{1}{3}\frac{1}{2}$. di capitale, tira di guadagno duc. 20000. che tirerà $\frac{1}{7}$. per il primo? & $\frac{1}{7}$. per il secondo? & $\frac{1}{7}$. per il terzo? operando separatamente, trouaresti, che ne verrebbe, come di sopra habbiamo risoluto.

Ma per procedere in queste ragioni con meno trouaglio di rotti, e secondo il modo offeruato da tutti gli Autori, tieni quest'ordine, di trouare sempre vn numero che habbia tutte quelle parti, che domandorno, cioè, che il detto numero habbia $\frac{1}{4}$. e non auanzi cos' alcuna, & habbia il $\frac{1}{3}$. e non auanzi, & habbia $\frac{1}{2}$. e non

e non auanzi, volendo adunque trouar tal numero con facilità, multiplica sempre il denominatore d'vna parte, ouero rotto, via il denominatore dell'altro, & il prodotto multiplica via il denominatore dell'altro, e così andaresti seguitando, fino a quante parti, ouero rotti fussero; hora noi habbiamo che le parti che domandano, sono queste cioè $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, che i loro denominatori sono 4. 3. 2. multiplica 4. via 3. fa 12. e questo multiplicalo via 2. terzo denominatore, farà 24. e questo è quel numero, che ha le sopradette parti intiera mente, & a nessuna di esse auanza rotto. Hora trouato il numero che uoluamo, bisogna pigliarne quelle parti, che ciascuno deue tirare, e per il primo pigliane il $\frac{1}{2}$. che è 6. e metti da parte, e per il secondo pigliane il $\frac{1}{3}$. che è 8. e metti sotto al 6. del primo, e per il terzo pigliane il $\frac{1}{4}$. che è 12. e questo metti sotto all'8. già posto, e così diremo che il primo deue trarre del guadagno per 6. il secondo per 8. & il terzo per 12. & hanno a diuidere duc. 20000. vedi hora che toccherà per vno, trouarai che al primo toccherà duc. 4615. $\frac{1}{2}$, al secondo duc. 6153. $\frac{1}{3}$. & al terzo duc. 9230. $\frac{1}{4}$. come per il primo, e secondo operare ne venne.

$$\begin{array}{r}
 \frac{1}{2} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{1}{4} \\
 \hline
 24 \\
 \hline
 6 \\
 8 \\
 12 \\
 \hline
 26
 \end{array}
 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} 20000.$$

Partitore.

Proposizione 20.

DVe hanno fatto compagnia, & hanno guadagnato duc. 120. quali vogliono diuidere in questo modo cioè, il primo ne deue hauere la metà più 2. & il secondo ne deue hauere li $\frac{1}{3}$. più 6. si domanda quanti ne toccherà per vno. In questa, & in tutte l'altre simili, tieni questa per regola generale, che quel più che i compagni deuono hauere fuor della parte, cioè fuor del $\frac{1}{2}$. o del $\frac{1}{3}$. o del $\frac{1}{4}$. &c. tu la caui sempre di quella quantità, che vogliono diuidere, e quel meno che douessero hauere fuor delle dette parti, sempre lo deui raggiungere a detta quantità, che vogliono diuidere; perciò aggiungi più 2. del primo con più 6. del secondo, fanno più 8. e questo trarrai sempre di duc. 120. che vogliono diuidere, restaranno duc. 112. e questo salua per diuidere. Dipoi troua vn numero, che habbia le parti integrali, che domandano, senza auanzar rotti, offesa il modo sopradetto, trouarai che il numero farà 6. del quale prendendone le sopradette parti, non auanzarà cos'alcuna; Piglia per il primo la metà di 6. che è 3. e metti da parte, dipoi per il secondo piglia $\frac{1}{3}$. di 6. che è 4. e questo metti sotto il 3. del primo. Hora dirai così, il primo deue trarre per 3. & il secondo per 4. & hanno a diuidere duc. 112. si domanda che tocca per vno, opera al primo ti verrà duc. 41. ma perche si disse che haueua hauere più 2. aggiungeli 2. faranno duc. 53. e tanti ne toccherà al primo, dipoi per il secondo ti verrà duc. 44. ai quali aggiungili più duc. 6. che doueua hauere farà duc. 70. e tanti ne toccherà al secondo.

Proposizione

Propositione 21.

DVe fanno compagnia, con patto che il primo tragga del guadagno la metà men 4. & il secondo ne tragga $\frac{1}{2}$. men 6. & hanno guadagnato duc. 100. si domanda quanti ne toccherà per vno. Somma insieme men 4. con men 6. fanno men 10. il quale aggiungi a 100. come s'è detto nella precedente, sarà 110. dipoi troua vn numero, che presone le parti, che deuono hauere, cioè $\frac{1}{2}$. & $\frac{1}{4}$. non auanzi rotti, che per i modi dati sarà 6. del quale piglia la metà che è 3. & il terzo che è 2. e così dirai che il primo deue tirar del guadagno per 3. & il secondo per 2. & hanno a diuidere duc. 110. opera, al primo ne verrà duc. 66. cauane 4. che deue hauer meno, restano duc. 62. e tanti ne toccherà al primo, e per il secondo ne verrà duc. 44. cauane 6. che deue hauer meno, restano duc. 38. e tanti diremo, che tocchi al secondo.

Propositione 22.

TRe hanno a partire duc. 120. con patto, che il primo ne deua hauere la metà men 8. & il secondo $\frac{1}{2}$. più 10. & il terzo $\frac{1}{2}$. men 6. si domanda quanti ne toccherà per vno. Fà così, perche habbiamo detto, che il più si deue trarre, & il meno si deue aggiungere, perciò aggiungi 8. meno del primo a 120. farà 128. e di questo cauane più 10. del secondo, restano 118. & a questi aggiungi 6. men del terzo compagno, fanno 124. e questo salua per diuidere; e con quest'ordine andresti cauando, & aggiungendo il meno, & il più, secondo la quantità de compagni che fussero. Hora troua vn numero, che habbia l'intiere parti, che domandano, cioè $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, ma non ti naua fangliare, se noi proponiamo semore le ragioni con rotti bassi, e facili; però che questo lo facciamo per più facile intelligenza. Hora tornando al nostro proposito, diceti che il numero, che hauera le parti sopradette sarà 24. ma potresti pigliare ancora che quel numero fusse 12. ouero 36. e 48. & in somma qual numero più ti piacesse, ma per ha iere i numeri più facili all'operate, procura semore di pigliare i minor numeri più facili che puoi trouare, purché habbino intieramente le parti, che vuoi prentere. Fondiamo hora la nostra ragione, che il numero sia 24. pigliane la metà per il primo che è 12. dipoi pigliane $\frac{1}{2}$. per il secondo, che è 8. e pigliane $\frac{1}{4}$. per il terzo per pagno, che è 6. dirai così, il primo deue trarre di duc. 120. ducati per 12. il secondo per 8. & il terzo per 6. che toccherà per vno? trouarai, che al primo toccherà duc. 57 $\frac{1}{2}$. de quali cauane 8. che deue hauer meno, come s'è detto, restano duc. 49 $\frac{1}{2}$. e tanti ne toccherà al primo, dipoi trouarai che al secondo ne verrà duc. 38 $\frac{1}{2}$. aggiungeli duc. 10. che deue hauer di più, faranno duc. 48 $\frac{1}{2}$. e tanti ne toccherà al secondo, dipoi trouarai, che al terzo ne verrà duc. 28 $\frac{1}{2}$. cauane 6. che deue hauer meno, restano duc. 22 $\frac{1}{2}$. e tanti ne toccherà al terzo, fanno prova, sommando quelle che tocca a ciascuno saranno duc. 120. vguale a quelli che doueuan diuidere.

Proposizione 23.

TRe hanno fatto compagnia, & il primo meste lir. 160. & il secondo meste tanto, che di lire 200. che guadagnorno gli toccò lir. 80. & il terzo meste tanto, che gli toccò lir. 50. si domanda quanto meste il secondo, & il terzo. Prima fa bisogno vedere quanto viene al primo del guadagno. Somma lir. 80. che toccano al secondo, con lir. 50. del terzo, fanno lir. 130. e queste toccano infra il secondo, & il terzo di guadagno; adunque al primo toccò il resto fino in lire 200. che sono lir. 70. fatto questo dirai così, se lir. 70. di guadagno del primo, vengono da lir. 160. che meste di capitale, da quante lire di capitale verranno lir. 80. guadagno del secondo, e lire 50. del terzo? opera separatamente nei modi dati, trouarai che il secondo meste lir. 182 $\frac{2}{5}$, & il terzo meste lir. 114 $\frac{2}{5}$.

Proposizione 24.

DVe hanno fatto compagnia, & il primo meste lir. 300. & il secondo meste scudi 45. & hanno guadagnato lir. 200. delle quali al primo toccò lir. 90. & il secondo il resto, che sono lir. 110. si domanda quanto valse lo scudo a lire. Dirai così, se lir. 90. di guadagno del primo, vengono da lir. 300. che meste di capitale, da che capitale verranno lir. 110. guadagno del secondo? opera, te ne verrà lir. 366. sol. 12. den. 4. e queste sono uguali a 45. scudi, che meste il secondo; parti adunque le dette lir. 366. sol. 12. den. 4. per 45. ne verrà lir. 8. sol. 2. den. 11 $\frac{1}{2}$. e tanto diremo, che valse lo scudo.

Proposizione 25.

DVe fanno compagnia, con patti, che ciascuno tiri del guadagno per quel che mette, il primo ha messo lir. 20. più del secondo, & hanno guadagnato lir. 160. delle quali il primo n'ha hauute lir. 84. & il secondo 76. si domanda quanto meste ciascuno. Arguirai così, che da lir. 76. che toccano al secondo, fino in lir. 84. che toccano al primo, v'è di differenza lir. 8. e questi più, toccano di guadagno al primo, perche mette lir. 20. più del secondo, laonde dirai così, se lir. 8. più di guadagno, vengono da lir. 20. più di capitale, da che capitale verranno lir. 84. del primo? e lir. 76. del secondo? opera, trouarai, che il primo mette lir. 210. & il secondo lir. 190.

Proposizione 26.

DVe hanno fatto compagnia, con patto, che ciascuno tragga del guadagno per quel che mette, il primo meste vna quantità, & il secondo meste li $\frac{3}{7}$. di quel che mette il primo, e lir. 24. più, & hanno guadagnato lir. 120. delle quali al primo ne toccò lir. 66. & al secondo lir. 54. si domanda quanto meste ciascuno. Arguirai così, che se il secondo mettesse li $\frac{3}{7}$. di quel che mette il primo

primo, gli douerebbe ancor toccare li due terzi di quel che tocca al primo, piglia adunque li due terzi di lir. 66. che toccorno al primo, ne viene lir. 44. e tanto toccherebbe al secondo; ma di sopra s'è detto, che gli toccò lir. 54. di guadagno, e che messe lir. 24. più che li $\frac{2}{3}$. di quel che messe il primo, e perche dalle lir. 44. alle lir. 54. che veramente li toccorno v'è di differenza lir. 10. le quali vengono ad essere il guadagno di lir. 24. perciò dirai così, se lire 10. più di guadagno, vengono da lir. 24. più di capitale, da che capitale verranno lir. 66. di guadagno del primo? e lir. 54. del secondo? opera, per il primo ne verrà lir. $158\frac{2}{3}$. e tanto messe, e per il secondo ne verrà lir. $129\frac{1}{3}$. e tanto messe, fanne proua, piglia $\frac{2}{3}$. di lir. $158\frac{2}{3}$. che mette il primo, ne viene lir. $105\frac{1}{3}$. aggiungi le lir. 24. che mette di più, fanno lir. $129\frac{1}{3}$. come doueua.

Proposizione 27.

DVe hanno fatto compagnia, con patti che ciascuno tragga per quel che mette; il primo messe li $\frac{2}{3}$. e lire 60. più di quello che mette il secondo, & hanno guadagnato lir. 320. delle quali al primo ne toccò lir. 190. & al secondo lire 130. si domanda quanto messe ciascuno. Perche noi habbiamo detto che ciascuno deue trarre per quel che mette, & al secondo toccandoli meno del guadagno, che non tocca al primo, si conclude, che habbia messo meno del primo, di manierache se il primo mettesse li $\frac{2}{3}$. di quel che mette il secondo, gli douerebbe ancor toccare li $\frac{2}{3}$. di quel che tocca al secondo, cioè li $\frac{2}{3}$. di lire 130. che sono lir. 104. e di sopra si disse, che gli toccò lir. 190. che da 104. fino in 190. v'è di differenza lir. 86. e queste vengono a essere il guadagno delle lir. 60. che messe di più il primo, Laonde, dirai così, se lir. 86. più di guadagno vengono da lir. 60. più di capitale, da che capitale verranno lir. 190. che è il guadagno del primo? e lir. 130. guadagno del secondo? opera per il primo ne verrà lir. $132\frac{2}{3}$. e tanto messe nella compagnia, e per il secondo ne verrà lir. $90\frac{1}{3}$. e tanto messe nella compagnia, fanne proua, piglia $\frac{2}{3}$. di lir. $90\frac{1}{3}$. ne viene lir. $72\frac{2}{3}$. & a questo aggiungi le lir. 60. più che messe il primo fanno lir. $132\frac{2}{3}$. come doueua.

Proposizione 28.

DVe fanno compagnia, con patto, che ciascuno tragga per quel che mette, il primo messe due tanti del secondo, e lir. 60. più & hanno guadagnato lir. 260. al primo ne toccò lir. 180. & al secondo lir. 80. si domanda quanto messe ciascuno. Arguisci così, che se il primo hauesse messo due tanti del secondo, douerebbe ancora hauere del guadagno due tanti del secondo, cioè due tanti di lir. 80. che fariano lir. 160. e noi habbiamo detto che li toccò lir. 180. adunque cauò lir. 20. più di due tanti del secondo, le quali vengono a essere il guadagno delle lir. 60. che messe di più il primo, per la qualcosa dirai così, se lir. 20. di guadagno, vengono da lir. 60. di capitale, da che capitale verranno lir. 180. guadagno del primo? e lir. 80. guadagno del secondo? opera, per il primo ne verrà lir. 540. e tanto messe nella compagnia, e per il secondo ne verrà lir. 240. per la qual quantità che messe, fanne proua, raddoppia i denari che messe

mette il secondo, cioè *lir. 240.* fanno *lir. 480.* & a queste aggiungi *lir. 60.* che mette di più il primo, faranno *lir. 540.* come di ragione doucua.

Proposizione 29.

TRe hanno fatto compagnia, con patto, che quando il primo caua 2. del guadagno, il secondo ne caui 3. e quando il secondo ne caua 4. il terzo ne caui 5. si domanda hauendo guadagnato *duc. 455.* quanti ne toccherà per vno. Noi habbiamo che quando al secondo tocca 3. di guadagno, al primo tocca 2. resta a vedere quando al secondo tocca 4. quanto toccherà al primo, perche dirai così, se quando il secondo caua 3. di guadagno, il primo caua 2. il secondo cauando 4. quanto douerà cauare il primo? moltiplica 4. via 2. fa 8. e questo parti per 3. ne viene $2\frac{2}{3}$. e così diremo, che quando al primo toccherà del guadagno $2\frac{2}{3}$. al secondo toccherà 4. & al terzo toccherà 5. di maniera che quando il primo mette $2\frac{2}{3}$. il secondo mette 4. & il terzo mette 5. & hanno a partire *duc. 455.* che toccherà per vno? opera, per modo di compagnia, al primo toccherà *104. duc.* al secondo *156.* & al terzo *195.* fanne proua.

$$\begin{array}{r}
 3 \quad 2 \quad 4 \\
 \hline
 8 \\
 2\frac{2}{3}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 2\frac{2}{3} \\
 4 \\
 \hline
 5
 \end{array}
 \quad
 \left. \begin{array}{l}
 \\
 \\
 \end{array} \right\} 455$$

Partitore. $11\frac{1}{3}$.

Proposizione 30.

DVe hanno fatto compagnia, il primo messé *duc. 300.* il secondo *duc. 460.* & tolsero vn fattore, al quale son d'accordo darli per suo salario a ragione di 10. per cento del guadagno, & infine della compagnia si trouorno di guadagno *duc. 650.* si domanda quanti ne toccherà per vno; prima, bisogna cauare quelli che deue hauere il fattore, e dirai così, se di 100. *duc.* se ne deue dar 10. al Fattore, quanti conuerà dargliene di *duc. 650.* opera, trouirai, che bisognerà dargliene 65. i quali caua di 650. restano *duc. 585.* da diuiderli fra il primo, e secondo per rata di quel che mettono, opera, al primo toccherà *duc. 230 $\frac{1}{2}$.* & al secondo *duc. 354 $\frac{1}{2}$.* & al fattore *duc. 65.* come di sopra s'è detto.

Proposizione 31.

TRe hanno insieme per indiuiso vn frantoio da Olio, & vn molino da grano, da quali il primo deue partecipare per *duc. 150.* il secondo per *duc. 190.* & il terzo per *duc. 210.* e questi due e liiti l'affittano ogn'anno per staia 80. di grano. e libb. 150. d'olio alla grossa, e vi hanno di spesa ogn'anno *lir. 24.* si domanda quanto grano, & olio, e spesa toccherà per vno. Fa così, somma insieme la parte del primo, cioè *duc. 150.* con la parte del secondo, e del terzo, fanno *duc. 550.* il quale caua per partitore, dipoi moltiplica staia 80. di grano via *duc.*

250.

250. che è la parte del primo, farà 12000. il qual parti per 650. ne viene $12\frac{2}{7}$. e tante staia di grano toccherà al primo, opera nel medesimo modo per il secondo, e per il terzo, trouarai, che al secondo li toccherà staia $23\frac{1}{7}$. di grano, & al terzo gli ne toccherà staia $38\frac{2}{7}$. e con il medesimo ordine diuiderai l'olio, e la spezia, che per esser cosa facile non ci estenderemo più oltre.

Propositione 32.

TRe hanno fatto compagnia, il primo mette lir. 8400. & il secondo mette canne 420. di panno, & il terzo mette libb. 16000. di lana, & alla fine si trouano di guadagno lir. 12000. delle quali al primo ne toccò lir. 3200. & al secondo lir. 4500. & al terzo lir. 4300. si domanda quante fu valutato la canna, del panno, e quanto il cento della lana. Noi habbiamo, che al primo toccò di guadagno lir. 3200. mediante il capitale di lir. 8400. che mette nella compagnia, perche dirai così, se lire 3200. di guadagno, vengono da lir. 8400. di capitale, da che capitale verranno lir. 4500. guadagno del secondo? opera, verranno da capitale di lir. $118\frac{1}{2}$. e tante furono valutate le canne 420. di panno; e volendo trouare qualche valse la canna, parti lir. $118\frac{1}{2}$. per 420. ne viene lir. 28. sol. 2. den. 6. e tanto fu valutata la canna. Dipoi per il terzo compagno dirai così, se lir. 3200. di guadagno, vengono da lir. 8400. di capitale, da che capitale verranno lir. 4300. guadagno del terzo? opera, verranno da capitale di lir. $112\frac{7}{8}$. e tanto furono valutate le libb. 16000. di lana; che volendo vedere qualche vale il cento, dirai in questo modo, se libb. 16000. ouero, se 160. centinaia cessano lir. $112\frac{7}{8}$. che costerà vn centinaio? parti $1128\frac{7}{8}$. per 160. ne viene lir. 70. sol. 10. den. 11. e tanto fu prezzato il cento della lana; e così farai quando fussero più oltre con altre diuersità di mercantie.

Propositione 33.

TRe hanno fatto compagnia; il primo mette duc. 300. e sette nella compagnia 18. mesi, & il secondo mette duc. 420. e sette nella compagnia vn' anno, & 8. mesi, & il terzo mette duc. 500. e sette nella compagnia 2. anni, & alla fine si trouano di guadagno duc. 600. domando quanti ne toccherà per vno. Prima riduci gl'anni a mesi, per hauere vna sola natura nelle multiplicationi; dipoi tieni questo per regola generale, di multiplicar sempre la quantità de' denari, che ciascuno mette separatamente, via la quantità e mesi, che stà nella compagnia, e perche il primo mette duc. 300. e stà 18. mesi nella compagnia, multiplica 18. via 300. fa 5400. e questo metti da parte, e dirai, che tra tempo, e denari il primo mette 5400. e per il secondo multiplica duc. 420. che mette via mesi 20. che stette nella compagnia, farà 8400. e tanto mette il secondo tra tempo, e denari. Dipoi per il terzo, multiplica duc. 500. che mette via 24. mesi che stette nella compagnia, farà 12000. e questo mette tra tempo, e denari il terzo. Hora siamo nella compagnia diritta, e diremo, che il primo mette 5400. il secondo 8400. & il terzo 12000. & hanno guadagnato duc. 600. vediamo quanti ne tocca per vno. Senza indiarci i capitali di tutti tre, cioè qualche

adotto

mettono fra tempo, e denari, fanno 26000. e questo farà partitore; dipoi moltiplica separatamente qualche mette il primo fra tempo, e denari, che è 5400. via quel che hanno guadagnato, che è duc. 600. & il prodotto parti per 26000. ne viene duc. $124\frac{2}{7}$, e tanti ducati toccherà al primo; opera per il secondo nel medesimo modo, te ne verrà duc. $198\frac{2}{7}$. e tanti ne toccherà al secondo; e per il terzo te ne verrà $276\frac{2}{7}$. e tanti ducati toccherà al terzo.

Proposizione 34.

TRe hanno fatto compagnia, nella quale il primo mette duc. 30. il secondo duc. 35. & il terzo duc. 45. con patto, che douesse durar 5. anni, & alla fine partire per terzo utile, danno, e capitale. Accade, che la compagnia non durò se non tre anni, e trouoronsi di guadagno duc. 202. si domanda quanto toccherà per vno tra guadagno, e capitale. Prima, somma insieme il capitale di tutti tre, cioè 110. 35. fanno duc. 110. & a questi aggiungi duc. 202. che hanno guadagnato, fanno duc. 312. e questi diuiderai per rata di quel che ha messo ciascuno separatamente, come semplice compagnia, opera, trouarai che al primo ne verrà duc. $85\frac{2}{7}$. al secondo duc. $99\frac{2}{7}$. & al terzo duc. $127\frac{2}{7}$. e questa sarebbe la giusta partitione di ciascuno, se non ci fusse conuenzione alcuna. Ma perche si disse, che se la compagnia duraua 5. anni, doueano diuidere per terzo li duc. 312. ouero quella quantità, che fra capitale, e guadagno si fussero trouata; hor poniamo che in capo di 5. anni si fussero trouati fra capitale, e guadagno duc. 312. sopradetti, delli quali a ciascuno sarebbe toccato duc. 104. e noi habbiamo detto, che al primo senz'altra conuenzione gli toccherebbe duc. $85\frac{2}{7}$. che tratti di duc. 104. restano duc. $18\frac{2}{7}$. e questi hauerebbe guadagnati il primo, se la compagnia duraua 5. anni, e perciò dirai così, se in 5. anni guadagnaua duc. $18\frac{2}{7}$. quanto guadagnerà in 3. anni? opera, guadagnerà duc. $11\frac{2}{7}$. e questi aggiungi a duc. $85\frac{2}{7}$. che gli toccorno di prima, faranno duc. $96\frac{2}{7}$. e tanto toccherà al primo fra capitale, e guadagno, dipoi per il secondo, che gli venne duc. $99\frac{2}{7}$. e se la compagnia duraua 5. anni, gli veniuu duc. 104. adunque in 5. anni gli veniuu duc. $4\frac{2}{7}$. piu; di maniere che in 3. anni alla medesima ragione, guadagnarebbe duc. $2\frac{2}{7}$. i quali aggiunti a duc. $99\frac{2}{7}$. che gli toccorno di prima, fanno duc. 102. e tanto toccherà al secondo fra capitale, e guadagno. Dipoi, per il terzo, che gli venne duc. $127\frac{2}{7}$. e se la compagnia duraua 5. anni, gliene veniuu 104. adunque veniuu a perdere duc. $23\frac{2}{7}$. e così dirai, se in 5. anni perdeua duc. $23\frac{2}{7}$. quanto perderà in 3. anni? opera, trouarai, che perderà duc. $14\frac{2}{7}$. che tratti di duc. $127\frac{2}{7}$. restano duc. $113\frac{2}{7}$. e tanti ne toccherà al terzo, fanne proua, sommâdo qualche tocca a ciascuno, trouarai che faranno duc. 312. piu, o meno che facessero stia male.

Potemo per altro modo peruenire alla medesima conclusione. Hora ci sia proposta la medesima compagnia. Noi diciamo vederli manifestamente, che se la compagnia hauesse durato 5. anni, e non hauesse guadagnato, nè perso, di necessità bisognaua, che partissero per terzo il capitale che messero, perciò somma insieme quel che messe ciascuno, cioè 30. 35. e 45. fanno 110. e questo parti per 3. ne viene duc. $36\frac{2}{3}$. per vno, di maniere che il primo hauendo messo duc. 30. e toccandoli duc. $36\frac{2}{3}$. guadagnarebbe duc. $6\frac{2}{3}$. & il secondo che messe

duc.

duc. 35. e toccandoli duc. $36\frac{2}{3}$. guadagnarebbe duc. $1\frac{2}{3}$. & il terzo, che nasse duc. 45. e toccandoli duc. $36\frac{2}{3}$. perderebbe duc. $8\frac{1}{3}$. hora cominciarai dal primo, e dirai così, se in cinque anni guadagnaua duc. $6\frac{2}{3}$. quanto guadagnerà in tre anni? opera, guadagnerà duc. 4. e questi aggiungi a duc. 0. che messe di prima fanno duc. 34. e tanto tornarebbe il capitale del primo in tre anni. Dipoi per il secondo, dirai: se in 5. anni guadagnaua duc. $1\frac{2}{3}$, quanto guadagnerà in 3. anni? opera, guadagnerà duc. 1. apunto, e questo aggiungi a duc. 35. suo primo capitale sarà duc. 36. e tanto tornarbbe il capitale del secondo in 3. anni; hor per il terzo dirai così, se in 5. anni perdeua duc. $8\frac{1}{3}$. quanto perderà in 3. anni, opera, perderà duc. 5. e questi caua di duc. 35. suo primo capitale restano duc. 40. e tanto tornarebbe il capitale del terzo compagno in 3. anni. Hora tu sei in compagnia diuita, perliche dirai così. Tre fanno compagnia, il primo mette duc. 34. il secondo duc. 36. & il terzo 40. & hanno guadagnato duc. 202. che tocca per vno? opera nei modi dati, al primo toccherà duc. $62\frac{2}{3}$, al secondo duc. $66\frac{2}{3}$. & al terzo duc. $73\frac{1}{3}$. Fatto questo noi habbiamo, che il capitale del primo tornò duc. 34. e del guadagno sopradetto li tocca duc. $62\frac{2}{3}$. che giunti insieme fanno duc. $96\frac{2}{3}$; e tanto tocco al primo fra guadagno, e capitale; & al secondo, il suo primo capitale gli tornò duc. 36. e del guadagno gli tocca duc. $66\frac{2}{3}$. che giunti insieme, fanno duc. $102\frac{2}{3}$. per il capitale, e guadagno del secondo. Dipoi per il terzo compagno, il suo primo capitale gli tornò duc. 40. e di guadagno gli tocca duc. $73\frac{1}{3}$. che giunti insieme, fanno duc. $113\frac{1}{3}$. e tanto tocco al terzo, fra capitale, e guadagno, come di sopra per il primo operare ne venne.

Propositione 35.

TRe hanno fatto compagnia, nella quale hanno posto somme vguali di denari, & hanno guadagnato duc. 1000. in vn'anno, & il primo lasciò i suoi denari 7. mesi in detta compagnia, & il secondo leuò i suoi dopo 6. mesi, & il terzo li lasciò fino alla fin dell'anno, si domanda quanti ne toccherà per vno. Fa così, somma insieme tutti li mesi, che lasciarono i lor denari nella cōpagnia, faranno 25. dipoi dirai in questo modo; Se in 25. mesi si guadagna duc. 1000. quanti se ne guadagnerà in 7. mesi? e quanto in 6? e quanto in 12? multiplica, e parti secondo le regole date, trouarai che al primo toccherà duc. 280. al secondo duc. 240. & al terzo duc. 480.

Propositione 36.

Qattro hanno a partire tra di loro duc. 785. con questo patto, che quante volte il primo hauerà 10. tante volte il secondo habbia 7., e quante volte il secondo hauerà 14. tante volte il terzo habbia 3. e quante volte il terzo hauerà 12. tante volte il quarto habbia 9. si domanda quanti ne toccherà a ciascuno. Fa così, comincia dal quarto compagno, e poni che habbia vna volta 9. hauerà adunque il terzo vna volta 12. ma perche quante volte il terzo ha 3. tante volte il secondo deuè hauer 14. e partirai 12. del terzo per 3. ne verrà 4. che mostra nel 12. quattro volte esse: contenuto il tre, multiplica adunque 4. via

4. via 14. fa 56. cioè il numero del secondo, nel quale il 14. tante volte si contiene quante volte il 3. nel 12. si ritroua, e perche quante volte il secondo ha 7. tante volte il primo deue hauer 10. se partiremo 56. cioè il numero del secondo per 7. ne verrà 8. multiplica adunque 10. via 8. farà 80. cioè il numero del primo, nel quale tante volte si contiene il 10. quante volte il 7. in 56. e così le parti di 785. deono hauere le propositioni di questi numeri 80. 56. 12. 9. perciò che in questa maniera, tante volte il primo hauerà 10. quante volte il secondo 7. e tante volte il secondo 14. quante volte il terzo 3. e quante volte il terzo 12. tante volte il quarto 9. diuidi hora i sopradetti denari a modo di compagnia, trouarai che al primo toccherà duc. 400. al secôdo 280. al terzo 60. & al quarto 45.

Poteuasi ancora soluere in quest'altro modo, cioè, quando il primo ha 10. il secondo ha 7. poni 10. per il primo, e 7. per il secondo, dipoi quando il secondo ha 14. il terzo ha 3. dirai così, se quando il secondo ha 14. il terzo ha 3. quanto hauerà il terzo, quando il secondo hauerà 7? multiplica 7. via 3. fa 21. il qual parti per 14. ne viene $1\frac{3}{2}$. e tanto hauerà il terzo, quando il secondo hauerà 7. dipoi per il quarto dirai così, se quando il terzo ha 12. il quarto ha 9. quanto hauerà il quarto, quando il terzo hauerà $1\frac{3}{2}$? multiplica $1\frac{3}{2}$. via 9. fa $13\frac{1}{2}$. il qual parti per 12. ne viene $1\frac{1}{4}$. e tanto hauerà il quarto, quando il terzo hauerà $1\frac{3}{2}$. Fatto questo, opera come se fusse vna semplice compagnia, dando al primo 10. quando al secondo 7. e quando al terzo $1\frac{3}{2}$. e quando al quarto $1\frac{1}{4}$. trouarai, che tornerà il medesimo che venne per il primo operare.

Propositione 37.

DVe hanno fatto compagnia per tre anni, cominciata a dì primo Gennaio 1588. e finita a dì primo di Gennaio 1591. & il primo mese duc. 800. & a dì primo d'Aprile di detto Anno ne cauò duc. 200. & a dì primo Giugno 1589. rimessè nella compagnia duc. 300. & il secôdo mese a dì primo di Luglio 1588. duc. 600. & a dì primo d'Ottobre di detto anno vi rimessè duc. 300. & a dì primo di Marzo 1589. ne cauò duc. 200. & alla fine si trouorno di guadagno duc. 800. si domanda quanti ne toccherà per vno. Poteuamo formare questa proposta di più compagni, e più trauagliata di tempi, con tratte, e rimessè di denari, ma perche solo apportarebbe fatica, e non scienza, perciò di due compagni soli c'è piaciuto proporla, la quale ti seruirà per guida d'ogn'altra simile.

Per non generare adunque confusione nel tempo, che si deue multiplicare, contro i denari che ciascul di loro mette nella compagnia, dirai così. Il primo mette duc. 800. per 3. anni, presupponendo, che non rimetta, e ci i altri denari della compagnia, multiplica adunque 800. via 36. mesi, fa 28800. e questo metterebbe il primo tra tempo, e denari, se non rimuouessè denari della compagnia; ma dice, che a dì primo Aprile del primo anno cauò duc. 200. adunque questi duc. 200. itanno fuori della compagnia dal dì primo d'Aprile 1588. fino alla fine delle tre annate, cioè fino al dì primo di Gennaio 1591. che dura la compagnia, che vi corre di tempo mesi 33. perciò multiplica 200. via 33. fa 6600. il quale caua di 28800. resta 22200. ma perche dice, che a dì primo Giugno 1589. rimette nella compagnia duc. 300. i quali vengono a seruire la compagnia fino alla fine di 3. anni, che sono mesi 39. perciò multiplica 300. via 39. fa

19. fa 5700. e questo aggiungi a 22200. farà in tutto 27. co. e questo è quello che viene a mettere il primo tra tempo, e denari. Hora per il secondo, vedi quanto tempo verrebbe a tenere 600. duc. nella compagnia, presupponendo, che non rimetta, o cavi altri denari; & aonde tu vedi, che dal di primo Luglio del primo anno, che mette duc. 600. fino alla fine de' 3. anni, cioè fino al di primo di Gennaio 1591. vi corre 30. mesi, perciò moltiplica 600. via 30. fa 1. 800. e questo metterebbe il secondo tra tempo, e denari, se non rimettesse, o causasse altri denari; ma perche a di primo d'Octobre 1588. vi rimette duc. 300. i quali vengono a scuire nella compagnia fino alla fine delle tre annate, cioè mesi 27. perciò moltiplica 300. via 27. fa 8100. e questo aggiungi a 1. 000. fa 26100. e perche a di primo di Marzo 1589. cauò 200. ducati, bisogna adunque vedere quanti mesi questi 200. ducati stanno fuori della compagnia, per il che tu vedi, che dal di primo di Marzo 1589. fino al di primo di Gennaio 1591. che finisce la compagnia, vi corre mesi 22. perciò moltiplica 200. via 22. fa 4400. e questo cauà di 26100. resta 21700. e questo è quello, che al netto viene a mettere il secondo compagno tra tempo, e denari. Hora tu sei in compagnia diritta, & hai che il primo mette 27900. & il secondo 21700. & hanno guadagnato duc. 800. vedi quel che tocca per vno, trouarai che al primo tocca duc. 450. & al secondo duc. 350. e così farai le simili.

Proposizione 38.

TRe hanno fatto compagnia per vn'anno, cominciata a di primo di Gennaio, e finita come segue. Il primo messè duc. 60. & il secondo messè a di 1. Marzo, tanto che del guadagno trasse la terza parte di quel che trasse il primo, & il terzo compagno messè a di primo Luglio tanto, che del guadagno li toccò il quarto di quel che toccò al primo, si domanda quanto messè il secondo, e quanto il terzo separatamente. Farai così, moltiplica i denari che n'essè il primo, cioè duc. 60. via tutto il tempo che stette nella compagnia, che sono mesi 12. farà 720. e questo mette il primo tra tempo, e denari; e perche il secondo compagno deuè tirare la terza parte di quel che tira il primo, bisogna ancora, che metta la terza parte di quel che mette il primo, perciò piglia il $\frac{1}{3}$. di 720. che è 240. e questo conuienè, che sia il tempo, e denari del secondo, e perche stette nella compagnia mesi 10. parti 240. per 10. ne viene 24. e questi sono i ducati che messè il secondo nella compagnia. Dipoi per vedere qualche messè il terzo, il quale doueuà trarre la quarta parte del primo, parti adunque 720. per 4. ne viene 180. e tanto mette il terzo compagno tra tempo, e denari; ma perche stette nella compagnia 6. mesi, parti 180. per 6. ne vien 30. e tanti ducati messè il terzo. Fanne proua, ponendo che habbiano a partire vna quantità di denari qual ti piace, e ti verrà secondo le propositioni sopradette. Sappi che simili proposte si possono dare di quattro, e cinque, e piu compagni, ma bisogna auuertire, che le parti quali debbon trarre del guadagno non eccedino l'vnita.

Proposizione 39.

TRe hanno fatto compagnia, & il primo messè tanti ducati, che del guadagno trasse 12. per cento, & il secondo ne messè tanti, che del guadagno

trasse

traffe a ragione di 22. per cento, & alla fine si trouorno di guadagno duc. 1800. si domanda quanti ne toccherà per vno, e quanti ne melle ciascuno. Questa proposta non richiedeua domandare quanto melle ciascuno, nientedimeno per dimostrare la forza della solutione, c'è piaciuta proporla. Volendo hora sapere quanto traffe ciascuno del guadagno (stante il termine che più volte s'è detto, che qual parte si trae del guadagno, tal parte si mette del monte) dirai così, il primo mette 12. il secondo 16. & il terzo 22. & hanno guadagnato duc. 1800. che tocca per vno? trouarai che al primo toccherà duc. 432. al secondo 576. & al terzo 792. volendo hor trouare quanto melle ciascuno, non ha dubbio alcuno, che tutti messero vguualmente, e che questo si a vero, si ritroua, così dicendo. Se 12. guadagno del primo vien da 100. capitale, da che verrà 432. che li toccò di guadagno? opera, verrà da 3600. e tanto melle il primo, e così farai per il secondo, e terzo, e trouarai che ciascuno mette duc. 3600. Poterai ancora trouare quel che mette ciascuno in questo modo, cioè. Somma insieme quel che deue tirar per cento ciascuno, cioè 12. 16. 22. fa 50. e questo è il guadagno che tirano fra tutti tre, il capitale adunque di 50. sarà 300. e perciò dirai se 50. viene da capitale di 300. da che capitale verrà 1800? multiplica, e parti, ne verrà 10800. e tanto messero fra tutti tre i compagni, perche parti 10800. per 3. ne viene 3600. e tanto melle ciascuno. Fanne proua dicendo.

Tre hanno fatto compagnia, e ciascuno di loro melle duc. 3600. & il primo deue trarre del guadagno 12. per cento, il secondo 16. per cento, & il terzo 22. per cento, & hanno guadagnato duc. 1800. domanda quanti ne toccherà per vno. Volendo soluer questa, farai così, multiplica duc. 3600. di capitale del primo via quello, che vuol trarre per cento, cioè via 12. fa 43200. e così farai per il secondo, & hauerai 57600. & per il terzo 79200. dipoi dirai così, il primo mette 43200. il secondo 57600. & il terzo 79200. & hanno a partire duc. 1800. che tocca per vno? opera, al primo toccherà duc. 432. al secondo 576. & al terzo 792. e questo medesimo ordine terrai quando mettesero quantità diuerse. cioè che non mettesse tanto l'vno, quanto l'altro. Potrebbe si intorno a tal dimostrazione a durre molte ragioni, ma perche habbiamo più mira alla breuità, & alle cose più utili, che perciò non diremo altro sopra questo fatto.

Proposizione 40.

Tre hanno fatto compagnia, e tra il primo, e secondo messero duc. 40. e tra il primo, e terzo messero duc. 60. e tra il secondo, e terzo, messero duc. 50. & hanno guadagnato duc. 200. si domanda quanti ne toccherà per vno. Prima bisogna trouare quanto melle ciascuno separatamente, perciò somma insieme 40. 60. 50. fanno 150. e questo per regola ferma partirai sempre per vn meno che non sono gli homini, cioè per 2. ne viene 75. e di questo caua a vna, a vna le dette quantità, cioè di 75. cauaue 40. 60. e 50. resta 35. 15. e 25. Hora tu sei in compagnia diritta, e dirai così, il primo mette 25. il secondo 15. & il terzo 35. & hanno guadagnato duc. 200. che tocca per vno? opera, trouarai che al primo toccherà duc. 66 $\frac{2}{3}$. al secondo duc. 40. & al terzo duc. 93 $\frac{1}{3}$. & habbiamo che il primo mette 25. & il secondo 15. che in tutto fanno 40. come si propose, e tra il primo, e terzo messero duc. 60. e così tra il secondo, e terzo messero duc. 50. come la proposta richiede.

Proposizione

Proposizione 41.

TRe hanno fatto compagnia per certo tempo, il primo mēse duc.40. e stette nella compagnia 12. mēsi, e del guadagno li toccò duc. 20. & il secondo mēse duc.40. a tal tempo, che del guadagno li toccò duc.15. & il terzo stette nella compagnia mēsi 10. e mēse tanto, che del guadagno li toccò il resto, che fu duc.25. si domanda quanto stette il secondo nella compagnia, e quanti ducati mēse il terzo. Fa così, prima troua quanto mette il primo tra tempo e denari, multiplica il suo tempo, che è mēsi 12. via duc. 40. che mēse, fa 480. dipoi dirai così, se duc.20. guadagno del primo, vien da tempo, e denari di 480. da che tempo, e denari insieme verrà 15. guadagno del secondo? opera, verrà da 360. e questo sarà tempo, e denari del secondo, il quale parti per li denari che mēse, cioè per 40. ne vien 9. e tanti mēsi stette nella compagnia. Dipoi per il terzo nel medesimo modo dirai, se 20. di guadagno vien da 480. tra tempo, e denari, da che verrà 25. guadagno del terzo? opera, trouarai che il tempo, e denari del terzo sarà 600. qual parti per il tempo che serui la compagnia, cioè per mēsi 10. ne vien 60. e tanti ducati mēse il terzo compagno.

40	12	20	480	15	25
480			7200	12000	
		40)	360.	10)	600.
			9.		60.

Il secondo stette nella compagnia mēsi 9. & il terzo mēse duc.60.

Proposizione 42.

TRe hanno fatto compagnia per vn'anno, il primo mēse a di primo di Gennaio duc.120.& il secondo mēse ad i. Marzo lir.600.& il terzo mēse ad i. di Maggio pezze 5. di panno, & alla fine si trouorno di guadagno duc. 400. de'quali al primo toccò duc.90. al secondo duc.120.& al terzo duc.190. domanda quante lire si valutato il ducato, e quanti ducati costò la pezza del panno. Prima bisogna trouare quanto mette il primo tra tempo, e denari, multiplica il suo tempo che è mēsi 12. via duc.120. che mēse, fa 1440. e questo mette il primo tra tempo, e denari, dipoi dirai così, se duc.90. che toccorno di guadagno al primo, vengono da 1440. tra tempo, e denari, da che verranno duc.120. che toccorno di guadagno al secondo? opera, verranno da 1920. e questo sarà tempo, e denari del secondo, il qual parti per il tempo, che stette nella compagnia, cioè per mēsi 10. ne viene 192. e tanti ducati metterà il secondo, & egli mēse lir.600. adunque queste lire sono vguale a duc.192. per il che parti lir. 600. per 192. ue vien lir.3 $\frac{1}{3}$. e tante lire si valutato il ducato. Hora per il terzo compagno dirai così, se duc.90. vengono da 1440. tra tempo, e denari, da che verranno duc.190. che toccorno di guadagno al terzo? opera, ne verrà 3040. e questo sarà tempo, e den. del terzo qual parti per 8. mēsi che stette nella compagnia, ne viene 380. e tanti ducati douera mettere il terzo, e mēse 5. pezze 0. panno, adunque furono stimate duc.380. parti 380. per 5. ne vien 76. duc. per pezza.

L

Proposizione

Proposizione 43.

TRe hanno fatto compagnia per vn'anno; il primo mēse adì 1. di Gennaio duc. 120. e del guadagno deue trarre la metà, & il secondo a dì 1. Marzo mēse tanto, che del guadagno li toccò il terzo di quel che toccò al primo, & il terzo mēse duc. 60. a tal tempo, che del guadagno li toccò il quarto di qualche toccò al primo, domando quanto mēse il secondo, e quanti mesi stette nella compagnia. Fa così, troua il tempo, e denari del primo, multiplica duc. 120. uia mesi 12. fa 1440. e tanto mēse il primo tra tempo, e denari, e perche dice, che al secondo li toccò il terzo di quel che toccò al primo, adunque conuien che metta fra tempo, e denari il terzo di quel che mette il primo, e perciò piglia $\frac{1}{3}$. di 1440. ne uiene 480. e questo uiene a mettere il secondo fra tempo, e denari, il qual per 10. mesi che stette nella compagnia ne uien 48. e tanti ducati mēse il secondo. Hora per il terzo, dice che del guadagno li toccò il $\frac{1}{4}$. di quel che toccò al primo, adunque bisogna che metta il quarto tra tempo, e denari di quel che mēse il primo, per il che piglia il quarto di 1440. ne uiene 360. e tanto mette il terzo fra tempo, e denari, qual parti per duc. 60. che mēse nella compagnia, ne uiene 6. e mesi 6. stette nella compagnia.

Proposizione 44.

TRe hanno fatto compagnia per vn'anno, il primo mēse adì 1. Gennaio duc. 120. e del guadagno deue hauer la metà, & il secondo adì primo Marzo mēse tanto, che del guadagno li toccò il terzo, & il terzo compagno mēse duc. 60. a tal tempo, che del guadagno li toccò il $\frac{1}{4}$. domando quanto mēse il secondo, & a che tempo entrò il terzo nella compagnia. Questa è molto differente alla sopradetta; se ben pare, che sia vniforme, perciò che in questa si domanda le parti, cioè la metà, il 3. & il 4. di tutto il guadagno, e nella sopradetta si domanda il terzo, & il quarto di quel che tocca al primo, e non di tutto il corpo del guadagno, perciò farai in questo modo, e prima. Troua il tempo, e denari del primo, multiplica duc. 120. uia 12. mesi fa 1440. fatto questo troua vn numero, che habbia le sopradette parti, le quali vogliono trarre del guadagno, cioè $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. opera nei modi dati, ouero piglia vn numero a beneplacito che habbia le sopradette parti, e non auanzi rotti, hor pigliamo 12. del quale prendi la metà, che è 6. & il $\frac{1}{3}$. è 4. & il quarto è 3. dipoi dirai così, se 6. che è la metà per il primo vuole di capitale 1440. fra tempo, e denari, che capitale fra tempo, e denari vorrà 4. del secondo? multiplica 4. uia 1440. fa 5760. e questo parti per 6. ne viene 960. e questo sarà il tempo, e denari del secondo, qual parti per il tempo, che stà nella compagnia, che è 10. mesi ne vien 96. e tanti ducati diremo, che mēse il secondo. Dipoi per il terzo compagno dirai così, se 6. vuol fra tempo, e denari 1440. che vorrà 3. del terzo? opera vorrà 720. e questo sarà tempo, e denari del terzo compagno, qual parti per duc. 60. che mēse, ne vien 12. e tanti mesi tenne il terzo compagno i suoi denari nella compagnia, adunque li mēse adì 1. Gennaio, come fece il primo compagno, & è fatta. Hora puoi mettere che habbino a partire vna quantità di denari, come ti piace, laquale

la quale verrà diuifa proportionatamente fecondo la propofita, cioè che il primo habbia a trarre la metà, il fecondo $\frac{1}{3}$. & il terzo $\frac{1}{6}$. opera in queſto modo, dicendo, ſe il primo deue trarre per metà, biſogna ancora, che metta per metà, adunque ſe fra tempo, e denari mette 1440. il tutto ſarà il doppio di 1440. cioè 2880, e ſe il fecondo deue trarre $\frac{1}{3}$. deue ancora mettere il $\frac{1}{3}$. e mettendo fra tempo, e denari 960. viene a mettere il terzo di 2880. e coſi, ſe il terzo compagno deue trarre per $\frac{1}{6}$. conuien che metta per $\frac{1}{6}$. e mettendo fra tempo, e denari 720. viene a mettere il $\frac{1}{6}$. di 2880. e coſi con queſta dichiarazione ſi dimoſtra, che volendo diuidere vna quantità di denari fra li ſopradetti tre compagni, cō i ſopradetti patti, che ſe il primo mette fra tempo, e denari 1440. & il fecondo 960. & il terzo 720. ne ſegue, che il primo trarrà di detta quantità per metà, il fecondo per $\frac{1}{3}$. & il terzo per vn $\frac{1}{6}$. conforme alle conuentioni.

Propoſitione 45.

TRe hanno fatto compagnia per vn'anno, il primo meſſe adì 1. Gennaio due. 120. & il ſecōdo adì 1. Marzo meſſe lir. 432. & il terzo meſſe adì 1. Luglio canne 20. di panno, e quando furono alla fin dell'anno, il primo traſſe del guadagno $\frac{2}{3}$. il ſecōdo $\frac{1}{3}$. & il terzo $\frac{1}{6}$. ſi domanda quante lire valſe il ducato, e quanto la canna del panno. Fà coſi, troua il tempo, e denari del primo, moltiplica duc. 120. che meſſe via 12. meſi che ſtette nella compagnia, fa 1440. e perche il ſecōdo deue tirare il terzo di quel che tira il primo, perciò vedi $\frac{1}{3}$. che parte ſia di $\frac{2}{3}$. che vuol trarre il primo, opera ne' nodi dati, trouarai, che ſarà $\frac{1}{3}$. adunque il ſecōdo tirò $\frac{1}{3}$. di quel che tirò il primo, perliche ne ſegue che lui metteſſe $\frac{1}{3}$. fra tempo, e denari di quel che meſſe il primo, cioè 1080. qual parti per il tempo, che ſtette nella compagnia, che ſono 10. meſi, ne viene 108. e tanti ducati doueua mettere il ſecōdo, e noi habbiamo detto che meſſe lir. 432. che ſono la valuta di 108. ducati, adunque il ducato val' è lir. 4. Hora per il terzo qual dice, che tirò li $\frac{1}{6}$. di quel che tirò il primo, adunque tirò la metà, perche $\frac{1}{3}$. ſono la metà di $\frac{2}{3}$. e perciò venne a metter la metà del tempo, e denari di quel che meſſe il primo, la qual metà ſarà 720. e queſto mette fra tempo, e denari il terzo compagno, e perche ſtette nella compagnia dal primo di Luglio fino a tutto Dicembre, cioè 6. meſi, perciò parti 720. per 6. ne viene 120. e tanti ducati doueua metter il terzo compagno, e noi habbiamo detto, che meſſe canne 20. di panno, adunque ſi valutata la canna 6. ducati.

Propoſitione 46.

DVe fanno compagnia, & vn di loro mette duc. 80. e deue tirare li $\frac{2}{3}$. del guadagno, & il ſecōdo mette duc. 20. e deue tirare $\frac{1}{3}$. del guadagno. Fatto l'accordo viene vn'altro, e mette duc. 120. e dice voler ſtare alla rata ſorò del guadagno, ſecōdo le loro conditioni; ſi domanda, hauendo guadagnato in tutto duc. 500. quanti ne toccherà a ciaſcuno. Queſta è la 58. propoſitione delle compagnie, che pone Fra Luca, e la 13. di Pietro Borgo Venetiano, la quale ambedue roſoluono, e concludono, che al primo toccherà duc. 200 $\frac{2}{3}$. al ſecōdo toccherà duc. 25 $\frac{2}{3}$. & al terzo ſi toccherà duc. 272 $\frac{1}{3}$. la qual ſoluzione

zione a noi non piace, perchè non offeruano l'ordine della proposta, e che questa sia la verità, chiaramente apparisce, proponendo eglino, che il primo tiri per $\frac{2}{3}$. & il secondo per $\frac{1}{3}$. del guadagno, ne doueria seguire, e così si deue intendere, che il primo tirasse il doppio del secondo, attesochè, come s'è detto altre volte, non bisogna riguardare a quel che mettono, ma bisogna riguardare alle conuentioni, e patti. Volendo adunque dare retta, e giusta soluzione alla sopradetta proposta, dirai così, se il primo vuol tirare $\frac{2}{3}$. del guadagno, quando il secondo $\frac{1}{3}$. è cosa manifesta, che il primo hauerà il doppio del secondo, perchè $\frac{2}{3}$. sono il doppio di $\frac{1}{3}$. adunque quando il secondo hauerà 1. il primo hauerà 2. hora è da vedere quanto hauerà il terzo compagno alla rata de due primi; perche dirai così; se duc.80. che mette il primo tirano 2. quando il secondo 1. che tireranno duc. 120. che mette il 3º opera, te ne verrà 3. e così habbiamo che il primo tira 2. il secondo 1. & il terzo 3. che giunti insieme tireranno 6. e noi voleuamo che tirassero duc. 500. cioè il 1º guadagno, del quale il primo ne tirerà $\frac{2}{3}$. che schisati sono $\frac{1}{3}$. & il secondo ne tirerà $\frac{1}{3}$. che viene a esser la metà di quel che tira il primo, e così si offerua la proposta, cioè che il primo tiri il doppio del secondo, & il terzo tirerà $\frac{1}{2}$. e perchè le parti che tirano fra tutti tre i compagni, giunte insieme fanno 1. appunto, perciò non accade trouare vn numero, che habbia le sopradette parti, per diuidere i sopradetti 500. ducati, come a pieno nella 19. delle nostre compagnie da noi è stato dimostrato; ma basta pigliare per il primo il $\frac{2}{3}$. di duc. 500. che è 166 $\frac{2}{3}$. e tanto ne toccherà al primo, e per il secondo, piglia il $\frac{1}{3}$. di duc. 500. ne viene 83 $\frac{1}{3}$. e tanti ducati toccherà al secondo, e per il terzo piglia la metà di duc. 500. ne vien 250. e tanti ducati toccherà al terzo. Laonde con quest'ordine ne segue che tirano del guadagno proportionatamente secondo le conuentioni, che è quanto occorreua dimostrare per la uera soluzione di tal proposta; adunque l'errore di Fra Luca, e Pietro Borgo è manifesto.

Proposizione 47.

DVe hanno fatto compagnia per un'Anno, & il primo mese duc. 640. & il secondo duc. 400. con patti che alla fin dell'anno debbino partire il guadagno, e capitale per metà, accade che in capo di 10. mesi rupp. ro la compagnia, e trouaronsi di guadagno duc. 300. si domanda quanti ne toccherà per uno. In questa noi uediamo chiaramente, che se duraua 12. mesi, il secondo guadagnaua duc. 120. del capitale del primo, perciò dirai così; se in 12. mesi io guadagnauo duc. 120. quanto guadagnerò in 10. mesi? opera te ne verrà duc. 100. e tanto toccherà al secondo in 10. mesi del capitale del primo; perche caua 100. ducati, che perde il primo del suo capitale, di duc. 640. che mese, restano duc. 540. e tanto tocca di capitale al primo, dipoi aggiungi duc. 100. che guadagna il secondo del capitale del primo, a duc. 400. che mette, fanno duc. 500. e tanto tocca di capitale al secondo. Hora tu sei in compagnia diritta, e dirai così; Il primo mette duc. 540. & il secondo duc. 500. & hanno guadagnato duc. 300. che tocca per vno? opera, al primo toccherà duc. 155 $\frac{1}{2}$. & al secondo duc. 144 $\frac{1}{2}$.

Proposizione 48.

DVe hanno fatto compagnia, il primo mese due. 60. e deue hauere 8. meno & il secondo mese due. 40. e deue hauere 2. più, e guadagnarono in tutto due. 84. domando quanti ne toccherà per vno. Fa così, aggiungi 8. meno, che deue hauere il primo, a 84. fanno due. 92. e di questi cauane 2. più per il secondo, restano due. 90. di poi dirai, il primo mette due. 60. & il secondo due. 40. & hanno a diuidere due. 90. che tocca per vno, opera, al primo ne toccherà 54. de' quali ne cauarei 8. meno, che deue hauere, restano due. 46. e tanto li tocca del guadagno, & al secondo ne verrà 26. ai quali aggiungi 2. più che deue hauere, fanno due. 38. e tanto li toccherà del guadagno.

Proposizione 49.

TRe hanno fatto compagnia per vn'anno, il primo mese due. 60. e stette nella compagnia 12. mesi, e deue tirar di guadagno a ragione di 20. per cento, & il secondo mese due. 80. e stette nella compagnia 10. mesi, e del guadagno deue tirare a ragione di 8. per cento, & il terzo mese due. 100. e stette nella compagnia 8. mesi, e del guadagno deue tirare a ragione di 6. per cento, & alla fine si trouorno di guadagno due. 100. domando quanti ne toccherà per vno. Fa così, multiplica due. 60. che mette il primo via 12. mesi che sta nella compagnia, fa 720. e questo multiplica via quanto vuol tirar per cento, cioè via 10. fa 7200. e tanto mette il primo tra ten po, e denari, opera col medesimo ordine per il secondo, e per il terzo compagno, hauerai, che tra tempo, e denari il secondo metterà 6400. & il terzo 4800. Fatto questo, tu hauerai la ragione in compagnia diritta, e se ne lice, diuidi due. 100. che hanno guadagnato, secondo il tempo, e denari che ciascun mette, hauerai che al primo toccherà due. $39\frac{1}{2}$. al secondo due. $34\frac{1}{2}$. & al terzo due. $26\frac{1}{2}$. del sopradetto guadagno.

60	12	720	10	7200	3
80	10	800	8	6400	3 100.
100	8	800	6	4800	3
Partitore:				18400.	

Proposizione 50.

VNo dà a pigione vna casa per vn'anno, per due. 240. da cominciare il primo di Gennaio; & il di primo di Maggio venne vn'altro a stare in compagnia col primo in detta casa, offerendo voler pagare per rata del tempo che vi starà, & a di primo di Settembre venne vn'altro a stare in detta casa, in compagnia di due primi, proponendo voler pagar per rata del tempo, che vi starà.

L 3

Hora

Hora essendo finito l'anno, si domanda quanto toccarà a pagare a ciascuno. Tu vedi, che il primo stà nella casa 12. mesi, & il secondo 8. mesi, & il terzo 4. mesi, & hanno a pagare duc. 240. opera per il modo di compagnia, hauerai che il primo pagará duc. 120. il secondo duc. 80. & il terzo duc. 40.

Proposizione 51.

TRe hanno fatto compagnia per vn'anno, cominciando a di primo Gennaio; il primo mese duc. 100. e stette nella compagnia 12. mesi; & il secondo mese a di primo di Maggio tanti ducati, che hebbe del guadagno quanto il primo, & il terzo mese duc. 300. a tal tempo, che hebbe del guadagno quanto il primo, domando quanto messo il secondo, & in che di mese i suoi denari il terzo. Si come del guadagno tirano vguilmente, di necessità bisogna, che tra tempo, e denari mettino vguilmente; perciò moltiplica duc. 100. che mette il primo, via 12. mesi, che stà nella compagnia, fa 1200. e questo farà tempo, e denari del primo, e tanto bisogna che metta il secondo; per il che parti 1200. per 8. mesi, che stà nella compagnia, ne viene 150. e tanti ducati mette il secondo, dipoi per il terzo, parti 1200. per duc. 300. che mette, ne vien 4. e mesi 4. stette nella compagnia, adunque la mese a di primo di Settembre.

Proposizione 52.

DVe hanno fatto compagnia, e tra tutti due mettono duc. 1210. & hanno guadagnato non sò quanto, ma sò bene, che partito; che fu il guadagno il primo moltiplicò la sua parte con la parte del secondo, e fece 20. tanti, quanto fece aggiunger quelli del primo con quelli del secondo, domando quanto fu il lor guadagno, e quanto toccò per vno, e quanto messo ciascuno. Volendo soluer questa, & ogni altra simile, dirai così, aggiungi sempre 2. per regola ferma a quel 20. cioè a quel tanti, che vuol che faccia, e se dicessi 20. tanti, l'aggiungeresti al 30. &c. aggiungi adunque 2. a 20. fa 22. e questo sarà il guadagno, che tocca al primo, dipoi per sapere qualche tocca al secondo, piglia la metà di quel medesimo 20. e se altro numero fusse in tal caso proposto, e questo offeruarsi per regola generale; la qual metà è 10. e questo moltiplica via 22. che toccò al primo fa 220. e tanti ducati toccò al secondo. Fatto proua, somma insieme quelli che tocca al primo, con quelli che tocca al secondo, cioè 220. con 220. fanno 440. e questo fu il lor guadagno, hor douiamo vedere, se a moltiplicare quelli che tocca al primo, cioè 22. via quelli che toccano al secondo, che sono 220. fanno 4840. tanti di 440. che fu il congiunto delle quantità d'ambidue del guadagno, moltiplica adunque 22. via 220. fanno 4840. et tanto deue fare a moltiplicare 242. via 20. opera, si anchora gli 4840. Dipoi per vedere quanto messo ciascuno, dirai così. Se duc. 242. guadagno d'ambidue, vengono da duc. 1210. di capitale, da che capitale verranno duc. 22. del primo? opera, verranno da capitale di duc. 110. e tanti ducati messo il primo, dipoi per il secondo dirai medesimamente, se duc. 242. di guadagno, vengono da duc. 1210. di capitale, da che capitale verranno duc. 220. guadagno del secondo? opera, verranno da capitale di duc. 1100. e tanto messo il secondo.

Proposizione

Propositione 53.

TRe hanno fatto compagnia per vn'anno, il primo mēse a di primo di Gen-
naio duc.600. & il secondo entrò nella compagnia a di primo di Febbraio
e mēse vna quantità di ducati, & il terzo entrò nella compagnia ad i. Marzo,
e mēse non sò quanto, & alla fine dell'anno, il primo trasse del guadagno il $\frac{2}{3}$.
& il secondo il $\frac{1}{3}$. & il terzo il $\frac{1}{3}$. si domanda quanto mēse il secondo, & il ter-
zo. Questa è bella, e maestreuole, la quale volendola soluere, conuien troua-
re vn numero che habbia le sopradette parti, cioè $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{3}$. trouarai, che il nu-
mero farà 60. che il terzo è 20. per il primo, & il $\frac{2}{3}$. è 15. per il secondo, & il $\frac{1}{3}$.
è 12. per il terzo compagno, dipoi tu vedi, che il primo stà nella compa-
gnia 12. mēsi, il secondo 11. mēsi, & il terzo 10. mēsi. Fatto questo, conuien trouare
quanto mette il primo tra tempo, e denari, moltiplica duc. 600. che mette via
mēsi 12. che è il suo tempo fà 7200. e tanto mette il primo tra tempo, e denari,
dipoi dirai così, se 20. che è la terza parte, che tira il primo, viene da 7200. tē-
po, e denari, da che verrà 15. che è la quarta parte, che tira il secondo? opera,
tē ne verrà 5400. e tanto mette il secondo tra tempo, e denari, il qual partirai
per il suo tempo, cioè per 11 mēsi 11; ne verrà 490 $\frac{1}{2}$. e tanti ducati mēse il se-
condo, dipoi per il terzo dirai così, se 20. viene da 7200. tempo, e denari del
primo, da che verrà 12. che è la quinta parte, che tira il terzo, opera ne verrà
4320. e questo farà tempo, e denari del terzo, il qual parti per il suo tempo, che
è 10. mēsi, ne viene 432. e tanti ducati mēse il terzo compagno.

Propositione 54.

DVe hanno fatto compagnia, e fra tutti due hanno messo duc. 7. & in vlti-
mo si trouorno di guadagno duc. 5. & al primo toccò fra capitale, e gua-
dagno duc. 5. & al secondo duc. 7. si domanda quanto mēse ciascuno. Fà così,
somma insieme duc. 5. che toccano al primo, con duc. 7. che toccano al secon-
do fanno duc. 12. fra capitale, e guadagno; dipoi dirai così, se duc. 12. fra ca-
pitale, e guadagno son venuti da duc. 7. di capitale, da che capitale verranno
duc. 5. che toccorno al primo? e duc. 7. che toccarono al secondo? opera, per
il primo ne verrà duc. 2 $\frac{1}{2}$. e tanti ne mēse, e per il secondo ne verrà ducati
4 $\frac{1}{2}$. e tanti ducati mēse il secondo.

Propositione 55.

Quattro hanno fatto compagnia, & il primo mēse duc. 1200. & il secondo,
terzo, e quarto non sò quanto mēse, ma quando il secondo guadagna-
ua 5. il terzo guadagnaua 8. e quando il terzo guadagnaua 6. il quarto
guadagnaua 10. e quando il quarto guadagnaua 9. il primo guadagnaua 12. &
in tutto hanno guadagnato ducati 1000. domando quanto tocca a ciascuno, e
quanto mēse il secondo, terzo, e quarto. Hauendo noi più volte detto, che se-
condo la quantità de' denari, che vno mette nella compagnia, a quella rata con-
uiene che tiri del guadagno, non essendoci altri patti, per il contrario

ne segue, che secondo le quantità che tirano del guadagno a quella rata habbino messo il lor capitale nella compagnia, adunque, se quando al primo tocca 12. del guadagno, al quarto li tocca 9. come di sopra s'è detto, diremo ancora che quando il primo metterà 12. di capitale, il quarto metterà 9. e perciò volendo noi trouare quanto mette ciascuno di essi, diremo così, se quando il primo mette 12. il quarto mette 9. quanto douerà mettere il quarto, hauendo messo il primo duc. 1200? multiplica 1200. via 9. & il prodotto parti per 12. ne viene 900. e tanti ducati diremo che mettesse il quarto compagno, dipoi per il terzo dirai così, se quando il quarto mette 10. il terzo mette 6. quanto douerà mettere il terzo, hauendo messo il quarto duc. 900? multiplica, e parti ne verrà duc. 540. e tanti ducati mette il terzo, dipoi per il secondo, dirai così, se quando il terzo mette 8. il secondo mette 5. hauendo messo il terzo duc. 540. quanto douerà mettere il secondo? opera, trouarai che il secondo douerà mettere ducati $337\frac{1}{2}$. Fatto questo procedi per via di compagnia ordinaria, dicendo. Il primo mette duc. 1200. il secondo duc. $337\frac{1}{2}$. il terzo duc. 540. & il quarto duc. 900. & hanno guadagnato ducati mille; si domanda, che tocca per vno? opera, trouarai che al primo toccherà duc. 403. fol. 6. den. 5. & al secondo duc. 113. fol. 7. den. 0. & al terzo duc. 181. fol. 7. den. 2. & al quarto duc. 302. fol. 5. den. 4. Fanne proua, sommando quel che tocca a ciascuno, computando gli auanzi, che importano vn denaro, faranno ducati mille, più, o meno che ne venisse stia male.

Proposizione 56.

Qattro hanno a partire duc. 120. & il primo ne deue hauere la metà degli altri tre, & il secondo ne deue hauere il $\frac{1}{2}$. degli altri tre, & il terzo ne deue hauere il $\frac{1}{3}$. degli altri tre, & il quarto deue hauere l'auanzo, si domanda quanto tocca a ciascuno. Perche dice, che il primo deue hauere la metà degli altri tre, deue adunque hauere il $\frac{1}{2}$. di tutto il monte, il quale viene a essere la metà di $\frac{3}{4}$. che è il resto del monte, il quale tocca a gli altri tre, e perciò diremo, che il primo douerà hauere il $\frac{1}{2}$. di tutto il monte. Et il secondo, perche s'è detto, che deue hauere il $\frac{1}{2}$. degli altri tre, ne segue che habbia il quarto di tutto il monte, & il terzo che deue hauere il $\frac{1}{3}$. degli altri tre, ne seguirà, che habbia il $\frac{1}{4}$. di tutto il monte. Hora troua vn numero, che habbia le sopraddette parti, le quali habbiamo concluso, che deuono hauere del monte, cioè $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. & non quelle parti, che prima ciascun domanda degli altri tre, il qual numero sarà 60. del quale pigliane il $\frac{1}{2}$. per il primo ne vien 30. pigliane il $\frac{1}{4}$. per il secondo ne vien 15. pigliane il $\frac{1}{3}$. per il terzo, ne vien 12. hora somma insieme 30. 15. 12. fanno 47. e tanto trarranno li tre compagni senza il quarto, ma perche il quarto deue trarre l'auanzo, perciò caua 47. di 60. resta 13. per il quarto. Fatto questo procederai, come vna compagnia ordinaria, e dirai così, quattro fanno compagnia, il primo deue trarre per 30. il secondo per 15. il terzo per 12. & il quarto per 13. & hanno a diuidere duc. 120. che tocca per vno? opera, trouarai che al primo tocca duc. 40. al secondo duc. 30. al terzo duc. 24. & al quarto duc. 26. e così habbiamo operato che al primo toccò la metà degli altri tre, perche a gli altri tre tocca duc. 80. & al primo tocca duc. 40. che son la metà, e così gl'altri hanno la parte, come s'è proposto. Fanne proua.

Propositione 57.

Q Vattro hanno denari, li tre senza il primo hanno duc. 132. li tre senza il secondo hanno duc. 114. li tre senza il terzo hanno duc. 106. e li tre senza il quarto hanno duc. 96. si domanda quanti n' haueua ciascuno, farai così. Somma insieme 122. 114. 106. 96. fanno 438. e questo per regola ferma partirai sempre per vn meno che non sono gli huomini, cioè per 3. ne viene 146. e nota che se questo auuenimento fusse minore d'alcuna delle sopradette quantità, allora la ragione non si potrebbe soluere, e perciò habbiamo proposto ancor questa, la qual'è simile alla 40. indietro posta. Hora del sopradetto 146. ne cauara, a vna a vna separatamente le sopradette quantità, cioè cauane 122. resta 24. e tanti ducati haueua il primo; dipoi cauane 114. resta 32. e tanti ducati haueua il secondo, dipoi cauane 106. resta 40. e tanti ducati haueua il terzo, dipoi cauane 96. resta 50. e tanti ducati haueua il quarto, fanne proua, e verratti secondo la proposta.

Propositione 58.

T Re compagni andorno per lor diporto a vna fonte, & iui con la prouisione che haucuan portare si messero a cenare, & il primo messé 4. pani, e sol. 10. di carne, il secondo messé 4. pani, e sol. 16. di vino, & il terzo messé 2. pani e sol. 14. tra cacio, e frutte, & in questo istante soprauenne vn loro amico, e possesi a mangiare con loro, e quando hebbero cenato, che niente auanzò, il quarto compagno messé su la tauola sol. 20. e disse, borse del pari, amicitia longa. Io vi pago la robba, che ho mangiato di vostro, e virringato della cortesia, si domanda quanti soldi ne toccherà per vno, presupponendo che ciascuno habbia mangiato vualmente, dirai così. Se il quarto compagno. paga sol. 20. per la sua parte, manifestamente si conosce, che tutto quello che mangiorno valse sol. 80. & in questi sol. 80. il primo ve n'ha sol. 10. di carne, & il secondo sol. 16. di vino, & il terzo sol. 14. tra cacio, e frutte, che sommati insieme fanno sol. 40. i quali tratti di sol. 80. restano pur sol. 40. e questo resto sarà la valuta di 10. pani, che mettono tra tutti, adunque vn pane valse 4. e perche il primo messé 4. pani, i quali vengono a valere sol. 16. e sol. 10. che mette di carne, fanno sol. 26. de' quali mangia per sol. 20. adunque resta hauere sol. 6. & il secondo messé 4. pani, che vagliono sol. 16. e sol. 16. che mette di vino fanno sol. 32. e lui mangia per sol. 20. per il che resta hauere sol. 12. & il terzo mette 2. pani, che vagliono sol. 8. e sol. 14. che mette tra cacio, e frutte, fanno sol. 22. lui mangia per sol. 20. adunque resta hauere sol. 2. e così habbiamo diuiso sol. 20. che pagò il quarto huomo, e datà la sua parte a ciascuno.

Propositione 59.

E Dicendo, due huomini andarono a mangiare all'hosteria, e portaronfi il pane, & il primo di loro portò 4. pani, & il secondo ne portò 2. & auuen-
ne

ne che in quel che entrarono a tauela vi giunse vn loro amico, e posefi a mangiar con loro, e finito, ch'hebbeno di mangiare, e pagato ciascuno la sua parte di quanto haueua hauer l'hoste, quell'amico, che mangiò con loro, per non hauer portato pane diede soldi 8. a gli altri due, che se li diuidessero, domandasi quanti ne toccherà per vno. Fà così, poniamo che mangino vualmente, adunque tutto il pane che mangiarono costò sol. 24. e perche mangiarono 6. pani, ne se gue, che ogni pane valeffe sol. 4. onde il primo hauendo messo 4. pari, vene a mettere sol. 16. de' quali ne mangiò 8. resta adunque hauere sol. 8. & il secondo che mette 2. pari, i quali vagliono sol. 8. e mangia pane per sol. 8. adunque resta hauer niente, perciò che mangia tanto, quanto mette, e così dirai, che il primo habbia hauere sol. 8. & il secondo niente.

Proposizione 60.

TRe hanno a partire lir. 25. in questo modo, cioè, che le lire, che toccano al primo moltiplicate via 3. e quelle del secondo via 4. e quelle del terzo via 5. faccino le dette moltiplicationi tanto l'vna, quanto l'altra, si domanda quante lire toccherà per vno. Fà così, troua vn numero che partito per 3. per 4. e per 5. non auanzi rotto alcuno, il qual numero sarà 60. che partito per 3. ne viene 20. per 4. ne viene 15. e per 5. ne vien 12. fatto questo dirai così, il primo deue trarre per 20. il secondo per 15. & il terzo per 12. & hanno a diuidere lir. 25. che tocca per vno? opera, al primo toccherà lir. $10\frac{1}{4}$. al secondo lir. $7\frac{1}{2}$. al terzo lir. $6\frac{1}{3}$. che moltiplicate le lire del primo via 3. e quelle del secondo via 4. e quelle del terzo via 5. ciascuna moltiplicatione farà $31\frac{1}{4}$.

Proposizione 61.

TRe conradini tolgono da vn gentil'huomo a cauar vn fossò intorno a vna vigna, & il primo da se solo lo cauarebbe in 12. giorni, & il secondo in 8. giorni, & il terzo in 6. giorni; si domanda lauorando tutti tre insieme in quanti giorni lo cauaranno, e quanto toccherà per vno di lir. 18. che gli diede per loro fatiche? Farai in questo modo, metti che lo cauassero in che quantità di giorni ti pare; ma per non hauere a trouagliare con i rotti, metti vn numero che habbia interamente le sopradette parti, cioè $\frac{1}{12}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{6}$. che osservando le regole date sarebbe 776. ma per esser noi facili nella dichiarazione, e nell'operare, pigliaremo che quel numero sia 24. perciò che, e l'vno, e l'altro ci risulta il medesimo. Poniamo adunque che tal fossò si cauasse in 24. giorni, chiara cosa è che il primo in detto tempo lo cauarebbe due volte, & il secondo in 24. giorni lo cauarebbe tre volte, & il terzo in detto tempo lo cauarebbe 4. volte, di maniera che sommando queste volte insieme, faranno 9. volte, e noi vorremo cauarlo vna volta sola, perciò dirai così, se 9. volte, che si farebbe cauato il fossò da 3. persone, vengono da 24. giorni, che ci apponemmo, da che verrà la cauatura d vna volta sola di detto fossò? opera, verrà da giorni $2\frac{2}{3}$. & in tanti giorni lauorando tutti tre insieme lo cauarebbono. Fanne proua, dicendo così per il primo; se in 12. giorni si cauaua il sopradetto fossò vna volta, che parte ne cauare in giorni $2\frac{2}{3}$? opera, ne cauare $\frac{1}{3}$. e per il secondo dirai, se in 8. giorni,

ni,

ai, io cauauo il soffo vna volta, che parte ne cauaro in giorni $2\frac{2}{3}$ opera, ne cauarà $\frac{1}{3}$. e per il terzo dirai così, se in 6. giorni io cauauo il soffo vna volta, che parte ne cauaro in giorni $2\frac{2}{3}$ opera ne cauara $\frac{2}{3}$. che sommati insieme $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{2}{3}$. fanno vno appunto, cioè vna volta sola, più o meno che facesse staria male. Resta hora a vedere quel che tocca per vno; per la qual cosa dirai così. Tre hanno a diuidere lir. 18. delle quali il primo ne deue hauere $\frac{2}{3}$. il secondo $\frac{1}{3}$. & il terzo $\frac{2}{3}$. che tocca per vno e perche le parti, che deuno hauere, sommate insieme fanno l'vnità per appunto, basta dir così, il primo deue trarre per 3. il secondo per 2. & il terzo per 4. opera per qual modo ti piace, trouarai, che al primo toccherà lir. 4. al secondo lir. 6. & al terzo lir. 8. e così habbiamo risposto alle domande sopradette.

Il medesim'ordine conuerrebbe offeruare in alcune proposte, come per esempio. Tre farti fanno vna veste, il primo la farebbe in tanti giorni, il secondo in tanti, & il terzo &c. Ouero, tre Muratori tollero a fare vna casa, il primo la farebbe in giorni &c. ouero, tre animali mangiano vna pecora, il primo la mangierebbe in giorni &c. e molte altre proposte simili, le quali son tut e da passar tempo, & ancora da effercitare, & affortigliare l'ingegno a cose più importanti. E similmente si può proporre. Vna nave ha tre vele, che con la prima farebbe vn viaggio in tanti giorni, e con la seconda in tanti, e con la terza in tanti, domando alzar tutte le vele in quanti giorni faranno detto viaggio &c. Et ancora, se dicesi, vna botte ha tre cannelle, che con la prima si votarebbe in tanti giorni &c. E medesimamente vna fontana ha 3. condotti, che col primo empirebbe vna pila in tanti giorni &c. le quali vanno solute col medesim'ordine sopradetto.

Proposizione 6.^a

DVe compagniando per viaggio giunsero a vn'hosteria, doue si fermarono per mangiare, e dettero 20. grossi all'hoste, con patti, che se porrà altri a tavola con loro, essi habbino hauere la metà di tutto quello che pagaranno. Accadde, che soprauennero tre compagni, e diedero 30. grossi all'hoste, e dissero volen mangiare, e stare al bene, e al male con i due primi, e pagar per rata, e quando hebbero finito di mangiare, dissero. Padrone facciamo il conto, si domanda quanto douerà pagare ciascuno, e quanto toccherà per vno de 30. grossi, che diedero all'hoste i tre compagni sopraggiunti. Tu vedi, che li due primi compagni deuno hauere la metà di questi 30. grossi, secondo i patti, ma perche gli altri tre dicono volere ancor loro stare al bene, & al male de' primi, e pagar per rata; perciò per accordarsi dirai così. Se li primi due compagni vogliono vn grosso per vno, similmente all'hoste ne tocca 2. per ciò che deue hauer lui solo, quanto i due primi insieme, adunque, se li due primi compagni, vogliono vn per vno, similmente li tre compagni ne vorranno vn per vno, cioè tre grossi, hora somma insieme queste rate, cioè due per li primi compagni, 2. per l'hoste, & 3. per li seguenti compagni, fanno 7. e noi voleuamo, che facesse 30. per il che dirai così, all'hoste tocca 2. quando ai due primi 2. e quando ai tre seguenti, 3. & hano a diuidere 30. che tocca per vno opera co ne semplice compagnia, trouarai che all'hoste toccherà grossi 8 $\frac{2}{3}$. & alli due primi grossi 8 $\frac{1}{3}$. & alli tre seguenti grossi 12 $\frac{1}{3}$. che per ciascuno separatamente

ne viene grossi $4\frac{2}{7}$. Hora è da vedere se pagano tanto l'vno quanto l'altro. Noi sappiamo, che li due primi diedero all'hoste 20. grossi, ma perche deuono esser rimborsati di grossi $8\frac{2}{7}$. che gli toccorno per rata di 30. perciò trai $8\frac{2}{7}$. di 20. resta $11\frac{2}{7}$. e tanti grossi pagorno fra tutti due, che ne viene grossi $5\frac{2}{7}$. per vno; hora vediamo per lire compagni, che pagano grossi 30. de quali ne vengono rimborsati di $12\frac{2}{7}$. i quali tratti di 30. restano $17\frac{2}{7}$. e questi parti per 3. ne viene grossi $5\frac{2}{7}$. per uno, e così uengono a pagare quanto i primi, & hanno tirato per rata de' primi.

Proposizione 63.

DVe compagni trouorno vna borsa di denari, e nel diuiderli vennero in differenza, e così ogn'un di loro prese de' detti denari più che potè, e si trouo, che li denari che tolse il primo furono $\frac{2}{3}$. di quelli che prese il secondo, e li denari, che prese il secondo, furono per 18. più di quelli, che tolse il primo; si domanda quanto tolse ciascuno. Questa non vuol dir altro, se non troua vn numero, che presone li $\frac{2}{3}$. sia men 18. di detto numero. Hor poni, che il primo pigliasse lir. 60. delle quali prendine $\frac{2}{3}$. ne viene 40. che tratto di 60. resta 20. e noi voleuamo, che restasse 18. perciò dirai così, se 10. di resto vien da 60. ch'io m'apposi, da che verrà 18? multiplica 18. via 60. fa 1080. al qual parti per 10. ne vien 108. e questo fu il numero, o vero quantità di denari che tolse il secondo, del qual se ne prendi li $\frac{2}{3}$. ne vien 90. e tanti ne tolse il primo, che son 18. meno di quelli del secondo.

Proposizione 64.

VN giouane andando a spasso trouò vna borsa con denari, e mentre che contaui i detti denari fu sopraggiunto da vn suo amico, al quale conferi d'hauer trouato la detta borsa con quei denari, & esso gli dimandò quanti ducati erano, a cui rispose, son tanti, che s'io vi aggiungessi il $\frac{1}{7}$. & il $\frac{1}{8}$. di essi, e 10. ducati più de miei, farebbono appunto ducati 100. si domanda quanti ducati era in detta borsa. Fa così, tu vedi chiaramente, se a quella quantità non vi aggiungeffe ducati 10. più de' suoi, farebbono duc. 90. e perciò bisogna trouare vn numero, al quale aggiuntoui il $\frac{1}{7}$. & il $\frac{1}{8}$. di detto numero faccia 90. appunto, il quale si trouarà così; poni che quel numero sia 30. prendine il $\frac{1}{7}$. che è 6. & il $\frac{1}{8}$. che è 5. giunti insieme fanno 11. e questo aggiungi a 30. farà 41. e noi voleuamo che facesse 90. per il che dirai così, se 41. vien da 30. ch'io m'apposi, da che verrà 90? multiplica 30. via 90. fa 2700. qual parti per 41. ne viene $65\frac{2}{41}$. e tanti ducati diremo, che fussero nella borsa, che trouò.

Proposizione 65.

TRe compagni andando per viaggio trouorno vna borsa, che v'era dentro ducati 120. e mentre che stauano sotto vn'albero al fresco, contando, e diuidendo i sopradetti denari, viddero soprauenire quattro malandrini armati per

per squaligiarli. Laonde di ciò spauentati con prestezza ciascuno di loro tolse a refuso di quei denari senza lasciarne alcuno, e mettesi in fuga si saluorno, dipoi giunti in luogo sicuro, furono d'accordo di diuidere i denari in questo modo, cioè, che il primo metta giù la metà di quelli che prese, & il secondo ponesse giù il $\frac{1}{2}$. & il terzo ponesse giù il $\frac{1}{3}$, e così fecero, e quello che fu posto giù fu diuiso in tre parti vguali, delle quali ogn'vno prese la sua, la quale aggiunta poi con quei denari che gli restorno, fecero la somma di duc.40. per vno, come di ragione se li perueniu, domando quanti ducati tolse ciascuno quando fuggirono da malandrini. Fa così, troua vn numero che habbia quelle parti, che rimetton giù, cioè $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$. il qual numero è 12. dipoi dirai così, che se quello che pongono giù è diuiso vguualmente in tre parti, e ciascuno dipoi si troua duc.40. di necessità resta a ciascuno di loro quantità vguale, e perciò, se il primo mette giù la metà di quelli che prese, gli resta la metà, poniamo adunque che a ciascuno resti in mano duc. 12. per il che ne seguirà, che il primo hauendo posto giù la metà di quelli che prese, mettesse giù 12. Laonde diremo, che pigliasse 24. e questo salua, dipoi per il secondo restandoli in mano duc.12. e mettendogli il $\frac{1}{3}$. di quel che prese, adunque li resta li $\frac{2}{3}$. cioè 12. perciò dirai 12. di che numero è $\frac{2}{3}$? opera, farà di 18. e così diremo che il secondo pigliasse 18. & al terzo restandoli 12. e ponendo giù il quarto di quel che prese, ne segue che il 12. che gli resta sia $\frac{3}{4}$. di quel che prese, e perciò dirai 12. di che numero è $\frac{3}{4}$? opera farà di 16. per la qual cosa, secondo il nostro operare si concluderebbe che il primo hauesse preso 24. il secondo 18. & il terzo 16. che in tutto hauerebbono preso 58. e noi voleuamo 120. Laonde dirai così, se 58. fusse 120. che farebbe 24. del primo, 18. del secondo, e 16. del terzo? opera trouarai, che 24. farebbe $49\frac{1}{2}$. e tanto prese il primo, e 18. farebbe $37\frac{1}{2}$. e tanto prese il secondo, e 16. farebbe $33\frac{1}{2}$. e tanti ducati prese il terzo, che in tutto fanno duc.120. Fanne proua in questo modo cioè, di quelli che prese il primo cauane la metà, e di quelli che prese il secondo cauane il $\frac{1}{3}$. e di quelli che prese il terzo, cauane il $\frac{1}{4}$. trouarai, che ciascuno resterà con duc.24 $\frac{1}{2}$. e partendo poi per terzo tutto quel che pongono giù, e ciascuno pigliandone la parte sua, & aggiugnendola a quel che gli restò, farà 40. come conueniu, perche se a cose vguale si aggiugono cose vguale le somme loro faranno sempre vguale.

Propositione 66.

VNo viene a morte, e lascia la sua donna grauida, fa testamento di duc.600. de' quali, se la moglie fa vna figliuola, vuol che habbia duc.200. e la madre 400. e facendo vn figliuolo, vuol che habbia duc.400. e la madre duc.200. accade che partori vn maschio, & vna femmina, domandasi che toccherà per vno, saluando l'intentione del testatore. In questa arguirai così, che la voluntà del testatore sia, che la madre hauesse il doppio della figliuola, & il figliuolo hauesse il doppio della madre, adunque quando alla madre toccherà 2. alla figliuola toccherà 1. & al figliuolo li toccherà 4. hor somma insieme 1. 2. 4. fanno 7. e noi voleuamo 600. perciò dirai così, se 7. fusse 600. che farebbe 1. che 2. e che 4? opera trouarai che alla figliuola toccherà duc.85 $\frac{1}{2}$. & alla madre ducari 171 $\frac{1}{2}$. & al figliuolo duc.342 $\frac{1}{2}$. Fanne proua, trouarai che la madre hauera il doppio della figliuola, & il figliuolo haera il doppio della madre.

Propositione

Proposizione 67.

VNo fa testamento di ducati 900. de quali lascia che 100. duc. sieno dispensati a poveri, e duc. 800. sieno della sua donna (la qual' è grauida) con questa conditione, che se ella fa vna figliola, la madre habbia duc. 400. e la figliola duc. 400. e se fa vn maschio, la madre habbia duc. 300. & il figliolo ducati 500. accade che fece vn maschio, & vna femina, si domanda che toccherà per vno. La mente del testatore è, che habbia tanto la figliola, quanto la madre, e che quando alla madre toccherà 3. al figliolo tocchi 5. adunque quando alla figliola toccherà 3. alla madre toccherà 3. & al figliolo toccherà 5. somma insieme 3. 3. 5. fanno 11. e noi voluamo 800. perciò dirai così, se 11. fusse 800. che farebbe 3. per la figliola 3. per la madre, e 5. per il figliolo > opera per la figliola ne verrà duc. $218\frac{1}{11}$. e per la madre duc. $218\frac{1}{11}$. e per il figliolo duc. $363\frac{4}{11}$. e così hauerai proportionatamente diuiso duc. 900. secondo la mente del testatore, dispensandone prima 100. a poveri, & il medesimo ordine terresti se dicessi che hauesse fatto due figlioli, o tre, e due figlie &c. diuidendo sempre con debita propositione, secondo il desiderio del testatore.

Proposizione 68.

VNo fa testamento, e lascia alla sua donna (grauida) in denari contanti, duc. 1200. con questa conditione, che se fa vna figliuola, la madre habbia duc. 900. e la figliuola duc. 300. e se fa vn figliuolo, la madre habbia duc. 300. & il figliuolo duc. 900. accade, che costei partori vna figliuola, vn figliuolo, & vn Erma frodito, cioè vna creatura con la natura di femina, & il membro di maschio, si domanda quanto toccherà per vno de' sopradetti denari. Arguirai così, che la mente del testatore è che quando la figliuola ha 3. la madre habbia 9. percioche 000. sono tre tanti di 300. sicome 9. è tre tanti di tre: ouero, quando la figliuola ha 1. la madre habbia tre che è la medesima proportione; e quando la madre ha 3. il figliuolo habbia 9. perche vuol che il figliuolo habbia 3. tanti della madre: adunque quando la figliuola hauerà 1. la madre hauerà 3. & il figliuolo hauerà 9. ma perche l' Erma frodito, è da più della femina, e da men del maschio, conuien adunque che habbia più della femina, e men del maschio, cioè il mezzo proportionale che è fra 1. della femina, e 9. del maschio. Hor perche à trouare il mezzo proportionale fra due estremi si puol intendere in due modi, cioè Arithmetice, e Geometriche, perciò dimostreremo, e l'vno, e l'altro, e prima Arithmetice. Somma 1. insieme con 9. fa 10. del qual prendi la metà, che è 5. e questo è il mezzo proportionale fra 1. e 9. percioche 1. 5. e 9. sono nella continua proportionalità Arithmetica; attesoche gl' ecc essi sono vguale fra loro. L'altro modo (Geometriche parlando) è questo, secondo che ne dimostra Euclide nell' sedicesima del sesto. Se saranno 3. quantità continue proportionali, e la prima, è terza sia nota, e vorrai trouar la seconda, farai così, moltiplica la prima nella terza, e la radice del prodotto sarà la seconda quantità proportionale; moltiplica adunque 1. viz 9. fa 9. del qual prendi la radice che è 3. e questo daremo che sia il mezzo proportionale infra 1. e 9. Fra Luca ancora in

vn caso simile fà vna Propositione, e dice così. Tre è poco, e 4. è troppo, che farebbe il douere? multiplica 3. via 4. fà 12. e la radice di 12. dirai che sia il douere, e giusto mezzo Geometricè. Arithmetice farebbe $3\frac{1}{2}$. e soggiuge queste parole, dicendo. *Et ideo in omnibus mercantiis agitur secundum proportionem Geometricam, & non Arithmeticam, quia summa æquitas in illa consistit.* Tornando hora alla nostra operatione, diremo così, che quando la figliuola hauerà 1. la madre hauerà 3. e l'Ermafrodito 3. & il maschio 9. e volèdo diuidere duc. 1200. con le sopradette proportioni, procedi per via di compagnia, trouarai che alla figliuola toccherà duc. 75. alla madre duc. 325. all'Ermafrodito duc. 225. & al figliuolo duc. 675. che in tutto fanno la somma di duc. 1200. e così vien sodisfatto alla volontà del testatore.

Propositione 69.

VNo vende vna Vacca pregna, con patti, che se fà vna Vitella ne vuole lir. 40. e se fà vn Vitello ne vuole lir. 48. accade che fece vn Vitello, & vna Vitella, e la Vacca val per due vitelli, & vn vitello val per due vitelle; si domanda quante lire deue pagare il compratore al venditore. Bisogna prima trouare la valuta della vacca; poni che la vacca vaglia che quantità di lire ti piace, hor poni che vaglia lir. 20. poniamo ancora che habbia vn vitello in corpo, il quale secondo la valuta che poniamo della vacca varrebbe lir. 10. adunque tra la vacca, e'l vitello varrebbero lir. 30. e noi voleuamo lir. 48. perciò dirai così, se lir. 30. che ponemmo valesse tra la vacca, e'l vitello, vengono da lir. 20. che si pose valesse la vacca sola, da che verranno lir. 48. le quali sono il prezzo della vacca, e del vitello; opera, ne verrà lir. 32. e tanto valse la vacca. Ritrouisi hora la valuta della vacca per vn'altro modo; poni che la vacca vaglia lire 20. e sia pregna d'vna Vitella, la quale viene a valere secondo la proposta lir. 5. cioè la metà d'un Vitello, che tra la Vacca, e la Vitella varrebbero lir. 25. e noi voleuamo lir. 40. per il che dirai così, se lir. 25. uengono da lir. 20. ch'io m'apposi, da che verranno lir. 40. opera, uerranno da lir. 32. per la valuta della Vacca, & il Vitello uarrà la metà, cioè lir. 16. e la Vitella uarrà lir. 8. cioè la metà di lir. 16. somma insieme, fanno lir. 56. e tanto deue pagare il compratore al Venditore,

Propositione 70.

VN Nauicellajo si parti di Pisa con vn Nauicello per andare a Fiorenza, e portò nel Nauicello 3. botte di Vino, una piena di maluagia, che tiene barili 6. l'altra piena di Greco, che tiene barili 4. e l'altra di Moscatello, che tiene barili 10. e tutte tre le dette botte haueuano le canne in fondo, & in questo nauicello condusse ancora una Bertuccia, e la prima notte prese porto a Ripacotti, e mentre il barcarolo dormiuà la bertuccia siuò tutte le canne delle botte, & il vino si versò nel nauicello, e la mattina essendo desto il Nauicellajo, e trouando sparso il vino dentro al nauicello, con pazienza, e diligenza, tornò a riempire le botte di quel vino mescolato, si domanda quanti barili ne farà in ciascuna botte di ciascuna sorte di vino. Fà così, somma insieme tutte le canne delle botte, cioè 6. 4. 10. fanno 20. e dirai, se in barili 20. di mescolato

v'è dentro barili 6. di maluagia pura, quanta ne sarà in barili 6. di mescolato? perche tanti barili tiene la prima botte, multiplica 6. via 6. fa 36. qual parti per 20. ne viene barili $1\frac{3}{5}$. e tanta maluagia farà tornata nella botte di 6. barili, di poi dirai se in 20. barili di mescolato v'è dentro barili 4. di greco puro, quanto farà nella botte di 6. barili? multiplica 6. via 4. fa 24. qual parti per 20. ne viene barili $1\frac{1}{5}$. e tanto greco farà nella botte di 6. barili; dipoi dirai, se in barili 20. di mescolato v'è dentro barili 10. di moscatello puro, quanto ne farà nella botte di 6. barili? multiplica 6. via 10. fa 60. qual parti per 20. ne viene barili 3. e tanto moscatello farà nella botte di 6. barili, che sommando insieme $1\frac{3}{5}$. $1\frac{1}{5}$. e 3. fanno 6. appunto, cioè tutta la tenuta della botte della maluagia. Hora per la botte del greco, farai nel medesimo modo dicendo, se in barili 20. di mescolato v'è dentro barili 4. di greco puro, quanti ne farà nella botte di 4. barili? multiplica 4. via 4. fa 16. qual parti per 20. ne viene $\frac{4}{5}$. e tal parte d'un barile di greco farà nella botte di 4. barili, dipoi dirai, se in 20. barili di mescolato, v'è dentro barili 6. di maluagia pura, quanta ne farà in 4. barili? multiplica 4. via 6. fa 24. qual parti per 20. ne viene $1\frac{1}{5}$. e tanta maluagia farà nella botte di 4. barili. Dipoi dirai, se in barili 20. di mescolato v'è dentro barili 10. di moscatello, quanto ne farà in 4. barili? multiplica 4. via 10. fa 40. qual parti per 20. ne viene 2. e tanto moscatello farà nella botte di 4. barili, hor somma insieme $\frac{4}{5}$. d'un barile di greco, con barili $1\frac{1}{5}$. di maluagia, e con barili 2. di moscatello, faranno barili 4. appunto, cioè la tenuta della botte del greco, troua col medesimo ordine da te stesso, quanta maluagia, greco, e moscatello farà nella botte di 10. barili.

Delle Soccite.

HAuendo noi discorso sopra la diuersità di molti casi di Compagnie, e parendoci hauerne trattato à bastanza, vogliamo al presente con l'aiuto di Dio dar principio, e trattar della diuersità delle soccite, le quali in molte parti d'Italia, e fuor d'Italia si costumano, e perciò ne proporremo alquanti casi, mediante i quali, ne potrai formare da te stesso quanti ti piace, e prima diremo così.

Proposizione 1.

TTe pastori comprorno vn pascolo due. 100. per farlo pasturare a i loro bestiani, & il primo vi tenne 80. vacche, & il secondo 90. & il terzo 120. si domanda quanto toccherà a pagare a ciascuno, e quanto si pagherà per capo di bestia. Queste tre prime proposizioni richiedeano esser poste dentro alle compagnie, ma perche trattano di bestiami, perciò l'habbiamo messe alla fine delle compagnie, & al principio delle soccite. Soluila adunque in questo modo dicendo, il primo mette 80. il secondo 90. & il terzo 120. & hano a diuidere due. 100. che tocca per vno? opera, al primo toccherà due. $27\frac{1}{2}\frac{2}{5}$. al secondo due. $31\frac{1}{2}\frac{1}{5}$. & al terzo due. $41\frac{1}{2}\frac{1}{5}$. Hor per saper quel che tocca per vacca, dirai così, se per capi 290. di bestie, si spende due. 100. che si spenderà per vn capo solo, opera, partendo lir. 100. per 290. ne viene lir. 2. fol. 8. den. 3. $\frac{2}{5}$. e tanto si pagherà per vacca.

Propozi-

Propositione 25.

TRe Pastori tolsero al tempo dell'herbe vn monte in affitto per i lor bestiami, e spesero duc.100. con patto di pagar per rata della quantità delle bestie, e del tempo, che ve le terranno. Il primo vi tenne 300. pecore 40.giorni, & il secondo vi tenne 400. pecore 35.giorni, & il terzo vi tenne 600.pecore 30.giorni, si domanda quanto douerà pagare ciascuno. In questa operai, come se fusse vna compagnia col tempo, multiplica 300. pecore del primo via 40.giorni che le tenne a pascolare in detto monte, fanno 12000. e questo è tempo, e pecore del primo, e così farai per il secondo, hauerai 14000. fra tempo, e pecore, e per il terzo hauerai 18000. somma insieme il tēpo, e pecore di tutti tre, fanno 44000. e questo sarà partitore, procedi hora come vna compagnia ordinaria, hauerai che al primo toccherà duc.27 $\frac{1}{4}$. al secondo duc.31 $\frac{1}{4}$. & al terzo duc.40 $\frac{1}{4}$. e sarà fatta.

Propositione 3.

DVe Pastori hanno comprato nelle Maremme di Siena vn pasco per lor bestiami per duc.300. & il primo vi ha messo 600. pecore bianche, e 500. pecore bigie, e 250. capre, e l'altro vi ha messo 800. pecore bianche, 600. pecore bigie, e 100. vacche, e le pecore bianche pagano a ragione di duc. 16. il cento, e le bigie a ragione di duc.12.il cento, e le capre à ragione di duc.6. per cento, e le vacche à ragione di 30. per cento, si domanda quanto douerà pagare ciascun pastore, e quanto si pagará per capo di bestia. Fu così, poni tutte le bestie ordinatamente vna sotto l'altra, dipoi a ogni quantità di bestie poni di contro quella quantità di ducati, che si paga per cento, dipoi multiplica ciascuna quantità di ducati, via ciascuna quantità di bestie separatamente, come di sotto vedi, e tutti quei prodotti li sommarai insieme, faranno 40100. il quale sarà tuo partitore in questa operatione, dipoi opera come vna semplice compagnia, e trouarai, che il primo pastore pagará duc.127. fol.18.den.7. & il secondo duc.172. fol.1. den.5. e per ogni pecora bianca si pagará fol.16. den.9. e per ogni pecora bigia fol.12. den.7. e per ogni capra fol.6. den.3. e per ogni vacca lir.1. fol.11. den.5. fanne prouari verrà fol.4. meno, rispetto i rotti che habbiamo lasciati andare nelle partitioni. Noi habbiamo messo che le pecore bianche paghino più delle bigie, perche pascurano molto più, che nō fanno le bigie.

Bianche	600.	16.	9600.
Bigie	500.	12.	6000.
Capre	250.	6.	1500.
Bianche	800.	16.	12800.
Bigie	600.	12.	7200.
Vacche	100.	30.	3000.
			40100. Partitore

Proposizione 4.

VNo dà in foccita a vn'altro 24. pecore, con patto che le deua tener 3. anni, e poi partire quelle che si trouaranno per metà, & in capo di 16. mesi li diede 48. pecore con i medesimi patti delle prime, si domanda a che tempo si douerà diuider la foccita. Queste si soluon per via di fonditure, e perciò farai così, moltiplica 24. pecore via il tempo che restaua a tenerle, cioè anni $1\frac{2}{3}$. farà 40. dipoi moltiplica 48. per 3. anni, che le douea tenere farà 144. hor somma questi due prodotti insieme, cioè 40. con 144. faranno 184. e questo parti per tutta la quantità delle pecore, cioè per 72. ne viene $2\frac{2}{3}$. e così diremo che anni $2\frac{2}{3}$. douerà tenere tutte le 144. pecore dal dì che gli dette le 48.

Proposizione 5.

VNo dà in foccita a vn Pastore 30. pecore per 3. anni, & il pastore l'ha tenute 9. mesi, dipoi gliene dà quaranta a termine di 3. anni, e l'ha tenute mesi 8. dipoi glie ne dà trenta al termine di 3. anni, e l'ha tenute mesi 5. hor son d'accordo il Padrone; & il Pastore di guastar questi tre capi, e farne vn solo, si domanda quanto tempo douerà tenere tutte queste cento pecore. Questa la propone Maestro Francesco Feliciano da Lazio Veronese nella sua opera intitulata Scala Grimaldelli, huomo veramente eccellente nella pratica, e speculatiua d'Aritmetica, e Geometria, & vna Propositione simile pone fra Luca dal Borgo, e nel soluerle tengono vn medesim'ordine, il qual è questo, cioè dicono che se le prime 30. pecore il Pastore le tiene 7. mesi, le resta a tenere mesi 29. a voler finire 3. anni, e se le 40. le tiene 8. mesi, resta a tenere mesi 28. e se l'ultime 30. le tiene 5. mesi, resta a tenerle mesi 31. dipoi sommano insieme questi residui, cioè mesi 29. 28. 31. fanno 88. e questo parton per 3. perche son tre tempi, ne viene mesi $29\frac{1}{3}$. e tanto dicono che il pastore le deue tener tutte. Noi dunque diciamo, che in vn supposito solo non possono stare questi tre capi, e che mentre che tiene le 40. pecore, cioè la seconda partita, di necessità tiene ancora le prime 30. e mentre che tiene l'ultime trenta, tiene ancora le prime trenta, e seco, marianente le quaranta, cioè il pastore tiene 7. mesi le prime 30. pecore, & in capo a questi 7. mesi ne ricoue 40. le quali prima che ne ricoue altre le tiene 8. mesi, laonde mentre che tiene queste 40. pecore 8. mesi tiene ancora le prime 30. i medesimi 8. mesi, e 7. mesi l'haueua tenute prima, che fanno 15. mesi, adunque quando hauerà tenute le 40. pecore 8. mesi, le prime 30. l'haueua tenute 15. mesi. Dipoi dice, che in capo de' sopradetti 8. mesi glie ne dà 30. & il pastore le tiene 5. mesi, & in capo a questi 5. mesi fanno nuovi patti, perche, mentre che tiene quest'ultime pecore 5. mesi, noi diciamo che tiene ancora le prime, e le seconde i medesimi 5. mesi. Laonde, concludiamo che alla fine de' detti 5. mesi, il pastore ha bbiato tenuto 20. mesi le prime 30. pecore, e perciò diciamo che le resta a tenere 16. mesi, douendole tenere 3. anni, e secondariamente le 40. le vien hauer tenute 13. mesi, le quali resta a tener 23. mesi, e l'ultime 30. hauendole tenute 5. mesi, le resta a tenere mesi 31. Hora farai così, come se tu haueſſe a recare a vn di tre partite di denari, come

se

se di cessi in questo modo. Vno deve hauere da vn'altro duc. 30. di qui a 16. mesi, e duc. 40. di qui a 23. mesi, e duc. 30. di qui a mesi 31. si domanda volendoli tutti in vn di, fra quanti mesi si douerà hauere; multiplica i denari di ciascuna partita via i suoi mesi, & i prodotti somma insieme, fanno 2320. e questo parti per la somma de' ducati, i quali son 100. ne viene $23\frac{2}{5}$. e di qui a mesi $23\frac{2}{5}$. li douerà hauere tutti; e questo medesimo ordine offeruando nel condurre le tre partite, in vna partita, e tempo solo, verranno ragguagliatamente che il pastore le deua tenere mesi $23\frac{2}{5}$. dal di della nuoua conuentione. Volendo a fauore de' sopradetti Autori concedere, che in vn supposto solo possino stare le, tre partite; non resta però che il pastore nò deua tener la prima partita 29. mesi, la seconda 28. e la terza 31. le quali considerando come partite di denari, o come fonditure, si multiplica le pecore di ciascuna partita via i suoi mesi, & i prodotti si sommano insieme, e tal somma si parte per la somma di tutte le pecore, ne verrà $29\frac{1}{2}$. e non $29\frac{1}{2}$. come vogli on loro. Se le partite delle pecore fussero vguali, cioè 30. pecore per partita, noi diciamo che ne verrebbe n. esi $29\frac{1}{2}$. secondo la loro openione, ma non essendo le partite vguali, nè meno potendosi tenere, e guardare la seconda, e terza partita, che non si guardi, e tenga la prima; perciò noi habbiamo risoluto, e concludentemente detto, che il pecoraio le douerà tenere mesi $23\frac{2}{5}$. e con questa nostra resolutione par che concordi Giouanni Sfortunati da Siena, se bene nella sua opera non forma la proposta, più che di due partite; ma nota questa di Giouan Francesco Peuerone da Cuneo Piemontese, il quale ha molto ben'inteso, e risoluto vna proposta simile, cioè la seguente.

Propositione del Peuerone 6.

VNo dà in foccita a vn'altro 100. vacche alla metà, a termine di 5. anni, e passati li due primi anni gliene dette 300. e doppo passati 18. mesi glie ne dette 150. tutte sotto la medesima conditione delle prime cento, si domanda quanto tempo le douerà tenere. Se vorrai sapere fra quanti anni si douerà diuidere la foccita, prima fa conto di tutti gli anni che mancano a finire i termini, e con quelli multiplica il numero delle vacche di quel termine separatamente, poi somma tutte quelle multiplicationi insieme, e parti per la somma intera di tutte le vacche, come per esempio, alle prime cento mancavano anni $1\frac{1}{2}$. alle 300. mancavano anni $3\frac{1}{2}$. & all'ultime mancavano anni 5. con questo $1\frac{1}{2}$. multiplica 100. fa 150. con gli $3\frac{1}{2}$. multiplica 300. fa 1050. e con il 5. multiplica 150. fa 750. quali numeri sommati insieme fanno 1950. e questo parti per il numero delle vacche, che sono 550. ne viene $3\frac{5}{11}$. e tanti anni le deue tener tutte, doppo l'ultime 150. che gli si diedero. Forse qualch'vno dirà che noi habbiamo fatto del gagliardo intorno a queste pecore, come animali timidi, e paurosi, e che intorno alle cose ardue, e d'importanza noi siamo detoli, e fiacchi, ai quali si risponde così

Non è per tutta l'Arabia felice,
Non a ogn'vn rende vguale giorno il Sole.
Nè ogn'uccello è Aquila o l'Enice.

Proposizione 7.

H V No dà in foccita a vn pastore 160. pecore, con patti che le tenga 5. anni, & alla fine del tempo si parta per metà, vtile, danno, e capitale; accadde che il Pastore le tenne 6. anni, e trouaronsi 600. pecore, si domanda quante ne toccherà per vno. E' cosa manifesta, che se il Pastore le teneua 5. anni, e non più, gli toccaua la metà. Hor mettiamo, che l'habbia tenute 5. anni apunto, che di ragione li toccarebbono mezza, cioè pecore 300. restano 300. per il padrone, delle quali gli tornaua più vtile a diuiderle in capo a 5. anni, che lasciarle tenere vn'anno più, perche queste 300. pecore del padrone, le quali ha lassate vn'anno più in mano del pastore, vengono in nuoua foccita al pastore come le prime, e perciò se l'hauesse tenute altri 5. anni li verrebbe ancora la metà di 300. e di quelle che si trouasse, la qual metà è 150. ma perche lui l'ha tenute vn'anno solo, d'rai così, se in 5. anni guadagnaua 150. pecore, quanti ne guadagnerà in vn'anno? opera, partì 150. per 5. ne viene 25. le quali aggiungi alle prime 300. che toccorno al pastore, fanno 325. e tante glie ne toccherà in 6. anni, & il resto fino in 600. che sono pecore 275. toccheranno al padrone.

Par cosa alquanto malageuole, che al padrone glie ne tocchi meno che al Pastore, la qual cosa non gli auerrebbe, se le partisse in capo di 5. anni, perciò che alla fine di detto tempo il pastore deuè hauere la sua metà, e metterla da banda, e l'altra metà, che è del padrone la viene a tenere vn'anno in nuoua foccita come le prime, e se le tenesse 5. anni glie ne verrebbe la metà, e tenendole meno di 5. anni, ne deuè hauer per rata, come di sopra habbiamo dimostrato.

Proposizione 8.

H V No dà in foccita a vn pastore 60. pecore per 5. anni, & in capo a detto tempo deuono partire vtile, danno, e capitale per metà, e quando furono in capo di 3. anni, e 4. mesi, si trouorno 240. pecore, e son d'accordo volerle partire, domando quante ne toccherà per vno. Arguisci così, che se il pastore le teneua 5. anni, e si fusse trouato 240. pecore, di ragione glie ne veniuua la metà che sono 120. perciò dirai così, se in 60. mesi gli veniuua 120. pecore, quante glie ne verrà in 40. mesi? opera, gliene verrà 80. & il resto fino in 240. che sono 160. toccano al padrone.

Proposizione 9.

H V No dà in foccita a vn'altro 270. pecore, & il pastore ne mette 90. con patto di tenerle tutte 5. anni, & alla fine partire vtile, danno, e capitale per metà, accade che in capo di 3. anni, e 4. mesi si trouano 560. pecore, e son d'accordo partirle secondo le conuentioni, domando quante ne toccherà per vno. Fa così, somma 90. pecore che mette il pastore, con le 270. che mette il padrone, fanno 360. delle quali il pastore ne mette 90. che sono $\frac{1}{4}$ di tutto il monte, che schiati sono $\frac{3}{4}$. adunque il pastore mettendo il $\frac{1}{4}$ del monte, douerà hauere

uere il $\frac{1}{2}$. di ciò che si trouano, per il che piglia il $\frac{1}{2}$. di 560. pecore che si trouano ne viene 140. e queste vengono al pastore per rata delle 90. che messe, ma perche si disse, che se le teneua 4 anni gliene toccarebbe la metà; perciò piglia la metà di 560. la quale è 280. adunque guadagnaua dalle 140. fino 280. che v'è 140. e queste l'auanzaua in 5. anni, per il che dirai così, se in 60. mesi il pastore guadagnaua 140. pecore, quantene guadagnerà in 40. mesi? opera, te ne verrà $93\frac{1}{3}$. e queste merita il pastore per le sue fatiche di 40. mesi, che l'ha tenute, quali aggiungi alle 140. che gli vengono per rata di quelle che messe, fanno 233 $\frac{1}{3}$. e tante ne toccherà al pastore, & il resto fino in 560. che v'è 326 $\frac{2}{3}$. toccano al padrone.

Proposizione 10.

Pietro Catani da Siena in vna simil proposta, gli dà diuersa soluzione, & a prima vista pare che non possa stare altrimenti, la qual Proposizione dice così. Pietro dà in foccita a Tomasso 300. pecore, con patto che finiti 4. anni, deuino partire a mezz'oil guadagno, & capitale, e Tomasso ha da se 60. pecore, le quali mescola con quelle di Pietro, e la foccita non dura poi se non 3. anni, e 4. mesi, e trouasi pecore 630. si domanda quanto ne toccherà per vno. Per risposta si così. Somma 60. che messe Tomasso con le 300. di Pietro, faranno 360. delle quali Tomasso, per metterne 60. partecipa per $\frac{1}{6}$. che schiari sono $\frac{1}{6}$. e perciò piglia $\frac{1}{6}$. di 630. che si trouano alla fine della foccita, e ne verrà 105. pecore, e queste toccano a Tomasso per le 60. che messe. Fin qui ci piace il suo ordine, e soluzione, ma hora che vuol che si caui le 105. di 630. le quali restano 525. e queste dice che se Tomasso le teneua 4. anni, gliene veniuua la metà, cioè 262 $\frac{1}{2}$. Laonde, vuol che di queste habbia per rata di tempo, cioè per mesi 40. delli quali hauerebbe 218 $\frac{1}{4}$. le quali congiunte con 105. che gli toccorno per rata di quelle che messe, farebbono 323 $\frac{1}{4}$. quelle che toccherebbono a Tomasso, ma (salua sua intelligenza) non faremo, per di che secondo la sua soluzione, vuole che al pastore salui le 105. che gli vengono pensata di 60. che ne mette, e poi vuol che sia partecipe del resto per metà, e per rata di tempo, adunque il padrone non farebbe partecipe dell'utile delle 60. che mette il pastore, e così potrebbe adunque proporre, che il pastore non ne mettesse nessuna, poiche non fa partecipe ancora il padrone, per il che ne segue per lui, che il pastore voglia il suo per se, e quel d'altri a mezza, la qual cosa non è conueniente. Ma i patto loro sono, che se le teneua 4. anni il pastore le doueua hauere intere, cioè la metà di 630. che si trouano in tutto, che sono 315. e non la metà di 525. adunque se le sente in 4. anni guadagnaua da 105. che li vennero per le 60. che messe fino in 315. che sono 210. e queste le guadagnaua in 4. anni, per il che dirai così. Se in 48. mesi il pastore guadagnaua 210. pecore, quantene guadagnerà in 40. mesi? opera, ne guadagnerà 175. che congiunte alle 105. fanno 280. e tante ne toccherà al pastore, & al padrone gli tocca il resto fino a 630. che sono 350. pecore. Con questa medesima conclusione concordano gl'inferascritti Autori, cioè Fra Luca, Francesco da Lazisio, Giouanni Serrunati, e Giouanni Ortega Spagnuolo, vedi le lor foccite, trouarai esser così. Se già il detto Catani non intendesse, che il padrone non douesse participare delle 60. pecore, che in tal caso, hauerebbe fatto bene.

Proposizione 11.

H Or sia nuovamente proposta la sopradetta foccita, e che il pastore non metta cos'alcuna. La qual dica così. Pietro dà in foccita a Tomasso pecore 200. ouero vna quantità, che non importa esprimere il numero; perche basto sapere quelle che hanno a diuidere. La qual foccita duri 4. anni, e poi partec. et ilo danno, e capitale per metà, e l'ha tenuta 3. anni, e 4. mesi, e trouansi pecore 630. quante ne toccherà per vno. Tu vedi, che se il pastore le teneua 4. anni gliene toccaua la metà, che sono 215. & alla medesima ragione in 40. mesi gliene toccherebbe 260. $\frac{1}{4}$. Non poniamo che le 60. che messe il pastore l'habbia tenute da per se, senza metterle in foccita con quelle di Pietro, e che in capo di 40. mesi li sieno tornate. 105. le quali aggiunte a $260\frac{1}{4}$, fanno $365\frac{1}{4}$. & il detto Pietro Carani vuol che sieno 367. $\frac{1}{2}$. ma quando questa sua soluzione preuallesse, che da noi non si concede, ne seguirebbe pur questo contro di lui, che il padrone non participarebbe dell'utile de' 60. pecore, che messe in foccita il pastore, douendo di ragione ciascuno di loro participare, del guadagno per dicità quando si fusse, adunque stante la sua soluzione, il padrone non farebbe partecipe se non di che fu, che mette in foccita. Il onde, se questa nostra soluzione sarà da qualcuno sopitata, errarà grandemente. Adducendo appresso, che in vn medesimo errore è incorso Francesco Pagan da Bagnacavallo nella terza proposizione delle sue foccite.

Proposizione 12.

V No da in foccita 200. pecore, con patto, che il pastore ne metta 50. e le tēga 6. anni, & alla fine de' uino partec. per metà, pro, dāno, e capitale, accade che il pastore tēga 6. anni, e trouaronsi 1200. pecore, si domanda quante ne toccherà per vno. Fa così, già tu vedi, che se non le teneua più di 6. anni, al pastore gliene toccaua la metà, cioè 600. e queste metti da parte per il pastore, e dell'altre 600. che restano per il Padrone, vengono in noua foccita col pastore, come se dicessi, il padrone mette 200. pecore, & il pastore 50. a termine di 6. anni, a parte come sopra, accade che le tiene 6. anni, e trouaronsi 600. pecore, cioè quella metà che uoliamo per il Padrone, si domanda quante ne toccherà per vno. Spina tofime 2000. 50. fanno 250. delle quali il pastore ne mette 50. che sono 4. di tutto il montepelle che deue ancora hauere il suo di quello che si trouano, piglia adique il 3. di 600. ne viene 120. e tanto ne viene al pastore per rata di quelle 50. che messe. Non vedi quante gliene farebbe toccate in capo di 6. anni tu sai che hauerebbe partito per metà, adunque n'hauerebbe hauute 300. e noi sappiamo che per rata di quelle che mette, gliene tocca 120. adunque si vede che in 6. anni guadagna da 120. fino in 20. che sono 180. e perche dirai così se in 6. anni guadagna 180. pecore, quante se ne guadagnera in 3. anni, che le tēne più che non erano i patto sopra, trouarai che si guadagnera 90. pecore, le quali aggiungerai con le 120. che li toccorno faranno a 10. e queste aggiungerai con le 600. che messimo da parte per il pastore, quali gli toccherano per sua parte de' primi 6. anni, trouarai che faranno in tutto 810. e tante pecore toccherebbe al padore, & al Padrone il resto, cioè 390.

Proposizione

Proposizione 13.

VNo dà in foccita 60. pecore, con patto che il pastore ne metta 20. e le tenga 40. anni, & alla fine partire pro danno, e capitale per metà, accade che il Pastore non messe niente, e si trouorno tra capitale, e guadagno alla fine del tempo 240. pecore, domando quante ne toccherà per vno. Arguisci così, che se il pastore hauesse messo le 20. pecore doucuano partire per metà, e perciò bisogna vedere quante farebbono augmentate con le 20. più. tu vedi che il Padrone mette 60. e tornano 240. adunque s'acquista 180. pecore. Laonde dirai così, se 60. acquistano 180. quanto hauerebbono acquistato 20. che doueua mettere il pastore? opera, ne verrà 60. & a queste aggiungi 20. di capitale che doueua mettere faranno 80. sì che se il pastore offeruaua la promessa, tornauano 80. pecore, più che non tornorno, perciò aggiungi queste 80. a 240. faranno 320. quali parti per metà (perche farebbono tornate 320. in tutto) ne viene 160. e tanti ne tocca al padrone, & il resto fino in 240. che si trouano, cioè 80. toccano al pastore.

Proposizione 14.

VNo dà in foccita a vn'altro 90. pecore, con patto che il pastore ne metta 30. & in capo di 4. anni deuino partire pro danno, e capitale per metà, accade, che il pastore ne messe solo 20. & in capo di tre anni si trouorno pecore 220. si domanda quante ne toccherà per vno? se il pastore metteua 30. pecore, come promesse, non ha dubbio alcuno, che in capo di 4. anni conueniua di ragione diuidere la foccita, ma hauendone messe solamente 20. ci conuien trouare a che tempo le doueriano partire, e quante manco pecore mette il pastore, tanto più tempo conuerrebbe le tenesse prima che le diuide ssero, e perciò diremo così, se 30. pecore che mette fussero 30. che realmente doueua mettere, quanto farebbono 4. anni, che le doueua tenere? moltiplica 4. via 30. fa 120. e questo parti per 20. ne vien 6. e 6. anni diremo che il pastore fusse tenuto a guardarle tutte, ma noi sappiamo che in capo di 3. anni son d'accordo di partirle, vediamo hora quante ne toccherà per vno. Noi habbiamo che il padrone ne mette 90. & il pastore ne mette 20. che in tutto fanno pecore 110. adunque il pastore mettendone 20. viene a mettere $\frac{1}{3}$ di tutto il capitale, e perciò deuue hauere li $\frac{1}{3}$ di tutte quelle che si trouano, piglia $\frac{1}{3}$ di 220. ne vien 40. e queste toccano al pastore per le 20. che mette, dipoi tu vedi, che se le teneua 6. anni, gli toccaua la metà di 220. pecore, cioè 110. Laonde veniua a guadagnare dalle 40. pecore fino in 110. cioè 70. perciò dirai così, se in 6. anni guadagnaua 70. pecore più, quante ne guadagnerà in 3. anni che l'ha guardate? opera, trouarai che ne guadagnerà 35. le quali aggiunte alle 40. che prima gli toccorno, faranno in tutto pecore 75. e tante ne toccherà al pastore, & il resto, cioè 145. toccheranno al padrone, le quali si trouano così. Perche mette 90. pecore viene a mettere $\frac{2}{3}$ di tutto il capitale, e perciò piglia $\frac{2}{3}$ di 220. ne viene 145. dipoi dirai così, se in 6. anni scapitaua 70. pecore con il pastore, quante ne scapitarà in 3. anni? opera, ne scapitarà 35. che tratte di 180. restano 145. per il padrone.

Soluila in quest'altro modo, diuidi 220. pecore per rata di 90. del padrone,

e di 20. del pastore, ne verrà 180. al Padrone, e 40. al pastore, adunque il pastore di 20. pecore ne fece 40. e se ne metteua 30. ne faceua 60. per il che diede di perdita 20. pecore a tutto il monte, perciò caua 20. di 220. restano 200. e queste diuidele per metà ne vien 100. e tante ne toccarebbe al pastore se le tenue 4. anni. Laonde dirai così, se in 4. anni doueua hauere 100. pecore, quantene douerà hauere in 3. anni? opera, ne douerà hauere 75. come di sopra habbiamo concluso.

Delle Pigionie.

Propositione 1.

VNo togli vna casa a pigione per duc. 36. l'anno, & il padrone di essa per suo bisogno, vuole auanti tra te duc. 120. e scontrarli nella pigione, e far buono al pigionante per merito de' ducati, che paga auanti, a ragione di 8. per cento l'anno a capo d'anno, si domanda quanto tempo douerà stare in detta casa, acciò che i detti denari si scontino nella pigione. Fa così, guarda quanto guadagnano duc. 120. in vn'anno, dicendo se cento ducati guadagnano duc. 8. quanto guadagneranno duc. 120? opera, ne verrà duc. 9. sol. 12. quali aggiunti a duc. 120. fanno duc. 129. sol. 12. e di questi caua duc. 36. che paga per vn'anno di pigione, restano duc. 93. sol. 12. e questi li meritarai per vn'altr'anno nel modo sopradetto a 8. per cento l'anno, torneranno duc. 101. sol. 1. den. 9. de' quali caua duc. 36. restano duc. 65. sol. 1. den. 9. e questi meritarai per vn'altr'anno alla medesima ragione, torneranno duc. 70. sol. 5. den. 11. de' quali caua duc. 36. restano duc. 34. sol. 5. den. 11. e questi meritarai per vn'altr'anno a 8. per cento l'anno, torneranno duc. 37. sol. 0. den. 9. de' quali caua duc. 36. resta duc. 1. sol. 0. den. 9. e questo merita per vn'altr'anno, tornerà duc. 1. sol. 2. den. 5. del quale non si puol più cauare duc. 36. per la qual cosa dirai così, se duc. 36. lo fanno stare nella casa vn'anno, cioè 12. mesi, quanti mesi, ouero giorni ve lo farà stare duc. 1. sol. 2. den. 5? opera, te ne verrà 11. giorni in circa, perciò che non habbiamo tenuto conto degli auanzi, e minutie de' denari, che in tal'operare s'è fatto, e perche quattro volte s'è cauato 36. ducati nel sopradetto operare, diremo che il pigionante douerà tenere 4. anni la detta casa, e poi resta hauere duc. 1. sol. 0. den. 9. dal padrone della casa, quando fussero d'accordo di 4. anni apunto, ma volendo stare in casa fin tanto siano sconti tutti i sopradetti denari, conuien meritare duc. 1. sol. 0. den. 9. per vn'anno, come di sopra habbiamo fatto, che tornano duc. 1. sol. 2. den. 5. e per questi denari, conuien che goda la casa 11. giorni più di 4. anni, come habbiamo dimostrato.

Propositione 2.

FRancesco appigiona vna Casa a Pietro a di 15. Giugno 1590. per lire 75. l'anno, e Pietro appigiona vna bottega a Francesco ad i. Gennaio 1591. per lire 77. l'anno, e quando furono alla fine di Luglio 1592. d'accordo Francesco si riprese la casa, e Pietro la bottega, si domanda chi di loro douerà ripare all'altro,

altro, e quanto. Fà così, vedi quanti mesi Pietro habita la casa, che dal di 15. Giugno che vi tornò fino a di vltimo Luglio 1592. vi corre mesi 25 $\frac{1}{2}$. vedi hora a lir. 75. l'anno quanto deue pagare in detto tempo, trouarai che Pietro douerà pagare lir. 159. fol. 7. den. 6. per la pigione della casa. Dipoi vedi quanti mesi Francesco gode la bottega, che dal di 1. di Gennaio 1591. che la conduce a pigione, fino ad vltimo Luglio 1592. vi corre mesi 19. vedi hora a lir. 77. l'anno quanto deue pagare in 19. mesi, trouarai, che Francesco douerà pagare lir. 121. fol. 18. den. 4. per la pigione della bottega, lequali tratte di lir. 159. fol. 7. den. 6. che doueua pagar Pietro, restano lir. 37. fol. 9. den. 2. e così diremo che Pietro douerà rifare a Francesco lir. 37. fol. 9. den. 2. e faranno del pari.

Proposizione 3.

VNo toglie vna casa a pigione per 5. anni a lir. 40. l'anno, & il padrone della casa dice al pigionante, se tu mi vuoi dare al presente tutti i denari della pigione di 5. anni, son contento fartene lo sconto a denari 2. per lira il mese, si domanda quante lire gli douerà dare al presente. Fà così, tu vedi che in 5. anni gli doueria dare lir. 200. hora bisogna vedere quanto guadagna vna lira l'anno, la quale viene a guadagnare fol. 2. & in 5. anni guadagnerebbe fol. 10. di maniera che meritando vna lira a 2. denari il mese, in 5. anni tornerebbe fra merito, e capitale lir. 1 $\frac{1}{2}$. e scontando lir. 1 $\frac{1}{2}$. per detto tempo, tornerebbe lir. 1. cioè se il pigionante hauesse a dare al padrone della casa lir. 1 $\frac{1}{2}$. in capo di 5. anni, e vollesse esser pagato al presente, gli douerebbe dare lir. 1. volendoli fare il sopradetto sconto, e perciò dirai così, se di lir. 1 $\frac{1}{2}$. che gli doueua dare alla fine di 5. anni, gli dà al presente lir. 1. quante glie ne douerà dare di lir. 200? opera, li douerà dare lir. 133 $\frac{1}{2}$. e così farà le simili.

Proposizione 4.

VNo toglie vna casa a pigione per lir. 60. l'anno, & il pigionante diede auanti al padrone della casa lir. 140. & esso gli promette di darli di merito a den. 2. per lira il mese, acciò che non tenga i suoi denari persi, e scontare ogn'anno lir. 60. nella pigione, si domanda quanto tempo le douerà tenere, e acciò siano sconti apunto. Questa è simile alla prima nostra proposizione delle pigioni. Prima bisogna vedere quanto guadagnano le lir. 140. in vn'anno a den. 2. per lira il mese, trouarai che guadagnano lir. 14. e queste aggiuntile a lir. 140. fanno lir. 154. e di queste cauarne lir. 60. per la pigione d'vn'anno, restano lir. 94. hora vedi quanto guadagnano queste lir. 94. in vn'anno alla medesima ragione trouarai, che guadagneranno lir. 5. fol. 8. le quali aggiuntoe a lir. 94. fanno lire 103. fol. 8. e di queste caua lir. 60. per la pigione del second'anno, restano lir. 43. fol. 8. e queste vni quanto guadagnano in vn'anno alla medesima ragione, trouarai che guadagnano lir. 3. ol. 5. den. 9. quali aggiute a lir. 43. fol. 8. fanno lir. 47. fol. 14. den. 9. hora tu vedi, che di questo non se può cauarne lir. 60. cioè la pigione d'vn'anno intero, e perciò dirai così: se lir. 60. lo facciano stare in casa mesi 2. per lir. 47. fol. 14. den. 9. quanti mesi vi douerà stare? opera, ne verrà mesi 9. e giorni 16 $\frac{1}{2}$. e così diremo che il pigionante douerà stare in casa

fa anni 2. mesi 9. e giorni $16\frac{1}{2}$. Nota, che tante volte, quante ne potrai calcolare le lire che si paga l'anno di pigione, cioè *lir. 60.* o quelle che fussero, tanti anni interi diremo che douerà stare in detta casa, e quando non se ne può calcolare quella quantità di lire, o ducati interamente, che si paga l'anno di pigione, farai, come in questa habbiamo dimostrato.

Proposizione 5.

VNo toglie vna casa in affitto per *lir. 60.* l'anno, & il padrone della casa vuol esser pagato per 2. anni inanzi, e farli lo sconto a ragione di 20. per cento l'anno a capo d'anno, si domanda quante lire li douerà dare al presente. Perche noi non habbiamo ancora trattato de' meriti, e sconti, o semplici, o a capo d'anno, perciò volendo intender meglio la solutione d' alcune proposte di queste pigioni: risguarda il trattato de' meriti, e sconti, dou' n' haurai piena notizia. Hor volendo soluer la presente proposta, noi habbiamo che meritando a 20. per 100. di cento si fa 120. cioè di 5. si fa 6. e scontando di 120. di 100. cioè di 6. si fa 5. e perciò dirai così, se di 6. si fa 5. che si farà di *lir. 60.* opera si farà 50. e tante lire li douerebbe dare, se l'hauesse a pagare d'vn anno solo inanzi, hora farai per il second'anno, dicendo, se di 6. si fa 5. che si farà di *lir. 50.* opera, si farà $41\frac{2}{3}$. e tante lire saranno quelle del second'anno, le quali aggiungerai a *lire 50.* del prim'anno, fanno *lir. 91 $\frac{2}{3}$.* e tante lire li douerà dare inanzi. Auuertendo di non arguir così, che in 2. anni douesse dare *lir. 120.* e scontar poi *lir. 120.* per 2. anni, le quali tornerebbono *lir. 83 $\frac{1}{3}$.* perciò che faresti grandissimo errore, ateso che le *lir. 60.* del primo anno, non si deuono pagare in capo a 2. anni, ma in capo a un'anno solo, e perciò bisogna scontarle per un'anno e l'altre *lir. 60.* del second'anno, conuiene scontarle per 2. anni, come habbiamo fatto.

Proposizione 6.

VNo tol'e vna casa a pigione per *duc. 30.* l'anno, & il padrone della casa vuol esser pagato per 3. anni innanzi, e farli lo sconto a ragione di 20. per cento l'anno semplicemente, si domanda quanti ducati li douerà dare innanzi. Noi habbiamo che in 3. anni il pigionante pagherebbe *duc. 90.* di pigione, de quali volendone far lo sconto a 20. per cento semplicemente, bisogna prima vedere quanto guadagna vna lira in vn mese, trouerai che guadagna 4. denari, hor vedi quanto guadagnerà in 3. anni, trouerai che guadagnerà *sol. 12.* i quali aggiunti a *sol. 20.* cioè, a vna lira di capitale faranno *sol. 32.* adunque se il pigionante hauesse hauuto a dare al padron della casa *sol. 32.* in capo di 3. anni, e volendoli nel principio di detti tre anni gli douerebbe dare *sol. 20.* perciò che (meritando) di 20. in 3. anni si fa 32. e scontando di 32. si fa 20. sperilche dirai così. Se 32. scontati per 3. anni a ragione di 20. per cento l'anno, tornano 20., che torneranno 90. opera torneranno $56\frac{2}{3}$. e tanti ducati gli douerebbe dare al presente.

Propositione 7.

VNo ha due case, che la maggiore vale duc. 800. e l'ha appigionata à Giovanni per 20. duc. l'anno, e l'altra casa vale duc. 600. e l'ha appigionata à Girolamo per tanto tempo, che per rata della prima, paghi duc. 20. si domanda quanto tempo Girolamo douerà tenere la seconda casa, e quanto tempo Giovanni douerà tener la prima, accioche paghi tanto quanto paga Girolamo in vn'anno. Arguirai così, che se duc. 600. fussero duc. 800. pagherebbe tanto d'vno, quanto l'altro, perciò dirai, se 600. fusse 800. che farebbe mesi 12. cioè vn'anno, opera, trouerai che 12. mesi farebbono 16. & in tanti mesi dirai che Girolamo douerà pagare duc. 20. di pigione, come Giovanni; Hora volendo saper quanto tempo Giovanni douerà tener la prima casa, accioche paghi quanto paga Girolamo in vn'anno, dirai così, se 800. fusse 600. che farebbe mesi 12. cioè vn'anno, opera, trouerai che 12. farebbe 9. & in 9. mesi Giovanni pagherebbe tanto quanto Girolamo in vn'anno, cioè duc. 15. Fanne proua, e trouerai, che sarà così.

De Cambij.

LE ragioni de' Cambij, non riguardano altro, nè altro vogliono inferire, che vn dire piglia qui, e dà qua; le specie de' quali noi diciamo che son quattro; la prima specie si chiama cambio minuto, o vero commune, la seconda specie si chiama cambio reale, la terza specie si chiama cambio secco, e la quarta specie si chiama cambio fitiuo.

Cambio minuto è quando si dà vna moneta per vn'altra, o vn'oro per vn'altro, o moneta per oro, & è conuerso, come chi volesse cābiare vn ducato, vā al banchiere, e li fa dare moneta a suo gusto, & il banchiere per comun'uso li tiene della valuta di tal ducato qualche cosa più che quell'oro non vale, e questo si chiama cambio minuto, il qual cambio molti sacri Dottori concludono esser lecito, massime a quelli che tengono il banco, e che per tal seruitio hanno fatica, e spesa. Il secondo è detto Cambio reale, e questo è veramente il timone del traffico mercantescio, perche se senz'esso sarebbe quasi impossibile a poter ben trafficare, il quale si costuma far per lettere, che son poi dette lettere di cambio, nel quale s'usa ricuere 2. o 3. per cento, secondo che più, o meno il corso vale da vn luogo all'altro, perche i cambij non stanno a vn segno nelle patrie, e questo procede dall'abbondanza, o carestia de' denari, che sono in quei luoghi. Perciò i buoni Mercanti stando in simili auuisi, sempre s'ingegnano eauer denari doue n'è abbondanza, e rimetterli doue n'è carestia con più lor vantaggio. Il terzo cambio, è detto cambio secco, il quale non stā mai fermo di prezzo, perche il cambio corre più, e meno secondo le fiere, come per esempio. Io sono in Fiorenza, & ho bisogno di 500. ducati, perciò li prendo dal Banchiere in questo dì, per prezzo, e costo, che di qua a 6. mesi, o altro termine correrà per Lioue, o per Londra, del qual conto, nè il datore, nè il prenditore hanno certezza alcuna, e puol così danneggiare l'vno, con l'altro. Il cambio fitiuo, è questo, che me per esempio, se vno hauesse hauer da te per co-

to di robbe vendute, o denari prestati, con conditione, e patti, che li vuol poter torre a cambio per qual parte li piace, o per Lione, o per Londra &c. e quando al tempo determinato tu non lo pagassi, allora quel tale finge (intendendosi con qualche amico che li fa terzo) d'hauerli dati a cambio, e per sua grandissima necessit  souenutolo, e questo tal terzo soggiunger , che con suo grandissimo scommodo l'ha seruito, & alle volte con verit  quel tale scriuer  in Lione, e in Londra all'amico suo in questo inodo. Trammi duc. 300. per qui, secondo l'vsanza, come se tu l'hauesti hauer da me di ratte, ch'io t'hauesti fatte, perci che io ho hauer qui da vno, e non viene a fine di pagarmi, & allora l'amico lo serue di parole, e gli fa vna lettera di cambio piu calda, che il fuoco, e tralli quella quantit  che vuole, e lui con questa lettera ti trouar , e dir  cos , ecco che mi bisogna pagar da tal somma di ducati al tale, che qui mi scriue, e cos  con mille finzioni ti far  parere il bianco nero, e quest'vso di cambio fittiuo malageuolmente si pu  commendare per molte, e diuerse fraudi, che dal c to del datore puole interuenire. Perci  ogni mercante, o cassiere di qualsuoglia traffico, conuien che ne' cambij sia molto esperto, perche alle volte potrebbe cos  se stesso, come altri ingannare. Laonde dimostrando noi alcune ragioni di cambij, faranno scorta, e guida, a soluere ogn'altra.

Propositi ne II.

† V No deue hauer da vn'altro in Fiorenza duc. 730. e son d'accordo che glieli rimetta in Roma, si domanda quanti gliene sar  rimessi in Roma, essendo peggio quelli di Fiorenza $2\frac{1}{2}$. per cento. Molti per soluer questa, & altre simili direbbono cos , se duc. 100. son peggio duc. $2\frac{1}{2}$. quanto faranno peggio duc. 730. che al modo loro farebbon peggio duc. $18\frac{1}{2}$. i quali tratti di duc. 730. restano duc. $711\frac{1}{2}$. e tanti direbbono che gli sarebbe rimesso in Roma; ouero alcun'altri direbbono cos , se duc. 100. di Fiorenza, tornano in Roma duc. $97\frac{1}{2}$. quanti torneranno duc. 730? che medesimamente tornerebbono duc. $711\frac{1}{2}$. Ma tal solutione   falsa, perci che non ne risulta qualche douerebbe, cio  si come duc. 100. di Fiorenza, dicono che tornano in Roma duc. $97\frac{1}{2}$. ne douerebbe seguitare ancora, che duc. $97\frac{1}{2}$. di Roma ritornassero in Fiorenza duc. 100. per la qual cosa non ritornano; perci che essendo meglio i ducati di Roma $2\frac{1}{2}$. per cento, noi diciamo, meglio, perci che qualche vno perde, l'altro acquista, come per esempio, se noi vendessimo vna mercantia a vn'altro, e perdessimo $2\frac{1}{2}$. per cento, si dice che quello il quale comprasse detta mercantia guadagnerebbe $2\frac{1}{2}$. per cento, di maniera che se i ducati di Fiorenza son peggio $2\frac{1}{2}$. per cento, cambiandoli poi con quelli di Roma, ne segue che quelli di Roma sieno meglio $2\frac{1}{2}$. per cento, adunque 100. ducati di Roma, torneranno in Fiorenza duc. $102\frac{1}{2}$. Hora essendo cos  la verit , vediamo se duc. $97\frac{1}{2}$. di Roma ritornano in Fiorenza duc. 100. come di ragione douerebbono, e dir  cos , se duc. 100. di Roma tornano in Fiorenza duc. $102\frac{1}{2}$. quanti torneranno duc. $97\frac{1}{2}$. di Roma in Fiorenza? opera, torneranno duc. $99\frac{1}{4}$. e douerebbono tornare duc. 100. e perci  ne seguirebbe secondo la loro opinione, che $97\frac{1}{2}$. fusse vgual  a 100. cio  che se duc. 100. di Roma, cambiandoli a ducati di Fiorenza crescono $2\frac{1}{2}$. che anche duc. $97\frac{1}{2}$. pur di Roma crescessero $2\frac{1}{2}$. la qual cosa   impossibile, e cos  concluderemo, che tanto quanto son peggio per cento i ducati di Fiorenza, t -

to sieno meglio per ceto quelli di Roma, o d'altri luoghi, doue si volessè fare il câbio, adûque i ducati di Roma farâno meglio $2\frac{1}{2}$. per cento, che quelli di Fiorenza, per ilche volendo soluer questa propositione, farai così, aggiungi $2\frac{1}{2}$. a 100. farâ 102 $\frac{1}{2}$. e così habbiamo concluso, che duc. 100. di Roma tornino in Fiorenza duc. 102 $\frac{1}{2}$. concludiamo ancora per l'opposito, che duc. 102 $\frac{1}{2}$. di Fiorenza, tornino in Roma duc. 100. che è quanto ci occorreua dimostrare, laonde volendo venire alla solutione di questa, dirai così, se duc. 102 $\frac{1}{2}$. di Fiorenza tornano in Roma duc. 100. si domanda duc. 730. di Fiorenza quanti torneranno in Roma; multiplica 730. via 100. & il prodotto parti per 102 $\frac{1}{2}$. trouarai che ne verrà duc. 712 $\frac{1}{4}$. e tanti ducati torneranno in Roma, come facendone proua (riuoltando la ragione) trouarai che i medesimi duc. 712 $\frac{1}{4}$. torneranno in Fiorenza duc. 730.

Per corroboratione di quanto habbiamo detto di sopra, notifi l'infra scritta propositione, che è la 7. descritta da Fra Luca, la qual dice così. Vno di Venetia rimette a Perugia sol. 300. Venetiani, e li denari Venetiani son peggio 8. per cento de' Perugini. Guarda in simili di peggio, e di meglio, che tu nò abbagli, come fanno alcuni grossolani, che direbbono che li sol. 300. di Venetia fussero peggio 24. a 8. per cento, che non è la verità; ma si fa così la proua, se quelli di Venetia son peggio 8. per cento, adûque per 108. di Venetia n'haurò 100. di Perugia; e perciò dirai, se per 108. n'haurò 100. quanti n'haurò per 300. opera, n'haurò 277 $\frac{2}{3}$. e tanti torneranno li 300. fiorini di Venetia in Perugia. Quest'ordine di meglio, e di peggio; offeruano ancora tutti gli altri Autori, che sopra di ciò hanno trattato.

Propositione 2.

IL Bolognino in Fiorenza vale 22. piccioli, & in Bologna vale 12. piccioli, & vno mi deue dare in Fiorenza 364. e me le vorrebbe dare in Bologna, si domanda quante me ne douerà dare di quella moneta. Fa così, per regola del tre, dicendo; se piccioli 22. di Fiorenza, tornano in Bologna piccioli 12. le lir. 364. di Fiorenza quante torneranno in Bologna; multiplica 364. via 12. fa 4368. e questo parti per 22. ne viene 198. $\frac{4}{11}$. e tante lire douerà hauere in Bologna di quella moneta. Datà forse ammiratione a qualcuno il non hauer noi ridotte le sopradette quantità a vna medesima natura, cioè le lire in denari, ouero i denari in parte di lira, ma di ciò non si marauigliano, perche se 22. piccioli di Fiorenza tornano in Bologna piccioli 12. ne segue ancora, che sol. 22. di Fiorenza tornino in Bologna sol. 12. e così lir. 22. di Fiorenza, torneranno lir. 12. in Bologna, & il medesimo interuerrebbe se fussero ducati, o scudi, o fiorini &c. operando secondo le propositioni &c.

Propositione 3.

VNo deue hauere da vn'altro in Fiorenza ducati 160. e vorrebbe che gli rimettesse similmente ducati 160. in Bologna, doue cento ducati di Fiorenza tornano duc. 102 $\frac{1}{2}$. in Bologna, si domanda quanti ne douerà pagare in Fiorenza, acciò che ne riceua 160. in Bologna. Dirai così, se per duc. 102 $\frac{1}{2}$. di Bologna

logna paga in Fiorenza ducati cento, quanti ne pagará per hauerne 160. in Bologna? multiplica 160. via 100. & il prodotto parti per $102\frac{1}{2}$. ne viene duc. 156. fol. 1. den. 11 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. e tanti ducati douerà pagare in Fiorenza.

Propositione 4.

† VN Merc ante deue hauere da vn'altro Mercante in Fiorenza la valuta di canne 630. di Rasce a lir. 31. fol. 16. la canna, della quale gl'è fatto il pagamento a Lione di Francia in tanti scudi del Sole; si domanda quanti scudi d'oro del Sole douerà hauere, essendo li scudi cento del Sole scudi 103. d'oro Italiani. Fa così, troua prima la valuta della Rasce, trouarai, che varrà lire 20034. delle quali farai scudi d'oro Italiani a lir. 7 $\frac{1}{2}$. per scudo; haueraí che faranno scudi 2671 $\frac{1}{2}$. i quali volendo ridurre a scudi del Sole, dirai così. Se scudi 103. Italiani sono scudi cento del Sole, li scudi 2671 $\frac{1}{2}$. Italiani, quanti scudi del Sole faranno? multiplica 2671 $\frac{1}{2}$. via cento, & il prodotto partilo per 103. trouarai che ne verrà scudi 2593 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. del Sole.

Propositione 5.

† VN Mercante deue hauere da vn'altro in Roma duc. 2350. d'oro di Camera, i quali gli sono rimessi in Lione in tanti Marchi, a scudi 65. d'oro il marco, si domanda quanti marchi ne douerà hauere, se ogni 100. ducati di Camera, sono scudi 102 $\frac{1}{2}$. d'oro di marchi, fa così, dicendo, se ducati cento di Camera, sono ducati 102 $\frac{1}{2}$. di marchi, i sopradetti ducati 2350. di camera quanti scudi d'oro di marchi faranno? opera, trouarai che faranno scudi 2408 $\frac{1}{2}$. de' quali conuien farne marchi, a scudi 65. il marco; parti adunque 2408 $\frac{1}{2}$. per 65. ne viene marchi 37 once 0. denari 4 e grani 1 $\frac{1}{2}$.

Propositione 6.

† C Ambiasi in Fiorenza per Milano, e dassi scudi 96 $\frac{1}{2}$. d'oro, per hauere in Milano scudi cento vn Mercante ha cambiato scudi 1250. d'oro, si domanda quanti ne douerà hauere in Milano. Fa così, dicendo, se scudi 96 $\frac{1}{2}$. di Fiorenza tornano in Milano scudi 100. li scudi 1250. di Fiorenza, quanti torneranno in Milano? opera, trouarai che torneranno scudi 1291. fol. 19. den. 9 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. Fanne proua, riuoltando la ragione, dicendo così, se scudi 100. di Milano, tornano in Fiorenza scudi 96. fol. 15. si domanda per scudi 1291. fol. 19. den. 9 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. di Milano quanti se ne douerà hauere in Fiorenza? opera, come di sotto vedi, partendo per 10. e 10. e per 20. e per 12. tenendo poco conto delle minutie, ouero rotti de' denari, che nel parture, o multiplicare in questi casi occorrono.

10)	96.	15.	0.	1291.	19.	9.
10)	9.	13.	6.			
20)	0.	19.	$4\frac{1}{2}$.			
12)	0.	0.	$11\frac{1}{2}$.			
	0.	0.	$0\frac{1}{2}\frac{1}{2}$.			
	0.	0.	$8\frac{1}{2}$.			
	0.	18.	$4\frac{1}{2}$.			
	0.	19.	$4\frac{1}{2}$.			
	87.	1.	6.			
	1161.	0.	0.			
Scudi	1249.	19.	$10\frac{1}{2}\frac{7}{10}$.			

Propositione 7.

Ambiasi in Fiorenza per Lione di Francia, e daffi scudi $100\frac{1}{2}$. per hauere in Lione scudi 100. del Sole, vn Mercante ha cambiato scudi 1150. d'oro, si domanda quanti scudi del sole douerà hauere in Lione. Fa così, dicendo, se per scudi $100\frac{1}{2}$. di Fiorenza, si riceue scudi 100. del Sole, quanti se ne riceuerà per scudi 1150. d'oro, multiplica 1150. via 100. & il prodotto parti per $100\frac{1}{2}$. ne viene $1146\frac{7}{10}\frac{1}{2}$. e tanti ducati doueria riceuere in Lione.

Propositione 8.

Ambiasi in Pisa per Siuiglia lo scudo d'oro per marauilis 420. doue dicefi che in Pisa vale 375. Vn mercante ha cambiato scudi 2600. d'oro, si domanda quanti scudi douerà hauere in Siuiglia. Fa così, dicendo, se 375. marauilis di Pisa tornano in Siuiglia 420. li scudi 2600. d'oro di Pisa, quanti torneranno in Siuiglia? multiplica 2600. via 420. & il prodotto parti per 375. ne viene 2912. e tanti scudi douerà hauere in Siuiglia.

Propositione 9.

Ambiasi in Roma per Fiorenza, e daffi ducati $93\frac{1}{2}$. di camera per hauere in Fiorenza scudi 100. d'oro. Vn mercante ha cambiato duc. 2360. di camera, si domanda quanti scudi d'oro douerà hauere in Fiorenza. Dirai così, se duc. $93\frac{1}{2}$. di Camera, m. danno scudi 100. di Fiorenza, quanti me ne daranno i sopradetti ducati 2350? multiplica 2350. via 100. & il prodotto parti per $93\frac{1}{2}$. ne viene $2517\frac{1}{2}$. e tanti scudi d'oro douerà hauere in Fiorenza.

Proposizione 10.

V No deue dare a vn'altro in Venetia duc.640. & il creditore se vorrebbe in Fiorenza, doue duc.100.di Venetia tornano in Fiorenza scudi $83\frac{1}{2}$. si domanda quanti scudi douerà hauere in Fiorenza. Dirai cosi, se duc.100. di Venetia sono scudi $83\frac{1}{2}$. in Fiorenza, li duc.640. di Venetia, quanti scudi torneranno in Fiorenza? multiplica, e parti, trouarai che ne verrà scudi 535. sol. 0. den 9 $\frac{2}{3}$. e tanti ne douerà hauere in Fiorenza.

Proposizione 11.

V No deue dare a vn'altro in Fiorenza scudi 560. & il creditore li vorrebbe in Roma, e li scudi di Roma son meglio $3\frac{1}{2}$. per cento, si domanda, quanti gliene douerà dare in Roma. Chiara cosa è, che se li scudi di Roma son meglio $3\frac{1}{2}$. per cento di quelli di Fiorenza, ogni 100. scudi di Roma, torneranno in Fiorenza scudi $103\frac{1}{2}$. e perciò dirai cosi, se scudi $103\frac{1}{2}$. di Fiorenza tornano in Roma scudi 100. li scudi 560. di Fiorenza, quanti torneranno in Roma? multiplica 560. via 100. & il prodotto parti per $103\frac{1}{2}$. & hauerai che ne verrà scudi 541. sol. 1. den. $3\frac{1}{2}$. e tanti ne douerà hauere in Roma.

Proposizione 12.

V No ha tratto di Fiorenza duc.300. sol.16. den.8. per Roma, per i quali ne sono stati scritti in Roma duc.290. sol.13. den.4. domando volendo trarre di Fiorenza per Roma duc. $60\frac{1}{2}$. quanti ne douerà esser pagati in Roma. Farai cosi, reca i soldi, e denari a parte di ducati, a sol.20. d'oro il ducato, di poi dirai, se duc.300 $\frac{1}{2}$. tornano in Roma duc. 290 $\frac{2}{3}$. li duc. $60\frac{1}{2}$. di Fiorenza, quanti torneranno in Roma? opera, seruendoti del crociamento de' rotti, si come altre volte habbiamo dimostrato, trouarai che ne verrà duc.58. sol.9. den. $1\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. e tanti se ne douerà pagare in Roma.

$$\begin{array}{r}
 300\frac{1}{2} \qquad 290\frac{2}{3} \qquad 60\frac{1}{2} \\
 \underline{\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{2}} \quad \times \quad \underline{\frac{1}{3} \frac{7}{3}} \qquad \underline{\frac{2}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{2}} \\
 \text{Partitore.}
 \end{array}$$

Proposizione 13.

V No deue dare a vn'altro in Lucca lir.300. di moneta Fiorentina, della quale non ha commodità di pagarle, ma ha il modo a darli due forti di monete, cioè bolognini, e grossi, & il bolognino in Fiorenza vale den.15. & in Lucca vale den.24. & il grosso di Lucca vale in Fiorenza den. 60. & in Lucca vale

vale den. 24. & il grosso di Lucca vale in Fiorenza den. 60. & in Lucca vale den. 72. si domanda qual moneta gli torna meglio pagare, o bolognini, o grossi, e quanto per cento. Sappi, che se den. 15. di Fiorenza sono in Lucca den. 24. anche sol. 15. di Fiorenza, sono in Lucca sol. 24. e così lir. 15. di Fiorenza sono in Lucca lir. 24. intendendo però, che le monete di Lucca siano d'vna medesima lega che il bolognino. Hora bisogna vedere, se gli desse bolognini, quante lire di bolognini gli darebbe per lir. 300. e dirai così, se per lir. 15. di Fiorenza si riceue in Lucca lir. 24. per lir. 300. di Fiorenza, quante lire si riceuerà in Lucca? opera, trouarai, che ne douerà riceuere lir. 480. e queste salua; Dipoi vedi, volendoli dar grossi, quante lire li douerà dare, e dirai così, se lir. 60. ouero denari, sono in Lucca lir. 72. le lir. 300. di Fiorenza, quante torneranno in Lucca? opera come di sopra, trouarai che torneranno lir. 360. adunque tu vedi manifestamente, che li torna meglio a pagar grossi, che bolognini, e volendo sapere quanto per cento, trarrai 360. di 480. resta 120. dipoi dirai così, se di lire 360. io mi auuantaggio lir. 120. quanto mi auuantaggio di lir. 100? opera, te ne verrà $33\frac{1}{3}$. e tanto s'auuantaggio per cento a pagar grossi.

Propositione 14.

VNo ha dato in Fiorenza a vn banchiere duc. 800. e vuole vna lettera di cambio per Venetia, con patto che li sia pagato tante lire di grossi, che vna lira; delle quali vale in Venetia duc. 10. & i ducati di Venetia son peggio che quelli di Fiorenza $16\frac{2}{3}$. per cento; si domanda quante lire di grossi li farà pagato in Venetia; Fa così, poni il peggio sopra la sorte del capitale, farà $116\frac{2}{3}$. dipoi dirai, se duc. 100. di Fiorenza, tornano in Venetia duc. 116 $\frac{2}{3}$. per ducati 800. di Fiorenza, quanti se ne douerà hauere in Venetia? opera, ti verrà duc. 931. sol. 4. di Venetia, de quali ne farai lire di grossi, partendo per 10. ne viene lir. 93. sol. 2. den. 4 $\frac{2}{3}$. di grossi.

Propositione 15.

VNo ha pagato in Fiorenza a vn Banchiere duc. 800. e vuole vna lettera di cambio per Roma, ma il Banchiere vuole 5. per cento, domando quanti ducati li farà dare in Roma, aggiungi 5. sopra 100. fa 105. poi dirai, se per duc. 105. di Fiorenza, il Banchiere li farà dare in Roma duc. 100. quanti gliene farà dare per duc. 800? opera, trouarai, che gliene farà dare in Roma duc. 761. sol. 18. den. 1 $\frac{1}{2}$.

Propositione 16.

LA lira di Fiorenza è sol. 20. & è meglio che la lira Lucchese den. 24. e la lira di Lucca è meglio che la Modenese den. 30. e la lira di Modena è peggio che la Bolognese den. 16. si domanda lir. 100. di Bologna, quante lire Fiorentine faranno. Prima bisogna vedere quanti soldi torna in Bologna vna lira di Fiorenza, e di già noi sappiamo che vna lira di Fiorenza torna in Lucca sol.

22. hor questi fol. 22. Lucchesi quanti tornano in Modena, e dirai così, se fol. 20. di Lucca tornano in Modena fol. 22 $\frac{1}{2}$. quanti torneranno fol. 22. di Lucca in Modena? opera, torneranno fol. 24 $\frac{1}{2}$. e questi sono vguali a fol. 20. cioè a vna lira di Fiorenza, dipoi dirai così, se fol. 20. di Modena, tornano in Bologna, fol. 18 $\frac{2}{3}$. quanti torneranno fol. 24 $\frac{2}{3}$. di Modena, che sono vguali a vna lira Fiorentina? opera, torneranno fol. 27 $\frac{1}{3}$. di Bologna, e questi saranno vguali a fol. 20. di Fiorenza, dipoi dirai così, se fol. 27 $\frac{1}{3}$. di Bologna sono fol. 20. di Fiorenza, le lir. 100. di Bologna quante torneranno in Fiorenza? opera torneranno lir. 86. fol. 11. den. 7 $\frac{1}{2}$.

Solaila per quest'altro modo, ritornando indietro, dicendo così, fol. 18 $\frac{2}{3}$. di Bologna, tornano in Modena fol. 20. le lir. 100. di Bologna, quante torneranno in Modena? perciò che se la lira di Bologna è meglio della lira Modenese 16. denari, ne segue che ogni fol. 18 $\frac{2}{3}$. di Bologna siano vguali a fol. 20. di Modena; opera torneranno lire 107 $\frac{2}{3}$. dipoi dirai, se fol. 22 $\frac{1}{2}$. di Modena, tornano in Lucca fol. 20. le lire 107 $\frac{2}{3}$. di Modena quante torneranno in Lucca? opera, torneranno lire 95 $\frac{2}{3}$. dipoi dirai così, se fol. 22. di Lucca, tornano in Fiorenza fol. 20. le lire 95 $\frac{2}{3}$. di Lucca, quante torneranno in Fiorenza? opera, torneranno lir. 86. fol. 11. den. 7 $\frac{1}{2}$. come di sopra nel primo operare.

Pigliala per quest'altro modo molto bello, e maestreuole, il quale si chiama regola del sette, o delle proposizioni. Metti ordinatamente in retta serie tutt' i numeri, come di sotto puoi vedere, li quali staranno così. fol. 20. di Fiorenza, sono fol. 22. di Lucca, e fol. 20. di Lucca sono fol. 22 $\frac{1}{2}$. di Modena, e fol. 20. di Modena sono fol. 18 $\frac{2}{3}$. di Bologna, e lir. 100. di Bologna noi desideriamo sapere quante torneranno in Fiorenza. La petitione, ouero domanda che si fa nella proposizione, auuertisci di segnarla sempre nell' vltimo luogo, cioè l' vltima quantità, si come sono hora le lire 100. quali volendole ridurre alla natura della prima cosa, cioè a lire di Fiorenza, tieni quest'ordine, troua prima il partitore, che in questa il tuo partitore sarà la multiplicatione di fol. 22. via fol. 22 $\frac{1}{2}$. & il prodotto via soldi 18 $\frac{2}{3}$. che in tutto fanno 9240, e questo salua per partitore, dipoi multiplica fol. 20. di Fiorenza, via fol. 20. di Lucca, fa 400. e questo multiplica via soldi 20. di Modena, fa 8000. e questo multiplica via lir. 100. di Bologna, fa 800000. e questo parti per 9240. che saluasti, ne viene lire 86. fol. 11. den. 7 $\frac{1}{2}$. come per il primo, e secondo operare. Per non confondere il lettore, donde tal'ordine deriui, non staremo a descriuere altro, ma solamente diremo che simili ragioni tu le metta ordinatamente in regola come questa, dipoi multiplica le quantità l' vna via l' altra, secondo le dimostrazioni delle linee, che qui di sotto habbiamo figurato, e parti secondo che di sopra habbiamo detto, & hauerai l'intento tuo.

Fi.	L.	L.	M.	M.	B.	B.
20	22	20	22 $\frac{1}{2}$	20	18 $\frac{2}{3}$	100.

Propositione 17.

VNo si troua scudi 160. e li vuol cambiare, & il Banchiere li dà 560. monete d'argento di due forti, che vna forte vagliono $\frac{1}{7}$. di scudo l'vna, e dell'altra forte vagliono $\frac{1}{5}$. di scudo l'vna, si domanda quante monete furono quelle d' $\frac{1}{7}$. e quante quelle d' $\frac{1}{5}$. Fa così, poni che hauesse 12. monete, di quelle d' $\frac{1}{7}$. di scudo l'vna, le quali farebbono 4. scudi, e questi caua di 12. monete, restano 8. monete, le quali metti che siano di quelle che vagliono $\frac{1}{5}$. di scudo l'vna, che farebbono 2. scudi, i quali aggiungi a 4. scudi sopradetti, fanno scudi 6. i quali derinano da 12. monete, per il che dirai così, se scudi 6. vengono da 12. monete, da che verranno scudi 160? opera, verranno da 320. monete, e queste varranno $\frac{1}{5}$. di scudo l'vna, il resto fino in 560. che v'è 240. sono le monete che vagliano $\frac{1}{7}$. di scudo l'vna. Ancora la potreuoli uolere per via di compagnia cioè metti che hauesse 12. monete, pigliane il $\frac{1}{7}$. che è 4. e pigliane il $\frac{1}{5}$. che è 3. somma insieme, fanno 7. e poi dirai così. Due fanno compagnia, & vn di loro mette 4. e l'altro 3. & hanno a partire 560. monete, che tocca per vno? opera, al primo toccherà 320. & al secondo 240. ma auerti, che quelle che toccano al primo varranno $\frac{1}{5}$. di scudo l'vna, e quelle del secondo $\frac{1}{7}$. di scudo l'vna, perciò che vanno scambiate. Per altri modi ancora poteuamo dimostrare tal solutione, come per le due false positioni, ma per non hauere ancora dimostrato le regole di tali positioni, noi non diremo altro sopra di ciò.

Propositione 18.

VNo si troua scudi 568. e li vuol cambiare, e vuol di quattro forte monete, cioè d'vna forte, che ne v'è sette allo scudo, e dell'altra diciotto, e dell'altra vint'vno, e dell'altra 28. si domanda quante monete haucrà di ciascuna forte. Fa così, aggiungi insieme 7. 18. 21. 28. fanno 74. monete, e queste sono di 4. forti, le quali vagliono 4. scudi, di poi troua quante monete deue hauere in tutto, e dirai così, se per 4. scudi io ho 74. monete di diuerse forti, per scudi 568. quante monete douerò hauere? opera, ne verrà 10508. monete, quali diuiserai a modo di compagnia, dicendo, quattro fanno compagnia, il primo deue trarre per 7. il secondo per 18. il terzo per 21. & il quarto per 28. si domanda di 10508. quanto trarrà ciascuno? opera, trouarai che della prima forte douerà hauere 994. monete, e della seconda 2556. e della terza 2982. e della quarta 3976. fanno proua, e lo vedrai.

Propositione 19.

VNo deue hauere da vn'altro 40. bolognini, di 6. quattrini il bolognino, e deue hauere 12. grossi di 20. quattrini l'vno, e vuol tanti dell'vna, quanti dell'altra forte, si domanda quanti n'hauerà di ciascuna. Fa così, somma insieme 40. bolognini, e 12. grossi, fanno 52. hor multiplica 40. via 12. fa 480. il qual parti per 52. ne viene $9\frac{1}{13}$. e questo raddoppia, fa $18\frac{2}{13}$. e tanti bolognini,

gnini, et tanti grossi gli douerà dare, perciò che douendoli dare 40. bolognini, sono 240. quattrini, e così 12. grossi, sono 240. quattrini, che in tutto deue hauere 480. quattrini, de' quali bisogna fare due tal parti, che tanto ne venga a partire la maggiore per 20. quanto la minore per 6. trouarai che la maggiore sarà $369\frac{1}{7}$. e la minore sarà $110\frac{4}{7}$. le quali, se le partirai come s'è detto, ne verrà tanto per l'vna, quanto per l'altra.

Proposizione 20.

VNo si troua vn ducato, che vale 70. bolognini, & a grossi ne vale 20. & a carlini ne vale 14. e le vuol cambiare, e vuol due tanti grossi, che bolognini, e due tanti carlini, che grossi, si domanda quanti n'hauerà di ciascuna forte. Poni che hauesse vn bolognino, adunque haurà 2. grossi, e 4. carlini. Or vedi quel che vagliono queste monete a ragione di bolognini, e dirai, se 20. grossi vagliono, ouero sono vguali a 70. bolognini, 2. grossi quanti bolognini varranno? opera varranno 7. bolognini, di poi dirai, se 14. carlini, vagliono, o sono vguali a 70. bolognini, 4. carlini quanti bolognini varranno? opera, varranno 20. bolognini, hor somma insieme tutti questi bolognini, cioè 1. 7. 20. fanno 28. e noi voleuamo 70. perciò dirai, se 28. fusse 70. che farebbe 1. bolognino? che 7? e che 20? opera, hauerai che 1. farebbe $2\frac{1}{2}$. e tanti bolognini hauerà, e 7. farebbe $17\frac{1}{2}$. e tanti saranno i bolognini de' grossi, e 20. farebbe 50. e tanti saranno i bolognini de' carlini. Ma perche noi habbiamo detto, che hauerà bolognini $2\frac{1}{2}$. e volendo due tanti grossi, che bolognini, douerà hauere 5. grossi, i quali sono vguali a bolognini $17\frac{1}{2}$. e volendo due tanti carlini, che grossi, douerà hauere 10. carlini, i quali sono vguali a 50. bolognini, e così concluderemo che douerà hauere bolognini $2\frac{1}{2}$. e 5. grossi, e 10. carlini. Fanne proua valutando il bolognino a quanti quattrini ti piace, hora valutalo a sol. 2. cioè a 6. quattrini l'vno, il ducato adunque cambiandosi per 70. bolognini verrà a valere lir. 7. per il che vedasi, se le tre forti monete ascendono alla somma di lire 7. e prima noi habbiamo che li deue dare bolognini $2\frac{1}{2}$. che sono sol. 5. e poi li deue dare 5. grossi vguali a $17\frac{1}{2}$. bolognini, che sono sol. 35. che il grosso viene a valere sol. 7. e dipoi li deue dare 10. carlini vguali a 50. bolognini, che sono sol. 100. adunque il carlino viene a valere sol. 10. hora somma insieme sol. 5. sol. 35. e sol. 100. fanno sol. 140. che sono lire 7. cioè vn ducato, come voleuamo.

Proposizione 21.

VNo ha vn ducato, che vale 8. giuli, & vn carlino, & il medesimo ducato vale vn giulio, e 12. carlini, costui lo vuol cambiare, e vuol giuli, e carlini, tanti dell'vna, quanti dell'altra forte, si domanda quanti giuli, e quanti carlini douerà hauere. Fa così, troua quanto vale il ducato a giuli, e quanto a carlini, e perche s'è detto nella prima valuta il ducato valere 8. giuli, & 1. carlino; e nella seconda valuta valere 1. giulio, e 12. carlini, tu vedi chiaramente, che leuando 7. giuli dalla prima valuta resta 1. giulio, & 1. carlino, e per quelli 7. giuli che si leuano della prima valuta, si cresce nella seconda valuta

11. carlini vagliono 7. giuli, quanto varrà vn carlino? opera, varrà $\frac{7}{11}$. d'vn giulio, e questo aggiungi a 8. giuli della prima valuta, sarà $8\frac{7}{11}$. e tanti giuli varrà tutto il ducato. Hora vedi quanti carlini varrà il detto ducato, e dirai così, se 7. giuli vagliono 11. carlini, che varrà 1. giulio, cioè quel giulio della seconda valuta? opera, varrà vn carlino, e $\frac{2}{7}$. d'vn carlino, e questo aggiungi a 12. carlini della seconda valuta, faranno carlini $12\frac{2}{7}$. e tanti carlini valse il ducato. Hora tu hai, che tutto il detto ducato vale giuli $8\frac{7}{11}$. & a carlini vale carlini $12\frac{2}{7}$. resta a sapere quanti giuli, e quanti carlini li douerà dare, e perche gli deue dare di ciascuna sorte vguualmente, poni che li dia vn carlino, & vn giulio, & il giulio si disse che valeua carlini $1\frac{2}{7}$. adunque giunti insieme li darà carlini $2\frac{2}{7}$. e noi voleuamo che li desse carlini $12\frac{2}{7}$. e perciò diremo che 2. carlini, e $\frac{2}{7}$. sieno vguuali a 13. carlini, e $\frac{2}{7}$. che sono la valuta di tutto il ducato, parti $13\frac{2}{7}$. per $2\frac{2}{7}$. ne viene $5\frac{1}{11}$. e tanti giuli, e tanti carlini li douerà dare. Fanne proua, dicendo così, se giuli $8\frac{7}{11}$. vagliono vn ducato, che varranno giuli $5\frac{1}{11}$. opera, varranno $\frac{1}{11}$. di ducato, dipoi dirai, se carlini $12\frac{2}{7}$. vagliono vn ducato, che varranno carlini $5\frac{1}{11}$. opera varranno $\frac{1}{11}$. di ducato, che sommati con $\frac{1}{11}$. fanno vn ducato appunto.

Propositione 22.

VNo ha vn ducato, che vale 9. giuli, e volendolo cambiare a carlini varrebbe 14. carlini, ma volendolo cambiare a Bolognini, non sà quanti bolognini vaglia, costui vā a vn banchiere, e lo fā cambiare, & il banchiere li dà 5. giuli, 5. carlini, e 5. bolognini, domando quanti bolognini valse il ducato. Fā così, tu vedi che riceuendo 5. giuli, riceue $\frac{5}{9}$. d'vn ducato, e riceuendo ancora 5. carlini, riceue $\frac{5}{14}$. di ducato, che giunti insieme fanno $\frac{5}{9} + \frac{5}{14} = \frac{95}{126}$. di ducato, vguuali a 5. giuli, & a 5. carlini, hor volendo fare vn ducato intero, tu vedi, che vi manca $\frac{1}{126}$. di ducato, adunque per $\frac{1}{126}$. di ducato diede 5. bolognini, però dirai così, se $\frac{1}{126}$. di ducato vale 5. bolognini, che varrà vn ducato, opera, varrà bolognini $57\frac{1}{2}$.

Propositione 23.

VNo si troua 100. ducati di due sorti, cioè d'argento, e d'oro, e li vuol cambiare a lire, & il Banchiere li dà del ducato d'argento lir. 6. sol. 15. e del ducato d'oro li dà lir. 7. sol. 5. e così li cambiò tutti, & hebbe in tutto lir. 690. domando quanti ducati furono quelli d'argento, e quanti quelli d'oro. Fā così, poni che li 100. ducati che cambiò fussero tutti d'argento, cioè del minor valore, e vedi a lire 6. sol. 15. quante lire sono, moltiplica 100. via $6\frac{3}{4}$. fa 675. e noi voleuamo lir. 690. trahi lire 675. di 690. restano lir. 15. fatto questo, trahi la valuta del ducato d'argento, della valuta del ducato d'oro, resta sol. 10. parti adunque lir. 15. per sol. 10. ne viene 30. e tanti ducati d'oro furono quelli che cambiò, & il resto fino in cento, che v'è 70. furono i ducati d'argento. Fanne proua, trouarai, che varranno lir. 690.

Proposizione 24.

VN Banchiere ha ducati di due forti, che il cento della prima forte vale lir. 700. & il cento dell'altra forte vale lir. 520. Viene vn giouane, e dà al Banchiere lir. 650. e lui gli dette duc. 100. tra l'vna, e l'altra forte, si domanda quanti glie ne diede di ciascuna. Fà così, poni che li desse duc. 100. della peggiore forte, cioè di quelli, che vagliono lir. 520. e queste trahi della valuta di cento ducati della miglior forte, cioè di lir. 700. restano lir. 180. e le sopradette lir. 520. cauale ancora di quelle lire, che esso diede al Banchiere, cioè di lir. 650. restano lir. 130. e queste parti per la differenza che trouasti fra 520. e 700. che sono lir. 180. parti adunque lir. 130. per lir. 180. ne viene $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$. hor piglia $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$. di cento ducati, ne viene $72 \frac{3}{4}$. e tanti ducati gli diede de' migliori, & il resto fino in 100. che u'è $27 \frac{1}{4}$. gli diede de' peggiori. Fanne proua, ualutando duc. $72 \frac{3}{4}$. a lir. 700. il cento, e duc. $27 \frac{1}{4}$. a lir. 520. il cento, trouarai, che tra tutte due le forte uarranno lir. 650. appunto.

Perche meglio tu apprendi l'antecedente propofa, noi ueniamo con questa a dichiararla in altro modo. Hor sia, che la propofa dicessi così. Vn banchiere si troua ducati di due forti, che il cento della prima forte uale lir. 500. & il cento della seconda forte uale lir. 300. viene un giouane, e dà al banchiere lir. 450. acciò che li dia tanti ducati, e così gli diede duc. 100. fra l'una, e l'altra forte, si domanda quanti gliene diede di ciascuna. Fà così, troua la ualuta del ducato di ciascuna forte, trouarai, che dell a prima forte il ducato uale lir. 5. e della seconda il ducato uale lir. 3. Fatto questo, tu uedi, che per lir. 450. si riceue dal banchiere duc. 100. i quali se fossero tutti d'una forte, uarrebbe il ducato lir. $4 \frac{1}{2}$. ma il banchiere non ha ducati di questa forte; e perciò dirai così. Vno ha ducati di due forti, che il ducato della prima forte uale lir. 5. e della seconda lir. 3. e vorrebbe far duc. 100. che ciascun ualesse lir. $4 \frac{1}{2}$. si domanda quanti ne torrà di ciascuna forte. Fà così, poni lir. 5. & vn poco lontano verso man destra poni lir. 3. & in quel mezzo, ma alquãto più alto, poni lir. $4 \frac{1}{2}$. come di sotto uedi. Dipoi dirai così, $4 \frac{1}{2}$. quanto è manco di 5? tu uedi che è $\frac{1}{2}$. meno; segna $\frac{1}{2}$. sotto le lir. 3. dipoi dirai $4 \frac{1}{2}$. quanto è più di lir. 3? tu uedi che è più $1 \frac{1}{2}$. Segna $1 \frac{1}{2}$. sotto le lir. 5. perche habbiamo, che quãdo il banchiere li darà $\frac{1}{2}$. ducato di quelli di lir. 3. l'uno, bisogna che li dia duc. $1 \frac{1}{2}$. di quelli di lir. 5. l'uno. Ma nota, che se lir. $4 \frac{1}{2}$. che ponesti fra lir. 5. e lir. 3. ma alquanto più alto, fossero più di lir. 5. o meno di lir. 3. tal ragione non si potrebbe soluere. Somma hora $\frac{1}{2}$. duc. che ponesti sotto le lir. 3. con duc. $1 \frac{1}{2}$. che ponesti sotto le lir. 5. fanno duc. 2. dipoi dirai, se in duc. 2. u'è dentro $\frac{1}{2}$. duc. di quelli di lir. 3. l'uno, quanti ne farà in duc. 100? opera, te ne uerrà duc. 25. e tanti n'ebbe della seconda forte; dipoi dirai, se in duc. 2. u'è duc. $1 \frac{1}{2}$. di quelli di lir. 5. l'uno, quanti ne farà in duc. 100? opera, te ne uerrà duc. 75. e tanti gliene diede della prima forte.

$$\begin{array}{r} 5 \\ 1 \frac{1}{2} \end{array} \quad \begin{array}{c} 4 \frac{1}{2} \\ \hline 3 \\ 1 \frac{1}{2} \end{array} \quad \begin{array}{c} \frac{1}{2} \\ 1 \frac{1}{2} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{c} 5 \\ 1 \frac{1}{2} \end{array}} \right\} 100. \\ \hline 2.$$

E se per la regola più breue la vuoi soluere, fa così, cauà lire 300. di lire 500. restano

restano lire 200. di poi caua lire 300. di lire 450. restano lire 150. hora guarda 150. che parte è di 200. tu vedi che sono li $\frac{3}{4}$. piglia $\frac{1}{4}$. di ducati 100. ne viene ducati 75. della prima forte, & il resto fino in 100. che v'è 25. faranno della seconda forte.

Propositione 25.

VNo si troua vn ducato, e lo vuol cambiare, e troua vno che gli dà 15. carlini, o vuol 25. grossi Lucchesi, o vuol 75. bolognini, e lui dice. che vuol 3. carlini, 5. grossi Lucchesi, 15. bolognini, e lire 3. di quattrini, si domanda quante lire valse il ducato; Fa così, tu vedi che 3. carlini sono $\frac{1}{5}$. di ducato, e 5. grossi sono $\frac{1}{5}$. di ducato, e similmente 15. bolognini sono $\frac{1}{5}$. di ducato: h r somma tutte queste parti insieme, fanno $\frac{3}{5}$. di ducato, per la qual cosa tu vedi che manca $\frac{2}{5}$. di ducato, a voler fare vn ducato intero, adunque le 3. lire di quattrini sono vuali a $\frac{2}{5}$. di ducato, parti lire 3. per $\frac{2}{5}$. ne viene lire 7. fol. 10. per la valuta del ducato.

Propositione 26.

**I**L marco dell'oro in Lione, vale scudi 58 $\frac{2}{3}$. & vno ha leuato da vn banco tanti marchi, che montano scudi 500. con patto di renderli la medesima quantità di marchi, per quel che varrà il marco la prossima fiera, accadde che il marco valse scudi 59 $\frac{2}{3}$. si domanda quanti scudi gli douerà rendere. Fa così, caua la valuta dal marco di quando gli accatta, della valuta del marco di quando gli rende; cioè trahi 58 $\frac{2}{3}$. di 59 $\frac{2}{3}$. resta 1 $\frac{1}{3}$. e tanto viene a guadagnare il banchiere per marco, per il che dirai così, se scudi 58 $\frac{2}{3}$. mi danno di guadagno scudi 1 $\frac{1}{3}$. gli scudi 500. quanto mi daranno di guadagno? opera, trouarai che ti daranno di guadagno scudi 8. fol. 17. iquali aggiunti a scudi 500. faranno scudi 508. fol. 17. e tanti scudi gli douerà rendere.

Propositione 27.

VNo ha vn ducato, che vale 8. carlini, e 12. grossi; va a vn banchiere, e lo cambia, e ne riceue 4. carlini, e 18. grossi, si domanda quanto valse il ducato a carlini, e quanto a grossi. Fa così ragguaglia le valute, toglie 4. carlini delli 8. carlini, e 12. grossi, restano 4. carlini, e 12. grossi, e per la seconda valuta del ducato, noi habbiamo che riceue 4. carlini, e 18. grossi, adunque per li 4. carlini che si toglie dalla prima valuta, il banchiere assegna 6. grossi più, perche gli dà 18. grossi, e perciò noi diremo, che i detti 4. carlini, che si tolgono da gli 8. carlini, sieno vuali a 6. grossi, adunque gli 8. carlini della prima valuta faranno vuali a 12. grossi, i quali aggiunti a 12. grossi della prima valuta faranno 24. grossi, e tanti grossi diremo che ualesse il ducato. Hora uolendo sapere quanto ualse il ducato a carlini, dirai così, se 6. grossi sono uguali a 4. carlini, quanti carlini faranno 18. grossi? cioè, i sopradetti 18. grossi che il banchiere gli dette; opera, trouarai che faranno 12. carlini, e perche gli diede anco 4. carlini, aggiungili insieme con 12. carlini faranno 16. carlini, per la valuta del ducato a carlini.

Proposizione 28.

E Dicendo 9. grossi Fiorentini vagliono quanto 12. grossi Lucchesi, & 8. grossi Lucchesi vagliono quanto 6. caualotti di Genoua, e 15. caualotti vagliono giuli $7\frac{1}{2}$. si domanda 46. grossi Fiorentini quanti giuli varranno. auuertendo il lettore che il grosso Fiorentino noi poniamo, che vaglia 20. quattrini, & il grosso Lucchese 15. quattrini Fiorentini, & il caualotto 20. quattrini Fiorentini, ma in Lucca il grosso Lucchese 15. quattrini Fiorentini, & il caualotto 20. quattrini Fiorentini, ma in Lucca il grosso Lucchese val e 18. quattrini, & il caualotto 24. Noi habbiamo proposto per maggior intelligenza del Lettore il presente cambio di monete generalmente cognite in Toscana, acciò che possa considerare, che quando gli peruenissero alle mani simili proposte d'altre monete a lui non cognite, che la regola la quale dimostraremo nel soluer questa, gli seruirà in ogn'altra simile. Volendo noi a dunque dimostrare la regola, & il modo da offeruarsi, fa così; Poni ordinatamente in retta serie tutte le quantità sopradette staranno così. 9. 12. 8. 6. 15. $7\frac{1}{2}$. 46. le quali quantità son 7. e perche la quantità della domanda che è 46. son grossi Fiorentini, e son della medesima specie che è la prima quantità, che sono similmente 9. grossi Fiorentini, perciò quando la domanda, cioè l'ultima quantità sarà simile alla prima quantità, e che l'ultima quantità s'habbia a conuertire, ouero ridurre nella specie della penultima quantità, come conuiene in questa, allora tieni quest'ordine. Fa vn punto sotto il 9. prima quantità, dipoi lascia la seconda quantità, e fa vn punto sotto la terza, cioè sotto l'8. e così ad ogni quantità farai vn punto, di manierache resti sempre vna quantità non puntata, ma l'ultima quantità auuertisci di non la puntare, perciò che deue restar sempre l'ultima, e la penultima quantità, senza esser puntate, dipoi le sopradette quantità puntate, che son queste 9. 8. 15. multiplica l'vna via l'altra in questo modo, multiplica 9. via 8. fa 72. e questo multiplica via 15. fa 1080. e quello salua per tuo partitore, dipoi multiplica le quantità non puntate l'vna via l'altra, in questo modo, multiplica 12. via 6. fa 72. e questo multiplica via $7\frac{1}{2}$. fa 540. e questo multiplica via 46. fa 24840. e questo parti per 1080. che saluasti, ne viene 23. e così diremo che 46. grossi Fiorentini varranno 23. giuli, perche quel che te ne verrà per tal partitione, sarà sempre della specie della penultima quantità; ma per maggiore intelligenza, noi diciamo, che si multiplichino le quantità l'vna via l'altra, secondo le dimostrazioni delle linee, le quali ti conducono da vna quantità all'altra, e partisi, come di sopra habbiamo detto; e sempre che l'ultima quantità, e la prima sono d'vn medesimo luogo, o specie, offerua quest'ordine.

Grossi 9. 12. 8. 6. 15. $7\frac{1}{2}$. 46. grossi.

Proposizione 29.

E Dicendo se 8. grossi Fiorentini valessero quanto 10. grossi Lucchesi, e 12. grossi Lucchesi valessero quanto 9. caualotti, e 16. caualotti valessero quanto 9. caualotti, e 16. caualotti valessero quanto 8. giuli, si domanda 100. giuli

giuli quanti grossi Fiorentini varrebbero. Prima poni distesamente tutte le sopradette quantità per ordine, staranno così 8. 10. 12. 9. 16. 8. 100. dipoi considera, che l'ultima quantità è della specie della penultima; per il che volendo noi ridurre l'ultima quantità alla natura, e specie della prima, bisogna tener diuerso modo a quel che teneffi nella sopradetta. Laonde farai vn punto sotto la prima quantità, & ad ogni due quantità farai vn punto, di maniera che verrà puntata ancora l'ultima quantità, e le quantità puntate faranno queste 8. 12. 16. 100. fatto questo, tira vna linea da vn punto all'altro, per dimostrazione di quelle quantità, che si deuono multiplicare l'vna via l'altra, però multiplica 8. via 12. fa 96. e questo multiplica via 16. fa 1536. e questo multiplica via 100. fa 153600. e questo salua; dipoi multiplica l'altre quantità non puntate l'vna via l'altra, le quali son queste 10. 9. 8. multiplica 10. via 9. fa 90. e questo multiplica via 8. fa 720. e questo sarà partitore di 153600. che saluasti; parti adunque 153600. per 720. ne viene 213. $\frac{1}{3}$. e tanti grossi Fiorentini farebbero i sopradetti 100. giuli, alla medesima ragione dell'altre monete. Auuertendo ancora che in simili quesiti, i quali siano proposti di 4. quantità, ò di 7. ò di 9. ò di 11. ò di 13. &c. che in infinito si può procedere, crescendo fatica, e non sapere, tu debbi sempre metter tutte le quantità distesamente per ordine, e poste che così l'hauerai, offerua i modi, e gli auuertimenti, che in queste due proposte habbiamo dimostrato, e volendole soluere per regola del tre, la rimettiamo all'arbitrio dell'operante, le quali in tutt' i modi torneranno.

8. 10. 12. 9. 16. 8. 100. giuli.

Proposizione 30.

E Dicendo, la libbra di Fiorenza è once 12. torna in Lucca once 13. e la libbra di Lucca è once 12. torna in Pisa once 11. si domanda la libbra di Pisa quant'once tornerà in Fiorenza. Fa così, poni distesamente tutte le quantità, e prima once 12. di Fiorenza, once 13. di Lucca, once 12. di Lucca, onc. 11. di Pisa, & onc. 12. di Pisa. Fatto questo, tu vedi chiaramente, che l'ultima quantità è simile alla penultima, cioè che l'ultima, e la penultima sono ambedue di Pisa; per il che offerua i modi, e documenti sopradetti: multiplicando, e partendo secondo le dimostrazioni, hauerai che la libbra di Pisa tornerà in Fiorenza once 12 $\frac{1}{4}$ $\frac{3}{4}$.

Partitore.

Fiorenza. 12. 13. 12. 11. 12. Pisa.

Proposizione 31.

E Dicendo così, se libbre cento al peso di Fiorenza tornassero in Siena libb. 102. e libb. 100. di Siena, tornassero in Roma libb. 96. e libb. 100. di Roma tornassero in Bologna libb. 98. si domanda libb. 800. al peso di Fiorenza quante libbre tornerebbono al peso di Bologna. Fa così, poni tutte le quantità per ordine, dipoi tu vedi, che l'ultima quantità è della natura, e specie della prima, perche ambedue sono al peso di Fiorenza; e libbre 800. di Fiorenza, le voglia-

mo ridurre al peso di Bologna, cioè alla natura della penultima quantità, però moltiplica l'una quantità uia l'altra, secondo le dimostrazioni, e quel prodotto che ti peruerà dalle lib. 800. di Fiorenza, lo partirai per l'altro prodotto, & hauerai, che libb. 800. al peso di Fiorenza, tornarebbono al peso di Bologna libb. $767\frac{1}{4}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$.

Partitore .

Fiorenza. 100. 102. 100. 96. 100. 98. 800. Fiorenza.

Proposizione 32.

E Dicendo, le 6. pere uagliano 10. quattrini, e 15. quattrini sono la ualuta di 20. mele, & 8. mele uagliano 30. noci, e 16. noci uagliano 40. castagne, e 24. castagne uagliano 12. fichi secchi; si domanda 300. fichi secchi quante pere varranno. Fa come nella sopradetta, moltiplica 6. via 15. e quel che fa, via 8. e quel che fa via 16. e quel che fa via 24. e quel che fa via 300. trouarai che sarà in tutto 82944000. e questo lo partirai per l'altre quantità, cioè per 10. e quel che ne viene per 20. e quel che ne viene per 30. e quel che ne viene per 40. e quel che ne viene per 12. & hauerai che per 12. ne verrà $28\frac{4}{5}$. e tante pere varranno le sopradette castagne; Potuasi ancora moltiplicare tutte le quantità (che hanno seruito per partitori) l'una via l'altra, e fate vn partitor solo, & ueniua il medesimo, e così con questa piaceuolezza faremo fine al trauagliamento de' cambi, ancorche molti altri se ne potrebbero formare; e daremo principio a i Meriti, e Sconti semplici, e dipoi a capo d'anno.

Partitori.

Pere 6. 10. 15; 20. 8. 30. 16. 40. 24. 12. 300. fichi.

De' Meriti semplici.

Merito s'intende quella quantità di denari, che guadagna il cento delle lire, o de' fiorini, o de' ducati l'anno, o la lira il mese, come per esemplo. Vno presta ad vn'altro lir. 200. per vn'anno, con patto che gli paghi d'interesse a ragione di 10. per cento l'anno, si domanda quanto pagará d'interesse. Non ha dubbio alcuno, che ogni grossolano conoscerà, che douerà dar d'interesse lir. 20. oltre il capitale, il capitale adunque è lir. 200. e le lir. 20. si chiama merito, ouero interesse di lir. 200. e così quando si dice a ragione di 10. per cento, quel cento si chiama capitale, & il 10. si chiama merito, ma prima che più oltre si proceda, vogliamo dimostrare alcune regole generali sopra i meriti, e sconti, le quali seruiranno a risoluere più facilmente tutte le propositioni susseguenti, & ancor con più breuità &c.

Tanti denari, quanti guadagna la lira, o il fiorino, o il ducato il mese, se li moltiplicarai via 5. il prodotto farà quante lire guadagnano lir. 100. o fiorini 100. o duc. 100. l'anno, come per esemplo.

La lira guadagna il mese 3. denari, si domanda lir. 100. in vn'anno quanto guadagnaranno; moltiplica 3. via 5. fa 15. e tante lire guadagnaranno lir. 100. in vn'anno, e così 100. fiorini guadagnarebbono 15. fiorini, e 100. scudi guadagnarebbono 15. scudi.

Tante

Tante lire quante guadagnano lire 100. l'anno, se le partirai per 5. l'auuenimento sarà quanti denari guadagna vna lira il mese, come per essemplio.

Se vno prestasse a vn'altro lir. 100. per vn'anno, & in capo al tempo gli dessi lire 15. di merito. Volendo sapere quanto venne a meritare vna lira in vn mese, parti lire 15. per 5. ne vien 3. e tanti denari guadagnò vna lira in vn mese.

Tanti denari quanti guadagna la lira il mese, se li farai partitore di 20. quel che ne verrà in tanti anni si raddoppierà vna lira, come per essemplio.

La lira guadagna il mese 4. denari, si domanda in quanto tempo si raddoppierà la detta lira, o qual si uoglia quantità di lire, o scudi; parti 20. fermamente, per quei denari che guadagna la lira il mese, cioè per 4. ne vien 5. & in 5. anni si raddoppierà vna lira, & ogn'altra quantità.

E se lire 100. in vn'anno guadagnarono lire 20. e tu volessi sapere in quanto tempo si raddoppiassero, parti lire 100. per 20. ne viene 5. & in 5. anni si raddoppierebbono le dette lire 100.

E dicendo ducati 100. guadagnano l'anno ducati 8. voglio sapere in quanto tempo ducati 320. si raddoppiaranno, parti 100. per 8. ne viene 12 $\frac{1}{2}$. & in tanti anni si raddoppierebbono.

Per dimostrare che le dette Regole non son false, ne faremo la proua per regola del tre. Hor pigliamo la prima regola, nella qual si disse che la lira che la lira guadagnaua 3. denari il mese, e noi voleuamo sapere quanto guadagnaua il cento l'anno. Fa così dicendo, se 1. lira guadagna 3. denari, 100. lire, quanto guadagnaranno? senza dubbio alcuno guadagnaranno 300. danari in vn mese, e volendo saper quanto guadagnaranno in vn'anno, dirai così, se in vn. mese guadagnano 300. danari, quanto guadagnaranno in 12. mesi? moltiplica 300. via 12. fa 3600. danari, i quali son 15. lire, e con questo medesimo ordine potrai far proua dell'altre sopradette. Non ti marauigliare amoreuolissimo Lettore, se nel dimostrare alcune cose ti paresse che troppo ci abbassassimo, perche tal fatica la duriamo volentieri, solo per beneficio degli introduttori in queste discipline, e non delle persone prouette, & intendenti.

Merito semplice, s'intende quando del merito non nasce alcun merito, ma che sta fermo il capitale, & v'ssi fare in diuersi modi, nulladimeno il piu comune, & vniuersale a noi par questo, cioè, meritare vna sola lira per tutto quel tempo che vuoi meritare qual si uoglia quantità di lire, o fiorini, o ducati, e quel tal merito, che d'vna lira ti peruiene lo deuì moltiplicare via quella quantità di lire, o fiorini, che vuoi meritare, come per essemplio a passo, a passo dimostreremo, ma prima meritamò vna lira per alcun tempo.

Propositione 1.

SE vna lira guadagna il mese 3. denari, quanto guadagnerà in 3. anni, 4. mesi, e 20. giorni? Fa così, riduci gli anni a mesi, haurai che i sopradetti anni, e mesi, e giorni, sono mesi 40 $\frac{2}{3}$. Hor se vna lira in un mese guadagna 3. denari; noi haueremo che in mesi 40 $\frac{2}{3}$. guadagnerà la moltiplicatione di 40 $\frac{2}{3}$. via 3. che fa 122. danari i quali ridotti a soldi, sono soldi 10. $\frac{1}{3}$. per il guadagno d'una lira nel sopradetto tempo.

Proposizione 2.

E Dicendo, vno ha prestato a vn'altro lire 460. fol. 16. den. 8. per 3. anni, 8. mesi, e 20. giorni, a ragione di 3. denari per lira il mese, si domanda quanto li douerà dare d'interesse. Fa così troua prima quanto guadagna vna lira in tutto il tempo sopradetto, multiplica mesi 44. $\frac{2}{3}$. via 3. denari, farà 134. denari, che sono fol. 11. den. 2. per il guadagno d'vna lira; Hor potrai dir così, se vna lira guadagna fol. 11. den. 2. le lire 460. fol. 16. den. 8. quanto guadagneranno? multiplica fol. 11. den. 2. via lir. 460. fol. 16. den. 8. offeruando i modi dati, come se tu haueffe a multiplicare lire, soldi, e denari, via lire, soldi, e denari; ouero riduci fol. 16. den. 8. in parte di lira, i quali sono $\frac{2}{3}$. e multiplica lir. 460 $\frac{2}{3}$. via fol. 11 $\frac{2}{3}$. che in tutti due i modi, ti verrà lir. 257. fol. 5. den. 11 $\frac{2}{3}$. per l'interesse, o merito delle sopradette lire.

Soluita per quest'altro modo, troua prima quanto guadagna il cento l'anno, a 3. den. la lira il mese, multiplica 3. via 5. fa 15. e tanto guadagnerà il cento l'anno, dipoi dirai così, se lir. 100. guadagnano lir. 15. le lir. 460. fol. 16. den. 8. quanto guadagneranno; multiplica 15. via lir. 460. fol. 16. den. 8. & il prodotto parti per 100. ne viene lir. 69. fol. 2. den. 6. e questo è il guadagno di lir. 460. fol. 16. den. 8. in vn'anno, dipoi dirai così, se in 12. mesi guadagnano lir. 69. fol. 2. den. 6. quanto guadagneranno in mesi 44 $\frac{2}{3}$? opera guadagneranno lir. 257. fol. 5. den. 11 $\frac{2}{3}$. come nella preccedente.

Proposizione 3.

DOmandasi lir. 420. in quanto tempo guadagneranno lir. 100. a ragione di 2. den. per lira il mese. Fa così, troua prima quanto guadagneranno lir. 420. in vn'anno a 2. denari la lira il mese, e perche vna lira in vn'anno guadagna fol. 2. multiplica lir. 420. via fol. 2. fanno fol. 840. che sono lir. 42. e noi voleuamo lir. 100. perche dirai così, se lir. 42. son guadagnate in 12. mesi, in quanti mesi faranno guadagnate lir. 100? multiplica 100. via 12. fa 1200. e questo parti per 42. ne viene mesi 28 $\frac{2}{3}$. che sono anni 2. mesi 4. e giorni 17 $\frac{2}{3}$. & intanto tempo si guadagnarebbe lir. 100. secondo la proposta.

Proposizione 4.

VNO ha prestato a vn'altro vna quantità di ducati, de'quali n'ha tratto tanto d'interesse che di 4. ha fatto 5. e dipoi gli ha prestati a vn'altro, e di 7. fece 8. & in tutto si trouò duc. 150. si domanda quanti ducati prestò la prima volta. Proccedi retrogredendo in questo modo; se 8. guadagno, e capitale insieme viene da 7. di capitale, da che capitale verranno duc. 150. multiplica 150. via 7. & il prodotto parti per 8. ne viene 131 $\frac{1}{2}$. e tanti ducati prestò la seconda volta: dipoi dirai così, se 5. tra guadagno, e capitale, vien da capitale di 4. da che capitale verranno duc. 131 $\frac{1}{2}$. multiplica 131 $\frac{1}{2}$. via 4. & il prodotto parti per 5. ne viene duc. 105. e tanti ducati prestò la prima volta.

Proposizione

Propositione 5.

VNo ha prestato a vn'altro duc. $26\frac{1}{2}$. con patto che li paghi d'interesse ogni 4. mesi duc. $2\frac{1}{2}$. & oltre a questi, gli prestò duc. 130. de' quali gli paga ogn' anno d'interesse duc. 14. si domanda di quali paga piu, & quanto per cento. Fa così, dicendo, se di duc. $26\frac{1}{2}$. si paga duc. $2\frac{1}{2}$. quanto si pagarebbe di duc. 1100. opera, trouarai, che pagarebbe duc. 3. fol. 17. den. 4. in 4. mesi; vedi hora quanto pagarebbe in vn'anno, dicendo, se in 4. mesi si paga duc. 3. fol. 17. den. 4. quanti se ne pagará in 12. mesi; opera, si pagará duc. 11. fol. 12. & questi sarà. Fatto questo dirai così, se di duc. 130. si paga duc. 11. quanti se ne pagarebbe di duc. 100. multiplica 100. via 14. & il prodotto parti per 130. ne viene duc. 10. fol. 15. den. 4. e tanto si pagarebbe di duc. 100. in vn'anno, a ragione della seconda prestanza, hora tu vedi, che del primo prestito pagarebbe duc. 11. fol. 12. per cento l'anno, & del secondo prestito pagarebbe duc. 10. fol. 15. den. 4. trahi l'vno dall'altro, resta fol. 16. den. 8. & così dirai che paga piu della prima quantità, che della seconda, a ragione di fol. 16. den. 8. per cento ducati l'anno.

Propositione 6.

VNo ha prestato a vn'altro vna quantità di ducati per mesi 9. a ragione di 12. per cento l'anno semplicemente, & alla fine gli rese fra merito, & capitale duc. 84. si domanda quanti ducati gli prestò. Fa così, troua prima quanto guadagna vna lira in vn mese a 12. per cento l'anno, trouarai che guadagnerà den. $2\frac{1}{2}$. & in mesi 9. guadagnerà fol. 1. 7. & questo l'aggiungerai a vna lira, faranno fol. 21. 7. dipoi dirai così, se $21\frac{7}{8}$. guadagno, & capitale, vien da 20. di capitale, da che capitale verrà 84. trouarai che verrà da capitale di duc. 76. fol. 14. den. 2. & tanti ducati gli prestò, & in altro modo far così, vedi quanto guadagnano due 100. in mesi 9. a 12. per cento, trouarai che guadagnano duc. $9\frac{1}{2}$. dipoi dirai così, se $9\frac{1}{2}$. viene da cento di capitale, da che capitale verrà 84. opera, ti verrà, come di sopra s'è detto.

Propositione 7.

VNo vuol prestare a vn'altro tanti denari a interesse, che meritati a ragione di 9. per cento l'anno; li venga ogni giorno di guadagno fol. 17. den. 8. si domanda quante lire li douerà prestare. Fa così, poni che li presti lir. 300. quall a ragione di 9. per cento in vn'anno meritano lir. 27. & in vn giorno meritano fol. 1. 7. perche dirai così, se fol. 1. 7. son guadagnati da lir. 300. in vn giorno, da quante lir. faranno guadagnati fol. 17. 7. opera multiplicando 17. 7. via 300. & il prodotto partirai per 1. 7. ne verrà lir. 353. 7. & tante lire li douera prestare. Po- teua si anco far così, sai che a ragione di 9. per cento l'anno, vna lira in vn mese guadagna den. 1. 7. & in vn giorno guadagnerà $\frac{7}{8}$. d' vn denaro, laonde dirai così, se $\frac{7}{8}$. d' vn denaro, son guadagnati da vna lira in vn giorno, da quante lire faranno guadagnati den. 212. cioè fol. 17. den. 8. multiplica 212. via vna lira, fa pur 212. il qual parti per $\frac{7}{8}$. ne vien 353. 7. come sopra.

Propo-

Proposizione 8.

- V**No ha prestato a vn'altro vna quantità di lire a ragione di 2. den. la lira il mese, & in capo di 3. anni, & 8. mesi, gli rese di merito lir. 60. si domanda quante lire gli prestò. Troua prima quanto guadagna vna lira in tutto il tempo, che sono mesi 44. moltiplica den. 2. via 44. fa 88. denari, che sono sol. $7\frac{1}{2}$. & questo è il guadagno d'vna lira in tutto il tempo, dipoi dirai così, se sol. $7\frac{1}{2}$. sono stati guadagnati da vna lira, da quante lire sono state guadagnate lir. 60. Recale 4 soldi, sono soldi 1200. Laonde moltiplica 1. via 1200. fa pur 1200. e questo parti per $7\frac{1}{2}$. ne viene lir. 163. sol. 12. den. $8\frac{1}{2}$. e tante lire gli prestò.

Proposizione 9.

- V**No ha prestato a vn'altro lir. 600. & in capo di 4. anni, e 2. mesi gli rese di merito lir. 150. si domanda a che ragione fu prestata la lira il mese. Fa così, reca gli anni a mesi, & hauei 50. mesi, e questo sarà partitore di lir. 150. ne verrà 3. lire, e tanto guadagnano lir. 600. in vn mese. Volendo adunque sapere quanto guadagna vna lira, parti lir. 3. per lir. 600. ne viene den. $1\frac{1}{2}$. & a tanti denari fu prestata la lira il mese, e volendo sapere a quanto fu prestato il cento l'anno, moltiplica den. $1\frac{1}{2}$. via 5. fa 6. & a 6. lire fu prestato il cento delle lire l'anno, & a 6. ducati, il cento de' ducati, & a 6. fiorini il cento de' fiorini, & sic de singulis.

Proposizione 10.

- E** Dicendo, vno ha prestato a vn'altro duc. 320. & in capo di 3. anni, e 4. mesi gli rese fra merito, e capitale duc. 450. domanda a quanto fu prestato il cento l'anno. Fa così, trahi duc. 320. di duc. 450. restano duc. 130. e questo è il guadagno di duc. 320. in 40. mesi. dipoi dirai così, se duc. 320. guadagnano duc. 130. voglio sapere cento ducati quanto guadagneranno; opera, trouarai, che guadagneranno duc. $43\frac{1}{2}$. e questo sarà il guadagno di 100. ducati in 40. mesi, dipoi dirai così, se in 40. mesi hanno guadagnato duc. $43\frac{1}{2}$. quanto guadagneranno in 12. mesi; opera, guadagneranno duc. $13\frac{1}{2}$. e tanti ducati fu prestato il cento l'anno.

Solui la per quest'altro modo, così dicendo, se in anni $3\frac{1}{2}$. si guadagna duc. 130. quanto si guadagnerà in vn'anno? moltiplica 1. via 130. fa pur 130. e questo parti per $3\frac{1}{2}$. ne viene 42. e questo è il guadagno, che fanno duc. 320. in vn'anno, dipoi dirai così, se duc. 320. guadagnano duc. 42. quanto guadagneranno duc. 100? opera, trouarai che guadagneranno duc. $13\frac{1}{2}$.

Solui la per quest'altro modo, trahi duc. 320. di ducati 450. restano ducati 130. poi metti tutte le quantità per ordine, staranno così, duc. 320. mesi 40. duc. 130. cioè il guadagno duc. 100. e mesi 12. Fatto questo, sappi, che se moltiplichi il primo capitale che è duc. 320. via il suo tempo, che è 40. mesi, ti produrrà 12800. il quale sarà partitore della moltiplicatione dell'altre tre quantità

rità l'vna via l'altra, cioè 140. via 100. fa 14000. e questo multiplica via 12. fa 168000. e questo parti per 12800. ne viene $13\frac{1}{2}$. come nelle sopradette.

320	40	140.	100.	12.
Partitori.				

Dello sconto semplice.

LO sconto veramente, è atto contrario del merito, e dicefi, che l'vno sia proua dell'altro, perciò che quando si merita alcuna quantità di denari, il capitale cresce, e scontando il capitale scema. Liando volendo scontare alcuna quantità di lire per qualsiueglia terminato tempo, a ragione di tanto per lira il mese, o il cento l'anno, prima cerca d'ineffigare quanto guadagna vna lira in tutto quel tempo, e quel merito, ouero guadagno l'aggiungerai con detta lira, & hauerai merito, e capitale insieme, il qual talua per partitor, dipoi multiplica quella quantità di ducati, o lire che vuoi scontare via quella lira non meritata, cioè senza il suo merito, & il prodotto lo partirai per la lira meritata insieme col suo merito, e quel che te ne verrà, farà la quantità delle lire, o ducati scontati per quel tempo, come per esempio.

Proposizione 1.

Giouanni deue hauere da Francesco duc. 360. di qui a 3. anni, e 4. mesi, ma perche Giouanni ha bisogno al presente de' sopradetti denari, perciò dice a Francesco, se tu mi vuoi rendere al presente quei ducati, de' quali mi sei debitore, io te ne voglio far lo sconto a ragione di due denari per lira il mese, e di ciò Francesco fu contento, si domanda quanti ducati Francesco douerà rendere a Giouanni. Fa così, vedi quanto merita vna lira in tutto il dato tempo, cioè in mesi 40. multiplica 40. via 2. den. fa 80. den. che sono sol. $6\frac{2}{3}$. adunque di 1. lira, cioè di sol. 20. meritandoli si farà sol. $26\frac{2}{3}$. ma volendoli scontare s'arguisc in contrario, cioè che di sol. $26\frac{2}{3}$. si faccia sol. 20. per il che dirai così, se $26\frac{2}{3}$. scontati per il sopradetto tempo tornano 20. quanti torneranno duc. 360? multiplica 360. via 20. fa 7200. e questo parti per $26\frac{2}{3}$. ne viene 270. e tanti ducati douerebbe rendere al presente Francesco a Giouanni.

Noi habbiamo detto, che meritando a 2. denari la lira il mese, si viene a meritare a ragione di 10. per cento l'anno, e così scontando a 2. denari la lira il mese, si viene a scontare a ragione di 10. per cento l'anno. Hora se Giouanni non sapesse far questi conti, il buon Francesco gli farebbe forse per lui, in questo modo, cioè, si come habbiamo propriamente veduto fare a molti, e direbbe cos, se duc. 360. s'hanno a scontare a 10. per cento l'anno, adunque d'ogni cento se n'ha a trarre 10. che alla medesima ragione, de' detti duc. 360. se ne doueria trarre duc. 36. in vn'anno, e con queste paroline dolci, gli fa parer bianco, quel che è più nero d'vn coruo; e dipoi soggiunge, se in vn'anno se n'ha a trarre 36. in 3. anni, $\frac{1}{3}$. ch'io lo doueuo tenere, se ne doueria trarre 120. e così trarrebbe 120. di 360. restarebbe 240. e direbbe, eccoti il tuo conto, e con queste sue ragioni, le quali paiono l'istessa verità lo mandarebbe sodisfatto, e gonfiato

di parole, ma non di borsa, perciò che in questo modo gli renderebbe 240. duc. e gliene douerebbe rendere 270. di maniera che li vorrebbe rubbare 30. duc. si che bisogna hauere l'occhi d'Argo con costoro.

Alcuni altri costumano far così, e dicono, s'io deuo scontare duc. 360. a ragione di 10. per cento l'anno, adunque d'ogni cento ducati, io te ne deuo rendere 90. in un'anno, operando poi secondo il loro ordine per il sopradetto tempo di 40. mesi, gli douerebbe rendere duc. 240. come nella sopradetta, che l'vno, e l'altro modo d'operare è falso, & usurario. Alcuni altri ancora costumano che 91. paghi 100. come per esemplo. Giouanni si chiama debitore di Francesco per uno scritto fra loro d'hauer riceuto in prestito gratuito duc. 300. ma effettivamente non n ha riceuti più che 273. perche Francesco disse, io ti presterò quella quantità di ducati che tu mi chiedi, ma io voglio che per ogni 91. ducato, ch'io ti presto, tu ti chiami debitore di duc. 100. e così segue lo storto; Ma se pur alcuno gli domandasse a che ragione uien prestato il cento l'anno, risponderebbono che uien prestato a 9. per cento, la qual cosa è falsa, perche ne seguirebbe che 91. fusse uguale a 100. il che è impossibile, e per dimostrare che uien prestato a più di 9. per cento; noi habbiamo detto che lo sconto è atto contrario al merito, e che l'uno è proua dell'altro; adunque mettiamo che Francesco presti a Giouanni duc. 300. scontati a 9. per cento l'anno semplicemente, torneranno duc. 275. sol. 4. den. 7. di maniera che mette più conto a Giouanni farli lo sconto a ragione di 9. per cento l'anno, che pigliar 91. per cento, a talche se Francesco dà a Giouanni duc. 273. in cambio di 300. i quali scontandoli a 9. per cento l'anno semplicemente, tornerebbono duc. 275. sol. 4. den. 7. chiaramente si conosce, che uengono meritati, o scontati a più di 9. per cento. e tanti gliene douerebbe dare giustamente, e che ciò sia uero, merita duc. 273. a 9. per cento semplicemente per un'anno, trouarai che torneranno duc. 297. $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$. e douevano tornare duc. 300. e questo è quanto ci occorreua dimostrare per auuertimento.

Proposizione 2.

VNo deue hauere da un'altro duc. 220. di qui a certo tempo, e se glie li vuol rendere al presente, li vuol far buono, cioè scontare a ragione di soldi 11. den. 8. a oro per ducato, domando quanti gli ne douerà rendere. Fa così, moltiplica sol. 11 $\frac{2}{3}$. in duc. 220. fanno sol. 266. sol. 8. a oro, che sono ducati 18. sol. 6. den. 8. e questi trarrai di duc. 220. restano duc. 201. sol. 13. den. 4. e tanti ducati li douerà rendere.

Proposizione 3.

VNo ha prestato a un'altro duc. 8 $\frac{1}{2}$. per mesi 18 $\frac{3}{4}$. de' quali n'ha tirato d'interesse lire 11 $\frac{1}{2}$. si domanda prestando duc. 28 $\frac{1}{2}$. in quanto tempo guadagneranno lire 56 $\frac{1}{2}$. Ancorche in due volte per regola del tre si possa solucere, nientedimeno soluita in vn tratto per regola delle propositioni, poni ordinatamente tutte le quantità sopradette con i lor rotte, tanto di ducati, quanto di lire, e di tempo, dipoi moltiplica, e parti secondo le dimostrazioni, come di sotto

Sotto vedi, offeruando il medesim' ordine in tutte l'altre simili.

8 $\frac{1}{2}$.18 $\frac{1}{2}$.11 $\frac{1}{2}$.28 $\frac{1}{2}$.56 $\frac{1}{2}$. $\frac{4}{7}$. $\frac{4}{7}$. $\frac{4}{7}$. Partitori $\frac{4}{7}$. $\frac{4}{7}$.

Le meriteranno in mesi 27. e giorni 20.

Del meritare a capo d'anno, o altro termine.

Meritare a capo d'anno, o d'altro termine di tempo, è quello il quale del merito nasce merito, e che esso merito diuien capitale a ogni capo d'anno, o altro termine, e volendo meritare alcuna quantità di denari a tanto la lira il mese, o a tanto il cento l'anno a capo d'anno, o di 6. mesi, o d'altro termine, offeruarai il presente modo, il quale è il più vniuersale, e commune fra i Mercanti, & ancora, che sia posto in luce, dagli scrittori, eccetto da Francesco Galigai Fiorentino, il quale dimostra nella sua opera modo alquanto diuerso da questo, ma per variar poco, o niente dal nostro ordine, noi lasciamo il darne conto, & invero il modo che egli offerua in cotai meriti è buono, ma è troppo laborioso, e non vsato, e perciò attenderemo solamente all'utilità commune, lasciando da parte le sofistiche d'Algebra.

Proposizione 1.

VNo ha prestato a vn'altro lir. 600. per 2. anni, 3. mesi, e 20. giorni, a ragione di 20. per cento l'anno a capo d'anno, si domanda quante lire gli douerà rendere alla fin del tempo fra merito, e capitale. Dicesi, che meritare a capo d'anno non è altro, che saldar la ragione a ogni fine dell'anno, e meritando a 20. per cento, ogni cento lire, o duecenti, in capo d'un'anno tornano 120. duc. o 120. lire, e perche 20. è il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, cioè di 100. & il medesimo 20. è il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, e guadagno insieme, cioè di 120. perciò chi guadagna 20. per cento, guadagna il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, e d'ogni 5. fa 6. e volendo scontare, d'ogni 6. fa 5. Hor per tornare alla nostra proposta, farai così, piglia il $\frac{1}{5}$. di lir. 600. che è 120. e queste aggiungi al capitale, che è lir. 600. farà lir. 720. fra capitale, e merito per il primo anno; dipoi per il second'anno, prendi il $\frac{1}{5}$. di lir. 720. che è 144. aggiungilo a 720. farà lir. 864. fra merito, e capitale per il second'anno. Hora ti conuien meritare le dette lir. 864. per 3. mesi, e 20. giorni, facendo in questo modo, merita lir. 864. per vn'altro anno intero, pigliandone il $\frac{1}{5}$. che è lir. 172. fol. 16. e queste aggiungi a lir. 864. faranno lir. 1036. fol. 16. e tante lire tornarebbono meritate per 3. anni le sopradette lir. 600. Ma perche l'habbiamo meritate per 8. mesi, e 10. giorni più che non doueuamo, perciò bisogna scontare lir. 1036. fol. 16. per 8. mesi, e 10. giorni, a 4. den. la lira il mese, cioè a ragione di 20. per cento semplicemente, merita adunque vna lira a 8. mesi, e 10. giorni, a 4. den. la lira il mese, cioè a ragione di 20. per cento semplicemente, merita adunque una lira per 9. mesi, e 10. giorni a 4. denari il mese, haueraai che meritarà fol. 2 $\frac{2}{7}$. per il che fol. 20. cioè vna lira meritanza

per il detto tempo tornarà sol. 22 $\frac{2}{3}$. e volendola scontare, ogni sol. 22 $\frac{2}{3}$. torneranno sol. 20. vedi adunque quante torneranno lir. 1036. sol. 16. moltiplica 20. via lir. 1036. sol. 16. & il prodotto parti per 22 $\frac{2}{3}$. te ne verrà lir. 910. sol. 7. den. 2 $\frac{2}{3}$. e tante lire douerà rendere quel che accettò le lir. 600. a quell' vsuraio che gliene prestò.

Il sopradetto modo di meritare a capo d'anno è il più honesto (se honesto si può dire) & il più commune; ma non perciò vogliamo mancare per con. mune utilità di dar notizia d'un altro modo, vſato da queſti cam' vsurati, nemici di Dio, acciò te ne guardi. Hor ſia che Giouanni preſti a Franceſco lir. 600. come nell' antecedente propoſitione s' è detto; per 2. anni, 3. meſi, e 20. giorni, a merito di 20. per cento l'anno a capo d'anno. Vſano queſti tali in queſto modo, cioè, prima meritano lir. 800. per due anni interi, al modo ſopradetto, le quali tornano lir. 864. reſta poi a meritare per 3. meſi, e 20. giorni, e perciò meritano lir. 864. per vn' anno intero, che viene a eſſere il terz' anno, il merito delle quali ſarà lir. 175. ſol. 16. e Giouanni dice a Franceſco, tu vedi che il terzo anno, i denari che tu hai di mio meriterebbono lir. 172. ſol. 16. ma perche tu non gli hai tenuti del terz' anno più che 3. meſi, e 20. giorni, però vediamo quelle che meritano in queſto tempo, e dice coſi, ſe in 12. meſi mi doueſſi dare d' intereſſe lir. 172. ſol. 16. quante me ne doueſſi dare in meſi 3 $\frac{2}{3}$ moltipl. 3 $\frac{2}{3}$. via lir. 172. ſol. 16. & il prodotto parti per 12. ne viene lir. 52. ſol. 16. per il merito di lir. 864. in 3. meſi, e 20. giorni, il qual merito aggiunto a lir. 864. faranno in tutto lir. 916. ſol. 16. e tante lire Giouanni dice a Franceſco, che li deue dare ſia merito, e capitale, che di ragione non gli douerebbe dare ſe nò lir. 910. ſol. 7. den. 2. ſecondo il commun' vſo. Che il modo del loro operare ſia permiſioſo, lo dimoſtraremo con queſto eſſempio, addotto ancora da Fra Luca dal Borgo, e da altri Autori degni di fede.

Merita lir. 100. per tempo di 6. meſi a 20. per cento l'anno; facendo a capo d' anno. Per il modo che vſano queſti tali, in capo di 6. meſi, farebbono lir. 120. la qual coſa farebbe vera, ſe il merito fuſſe ſemplice, ma perche la conuentione s' intende al termine d' vn' anno; per forza biſogna che vi ſia differenza, per ciò che colui, che hauereſſe accatrato lir. 100. con ſimil patto non gli deue dare alcun merito, ſe non alla fine dell' anno, e ſe pure il creditore voлеſſe eſſer pagato in capo di 6. meſi, il debitore non è tenuto a darli ſe non lir. 100. le quali accettò, e dipoi alla fin dell' anno è tenuto a darli il merito di dette lir. 100. per 6. meſi, che tenne cioè lir. 10. e ſe pure il creditore le voлеſſe inſieme con le lir. 100. cioè in capo di 6. meſi, è coſa ragioneuole, che ſe ne faccia lo ſconto per 6. meſi, che il debitore le douea tener di più. Sconta adunque lir. 10. per 6. meſi a 4. den. la lira il meſe, torneranno lir. 9. ſol. 1. den. 9 $\frac{1}{4}$. che aggiunte a lir. 100. di capitale, fanno lir. 100. ſol. 1. den. 9 $\frac{1}{4}$. ſia merito, e capitale, e non lir. 110. come voglion loro, e coſi hauerai meritato lir. 100. per 6. meſi a 20. per cento l' anno, a capo d' anno.

Ma perche nel meritare alcuna quantità di lire, o ducati, non faranno ſempre date le porcioſte a 20. per cento l' anno, per la qual coſa tu poſſa accomodarti a pigliare il $\frac{1}{3}$. di ſiſa quantità, nè meno metterla in regola, dicendo, ſe di 5. ſi fa 6. che ſi farà &c. perche queſta commodità non ſi puol' hauere, ſe non quādo ſ' habbia a meritare a 20. uero a 10. per cento, perciò che dieci è netto guadagno di cento, & il $\frac{1}{3}$. di detto cento ſuo capitale, perche ancora in queſta ti puoi accomodare a pigliarne il $\frac{1}{3}$. tante volte, quanti ſono gli anni, per i quali

vuoi meritare detta quantità, & essendoui mesi fuor degli anni intieri, li douerai meritare per vn capo più, e dipoi scontar semplicemente per quei mesi, che soprameritasti tal quantità, come nella prima propositione de' meriti a capo d'anno s'è dimostrato. Laonde conoscendo noi, che queste commodità del 20. o del 25. o del 30. per cento l'anno non sempre accadono, perciò volendo meritare alcuna quantità di lire, o ducati, a 7. o 8. o 9. per cento, diceasi che le regole sopradette non seruono, perciò che questi son numeri, che non possun seruire a prender parte del lor capitale, se non con fatica grandissima; perli che formaremo al presente vna propositione per maggior intelligenza.

Propositione 2.

HOr sia che la proposta diceasi così; Merita duc. 300. per 3. anni, 8. mesi, e 20. giorni, a ragione d'8. per cento l'anno a capo d'anno, si domanda quanti torneranno fra merito, e capitale. Fa così, dicendo, se cento merita 8. che meritarà 300? multiplica 300. via 8. fa 2400. e questo parti per 100. ne vien 24. il quale aggiunto a 300. suo capitale farà 324. duc. fra merito, e capitale del prim'anno, hora per il second'anno dirai così, se 100. merita 8. che meritarà 324? opera, meritarà duc. 25. fol. 18. den. 5. i quali aggiunti a duc. 324. fanno duc. 349. fol. 18. den. 5. fra merito, e capitale del second'anno, hora per il terz'anno, dirai così, se cento merita 8. che meritarà duc. 349. fol. 18. den. 5? opera, meritaranno duc. 27. fol. 19. den. 10. i quali aggiunti a duc. 349. fol. 18. den. 5. fanno duc. 377. fol. 18. den. 3. fra merito, e capitale del terz'anno. Resta hora a meritare duc. 377. fol. 18. den. 3. per 8. mesi, e 20. giorni a capo d'anno, e perciò li meritarai per vn'anno intiero, e dirai così, se cento meritano 8. che meritaranno duc. 377. fol. 18. den. 3? opera, meritaranno duc. 30. fol. 4. den. 8. i quali aggiungi a duc. 377. fol. 18. den. 3. fanno duc. 408. fol. 2. den. 11. fra merito, e capitale per il quart'anno, ma noi non li doueuamo meritare più che per 3. anni, 8. mesi, e 20. giorni; perli che si conosce che gli habbiamo meritati per 3. mesi, e 10. giorni più che non doueuamo; laonde ci conuiene scontare duc. 408. fol. 2. den. 11. per 3. mesi, e 10. giorni, a 8. per cento l'anno semplicemente, cioè a den. 1 $\frac{2}{3}$. per lira il mese. Merita adunque vna lira per 3. mesi, e 10. giorni, te ne verrà di merito $\frac{2}{3}$. d'un soldo, i quali aggiunti a fol. 20. faranno fol. 20 $\frac{2}{3}$. fra merito, e capitale; hora volendo scontare duc. 408. fol. 2. den. 11. per 3. mesi, e 20. giorni, dirai così, se fol. 20 $\frac{2}{3}$. scontati per 3. mesi, e 20. giorni torneranno fol. 20. quanti torneranno duc. 408. fol. 2. den. 11? opera, torneranno duc. 399. fol. 5. den. 9. et anti diremo che torneranno i sopradetti ducati 300. meritati per il detto tempo.

Propositione 3.

ESe la proposta diceasi così. Merita duc. 200. per 6. mesi, e 20. giorni a den. 1 $\frac{1}{2}$. per lira il mese, faciendo a capo d'anno, fa così, tu sai, che a den. 1 $\frac{1}{2}$. per lira il mese si presta a ragione d'8. per cento l'anno. Hor merita 200. duc. per vn'anno intiero, dicendo così, se duc. 100. meritaro duc. 8. quanti ne meritaranno duc. 200? opera, meritaranno duc. 16. i quali aggiunti a duc. 200. faranno

no duc. 216. fra merito, e capitale d'un anno; hora bisogna che tu li sconti per 5. mesi, e 10. giorni semplicemente, perciò che si doneuano meritare per 6. mesi, e 20. giorni, e si son meritati per vn'anno, merita adunque vna lira per 5. mesi, e 10. giorni a den. $1\frac{2}{7}$. per lira il mese, te ne verrà den. $8\frac{2}{7}$. di merito, che ridotti in parte di soldo, sono $\frac{2}{7}$. d'un soldo, e questo aggiungi a fol. 20. cioè a vna lira di capitale faranno fol. $20\frac{2}{7}$. fra merito, e capitale, dipoi dirai così se fol. $20\frac{2}{7}$. scontati per 5. mesi, e 10. giorni, tornano fol. 20. quanti torneranno duc. 216. opera, trouarai che torneranno duc. 208. fol. 11. den. 7. e così diremo, che duc. 200. meritati per 6. mesi, e 20. giorni a den. $1\frac{2}{7}$. la lira il mese a capo d'anno, torneranno duc. 208. fol. 11. den. 7. e così farai le simili &c.

Potresti ancora meritare semplicemente vna lira sola per vn'anno, la quale tornaua fol. $21\frac{1}{7}$. e questi scontare per 5. mesi, e 10. giorni, che fu sopra meritata, torneranno fol. $20\frac{2}{7}$. di maniera che vna lira meritata per 6. mesi, e 20. giorni a den. $1\frac{2}{7}$. la lira il mese, facendo a capo d'anno, torna fol. $20\frac{2}{7}$. hora dirai così, per regola del tre, se fol. 20. meritati a capo d'anno per il dato tempo tornano fol. $20\frac{2}{7}$. li duc. 200. quanti torneranno? multipl. 200. via $20\frac{2}{7}$. & il prodotto parti per 20. ne verrà duc. 208. fol. 11. den. 7. come di sopra.

Proposizione 4.

VNo toglie adì primo Maggio dall'Ebreo lir. 250. a merito in ragione di 20. per cento l'anno, facendo il termine a capo dell'anno, e costui li tiene 17. mesi. Domando quanto meritaranno detti denari in detto tempo. Il Pagani, offeruando il modo vsurario (da noi descritto per fuggirlo) conclude che torneranno fra merito, e capitale lir. 325. ma secondo i suoi, e dotti Arithmetici torneranno lir. 322. fol. 7. den. 9. $\frac{2}{3}$. come facendo il conto ciascun potrà trouare.

Proposizione del Peuerone 5.

Merita duc. 100. per 2. anni, e 6. mesi, à 10. per cento à capo d'anno. Nel risolvere questa proposizione il d. Gio: Francesco Peuerone merita 100. ducati per 2. anni à capo d'anno, à 10. per cento l'anno, i quali tornano duc. 121. dipoi per 6. mesi egli piglia duc. 110. cioè il capitale, e merito del primo anno, e lo multiplica per se stesso, il quale fa 12100. e questo lo parte per $115\frac{1}{2}$. cioè per il merito, e capitale d'un anno, e 6. mesi; ne viene $104\frac{1}{2}$. alli quali aggiunge duc. 21. che sono il merito del primo, e second'anno, fanno in tutto duc. 125. $\frac{1}{2}$. e tanti ducati dice che tornerebbono li detti duc. 100. a meritargli per 2. anni, e 6. mesi à 10. per cento l'anno a capo d'anno, la qual cosa è falsa, perciò che egli vuole che in 6. mesi del second'anno guadagnino duc. $5\frac{1}{2}$. cioè la metà d'11. duc. che sono l'interesse del second'anno, e dipoi per li 6. mesi, che partecipano del terz'anno, vuol che meritino solamente duc. $4\frac{1}{2}$. la qual cosa non puol essere che merino più il semestre del second'anno, che il semestre del terz'anno, e perciò assolutamente diciamo, che tal modo d'operare è falso, ma operando secondo il douere, e regole date da noi, e da ciascun'altro Autore, trouarai che torneranno in tutto duc. 126. fol. 15. den. 2 $\frac{2}{3}$.

Dello sconto semplice del Peuerone.

Questa compensazione è di due sorti, l'una semplice, l'altra composta, & al fin dell'anno: è semplice quando il principale, cioè capitale si stima al contrario del semplice augumento per termini di Proportioni. Come per esempio, il semplice augumento à 10. per cento fà 110. per il primo anno, però in questa semplice compensatione se vuoi sapere in 3. anni di quanto si compenserebbono duc. 100. a 10 per 100. multiplica 100. via 100. fà 10000. il qual parti per 110. ne viene $9\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. Nel secondo anno il semplice merito fà duc. 110. però multiplica 100. via 100. fà 10000. e questo parti per 120. ne viene $8\frac{3}{4}\frac{1}{4}$. Nel terzo anno duc. 100. di semplice merito farebbono duc. 130. però multiplica 100. via 100. fà 10000. e questo parti per 130. ne viene duc. $76\frac{4}{13}\frac{2}{13}$. e tanti tornerebbono scontati duc. 100. per 3. anni semplicemente a 10. per cento l'anno.

Se nella compensatione semplice interuenisse mesi, come ti dò duc. 100. per compensatione semplice a 10. per cento per 2. anni, e 9. mesi, e vuoi sapere quanti tornaranno, multiplica 100. via 100. fà 10000. il qual parti per 110. ne viene $90\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. e per il secondo anno ne viene $8\frac{3}{4}\frac{1}{4}$. come di sopra habbiamo detto, hora per il termine di 6. mesi, tu sai, che nel semplice merito il termine 2. anni, e 6. mesi tornerebbono duc. 125. però multiplica 100. via 100. fà 10000. il qual parti per 125. ne viene 80. e tanti tornerebbono duc. 100. scontati per 2. anni, e 6. mesi à 10. per cento l'anno semplicemente.

Ma nella compensatione a capo d'anno v'è vna scematione contraria all'augumento del merito composto, come per esempio. Nel merito composto duc. 100. il primo anno crescono 10. però se vuoi sapere nella compensatione composta di 3. anni quanto si scemerebbono duc. 100. a 10. per 100. multiplica 100. via 100. fà 10000. il qual parti per 110. ne viene $90\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. per il primo anno nel secondo anno il merito composto è di duc. 121. però multiplica 100. via 100. fà 10000. il qual parti per 121. ne viene $82\frac{7}{11}\frac{1}{11}$. nel terzo anno il merito composto farebbe duc. 133. $\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. però multiplica 100. via 100. fà 10000. il qual parti per 133. $\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. ne viene duc. $75\frac{7}{11}\frac{7}{11}$. e tanti tornerebbono ducati 100. scontati per 3. anni a capo d'anno.

Se il termine della compensatione al fin de l'anno fusse d'anni 2. e mesi 6. compenzerai prima per due anni al modo sopradetto, dipoi per li 6. mesi multiplica 100. via 100. fà 10000. e perche nel merito composto di 2. anni, e 6. mesi la somma farebbe duc. 125. $\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. perciò parti 10000. per 125. $\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. ne viene duc. $79\frac{1}{11}\frac{1}{11}\frac{1}{11}$. e tanti tornerebbono duc. 100. scontati per 2. anni, e 6. mesi à capo d'anno secondo l'ordine del Peuerone. Ma per hauer egli errato ne i primi termini del meritare à capo d'anno, come habbiamo dimostrato, il qual vuole che 100. duc. tornino in 2. anni, e 6. mesi duc. 125. $\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. e noi diciamo che tornerebbono duc. 126. $\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. perciò se partirai il prodotto di 100. via 100. cioè 10000. per 126. $\frac{1}{11}\frac{0}{11}$. ne verrà duc. 78. 17. 8. come scontando li detti 100. duc. per 2. anni, e 6. mesi à 10. per cento l'anno à capo d'anno, secondo le nostre regole potrai similmente trouare.

Proposizione 6.

E Se la propoſta diceſſi così. Merita duc. 400. per vn'anno, & 8. meſi à ragione di den. $1\frac{1}{2}$. la lira il meſe, facendo à capo di 6. meſi ſa così prima v'edi quanti capi ſono in vn'anno, & 8. meſi, cioè in 20. meſi à 6. meſi per capo, trouerai che faranno tre capi, & auanzerà 2. meſi. Merita adunque duc. 400. per 3. capi interi, ma prima merita vna lira per 6. meſi, trouerai che merita 9. den. che ſono $\frac{1}{4}$. d'vn ſoldo, per il che di ſol. 20. ſi viene à fare ſol. $20\frac{1}{4}$. ogni 6. meſi, laonde dirai così, ſe di ſol. 20. ſi fa ſol. $20\frac{1}{4}$. che ſi farà di duc. 400 ? opera, multiplicando $20\frac{1}{4}$. via 400. & il prodotto parti per 20. ne viene duc. 415. fra merito, e capitale per il primo capo de primi 6. meſi, dipoi per il ſecondo capo dirai così, ſe di 20. ſi fa $20\frac{1}{4}$. che ſi farà di duc. 415 ? opera, hauerai che ſi farà duc. 430. 11. 3. e così farai per il terzo capo, e torneranno duc. 466. 14. 2. Reſta hora à meritare l'ultima quantità di duc. per 2. meſi che auāzorno fuor de 3. capi, e volendo far queſto, ſi come ſi richiede à capo di 6. meſi, è forza meritare duc. 446. 14. 2. per il quarto capo, cioè per altri 6. meſi, nel medefimo modo che hai meritato gli altri, trouerai, che per il quarto capo te ne verrà fra merito e capitale duc. 463. 9. 2. e queſti biſogna ſcontar ſemplicemēte per 4. meſi à den. $1\frac{1}{2}$. la lira il meſe, per cioche noi gli doueuamo meritare per 20. meſi, e gl'habbiamo meritati per 4. capi, che ſono 24. meſi, per il che è manifeſto che ſi ſon meritati per 4. meſi più. Laonde, volendoli ſcontare per 4. meſi, merita prima vna lira per 4. meſi trouerai che meriterà 6. den., che ſono $\frac{1}{2}$. ſoldo, aggiungilo à ſol. 20. cioè à vna lira, farà ſol. $20\frac{1}{2}$. e così meritando d'ogni 20. cioè, à vna lira, farà ſol. $20\frac{1}{2}$. e così meritando d'ogni 20. in 4. meſi ſi farà ſol. $20\frac{1}{2}$. e ſcontando d'ogni $20\frac{1}{2}$. ſi farà 20. e perciò dirai così, ſe di ſol. $20\frac{1}{2}$. ſi fa ſol. 20. che ſi farà di duc. 463. 9. 2. ? opera, ſi farà duc. 432. 3. 1. & il merito, ouero v'ſura, è la diſſerēza che ſi troua da duc. 400. che li preſta, fino à duc. 432. 3. 1. che gli deue rēdere, e così farai le ſimili, quādo fuſſero à capo di 7. ouero di 8. meſi &c.

Soluiſa per queſt'altro modo aſſai commodò, dicendo così, ſe vna lira guadagna duc. $1\frac{1}{2}$. in vn meſe; il cento guadagnerà $7\frac{1}{2}$. l'anno, & in 6. meſi guadagnerà la metà, cioè $3\frac{3}{4}$. per il che dirai, ſe 100. guadagna $3\frac{3}{4}$. che guadagna 400. opera guadagnerà 15. duc. per il primo capo di 6. meſi, i quali aggiunti à duc. 400. di capitale, fanno duc. 415. fra merito, e capitale, e così farai per il ſecondo, e per il terzo capo, & anco per il quarto; ma per il quarto hauerai che te ne verrà fra merito, e capitale duc. 463. 9. 2. i quali ſcontarai per 4. meſi che ſono ſoprameritati, nel modo che di ſopra habbiamo detto à den. $1\frac{1}{2}$. la lira il meſe, e verratti il medefimo, come di ſopra, cioè duc. 432. 3. 1. Per altri modi ancora potremo dimoſtrare tale ſconto; ma per non eſſer tedioſo vogliamo, che queſti ſiano à baſtanza.

Proposizione 7.

VNo ha preſtato à vn'altro vna quantità di duc. per 2. anni à merito di 12. per 100. l'anno à capo d'anno, & alla fine gli dette di merito duc. 28. domando quanti ducati gli preſtò. Fa così, merita vna quantità di ducati quali ti piace

piace per 2. anni a 12. per cento l'anno a capo d'anno, hor poni che gli prestasse duc. 100. i quali meritati a 12. per cento l'anno in 2. anni guadagneranno duc. $25\frac{1}{2}\frac{1}{2}$, e noi voleuamo duc. 28. per il che dirai così, se duc. $25\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ son guadagnati da duc. 100. ch'io m'approssi, da quanti saran guadagnati duc. 28. ? opera, trouerai che saranno guadagnati da duc. 110. $1\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. e tanti ducati li prestò, fanne proua, merítandoli per 2. anni, e trouerai che meriteranno duc. 28. à punto.

Di vno sconto à Capo d'anno, ò d'altro termine ?

Quando vorrai scontare alcuna quantità di denari a vna certa ragione da lina il mese, o il cento l'anno in vn terminato tempo a capo d'anno, o di sei mesi, o d'otto mesi, &c. offeruerai il presente modo, e prima . Se per quel tempo, che vuoi scontar tal quantità vi fusse anni spezzati, cioè che fuor degl'anni interi ci fusse mesi, e giorni ; e così, che i capi di sei mesi, o d'otto mesi non fussero interi, e che fuor di tali capi auanzasse qualche mese, o giorni, tu deui sempre vedere quanti mesi manca a far l'anno intero, ò vero altri capi, e per quel tempo che manca meritar semplicemente tutta quella quantità di lire, o ducati, che vuoi scontare, e di poi tutta quella quantità così meritata, insieme col merito la sconterai per tutti i detti capi interi, connumerando fra gli interi, quell'anno, ò quel capo di tempo che facesti intero, il qual non era, come per esempio .

Proposizione 1.

VNo deue hauere da vn'altro duc. 300. da hoggi a 2. anni, e 6. mesi, e se glieli vuol rendere al presente, li vuol far lo sconto a ragione di 20. per cento l'anno a capo d'anno, si domanda quanti ne li douerà rendere . Tu vedi che volendo far gl'anni interi, vi manca 6. mesi, e con 6. mesi più noi haueuamo 3. anni interi, i quali saranno tre capi ; Laonde, merita duc. 300. semplicemente per 6. mesi che mancano fino alla fin dell'anno, trouerai che torneranno duc. 330. i quali sconterai per 3. anni interi, anno per anno, il qual modo di scontare è questo . Tu sai che habbiamo detto, che meritando a ragione di 20. per cento l'anno di 100. si fa 120. e volendo scontare, ne segue il contrario, cioè, che di 120. si fa 100. adunque douerai dir così se di 120. si fa 100. che si farà di 300. ? opera, si farà 250. e così deui fare per il secondo, e terzo anno ; ma volendo in questa procedere con modo più breue, farai così ; riducendoti a memoria, che da noi è stato detto, che meritando a 20. per cento l'anno, di 5. si fa 6. e scontando, di 6. si fa 5. Laonde, dirai in questo modo, se di 6. si fa 5. che si fa di duc. 300? multiplica 300. via 5. & il prodotto parti per 6. ne vien duc. 150. per lo sconto del prim'anno, dipoi per il second'anno dirai così se di 6. si fa 5. che si farà di 250? opera si farà duc. 208. 6. 8. per lo sconto del second'anno, dipoi per il terz'anno dirai così, se di 6. si fa 5. che si farà di duc. 208. 6. 8. opera, si farà duc. 172. 12. 2. $\frac{2}{3}$. per lo sconto del terz'anno ; e così diremo, che i sopradetti duc. 300. scontati per tempo di 2. anni, e 6. mesi, a 20. per cento l'anno a capo d'anno, torneranno duc. 172. 12. 2. $\frac{2}{3}$.

Proposizione 2.

Voglio scontare duc. 360. per 2. anni, 3. mesi, e 20. giorni a ragione di 10. per cento l'anno, a fare a capo d'anno, si domanda quanti torneranno. Tu vedi che in questa proposta ci sono 3. mesi, e 20. giorni fuor di 2. anni interi, e volendo noi far l'anno intero manifestamente si conosce vi manca 8. mesi, e 10. giorni, per ilche, ci conuien meritare duc. 360. semplicemente per i detti mesi $8\frac{1}{3}$. a 2. denari la lira il mese, trouerai che torneranno duc. 385. e questi li scontrarai per 3. anni interi, cioè per 3. capi. Farai adunque così, aggiungi lo sconto, che vuoi far per cento che è 10. a esso 100. dipoi dirai in questo modo, se duc. 100. scontati per vn'anno, tornano duc. 100. quati torneranno duc. 385? opera, torneranno duc. 350. per lo sconto del prim'anno; dipoi per il second'anno dirai così, se duc. 110. tornano duc. 100. quanti torneranno duc. 350? opera, torneranno duc. $318\frac{1}{4}$. e tanti torneranno scontati per 2. anni, opera nel medesimo modo per il terz'anno, trouarai, che scontati per 3. anni torneranno duc. 289. 5. 2. Ma volendo procedere con più breuità; fa così, merita prima duc. 360. semplicemente per mesi $8\frac{1}{3}$. noi habbiamo detto che torneranno duc. 385. dipoi arguirai così, che se di duc. 110. scontando, si fa duc. 100. ne segue che d'11. si faccia 10. di modo che volendo scontare duc. 385. per 3. anni, conuien dir così; se d'11. si fa 10. che si farà di duc. 385? moltiplica 385. via 10. & il prodotto parti per 11. ne viene duc. 350. e così farai per il secondo, e terzo capo, e trouarai che alla fine torneranno duc. 289. 5. 2. come nella prima si concludo.

Per altro modo ancora poteuamo procedere, il quale è molto conforme al sopradetto, & è questo, che tu meriti duc. 360. semplicemente per il tempo che manca fino alla fine de' capi interi, che come sopra s'è detto tornano duc. 385. dipoi tu fai, che scontando a ragione di 10. per cento, di 110. si fa 100. come in questa medesima s'è detto, per il qual operare, si viene a scontare l' $\frac{1}{11}$. del suo capitale, laode piglia l' $\frac{1}{11}$. di detto 385. ne viene duc. 35. i quali tratti di duc. 385. restano duc. 350. scontati per il primo anno; Hora per il secondo anno, piglia l' $\frac{1}{11}$. di duc. 350. ne viene duc. 31. 16. 4. i quali tratti di duc. 350. restano duc. 318. 3. 8. scontati per il second'anno, dipoi per il terz'anno piglia l' $\frac{1}{11}$. di duc. 318. 3. 8. ne viene duc. 28. 16. 6. i quali tratti di duc. 318. 3. 8. restano duc. 289. 5. 2. scontati per il terz'anno, e così concluderai, che duc. 360. scontati per 2. anni, 3. mesi, e 20. giorni, torneranno duc. 289. 5. 2. e se per più anni, ouero capi si douessero scontare, tante volte più ne prenderesti l' $\frac{1}{11}$. sottraendolo ogni volta; e così habbiamo dimostrato, come in 3. modi d'operare torna sempre la medesima conclusione.

Proposizione 3.

Voglio scontare duc. 225. per tempo d'vn anno, & 8. mesi, a ragione di 8. per cento l'anno, a fare a capo di 8. mesi. Prima vedi 8. mesi, cioè vn capo di tem; o, quante volte entrano in vn'anno, & 8. mesi, cioè in 20. mesi, trouarai, che vi yanno due volte, & aanza 4. mesi, e così diremo, che sono 2. capi, e 4. mesi,

mesi, che volendo noi fare fino in 3. capi, vi manca 4. mesi; e perciò conuen meritare duc. 225. semplicemente per 4. mesi (che mancano a fare intero) a denari $1\frac{1}{2}$. la lira il mese, merita adunque vna lira per 4. mesi, trouerai che meriterà denari 6. $\frac{3}{4}$. i quali sono $\frac{3}{4}\frac{1}{2}$. d'vn soldo, dipoi dirai così, se di sol. 20. in 4. mesi si fa sol. 20. $\frac{3}{4}\frac{1}{2}$. che si farà de duc. 225? opera, si farà duc. 231. e questi li deui scontare per 3. capi; ma perche ogni capo di tempo contiene 8. mesi, perciò bisogna prima meritare vna lira per 8. mesi, la qual trouerai che meriterà sol. $1\frac{1}{4}$. che aggiunto a sol. 20. suo capitale farà sol. 21 $\frac{1}{4}$. di maniera che meritando vna lira per 8. mesi a den. $1\frac{1}{2}$. per lira il mese, d'ogni sol. 20. si fa sol. 31. $\frac{1}{4}$. Ma volendo scontare, ne segue il contrario, cioè, che di sol. 21 $\frac{1}{4}$. Si fa sol. 20. vedi adunque quel che si farà di den. 231. alla medesima ragione, moltiplica 231. via 20. & il prodotto parti per 21 $\frac{1}{4}$. ne viene duc. 219. 6. 1. e tanti torneranno scontati per il 1. capo d'8. mesi, e così farai per il secondo, e terzo capo, & hauerai per l'ultimo capo, che te ne verrà den. 197. 13. 2. e tanti torneranno i detti duc. 225. scontati per 20. mesi, a ragione d'8. per cento l'anno, a capo di 8. mesi.

Potemo ancora operare in altro modo, volendo peruenire alla medesima conclusione, il qual'è questo, cioè, merita duc. 225. per 4. mesi che mancano fino alla fine del terzo capo a 8. per cento l'anno semplicemente, dicendo così se duc. 100. in vn'anno meritano duc. 8. quanti ne meritaranno duc. 225? opera, meritaranno duc. 18. dipoi dirai, se in 12. mesi hanno meritato duc. 18. quanti ne meritaranno in 4. mesi? opera, meritaranno 6. ducati, i quali aggiunti a duc. 225. fanno duc. 231. dipoi diui veder 100. duc. quanto meritaranno in 8. mesi cioè vn capo solo, dicendo, se in 12. mesi meritano 8. ducati, quanti ne meritaranno in 8. mesi? opera, meritaranno duc. 5. $\frac{2}{3}$. e questi aggiungi al suo capitale che è 100. farà 105. $\frac{2}{3}$. di maniera che tu vedi chiaramente, che meritando semplicemente 100. duc. per 8. mesi, tornano duc. 105. $\frac{2}{3}$. ma volendo scontare, di 105. $\frac{2}{3}$. si farà 100. per la qual cosa conuen dir così, se duc. 105. $\frac{2}{3}$. tornano duc. 100. quanti torneranno 231? opera, torneranno duc. 219. sol. 6. den. 1. scontati per il primo capo, e per il secondo capo dirai similmente così, se duc. 105. $\frac{2}{3}$. tornano duc. 100. quanti torneranno duc. 219. sol. 6. den. 1? opera, torneranno duc. 208. sol. 4. dipoi per il terzo capo, dirai, se duc. 105. $\frac{2}{3}$. tornano duc. 100. quanti torneranno duc. 208. sol. 4? opera, torneranno duc. 197. sol. 13. den. 2. scontati per tutto il sopradetto tempo, a capo d'otto mesi.

Proposizione 4^a

VNo deue hauere da vn'altro duc. 1200. in tre paghe, in questo modo cioè, che ogni 6. mesi deue hauere la terza parte, e se il debitore glie li vuol rendere tutti al presente li vuol far lo sconto a ragione di 8. per cento l'anno semplicemente, si domanda quanti glie ne douerà rendere. Fa così diuidi duc. 1200. in tre parti vguali, ne vien duc. 400. per parte, e se ogni 6. mesi il creditore doueua hauere 400. ducati ne segue, che volendo la prima paga al presente la viene a conseguire di 6. mesi inanzi che non doueua, per la qual cosa bisogna scontare semplicemente 400. duc. per sei mesi a 8. per cento l'anno; Offerua il modo dello sconto semplice, trouerai che la prima paga, li douerà rendere ducati 384. sol. 12. den. 4. e perche la seconda paga si doueua fare di qui a 12. mesi, pe-

rò volendola al presente, scontala semplicemente per 12. mesi, & hauerai che per la seconda paga li douerà rendere al presente duc. 376. fol. 7. den. 5. e perche la terza paga si doueua fare di qui a 18. mesi; perciò volendola al presente, si bisogno scontar la semplicemente per 18. mesi, opera, trouerai che li douerà rendere al presente duc. 357. fol. 2. den. 10. per la terza paga. Fatto questo, somma insieme i ducati che li due rendere al presente della prima paga, con quelli della seconda, e della terza: hauerai che in tutto faranno duc. 1112. fol. 2. den. 7. e tanti ducati douerà rendere il debitore al creditore al presente.

Come si saldino le ragioni semplicemente trà gli Mercanti.

Volendo saldare vna ragione semplicemente, non è altro che meritar semplicemente quelle quantità di denari, che si son prestate per quel tempo che sarà dal di che si son prestate, fino al di che vogliono saldar la ragione, dipoi col medesimo ordine meritare quelle quantità di denari che son rese in dietro, o fatte buone, come occorre fra gli Mercanti, e di poi che così l'hauerai meritata, aggiungerai il merito del due hauere al suo capitale, & il merito dell'hauere hauuto, ouero del pagamento fatto indietro, l'aggiungerai al suo capitale; & in questo modo vedrai qual sarà più il debito, o il credito, e similmente conoscerai chi resta debitore. Ma prima, per auuertimento noi diciamo che il mese comunemente s'intende di 30. giorni, e l'anno di 360. e benché dell'anno sia stato vn sol principio, nientedimeno fra i popoli del mondo s'va incominciare in diuersi tempi; laonde S. Chiesa principia l'anno alla Natiuità del Signore; In Venetia si fa principio all'anno il 1. di Marzo, & in Firenze a 25. di Marzo, e noi nel nostro operare faremo principio all'anno il 1. Gennaio, per esser così solito per lo più in Toscana, & in molt'altre parti d'Italia.

Vno deuè banere da vn'altro l'infrastrate partite di denari, e prima.

lir. 330. a di primo di Maggio 1592.	mesi 6.
lir. 420. a di primo di Settembre 1592.	10.
lir. 260. a di primo d'Agosto 1593.	21.
lir. 320. a di primo di Marzo 1594.	28.

E se glie li vuol dare al presente che siamo a di primo di Nouembre 1591. li vuol far lo sconto di ciascuna partita a ragione di 10. per ceto l'anno semplicemente, si domanda quante glie ne douerà rendere. Fa così, troua prima quanti mesi sono dal di che vuole tutti i denari, cioè dal di primo di Nouembre 1591. per fino alla prima partita della qual'è debitore, cioè fino a di primo Maggio 1592. trouarai che vi sarà 6. mesi, adunque il creditore vuole i denari della prima partita di 6. mesi inanzi, e perciò dice volerne far lo sconto a ragione di 2. denari la lira il mese, sconta adunque lire 330. per 6. mesi, torneranno lire 314. fol. 5. den. 9. dipoi troua, quanti mesi sono dal di che riuorrebbe tutti i denari, cioè dal di primo di Nouembre 1591. fino al di di ciascun'altra partita a vna per vna, trouerai, che fino alla seconda partita vi sarà 10. mesi, e fino alla terza 21. mesi,

mesi, e fino alla quarta 28. mesi i quali poni di contro a ciascuna partita come vedi; Fatto questo sconta semplicemente, quero a capo d'anno (secondo i parti) ciascuna partita da per se per quel tempo che hanno di contro, e qualche resterà di ciascuna partita scontata, sommerai insieme, e trouerai che faranno lire 1182. fol. 14. den. 3. e tante lire li douerebbe rendere al presente.

*Gionanni deuè hauer da Francesco l'infrastrate partite di denari
in diuersi tempi.*

Meriti

Lir. 340. fol. 8. den. 4. adi 10. Setteb. 1588. mesi 31. e gior. 20. lir. 89. 16. 7. $\frac{1}{4}$.
Lir. 260. fol. 16. den. 8. adi 20. Marzo 1589. mesi 25. e gior. 10. lir. 55. 1. 3. $\frac{1}{2}$.
Lir. 180. fol. 8. den. 4. adi 15. Noueb. 1589. mesi 17. e gior. 15. lir. 26. 6. 2. $\frac{1}{4}$.
Lir. 360. fol. 3. den. 4. adi 25. Luglio 1590. mesi 9. e gior. 4. lir. 27. 10. $\frac{3}{4}$.

E Francesco ha reso a Gionanni l'infrastrate partite cioè.

Meriti

Lir. 280. 11. 8. adi 1. di Giugno 1589. mesi 22. lir. 51. 8. 9. $\frac{1}{2}$.
Lir. 120. 15. 0. adi 6. di Febr. 1590. mesi 14. e gior. 24. lir. 14. 17. 10. $\frac{1}{4}$.
Lir. 200. 8. 4. adi 18. Ottobre 1590. mesi 6. e gior. 12. lir. 10. 13. 9. $\frac{1}{4}$.

Hora son d'accordo voler saldare la ragione a di primo Maggio 1591. e meritare semplicemente il debito, & il credito a ragione di 2. denari la lira il mese, si domanda quanto Francesco resterà debitore di Gionanni. Fa così, troua prima quanti mesi sono dalla prima partita, cioè dal di 10. di Settembre 1588. per fino adi primo Maggio 1591. che è il di del saldo, trouarai, che vi farà mesi 31. e giorni 20. e per questo tempo meritarai semplicemente i denari della prima partita, che sono lir. 340. fol. 8. den. 4. a ragione di 2. den. la lira il mese; hauerai che meritaranno lir. 89. fol. 16. den. 7. $\frac{1}{4}$. e queste le segnarai di contro alla prima partita verso man destra, come nella presente propositione puoi vedere, dipoi troua quanti mesi sono dalla seconda partita, cioè dal di 20. Marzo 1589. per fino al di del saldo, trouarai, che vi farà mesi 25. e giorni 10. e per questo tempo meritarai lir. 260. fol. 16. den. 8. a 2. den. la lira il mese semplicemente, trouarai che meritaranno lir. 55. fol. 1. den. 3. $\frac{1}{2}$. le quali segnarai di contro alla seconda partita, dipoi troua quanti mesi sono dalla terza partita, cioè da di 15. Nouembre 1589. per fino al di del saldo, trouarai, che vi farà 17. mesi, e 15. giorni, e per questo tempo meritarai semplicemente lir. 180. fol. 8. den. 4. a 2. den. la lira il mese, trouarai che meritaranno lir. 26. fol. 6. den. 2. $\frac{1}{4}$. e queste segnarai di contro alla terza partita, dipoi troua quanti mesi sono dalla quarta partita, cioè dal di 25. Luglio 1590. per infino al di del saldo, trouerai che vi farà 9. mesi, e 5. giorni, e per questo tempo meriterai semplicemente lire 360. fol. 3. den. 4. a 2. denari la lira il mese, trouerai che meriteranno lire 27. fol. 10. den. 3. $\frac{1}{4}$. le quali segnarai di contro alla quarta partita; e se altre vi fussero, tutte le meriteresti à vna per volta, per il tempo che hauessero fino al di del saldo. Fatto questo somma insieme tutte le partite di meriti, trouerai che ascendono alla somma di lire 198. fol. 14. den. 5. (pigliando il mezzo denaro per denaro intero) e questo merito l'aggiungerai alla somma delle quattro partite del due

deue hauere, la somma delle quali è lire 1141. fol. 16. den. 8. che è il principal capitale, aggiungi adunque lir. 198. fol. 14. den. 5. che è il merito di detto capitale, faranno in tutto lire 1340. fol. 11. den. 1. e tante lire Giovanni douerebbe hauere da Francesco fra merito e capitale; se Francesco nò gl'hauesse reso cosa alcuna, ma perche gli ha reso lire 601. fol. 15. in tre partite, perciò bisogna vedere quanti mesi sono dal dì di ciascuna di queste partite, fino al dì del saldo: opera trouerai che dalla prima partita vi farà mesi 22. e dalla seconda partita vi farà mesi 15. e giorni 24. e dalla terza partita vi farà mesi 6. e giorni 12. fatto questo merita ciascuna partita di denari separatamente per il suo tempo a 2. denari la lira il mese, a merito semplice, trouerai che alla prima partita ne verrà di merito lir. 51. fol. 8. den. 9. $\frac{3}{4}$. & alla seconda lir. 14. fol. 17. den. 10. $\frac{1}{2}$. & alla terza lir. 10. fol. 13. den. 9. $\frac{1}{2}$. di poi somma insieme questi meriti, fanno lir. 77. fol. 0. den. 5. e queste l'aggiungerai alla soma delle tre partite che Francesco ha rese a Giovanni, la soma delle quali è lir. 601. fol. 15. aggiungi dunque lir. 77. fol. 0. den. 5. faranno in tutto lir. 678. fol. 15. den. 5. e tante lire firà merito, e capitale diremo che Francesco habbia reso a Giouanni, le quali trarrai di lir. 1340. fol. 11. den. 1. che Giouanni douea hauere da Francesco, restano lir. 661. fol. 15. den. 8. e di tante lire Francesco resta debitore di Giouanni; e se i patti fussero che le partite si douessero meritare a capo d'anno, o d'altro termine, a tanto per cento l'anno, procederesti come nei meriti più volte habbiamo detto, aggiungendo poi i meriti ai capitali, come in questa s'è fatto.

Volendo operare nelle ragioni de'aldi con modo alquanto più facile del sopradetto, fa così, merita semplicemente ciascuna partita da per se per il suo tempo a vn denaro solo la lira il mese, e la somma del merito, che ti peruiene di tutte le partite del deue hauere, come dell'hauere hauuto, la multiplicatione via tanti denari, quanti haucui a meritare le dette partite, come per esempio. Merita la prima parte del deue hauere sopradetto che è lir. 340. fol. 8. den. 4. per mesi 3. e giorni 20. semplicemente a vn denaro per lira il mese, hauerai, che meritaranno lir. 44. fol. 18. den. 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. ma perche i patti sopradetti sono che s'habbino a meritare a 2. den. la lira il mese, perciò moltiplica lir. 44. fol. 18. den. 3 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. via 2. den. farà lir. 89. fol. 16. den. 7. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{4}$. e così verranno meritate a 2. den. e se tu l'hauessi a meritare a 3. den. la lira il mese, merita prima quella quantità a vn denaro, e poi quel merito moltiplicalo via 3. e così hauerai il tuo intento.

E volendo saldare la ragione a 11. per cento, noi diciamo che tu la puoi saldare a 10. e quando hauerai raccolto il merito, aggiungili sopra il $\frac{1}{10}$. di detto merito, e così sarà saldada a 11. per cento, & hauendolo a saldare a 9. per cento, saldala a 10. e della somma del merito abbattine il $\frac{1}{10}$. e restará saldada la ragione a 9. per cento.

Del modo di recare a vn di più partite di denari.

REcare a vn di più partite, non è altro che ragguagliare più pagamenti da farsi in diuersi tempi, e condurli in vn pagamento solo, & in vn di solo, costumasi far così. Accomoda prima per ordine tutte le partite, che vuoi ragguagliare, l'una sotto l'altra, cominciando da quella di più basso millesimo, e seguita gradatamente, e come l'hauerai così accomodate, comincia dalla prima partita, e guarda quanti mesi sono dalla prima partita alla seconda, quel tempo, che vi sarà, lo metterai di contro al la seconda partita, perciòche la prima
partita

partita non ha d'hauer di contro tempo nissuno, dipoi troua quanti mesi sono dalla prima partita alla terza, e quel tēpo che vi farà, lo metterai di contro alla terza partita, dipoi troua quanti mesi sono dalla prima partita alla quarta, e quel tempo che vi farà lo metterai di contro alla quarta partita, e così farai alla quinta, & alla sesta, & a quante partite iussiero facendo sempre che la prima partita resti senza tēpo di contro, e come hauerai così fatto, merita tutte quelle partite, ciascuna da per se semplicemente a quanto ti piace la lira il mese, ò il cento l'anno, che non fa caso, come poco più oltre dirò. e il merito di ciascuna partita l'aggiungerai insieme, dipoi raccogli tutte le partite del capitale da per se; Fatto questo bisogna trouare in quanto tēpo il detto capitale guadagnerebbe quel tal merito a ragione d'un denaro la lira il mese, e se tu haessi meritate le partite a 2. ò 3. den. la lira il mese, bisognerebbe similmente che tu trouassi in quanto tempo tutto quel capitale a 2. ò 3. denari per lira il mese guadagnasse quel tal merito, dipoi trouato che hauerai quel tempo, l'aggiungerai sopra la prima partita, che e ha minor millesimo, e doue torni inerà quel tempo, in quel di verranno pagate, ò ragguagliate tutte le partite, come per esempio.

Vno deue hauere da vn' altro l'infrastrate partite in questi tempi cioè.

	Mesi	giorni	Denari
lir. 340. adi primo di Giugno 1588.			
lir. 260. a di 18. di Nouembre 1588.	5.	18.	1456.
lir. 180. adi 20. d'Agosto 1589.	14.	20.	2640.
lir. 420. adi 24. d'Aprile 1590.	22.	24.	9576.
lir. 560. adi 15. Ottobre 1591.	40.	15.	22680.
1760.			36352.

Si domanda in che di verranno ragguagliate. Volendo recare a vn sol di tutte le sopradette partite, farai in questo modo. Trota quanti mesi sono dalla prima partita alla seconda, dal di primo Giugno 1588. fino a di 18. Nouembre 1588. che v'è mesi 5. e 18. giorni, e questi poni di contro alla seconda partita verso man destra, dipoi troua quanti mesi son dati alla prima partita, fino alla terza, cioè dal di primo Giugno 1588. per fino adi 20. Agosto 1589. che v'è 14. mesi, e 20. giorni, e questi poni di contro alla terza partita; dipoi troua quanti mesi sono dalla prima partita alla quarta, cioè dal di primo di Giugno 1588. per fino adi 24. d'Aprile 1590. che v'è mesi 22. giorni 24. e questi poni di contro alla quarta partita; dipoi troua quanti mesi sono dal di primo Giugno 1588. per fino adi 15. Ottobre 1591. che v'è 40. mesi, e 15. giorni, e questi poni di contro alla quinta partita, come nella presente propositione si vede. Fatto questo, merita semplicemente tutte le partite, che hanno il tempo di contro per quei medesimi mesi, che hanno da lato, ciascuna da per se, a vn denaro per lira il mese, o a quanto ti piace, che non fa caso; ma per più facilità meritate a vn denaro per lira il mese, hor merita vna lira per 5. mesi, e 18. giorni, che è il tempo della seconda partita, trouarai che meritarà denari 5 $\frac{7}{8}$. per il che multiplica den. 5 $\frac{7}{8}$. via lir. 260. sarà den. 1456. per il merito di lir. 260. in 5. mesi, e 18. giorni, & i sopradetti denari 1456. li porrai di contro alla seconda partita verso man destra, come vedi. Di maniera che, senza che replichiamo più il modo, che si deue tenere nell'altre partite, basta che diciamo questo,

questo, cioè, che bisogna multiplicare tutti quei mesi, e giorni (reca soli in parte di mese) via quelle partite, che hanno da lato i sopradetti mesi; & ad ogni partita segnarai da lato il suo prodotto l'vno sotto l'altro per ordine, e tutti quei prodotti conuien sommarli insieme, i quali faranno denari, cioè il merito di tutte quelle partite; somma adunque tutti i prodotti sopradetti, faranno den. 36352. e questo è il merito delle sopradette partite, dipoi somma tutte le partite insieme che deue hauere, trouarai, che sono lir. 1760. le quali bisogna vedere in quanto tempo meritaranno den. 36352. a vn denaro per lira il mese, per la qual cosa tu vedi che le lir. 1760. in vn mese guadagnano 1760. denari; Laonde dirai così, se 1760. den. son guadagnati in vn mese, in quanti mesi faranno guadagnati den. 36352? opera, trouarai che faranno guadagnati in 20. mesi, e 19. giorni, & auanza $\frac{1}{7} \frac{2}{7} \frac{3}{7}$ d'vn giorno, il qual auanzo pigliaremo per vn giorno intero, e diremo 20. giorni. Hora questi 20. mesi, e 20. giorni bisogna aggiungerli sopra il millesimo della prima partita, perciò che è il minor millesimo, la qual'è scritta a di primo di Giugno 1588. aggiungi adunque 20. mesi, e 20. giorni sopra il di primo Giugno 1588. trouarai che termineranno a di 20. Febbraio 1590. & in questo diueranno precisamente ragguagliate tutte le sopradette partite, e così l'habbiamo recate tutte a vn sol giorno, per la qual cosa si puol creare, e tirare inanzi vna partita sola al libro, e far debitore quel tale di lir. 1760. a di 20. di Febbraio 1590.

Son molti, che in simili operationi, cominciano dal maggior millesimo, lasciando l'ultima partita (che viene ad esser la prima, doue cominciano a operare) senza metterli tempo di conto, e tornano indietro col tempo, operando nel resto come nella sopradetta, e quel tēpo che gliene viene al fine del loro operare, lo traggono del maggior millesimo, il qual torna tutt'vno col nostro operare.

Ma perche puol auenire che nel recare a vn di piu partite, le medesime partite hauessero vna medesima quantità di denari, e da vna partita all'altra vi fusse vguale distanza di tempo, allora in simil casi per maggiore speditione, troua quanti mesi sono dalla prima partita del minor millesimo, per fino all'ultima partita del maggior millesimo, e tanti mesi, e giorni, quanti vi sarà pigliare la metà, la qual aggiungi sopra la partita del minor millesimo, e doue terminerà quel tempo, in quel di verranno ragguagliate le dette partite, come per esēpio.

Vno deue hauere da vn' altro, l'infrastrate partite di denari, in questi tempi, cioè.

Lir. 160. adi primo Maggio 1589.

Lir. 160. adi primo di Gennato 1590.

Lir. 160. adi primo Settembre 1590.

Lir. 160. adi primo di Maggio 1591.

Volendo recare a vn di le sopradette partite, noi diciamo che per esser le partite vguali in quantità, & vguale in differenza di tēpo (attesoche da vna partita all'altra vi sono 8. mesi) conuien sommare insieme quelle tre differenze, cioè tre volte 8. mesi, fanno 24. mesi, de quali piglia la metà, che sono 12. mesi, e questi aggiungi sopra la partita del minor millesimo, cioè sopra la prima, che è scritta adi 1. Maggio 1589. e faranno adi 1. Maggio 1590. & in detto giorno si douerebbe fare il pagamento. E se le dette partite le meritarai a vn den. la lira il mese, come nella prima proposta del recare a vn di s'è detto, ti verrà il medesimo.

De

De Resti esempio primo.

A Noi pare che le ragioni che si fanno de resti sia atto loduole, poiche per merito delle partite se le dà tempo, e non denari, come per esempio.

Giovanni deve hauere da Francesco lire 200. adi 1. di Nouembre 1591. e Fracesco ha reso a Giovanni lire 100. adi 1. d'Ottobre 1591. si domanda quanto tempo Giovanni douerà fare a Francesco del resto de denari. Giusta cosa par che sia che se Fracesco ha pagato lire 100. vn mese innanzi, che non doueua, che ancor Giovanni deua far tēpo del resto a Francesco vn mese più, perciò che ha pagato la metà di quella doueua; perche il resto giustamente lo douerebbe pagare adi primo Dicbre 1591. e questo si conclude per modo di discorso, e ragion naturale. Ma volendo procedere per regola, come nelle seguenti proposte dimostrato, sarà così, e prima. Tu vedi che Francesco paga lire 100. a Giovanni d'vn mese innanzi, le quali meritarai a vn den. per lira il mese, hauera, che meritano 100. den. e questo guadagno lo fanno in mano di Giovanni, il qual doueua esser di Francesco se non gli rendue le lire 100. Hora tu vedi che il resto è lire 100. troua dunque quelle 100. lire di resto in quanto tēpo meritauano quei 100. den. alla medesima ragione, d'vn denaro per lira il mese, tu vedi che in vn mese faranno il detto guadagno, il qual mese aggiungi sopra adi primo Nouembre 1591. sarà adi 1. di Dicembre 1591. Perciò che par cosa ragionevole, che pagando parte del debito più presto, che non si deue, del resto sia aspettato più oltre che non sono le conuentioni di tutto il debito. Non per tediare gl'intelligenti, ma per beneficio di quelli che non fanno, e procurar di sapere habbiamo descritto la proposta così facile.

Volendo giustamente concludere simili proposte; Bisogna sempre considerare se quella quantità di denari, che s'è resa, ella sia restituita, più presto, o più tardi che nō si conuiene, se sarà resa più presto, opera come di sopra habbiamo detto, e quel tempo che ti peruerà nell'operatione, aggiungilo sopra il giorno, e mellestino, che si doueua pagare tutt'i denari, e se quella quantità fusse resa più tardi, allora quel tempo, che ti peruerà nell'operatione, lo trarrai, tirarsi indietro dal di, e mellestino, che si doueua pagar tutt'i denari, e doue arriuarrà, o resterà quel tempo, che s'aggiunge, o che si trabe, quini, & in tal di douerà hauere il resto, o far debitore il debitore.

Potria forse qualcuno dir così. Io non posso comprendere, come questa cosa possa stare; che se io son debitore d'vna quantità di lire, da pagarglieli a vn terminato tempo, e che io gliene dia vna parte più tardi del detto tempo, ch'io possa poi pagare il resto alcuni mesi indietro dal di ch'io mi ritrouo, come per esempio, s'io mi trouasse al presente adi primo di Nouembre 1591. con debito di lire 200. per resto di maggior somma, come saria possibile che io potessi pagar tal resto è vn n. di creditore adi primo di Maggio 1592. o il qual tempo è già passato, à cui risponderò così, e diciamo esser veramente cosa impossibile nello stato presente poter pagare in tempo preterito; ma non è già impossibile, poter creare vna partita, e far che vno sia debitore d'vn'altro d'alcuna quantità di denari, e che tal quantità sia cosa conueniente douersi pagare in tempo preterito, ma perche in tempo preterito non si puo far tal pagamento, basta sapere in che di si douesse fare, accioche il debitore paghi l'interesse di quel resto, per ra-

ta di tutto quel tempo che correffe dal di che si creaffe debitore per fino al di proprio in che si troua a tanto per lira, o per cento feconda i patti, come più oltre dimoftraremo.

Giuuanni deue hauer da Francesco lir. 898. adi primo Settembre 1591. e Francesco ha refo a Giouanni lir. 370. adi 20. Maggio 1588. si domanda in che di Francesco farà debitore del reffo. Fa così, tu vedi manifestamente che Francesco rende a Giouanni lire 370. più preffo che non è obligato, procura adunque in vestigar di quanti mesi glie li rende innazi, trouerai che dal di 20. di Maggio 1588. (che glie li rende) per fino adi primo di Settembre 1591. vi corre 39. mesi e 10. giorni, guarda hora quanto meritano lire 370. in questo tempo à vn denaro per lira il mese, o quanto ti piace che non fa caso, ma per più facilità le meriterai a vn denaro semplicemente, trouerai che meriteranno lire 60. fol. 12. den. 9. Fatto quelto trahi lire 370. di lire 898. per veder di quãto Francesco resta debitore hauerai che resta debitore di lire 528. le quali deui inuestigare in quanto tempo meriteranno lir. 60. fol. 12. den. 9. alla medesima ragione per lira il mese, o il cento l'anno che meritasti le lire 370. e perche le meritasti à vn denar per lira il mese, vedi adunque lire 528. quanto meriteranno in vn mese, le quali meritano 528. denari, che sono lire 2. 4. e questo è il merito di lir. 258. in vn mese, e noi voleuamo lire 60. 12. 9. perciò dirai così, se lir. 2. $\frac{4}{5}$. son guadagnate in vn mese, in quanti mesi faranno guadagnate lir. 60. 12. 9. opera, trouerai che faranno guadagnate in mesi 27. e giorni 17. e tanto refo Francesco deue tardare a pagare il reffo, dal di che li doueua pagar tutti, per il che aggiungi 27. mesi e 17. giorni di sopra il primo di Settembre 1591. termineranno adi 17. di Dicembre 1593. e così diremo, che in questo giorno Francesco deui pagare il reffo a Giouanni, e non prima, e se lo pagasse innanzi a detto tempo, Giouanni farebbe tenuto a pagar l'interesse a Francesco de' detti denari per tutto quel tempo, che lo pagasse innanzi.

Vno deue hauer da vn altro lire 1656. a di 15. di Giugno 1589. delle quali n'ha hauute lire 450. a di 20. di Maggio 1591. si domanda in che di si deue far debitore del reffo: Prima considera se le lire 450. son rese più preffo, o più tardi che non doueua, le quali manifestamente si conofce esser pagate più tardi, vedi hora quanti mesi son rese più tardi, trouerai che dalli 15. di Giugno 1589. (che doueua pagar tutte) per fino a di 20. di Maggio 1591. vi corre mesi 23. $\frac{1}{2}$. fatto questo merita lire 450. semplicemente per mesi 23. $\frac{1}{2}$. a vn denaro per lira il mese, trouerai che meriteranno lire 44. 8. $\frac{1}{2}$. di poi guarda quanto resta a dare, trahi lire 450. di lire 1656. restano lire 1196. le quali deui vedere in quanto tempo guadagneranno lire 44. 8. $\frac{1}{2}$. Facendo così, tu vedi che lir. 1196. a vn denaro la lira il mese guadagnano 1196. den. che sono lire 4. 19. 8. e noi voleuamo lire 44. 8. 0. $\frac{1}{2}$. Laonde dirai così, le lire 4. 19. 8. son guadagnate in vn mese, in quanto tempo faranno guadagnate lir. 44. 8. 0. $\frac{1}{2}$ opera secondo i modi dati, trouerai che faranno guadagnate in otto mesi, e 27. giorni, i quali trarrai, e tirerai indietro dal di 15. di Giugno 1589. e resterà adi 18. di Settembre 1588. & in tal di douerà farsi debitore del reffo.

Ma perche all'operante, hauendo a parture lire, soldi, e denari, per lire soldi, e denari, o il recare i soldi, e denari in parte di lira, gli apporterebbe troppa gran briga, massime a chi non fusse esperto nelle ragioni de' rotti, perciò voliamo dimonstrare la solutione della sopradetta proposta con più facilità, da non potere errare quando uoleffi, e col medesimo ordine potrai soluere ogn'altra simile. Il modo adunque e questo.

Multi-

Moltiplica *lir.* 460. che il debitore rende al creditore, via mesi $23\frac{1}{2}$. le quali gli rende più tardi che non deuē, fanno $10656\frac{2}{3}$. e questo prodotto parti sempre per quella quantità di lire, o ducati che resta a dare, parti adunque $10656\frac{2}{3}$. per *lir.* 1196. che resta a dare, ne viene 8. e questi son mesi, & auāza $1088\frac{2}{3}$. il qual moltiplica via 30. fa 32660. e questo parti per 1196. ne viene 27. giorni, e così hauerai che 8. mesi, e 27. giorni si doueranno trarre, e tirare indietro dal dì 15. Giugno 1589. come nel primo operare di questa s'è fatto, e se le *lir.* 460. fussero pagare auanti del douere, allora i detti mesi 8. e 27. giorni si douerebbono portare innanzi dal dì 15. Giugno 1589. caua adunque i sopradetti mesi del dì 15. Giugno 1589. trouarai, che restarà a dì 18. di Settembre 1588. & in tal giorno si douerà far debitore del resto.

Puol'accadere spesse volte, che vno deua hauere da vn'altro. più partite di denari in diuersi tempi, & che il debitore n'abbia rese al creditore in più partite, & in diuersi tempi, e volendo saldare i conti, e vedere di quanto resta debitore, e sapere in che dì si deuē far debitore del resto, perciò noi formaremo le presenti proposte, per essemplio di molti altre.

Vno deuē hauere da vn'altro l'infraferitte partite di denari.

Lir. 520. 16. adi primo Maggio 1589.

Lir. 466. 10. adi 10. Marzo 1590.

Lir. 340. 14. adi 15. Nouembre 1590.

Delle quali n'ha hauute.

Lir. 360. 10. adi 12. di Settembre 1589.

Lir. 290. adi primo d'Agosto 1590.

Lir. 420. adi 18. di Maggio 1591.

Si domanda in che dì viene il resto. Fa così. reca a vn dì tutte le partite del deuē hauere, trouarai, che verranno ragguagliate adi 15. Gennaio 1590. dipoi reca a vn dì tutte le partite dell'hauere hauuto, trouarai che verranno ragguagliate adi 6. Agosto 1590. dipoi somma insieme tutte le partite del deuē hauere trouarai, che fanno soldi 1328. & ancora somma insieme le partite dell'hauuto quali fanno soldi $1070\frac{1}{2}$. fatto questo, forma la proposta in due partite sole, dicendo così. Vno deuē hauere da vn'altro sol. 1328. adi 15. Gennaio. 1590. delle quali n'ha hauute $1070\frac{1}{2}$. adi 6. Agosto 1590. si domanda in che dì si deuē far debitore del resto. Considera hora se i denari restituiti son resi più presto, o più tardi del douere, conoscerai che son resi più tardi 6. mesi, e 21. dì, moltiplica adunque mesi $6\frac{1}{2}$. via *lir.* $1070\frac{1}{2}$. fanno $7172\frac{1}{2}$. e questo parti per *lir.* 257. $\frac{1}{2}$. che son quelle che resta a dare, ne viene mesi 27. e giorni 15. e così dal dì 15. Gennaio 1590. che doueua hauere tutti i denari, torarai indietro 27. mesi, e 25. giorni, resterà adi 20. Settembre 1587. & in questo dì, si farà debitore del resto.

Poteuasi ancora recare a vn dì solamente il deuē hauere, e non in quel che ha hauuto, ma per non esser tedioso, & ancora perche tal modo d'operare a noi par fastidioso nel dichiararlo, perciò lo lassaremo stare, auuertendo, che quando il deuē hauere fusse dato in vna partita sola, e l'hauere hauuto fusse dato in più partite, & è conuerso, in tal caso reca sempre tutte le partite a vn dì, e ferma la proposta del deuē hauere, e dell'hauer hauuto in due partite sole, dipoi procederai come di sopra habbiamo detto.

Vno ha prestato a vn'altro adi primo di Settembre 1591. duc. 100. per 4. mesi,

P

con

con patto, che in capo a detti 4. mesi il debitore gli rēda poi ogni mese la quarta parte di detti ducati, si domanda se il creditore volesse i detti 100. duc. tutti in un giorno, in che di il debitore gli douerebbe pagare. Tu vedi, che per 4. mesi il Creditore non gli può domandare, però passa auanti 4. mesi dal di che gli li presta, ti trouerai adi primo di Gennaio 1592. & hora dice, che ogni mese gli deuà dare il $\frac{1}{4}$. adunque conuien dir così: Vno deue hauere da vn' altro duc. 25. di qui a un mese, e duc. 25. di qui a 2. mesi; si domanda uolendoli tutti in un di in che di uerranno pagati. Farai così, multiplica ciascuna parte uia i suoi mesi, & i prodotti somma insieme, fanno 250. e questo parti per 100. ducati, ne uien mesi $2\frac{1}{2}$. e così diremo che dopo i 4. mesi li douerà hauere fra mesi $2\frac{1}{2}$. cioè adi 15. di Marzo 1592.

Vno deue hauere da vn' altro l'infrastrate partite di denari, e prima

Lir. 560. adi primo Maggio 1588.	mesi 42.
Lir. 320. adi primo Settembre 1588.	mesi 38.
Lir. 480. adi primo Luglio 1590.	mesi 16.
Lir. 600. adi primo Aprile 1593.	mesi 17.

Vogliono faldar la ragione hoggi che sono adi primo Nouembre 1591. e meritare i detti den. a 10. per cento l'anno semplicemente, si domanda quanto douerà hauere fra merito, e capitale. Fà così, tu uedi, che il creditore deue hauere tre partite di denari ināzi al di del saldo, & una partita sola dopo il di del saldo, però guarda quanti mesi sono dal di di ciascuna partita, per fino al di del saldo, trouarai che dalla prima partita ui sarà 42. mesi, e dalla seconda, ui sarà 38. mesi, e dalla terza ui sarà 16. mesi, e queste tre partite le meritarai semplicemente, o a capo d'anno, come sono i patti per il tempo, che hanno da lato, meritale adunque a 2. den. multiplicando i mesi uia le lire, & il prodotto multiplica uia 2. denari, e tutti tre i prodotti sommati insieme saranno denari, dei quali ne farai lire, faranno lir. 361. 6. 8. e questo sarà il merito delle tre partite, che il creditore doueua hauere auanti al di del saldo, le quali aggiungi alle 4. partite del capitale, faranno in tutto lir. 2321. 6. 8. fatto questo, tu sai, che u'è l'ultima partita, la qual ueniua pagata di 17. mesi dopo al di del saldo, laonde uolendola più presto, che non sono i patti, e cosa conueniente farli lo sconto per tal tempo a 2. den. la lira il mese, merita adunque lir. 600. per 17. mesi, trouarai, che meritaranno lir. 85. le quali trarrai di lir. 2321. 6. 8. restaranno lir. 2236. 6. 8. e tanto il debitore douerà pagare al creditore il di del saldo.

Vno deue hauere da vn' altro duc. 320. di qui a 10. mesi, de' quali n'ha hauuti duc. 240. già son 6. mesi, si domanda in che di uiene il resto. Fà così, tu vedi, che li 240. duc. son resti 16. mesi inanzi, che non erano i patti, perciò che li duc. 320. debbono esser pagati di qui a 10. mesi, e li denari sono stati pagati già 6. mesi, adunque sono stati pagati di 16. mesi inanzi; Laonde guarda 240. ducati quanto guadagnarebbono in 16. mesi a vn denaro la lira il mese, ouero a 5. per cento l'anno, che è il medesimo, trouarai che guadagneranno duc. 16. e però dirai (che quando verrà il tempo del resto, cioè di qui a 10. mesi) che il resto sarà duc. 80. men duc. 16. di modo che bisogna che il debitore, quando si trouarà in capo di 10. mesi, che tenga tanto tempo 80. duc. cioè il resto, che guadagnerà 16. ducati alla medesima ragione come di sopra, opera, trouarai, che li douerà tenere

nere 42. mesi, doppo che faranno passati 10. mesi, e così diremo, che il debitore douerà tenere il resto 52. mesi.

Sono già 10. mesi, che vnò doueua hauere da vn'altro 300. duc. e son già 4. mesi, che n'hebbe 100. duc. domando in che di viene il resto. Tu vedi, che li 100. ducati son resi più tardi del douere 6. mesi, per il che vedi quanto guadagnano a vn denaro la lira il mese, trouarai che guadagnà duc. $2\frac{1}{2}$. Hora vedi 200. duc. di resto quanto tempo penano a guadagnare duc. $2\frac{1}{2}$. alla medesima ragione, trouarai che penano mesi tre, i quali aggiunti a 10. mesi faranno 13. mesi, e così diremo che resti a dare due. 200. già 13. mesi, cioè che gli doueua pagare già 13. mesi sono. Ma volendola far più breue, multiplica 100. ducati resi, via 6. mesi, che gli rende più tardi, fanno 600. e questo parti per 200. ducati di resto, ne viene 3. mesi, e questi li deu tirare indietro de' 10. mesi, faranno 13. mesi.

Vno duec hauere da vn'altro duc. 250. già 10. mesi, hanne hauuti duc. 100. già 18. mesi, domando in che di viene il resto. Tu vedi, che gli rende cento duc. 8. mesi prima che non duec, però multiplica 8. via 100. fa 800. e questo parti per 150. di resto, ne viene mesi $5\frac{1}{3}$. i quali tratti di dieci mesi, restano mesi $4\frac{2}{3}$. e così dirai, che resti hauere 150. ducati, già mesi $4\frac{2}{3}$.

Vno duec hauere da vn'altro duc. 250. già 10. mesi, de' quali n'ha hauuti duc. 100. di qui a 6. mesi, cioè gli faranno pagati di qui a 6. mesi, domando in che di viene il resto. Tu vedi, che gli rende duc. 100. più tardi 16. mesi, i quali multiplicati via 100. fanno 1600. e questi parti per duc. 150. di resto, ne viene mesi $10\frac{2}{3}$. i quali aggiunti a 10. mesi, fanno mesi $20\frac{2}{3}$. e così diremo che resti hauere duc. 150. già mesi $20\frac{2}{3}$. cioè, che già son mesi $20\frac{2}{3}$. che gli doueua hauere.

Vno duec hauere da vn'altro 260. duc. adi primo Settembre 1590. de' quali n'ha hauuti vna parte a di primo Maggio 1591. e restò hauere l'auanzo adi primo Marzo 1590. si domanda quanti denari pagò in quella partita, e di quanto restò debitore. Fa così. Tu vedi, che n'ha hauuti vna parte adi primo di Maggio 1591. la qual doueua hauere a di primo di Settembre 1590. per il che la viene a riecure più tardi 8. mesi, che non doueua, dipoi dice, che restò hauere l'auanzo adi primo Marzo 1590. e lo doueua hauere adi primo Settembre 1590. adunque il resto viene 6. mesi prima, cioè tutti quei mesi, che sono dal di primo Marzo 1590. per fino adi primo Settembre 1590. Hora tu hai, che vna parte è data più tardi 8. mesi, e l'altra parte vien data di 6. mesi inanzi, per la qual cosa ti conuiene fare di duc. 260. due parti, che multiplicata la prima via 8. e l'altra via 6. faccia tanto l'una, quanto l'altra; Farai così, somma 8. e 6. fanno 14. e questo sarà partitore, dipoi multiplica 8. via 260. fanno 2080. che partito per 14. ne viene duc. 148 $\frac{2}{7}$. e tanti ducati restò a dare, e l'auanzo per fino a 260. che v'è 111 $\frac{5}{7}$. e tanti ducati pagò nella prima partita.

Lire 150. in 6. mesi hanno guadagnato lir. 10. più che non hanno fatto lir. 60. in quattro mesi, si domanda a che ragione fu prestata la lira il mese. Ponì che la lira fusse prestata il mese a quanti denari ti piace, hor poni che sia prestata a 2. denari, guarda lir. 60. in 4. mesi quanto guadagnano, trouarai che guadagnano lir. 2. di più alla medesima ragione guarda quanto guadagnano lir. 150. in 6. mesi, trouarai che guadagnano lir. 7 $\frac{1}{2}$. cauane lir. 2. restano lir. 5 $\frac{1}{2}$. più, e noi vogliamo lire 10. perciò dirai così, le lir. 5 $\frac{1}{2}$. più vengono da 2. den. ch'io m'apposi, da che verranno lir. 10. più multiplica lir. 10. via 2. fa 20. e questo parti per 5 $\frac{1}{2}$. ne vien den. 3 $\frac{2}{3}$. & a tanti denari fu prestata la lira il mese.

E dicendo duc.800. in 8.mesi guadagnano duc.20. più che non hanno fatto duc.320. in 6.mesi, si domanda a che ragione sù prestato il cento l'anno, opera come di sopra, trouarai che il cento sù prestato a $8\frac{1}{2}$. l'anno.

Vno presta a vn'altro lir.50. per vn'anno, de' quali ha di guadagno vn ducato, dipoi gli prestò duc.20. per vn'anno, e n'hebbe di guadagno lir. 10. si domanda quante lire valse il ducato. Fa così, poni lir. 50. & 1. ducato che gli presta la prima volta, e sotto a queste poni duc.20. e lir. 10. starà come da lato vedi, dipoi moltiplica in croce, cioè lir. 10. via lir.50. fa 500. e questo parti per la moltiplicatione de' ducati, via li ducati, cioè 1. via 20. fa 20. che partito 500. per 20. ne vien 25. e di questo pigliane la radice quadra, che è 5. e lir. 5. diremo, che valse il ducato. A suo luogo, e tempo dimostreremo che cosa sia radice quadra, e come si tragga di qualsiuoglia numero.

Vno presta a vn'altro duc.60. e lir.60. per vn'anno a 2.denari la lira il mese, & in capo dell'anno il debitore rende al creditore duc.50. e lir. 150. e disse hauerli reso quanto doueua, si domanda quante lire valse il ducato. Fa così, merita duc.60. per vn'anno a 2.den. la lira il mese, trouarai, che meritaranno duc.6. dipoi merita lir.60. per vn'anno a 2.den. la lira il mese, trouarai che meritaranno duc.6. dipoi merita lir.60. per vn'anno a 2.den. la lira il mese, trouarai che meritano lir.6. fatto questo aggiungi 6.duc. a 60. duc. e 6.lire a 60.lire, haueai fra merito, e capitale duc.66. e lir.66. dipoi caua 50. duc. che gli rende di duc.66. che gli doueua dare, restano duc.16. e questi gli resta a dare i quali salua per partire, dipoi caua lir.66. fra merito, e capitale, le quali gli doueua dare, di lire 150. che gli rende, restano lir.84. e questo gli dà in cambio di 16. ducati, perche patti lir.84. per 16. che saluasti, ne viene lir. $5\frac{1}{2}$. e tanto valse il ducato.

Fanne proua, tu vedi che a lire $5\frac{1}{2}$. il ducato, li ducati 60. che gli presta faranno lir.375. aggiungiui ancora lir.60. che gli presta di più, faranno lir. 375. et ante lire gli presta in tutto, dipoi tu vedi che gli rende duc. 50. i quali a lire $5\frac{1}{2}$. il ducato, faranno lir.262 $\frac{1}{2}$. aggiungiui ancora lir. 150. che gli rende, faranno lir 412 $\frac{1}{2}$. e tante lire gli rende in tutto, fra merito, e capitale, e di queste cauane 6. ducati, e 6. lire di merito, che ridotti a lire, sono lir. 37 $\frac{3}{4}$. le quali tratte di lir.412 $\frac{1}{2}$. restano lir.375. che sono vuali a quelle che gli presta.

Vno presta a vn'altro vna quantità di lire per 6. mesi, con patto, che in capo a detto tempo gli renda lir.80. & il debitore per la commodità di certa quantità di denari, che riscosse subito, su d'accordo col creditore di rendergli lir.72. si domanda a che ragione venne prestata la lira il mese. Fa così, guarda quello che il creditore perde in 6.mesi, cioè quanto riceue meno di lir.80. trouarai, che gli rende lir.8. meno, e tanto guadagnaranno lir. 72. in 6. mesi, perche dirai così, se lir.72. guadagnano lir.8. quanto guadagna vna lira? opera, guadagnaua $\frac{1}{9}$. di lira, dipoi dirai, se in 6. mesi guadagnaua $\frac{1}{9}$. quanto guadagnaua in vn mese? opera, guadagnaua $\frac{1}{54}$. di lira, che sono den.4 $\frac{2}{3}$. & a tanti denari venne prestata la lira il mese: Ma più accorta a soluerla per via delle proportioni, dicendo così, se lir.72. in 6. mesi guadagnano den.1920. (facendo prima denari d'8. lire) si domanda vna lira in vn mese quanto guadagna? opera, guadagnerà den.4 $\frac{2}{3}$. come per il primo operare.

7 2 — 6 — 1920 — 1 — 1.

partitori.

Vno

Vno presta a vn'altro lire 60. per 15. mesi a 2. denari per lira il mese semplicemente, e quando sian capo del tempo il creditore rithebbe due. 10. si domanda quante lire valse il ducato. Fa così, guarda quanto guadagna vna lira in 15. mesi, trouarai che guadagnerà sol. 2 $\frac{1}{2}$. aggiungili a 20. cioè al suo capitale: faranno sol. 22 $\frac{1}{2}$. dipoi dirai, se sol. 20. tornano sol. 22 $\frac{1}{2}$. quante torneranno lire. 60? opera torneranno lire. 67 $\frac{1}{2}$. e queste sono vguali a 10. ducati, parti lire. 67 $\frac{1}{2}$. per 10. ne viene 6 $\frac{1}{2}$. e tante lire valse il ducato.

Vno deue hauere da vn'altro lire 60. di qui a 16. mesi, e se glie li vuol dare al presente gli vuol far lo sconto a 2. den. la lira il mese a capo d'anno, si domanda quante glie ne darà. Fa così, merita vna lira a capo d'anno per 16. mesi, tu vedi che in vn'anno guadagna 2. soldi, adunque vna lira in vn'anno tornerà sol. 22. hor per il second'anno dirai così, se sol. 20. guadagnano sol. 2. quanto guadagneranno sol. 22? opera guadagnerà sol. 2 $\frac{1}{2}$. i quali aggiunti a sol. 22. faranno sol. 24 $\frac{1}{2}$. e tanti soldi tornerà meritata vna lira in 2. anni, ma noi voleuamo che si meritasse solo per 16. mesi, adunque h'è meritata per 8. mesi più, che non si doueua, perche bisogna scontare sol. 24 $\frac{1}{2}$. per 8. mesi semplicemente a 2. den. per lira il mese: tu vedi che in 8. mesi vna lira guadagna 16. den. che sono sol. 1 $\frac{1}{2}$. i quali aggiunti a sol. 20. fanno sol. 21 $\frac{1}{2}$. dipoi dirai così, se sol. 21 $\frac{1}{2}$. scotati per 8. mesi tornano sol. 20. quanti torneranno sol. 24 $\frac{1}{2}$? opera, torneranno sol. 22 $\frac{1}{2}$. e tanto tornerà vna lira meritata a capo d'anno per 16. mesi. Volendo hora scontare lire. 60. per detto tempo, dirai così, se sol. 22 $\frac{1}{2}$. (scotati che sono per il sopradetto tempo) tornano sol. 20. quante torneranno lire. 60? opera torneranno lire. 52 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. e tante lire li donerà dare al presente.

Se con altr' ordine d'opere vuoi scontare le sopradette quantità di lire, fa così, tu sai che scontando a 2. den. la lira il mese, si sconta a ragione di 10. per cento l'anno, merita adunque lire. 60. semplicemente per 8. mesi, che mancano a finir 2. anni, trouarai che torneranno lire. 64. e queste scontate per 2. anni a capo d'anno, dicendo, se 10. torna 100. che tornerà 64? opera, tornerà 58 $\frac{1}{2}$. dipoi per il second'anno dirai così, se 100. torna 100. che tornerà 58 $\frac{1}{2}$? opera tornerà 52 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. e tante lire torneranno le lire. 60. scontate per 16. mesi a capo d'anno.

Vno presta a vn'altro lire. 60. per 2. anni, dipoi s'accorda che il debitore gli dia di presente lire. 71 $\frac{1}{2}$. e venghino scontate a capo d'anno, si domanda a che ragione sù scontata la lira il mese. Fa così, poni che sù scontata a 2. denari; vedi quanto torna vna lira meritandola per 2. anni a capo d'anno, opera, secondo che altre volte s'è detto, trouarai che tornerà sol. 34 $\frac{1}{2}$. perche vna lira viene a guadagnare sol. 4 $\frac{1}{2}$. fauo questo, vedi quanto guadagnano lire. 71 $\frac{1}{2}$. in 2. anni: trahi lire. 71 $\frac{1}{2}$. di lire. 90. restano lire. 18 $\frac{1}{2}$. e questo farebbe il guadagno di lire. 71 $\frac{1}{2}$. in 2. anni, vedi hora quanto guadagna vna lira, parti lire. 18 $\frac{1}{2}$. per lire. 71 $\frac{1}{2}$. ne viene sol. 5 $\frac{1}{2}$. e noi voleuamo sol. 4 $\frac{1}{2}$. per la qual cosa dirai così, se soldi 4 $\frac{1}{2}$. vengono da 2. denari, ch'io m'apposi, da che verrà sol. 5 $\frac{1}{2}$? opera verrà da den. 2 $\frac{1}{2}$. & a ragione di tanti den. sù scotata la lira il mese a capo d'anno.

Vno deue hauere da vn'altro di qui a 3. anni lire. 120. & il debitore gli dicde al presente duc. 12. e disse che le sopradette lire erano scontate a 2. den. la lira il mese semplicemente, si domanda quante lire valse il ducato, fa così, vedi prima quanto guadagna vna lira in tutto quel tempo, trouarai che guadagna soldi 6. aggiungili a sol. 20. suo capitale, faranno sol. 26. dipoi dirai così, se sol. 26. vengono da capitale di sol. 20. da che capitale verranno lire. 120? opera, veran-

no da lir. $92\frac{7}{8}$, e queste sono vguali a 12. duc. vedi il ducato valse lir. $7\frac{7}{8}$. Vno deue hauere da vn'altro di qui a 3. anni duc. 20. & il debitore gli diede al presente lir. $92\frac{7}{8}$, e disse al creditore, io ho scontato quella quantita di ducati, che tu mi prestasti a 2. denari la lira il mese semplicemente, & il creditore fu contento, si domanda quante lire valse il ducato. Fa così, vedi quanto merita vna lira semplicemente in tre anni, ti verrà sol. 26. fra merito, e capitale, fatto questo, tu deui vedere quante tornano lir. $92\frac{7}{8}$. meritate per 3. anni semplicemente, dicendo così, se sol. 20. tornano sol. 26. che torneranno lir. $92\frac{7}{8}$? opera torneranno fra merito, e capitale lir. 120. e tante lire valsero 20. ducati, adunque il ducato valse lire 6.

Vno deue hauere da vn'altro lir. 120. di qui a certo tempo, & il creditore disse al debitore, setu mi vuoi pagare al presente, io mi contento, che tu mi dia lir. $92\frac{7}{8}$, e così verrà scontato quel che tu mi doueui dare, a ragione di 2. denari la lira il mese, & il debitore fu contento, si domanda quanto tempo le doueua tenere. Fa così, vedi quanto guadagnano in vn mese lir. $92\frac{7}{8}$. a 2. den. per lira il mese, trouarai, che guadagnano den. $184\frac{7}{8}$. i quali ridotti a lire sono $\frac{1}{8}$. d'vna lira, dipoi trahi lire $92\frac{7}{8}$. di lire 120. restano lir. $27\frac{7}{8}$. per tutto il guadagno che farebbono lir. $92\frac{7}{8}$. in tutto il tempo che le doueua tenere, dipoi dirai così, se $\frac{1}{8}$. d'vna lira vengono guadagnati in vn mese, da che tempo verranno guadagnate lir. $27\frac{7}{8}$? opera, trouarai, che verranno guadagnate in 36. mesi, e tanto tempo le doueua tenere.

Vno deue hauere da vn'altro di qui a 2. anni vna quantita di lire, & il debitore gli diede di presente lir. 320. e disse hauere sconto tal quantita a 2. den. la lira il mese, a capo d'anno, si domanda quante lire gli prestò: Fa così, merita vna lira per 2. anni a capo d'anno, hauera che tornerà fra merito, e capitale lir. $24\frac{7}{8}$, dipoi dirai, se sol. 20. tornano sol. $24\frac{7}{8}$. quante torneranno lir. 320? opera, torneranno lir. $387\frac{7}{8}$. e tante lire dirai, che gli prestò.

Volendo sapere ogni quantita di denari, a tanto per cento l'anno a capo d'anno in quanti anni si raddoppiara tal quantita. Fa così per regola generale. Reçau alla memoria 72. il qual sempre parti per l'interesse di tanto per cento l'anno, e quel che ne verrà, in tanti anni farà raddoppiata tal quantita di denari a capo d'anno, come per effempio, meritando vna quantita di denari a 6. per cento l'anno a capo d'anno, parti 72. per 6. ne viene 12. & in 12. anni tal quantita sarebbe raddoppiata fra merito, e capitale.

Vno ha prestato a vn'altro vna quantita di ducati per 2. anni a den. 2. per lira il mese a capo d'anno, & in capo a detti 2. anni rihebbe fra merito, e capitale duc. 100. si domanda quanti ducati gli prestò. Fa così, poni che gli prestasse duc. 40. meritale per vn'anno a ragione di 10. per cento l'anno, trouarai, che torneranno duc. 44. fra merito, e capitale. Fatto questo dirai così, se duc. 44. fra merito, e capitale vengono da duc. 40. da che capitale verranno duc. 100? multiplica 100. via 40. & il prodotto parti per 44. ne viene $90\frac{3}{4}$. fra merito, e capitale del prim'anno, dipoi dirai così, se 44. vien da 40. da che capitale verrà $90\frac{3}{4}$? multiplica, e parti ne viene $82\frac{1}{4}$. e tanti ducati gli prestò. Fanne proua meritandoli per 2. anni a 10. per cento l'anno a capo d'anno, trouarai, che torneranno duc. 100. appunto.

Vno ha prestato a vn'altro vna quantita di lire, e non sò a che ragione la lira il mese, ma sò bene, che il prim'anno la lira guadagnò tanto, che d'ogni lir. 5. che gli prestò per vn'anno, ne ritrasse tra capitale, e merito lir. 6. & il second'

anno

anno li rese tra capitale, e merito $\text{lit. } 120$. e sù pagato; si domanda quante lire gli prestò a capo d'anno, & a quanto sù prestata la lira il mese: Noi habbiamo che $\text{lit. } 5$. in vn'anno guadagnano vna lira, adunque vna lira in vn mese guadagnerà 4. den. e le dette $\text{lit. } 5$. tra capitale, e merito il prim'anno tornano $\text{lit. } 6$. hor per il second'anno merita $\text{lit. } 6$. a den. 4. per lira il mese, trouarai, che in vn'anno guadagneranno $\text{lit. } 1\frac{1}{2}$. e queste aggiungi a $\text{lit. } 6$. faranno $\text{lit. } 7\frac{1}{2}$. per il second'anno, dipoi diremo cosi, se $\text{lit. } 7\frac{1}{2}$. tra merito, e capitale, son venute da $\text{lit. } 5$. primo nostro capitale, da che capitale verranno $\text{lit. } 120$? cioè il capitale, e merito che pagò in tutto il second'anno, moltiplica 120 . via 5 . fa 600. il qual parti per $7\frac{1}{2}$. ne viene $\text{lit. } 83\frac{1}{3}$. e tante lire gli prestò, & a den. 4. sù prestata la lira il mese, cioè a 10. per cento l'anno. Fanne proua, merita $\text{lit. } 83\frac{1}{3}$. per 2. anni a capo d'anno, a ragione di 20. per cento l'anno, trouarai, che torneranno tra merito, e capitale $\text{lit. } 130$. appunto.

Vno ha prestato a vn'altro vna quantità di lire, e non sò a che ragione la lira il mese, ma ò bene che alla fine del prim'anno, quello che accettò i denari sù debitore tra merito, e capitale di $\text{lit. } 120$. e s'accordò col creditore, che gli ne douesse lassar tenere vn'alt'anno a quella medesima ragione, e così saldorno in capo del second'anno, e trouorno che il merito del prim'anno fu tal parte del merito del secondo, come 5. di 6. si domanda quanti denari gli prestò, & a che ragione sù prestata la lira il mese. Noi habbiamo, che il merito del prim'anno e come 5. a 6. del merito del second'anno, per il che arguiremo che sia la medesima propotione dal capitale del prim'anno al capitale del secondo, e così haueremo quattro quantità proportionali, delle quali ne sono tre note, cioè la prima è 5. la seconda è 6. e la terza è $\text{lit. } 120$. delle quali è debitore il prim'anno tra capitale, e merito: hora ci manca a trouare la quarta quantità che sarà il capitale, laonde per trouarla dirai cosi, se $\text{lit. } 6$. tra capitale, e merito vengono da $\text{lit. } 6$. di capitale, da che capitale verranno $\text{lit. } 120$? moltiplica 120 . via 5 . farà 600. il quale parti per 6. ne vien 100. e tante lire diremo che gli prestò, dipoi se vuoi sapere a quanto sù prestata la lira il mese, dirai cosi, se $\text{lit. } 100$. guadagnano l'anno $\text{lit. } 20$. quanto guadagnerà vna lira in vn mese? opera, trouarai che guadagnerà 4. den. per la qual cosa concluderemo, che la lira sù prestata a 4. denari, e così habbiamo trouato che il merito del prim'anno sù $\text{lit. } 20$. & il merito del second'anno sù $\text{lit. } 24$. ch'è nella proportion medesima, che è 5. a 6.

Vno ha prestato a vn'altro $\text{lit. } 120$. per 6. mesi, e non sò a che ragione la lira il mese, & in capo a detto tempo quello che accettò i denari rese al prestatore le $\text{lit. } 120$. e poi gli disse: Io voglio prestare a te 20. due. per 8. mesi, e così verremo pari dell'interesse, si domanda quante lire valse il ducato, & a che ragione sù prestata la lira il mese. Fà cosi, poni che la lira sia prestata il mese a quanti denari ti piace; Hor poni, che sia prestata a 2. den. tu vedi $\text{lit. } 120$. in 6. mesi guadagnano $\text{lit. } 6$. adunque, quando il debitore rese le $\text{lit. } 120$. restò debitore $\text{lit. } 6$. d'interesse, dipoi poni che 20. ducati vaglino tante lire ti piace, hor poni che vaglino $\text{lit. } 100$. che in 8. mesi guadagnarebbono $\text{lit. } 6$. sol. 13. den. 4. e noi voluemo $\text{lit. } 6$. Laonde dirai cosi, se $\text{lit. } 100$. ni danno di guadagno $\text{lit. } 6\frac{2}{3}$. quante lire vorranno esser quelle che ni guadagnino $\text{lit. } 6$? opera, moltiplica 100 . via 6. & il primo prodotto parti per $6\frac{2}{3}$. ne viene $\text{lit. } 90$. per la valuta di 20. due. adunque il ducato valse $\text{lit. } 4\frac{1}{2}$. & a 2. denari sù prestata la lira il mese. Saprai, che se poniamo che la lira fusse prestata a 3. ouero 4. den. il mese in

ogni modo veniua che il ducato ualesse $\text{lit. } 4\frac{1}{2}$. di maniera che il domandare a che ragione si prestata la lira il mese, è cosa vana in questa proposta, poichè ponendo diuerso guadagno a vna lira vien sempre la medesima valuta del ducato.

Vno ha prestato a vn'altro per 2. anni a capo d'anno $\text{lit. } 200$. & il debitore in capo a 2. anni gli rese tra capitale, e merito $\text{lit. } 264\frac{1}{2}$. domando a che ragione si prestata la lira il mese. Fà così, toglì vna lira di quelle che gli presta, e se fussero ducati torrestì vn ducato, il qual sarà sempre 20. soldi a oro, e così vna lira è 20. soldi, multiplica il detto 20. in se medesimo fa 400. e questo multiplica via $\text{lit. } 264\frac{1}{2}$. che gli rende, fa 105800. e questo parti per 200. lire che gli presta, ne viene 529. e di questo piglia la radice quadra, che è 23. del quale abbatte 20. che multiplicasti resta 3. & a 3. denari dirai che fu prestata la lira il mese.

Vno ha prestato a vn'altro duc. 60. per 2. anni in capo d'anno, & in capo di due anni il creditore rihbbe tra capitale, e merito duc. 93 $\frac{1}{2}$. domando a che ragione si prestata la lira il mese, e quanto guadagnorno duc. 60. il primo anno. Fà così, perche sono 2. anni, però multiplica 20. via 20. fa 400. e questo multiplica via duc. 93 $\frac{1}{2}$. che gli rende, fa 37500. e questo parti per 60. ducati, che gli presta, ne viene 625. e di questo piglia la radice quadra, che è 25. abbatte 20. resta 5. e così dirai che la lira fu prestata a 5. denari il mese. Hor guarda quanto meritano 60. ducati, e così habbiamo risposto alle due domande; Ma quando la proposta fusse data per 3. anni, doueresti multiplicare 20. via 20. fa 400. e questo ancora multiplicaresti via 20. e seguire come di sopra, e poi partire per 60. e dipoi pigliarne la radice cuba, e se fusse data per 4. anni, ne pigliaresti la radice censa dicensa, e se dicesse per 5. anni, ne pigliaresti la radice relata, e così seguiresti d'anno in anno, alle quali radici non attendono i trafficanti del maneggio Mercantescio, e perciò in simil cose non ci estendemo più oltre.

Il Fine del Terzo Libro.

LIBRO

QUARTO.



Rattaremo al presente della diuersità de baratti, i quali sono molti utili ai Mercanti, per ciò che in simili casi, bisogna che siieno con la mente molto destà, poiche loro stessi i baratti li chiamano in bratti. I baratti adunque noi diciamo, che sono di tre specie, la prima si chiama semplice, la seconda composta, e la terza a tempo; semplice è quella che si baratta vna mercantia a vn'altra, o del pari, o con guadagno d'vna di due. Composta è quella, quando vno dà vna mercantia, e che per essa ne riceue vn'altra insieme con denari, e così vnasi dai denari contanti con quella Mercantia quando ella non è di buona qualità. Terza, & vltima specie, è a tempo, & è quando il pagamento de' denari non si fa al presente, ma con intervallo di tempo, e perciò apri l'intelletto, e guarda non esser preso al boccone come i ranocchi, riguardando più alla giunta che si dà in denari contanti, o all'abilità del tempo, che alla mercantia la qual sia poco buona, perche ogni termine di tempo giunge.

Proposizione 1.

† **D**Ve vogliono barattare lana a panno, il cento della lana vale lir. 46. 13. 4. e la canna del panno vale lir. 16. 16. 8. si domanda per 24. canne di panno quante libbre di lana si douerà hauere. Fa così, troua prima quanto varranno 24. canne di panno a lire 6. 16. 8. la canna, trouarai che varranno lir. 1414. e con queste lire bisogna comprare tanta lana, dicendo così; se lir. 46 $\frac{13}{4}$. mi danno libbre cento di lana, quante libbre ne ne daranno lir. 1414? opera, moltiplicando 1414. via cento, & il prodotto partasi per 46 $\frac{13}{4}$. ne verrà libb. 3030. e tante libbre di lana si douerà hauere per 24. canne di panno.

E se si fusse detto per libb. 1800. di lana quante canne di panno si douerebbe hauere; bisognaua valutarle libb. 1800. di lana a lire 46. 13. 4. il cento, la quale a questo prezzo varrebbe lir. 840. dipoi queste lire conuerrebbe cambiarle in tante canne di panno, dicendo così, se con lir. 16 $\frac{16}{8}$. si deuè hauere vna canna di panno, quante canne se ne douerà hauere con lir. 840? opera, trouarai che si douerebbe hauere canne 49. bracc. 31 $\frac{6}{8}$. di panno.

Proposizione 2.

DVe vogliono barattare lana a panno, la canna del panno vale a denari 66. tanti lir. 16. 13. 4. & in baratto ne vuole lir. 18. 10. & il cento della lana vale a denari contanti lir. 45. 12. domando quanto si douerà mettere in baratto, acciò che sia vguale, cioè che nessuno habbia vantaggio. Fa così, se lir. 16 $\frac{1}{2}$. (che vale la canna del panno a contanti) si mettono in baratto lir. 18. 10. quanto si metteranno lir. 45 $\frac{1}{2}$. di contanti? in 45 $\frac{1}{2}$. moltiplica 45 $\frac{1}{2}$. via 18 $\frac{1}{2}$. & il prodotto parti per 16 $\frac{1}{2}$. ne verrà lir. 50. 12. 3. $\frac{1}{2}$. e tanto si douerà mettere il cento della lana in baratto.

Proposizione 3.

DVe barattano lana a panno, il braccio del panno si conta in baratto lir. 15. più che non vale a denari contanti, & il cento della lana vale a denari lir. 45. 10. & in baratto si conta lir. 52. 15. si domanda quanto valse il braccio del panno a denari contanti, e quanto si conto in baratto. Fa così, caua lir. 45. 10. di lir. 52. 15. restano lir. 7. 5. e questo è il guadagno di lir. 45. 10. Hor a tu deu sapere che tanto è a dire lir. 45 $\frac{1}{2}$. guadagnano lir. 7 $\frac{1}{2}$. quanto a dire due. 45 $\frac{1}{2}$. guadagnano duc. 7 $\frac{1}{2}$. perciò che è la medesima proposizione: laonde dirai così, se lir. 7 $\frac{1}{2}$. si guadagno vengono da lir. 45 $\frac{1}{2}$. di capitale, da che capitale verranno $\frac{1}{2}$. d'vna lira? cioè i sopradetti 15. soldi? opera, trouarai, che verranno da capitale di lir. 4. 14. $\frac{1}{2}$. e tanto valse il braccio del panno a contanti, & in baratto si disse, che si conto sol. 15. più, cioè lir. 5. 9. 1. $\frac{1}{2}$. Poteuasi soluere ancora senza recare a parte i sopra detti 15. soldi, e dir così, se 7 $\frac{1}{2}$. viene da 45 $\frac{1}{2}$. da che verrà 15? opera, verrà da lir. 94 $\frac{1}{2}$. ma queste non sono veramente lire, ma sono soldi, però parti per 20. ne viene lir. 4. 14. 1 $\frac{1}{2}$.

Proposizione 4.

DVe vogliono barattare lino a lana, il cento del lino vale a denari lir. 45. & in baratto ne vuole lir. 50. & il cento della lana vale a denari lir. 48. & in baratto ne vuole duc. 8. e fu il baratto vguale, si domanda quante lire valse il ducato. Fa così, guarda quanto si douerà mettere in baratto il cento della lana, dicendo se lir. 45. di contanti, si mette lir. 50. che si metterà in baratto lire 52 $\frac{1}{2}$. e tante lire valsero 8. ducati, parti 52 $\frac{1}{2}$. per 8. ne viene lir. 6 $\frac{1}{2}$. per la valuta d'un ducato.

Proposizione 5.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a denari lir. 15. & in baratto ne vuole lir. 18. & il cento della lana vale a denari vna quantità di lir. & in baratto si conto lir. 2. più che non valse a contanti, e fu il baratto uguale, si domanda quante lire e osto a contanti il cento della lana. Fa così, caua lir.

lir. 15. di lir. 18. restano lir. 3. e questo è quanto si mette più in baratto la canna del panno, che non valse a contanti; per il che dirai così, se 3. lire più vengono da lir. 15. di capitale, da che capitale verranno lir. 8. più che si contò in baratto il cento della lana? opera, ti verrà lir. 40. e tanto valse a contanti il cento della lana, & in baratto si contò lir. 48.

Proposizione 6.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 20. & in baratto si contò lir. 25. & il cento della lana vale a contanti lir. 44. & in baratto si contò lir. 58 $\frac{1}{2}$. si domanda chi barattò meglio, e quanto per cento. Fa così, vedi prima quanto si deve mettere in baratto giustamente il cento della lana, acciò che il baratto sia uguale, dicendo così, se 20. si mette 25. che si metterà 44? opera, si metterà lir. 55. e tanto si douerebbe mettere in baratto il cento della lana, e farebbe il baratto uguale, ma lui dice che lo mette in baratto lir. 58 $\frac{1}{2}$. adunque sopra il baratto giusto, guadagna lir. 3 $\frac{1}{2}$. ma volendo sapere quanto guadagna per cento, bisogna intender da colui, che ti fa la proposta, se vuol sapere quanto si guadagna per cento del baratto, e del contanti, se dice del baratto, farai così, dicendo, se lir. 55. di baratto giusto, guadagnano lir. 3 $\frac{1}{2}$. che guadagnerà 100? opera, trouarai, che guadagnerà 6 $\frac{1}{2}$. per cento di baratto; ma se volesse intender quanto guadagna per cento di contanti, dirai così, se lir. 44. di contanti guadagnano lir. 3 $\frac{1}{2}$. più che non fanno (rata per centone) quelle del panno, quanto guadagneranno lir. 100? opera, guadagneranno lir. 7 $\frac{1}{2}$. e tanto barattò meglio per cento quelle della lana, e veramente il guadagno che si fa per cento, si deve intendere sopra il contanti, e non sopra il baratto, nientedimeno, noi habbiamo dato il modo di trouare chi barattò meglio, e quanto per cento sopra quel che mette in baratto, per sodisfare a qualche persona cauillosa, ouero poco capace di ragione.

Volendo ritrouare per altro modo, e molto facile, & accorto, chi barattò meglio sopra il contanti, farai così, e prima per quel del panno, dirai, se 20. di contanti si mette 25. in baratto, che si metterà 100? opera si metterà 125. adunque quel del panno viene a guadagnare 25. per cento. Hora per quel della lana dirai così, se 44. di contanti si metterà 58 $\frac{1}{2}$. in baratto, che si metterà 100? opera si metterà 132 $\frac{1}{2}$. per il che chiaramente si conosce, che quel della lana guadagna 32 $\frac{1}{2}$. per cento, e quel del panno guadagna 25. per cento, caua 25. di 32 $\frac{1}{2}$. resta 7 $\frac{1}{2}$. e tanto diremo che barattasse meglio per cento quel della lana, il che è conforme alla soluzione fatta di sopra.

Primo auuertimento.

PRima che più oltre si proceda nei baratti è da notare questi auuertimenti, cioè; Quando fussero due Mercanti che barattassero le loro mercantie, e che vn di loro volesse alcuna parte in denari contanti, & il resto in baratto di robbe, sempre deuì pigliare quella tal parte, che vuole in denari di quella quantità di lire, o ducati che esse la mette in baratto, e presta che l'haurà cauala del baratto, & ancora del contanti.

Secondo

Secondo Auuertimento!

Quando vno volesse $\frac{1}{2}$. in denari contanti, & il resto in tante mercantie, come per effempio.

Due barattano lana a panno, la canna del panno vale a cōtanti lir. 17. & in baratto ne vuole lir. 24. e di questo vuole $\frac{1}{2}$. in denari di quello che il suo panno vale in baratto, & il cento della lana vale lir. 40. a contanti, domando quanto si metterà in baratto. Piglia $\frac{1}{2}$. di lir. 24. ne viene lir. 12. e queste cauale del baratto, cioè di 24. restano lir. 12. delle quali vuol pigliare tanta lana, hora le medesime lir. 12. bisogna cauarle dai contanti, cioè di lir. 17. le quali non si possono trarre, per la qual cosa concluderemo, che tal proposta non si possa soluerè.

Terzo auuertimento!

Quando alcuno volesse qualche parte in denari contanti, come la metà, ouero il terzo, o il quarto, o il quinto, e simili, come per effempio.

Propositione 7.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno a contanti vale lire 16. & in baratto si contò alcuna cosa, & il cento della lana vale a denari lir. 48. & in baratto ne vuole lir. 54. e vuol dare la metà in denari contanti a quello del panno, domando quanto si contò in baratto la canna del panno. Fà così, raddoppia il baratto della lana, cioè lir. 54. fanno lir. 108. dipoi aggiungi il baratto della lana, cioè le medesime lir. 54. al suo contanti, che sono lir. 48. faranno lir. 102. dipoi dirai eos, se lir. 102. si mette 108. che si metterà lir. 16. che valse a contanti la canna del panno? opera si metterà lir. $16\frac{2}{3}$. in baratto, di manierache, quando alcuno volesse dare la metà in denari contanti, terrai l'ordine sopradetto, ancorche tanto sia a voler la metà, quanto a dar la metà, ma la differenza, che nasce in questo volere, e voler dare la generano le proposte, come più oltre procedendo vedrai.

Propositione 8.

DVe vogliono barattare lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 16. & in baratto ne vuole lir. 20. e vuol dare altrettanti denari, & il cento della lana vale a denari duc. 9. domando quanto si metterà in baratto, e per libbre 580. di lana quanto panno, e denari si douerà hauere. Noi habbiamo che quel del panno vuol metter 20. quel che vale 16. e vuol dare a ltrecentanti denari, la qual cosa altro non vuol dire, se non che per quanto monterà la lana, esso vuol dare la metà panno, e l'altra metà denari, e perciò volendo dare la metà in denari, raddoppia le lire del baratto del panno, cioè lir. 20. faranno
hrc

lin. 40. dipoi aggiungi le dette lin. 20. al contanti del panno, che sono lin. 10. faranno lin. 36. e così diremo, che di 36. vuol far 40. e perciò dirai così, se di 36. si fa 40. che si douerà far di 92 che tanti ducati vale il cento della lana, trouarai, che di 9. si douerà far 10. e tanti ducati si douerà mettere il cento della lana in baratto. Hor per sapere quanto panno, e denari douerà hauere per libbre 580. di lana, valutarai la detta lana a ducati 10. il cento, trouarai, che varrà di c. 58. e perche quel del panno vuol dare tanti denari, quanto dà ancora in panno; adunque deue dare in denari la metà di quel che monta la lana, cioè di duc. 58. che sono duc. 29. e per a ltri duc. 29. gli deue dar panno. E volendo sapere quanto panno entrerà in duc. 29. farai lin. dei detti duc. 29. a lin. 7. per ducato sono lin. 203. dipoi dirai così, se con lin. 20. si dà vna canna di panno, quanto se ne douerà dare con lin. 203? opera, trouarai, che ti daranno canne $10\frac{3}{4}$ di panno, e così habbiamo trouato, che il cento della lana varrà in baratto duc. 10. e per libbre 580. di lana, si hauerà duc. 29. contanti, e canne $10\frac{3}{4}$ di panno.

Propositione 9.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti lire 16. & in baratto ne vuole lire $16\frac{1}{4}$. e di questo vuole la metà in denari, & il resto in baratto di lana, & il cento della lana vale a contanti lire 48. domando quanto si conterà il baratto. Questa è la proua dell'esempio che habbiamo dato nel terzo auuertimento. Farai adunque così, piglia la metà di quel che vale la canna del panno in baratto, cioè la metà di lire $16\frac{1}{4}$. la quale è lire 8. $\frac{1}{4}$. e queste le cauera di quel che vale la canna del panno in baratto, cioè di lire 16. $\frac{1}{4}$. restano lire 8. $\frac{1}{4}$. dipoi la sepradetta metà del baratto cauata ancora di lire 16. cioè del contanti, restano lire 7. $\frac{1}{4}$. l'atto questo dirai così, se 7. $\frac{1}{4}$. di contanti si mette in baratto 8. $\frac{1}{4}$. che si n'enterà lit. 48. che valse a contanti il cento della lana; opera, si n'enterà in baratto lit. 54. come era di deuere. e così con questa proua habbiamo verificato l'ordine da esser uasi del terzo auuertimento.

Quarto auuertimento.

Sempre che qualcuno voglia dar parte in denari, come nel terzo auuertimento s'è detto, nuouamente diciamo, che volendo dare la metà in denari, si deue raddoppiare la valuta della cosa in baratto, & aggiungerle al capitale, come habbiamo ossosso, u a volendo dare il $\frac{1}{4}$. in denari, s'aggiunge la metà della valuta della cosa in baratto al detto baratto, & al contanti ancora. e volendo dare il quarto, s'aggiunge il $\frac{1}{4}$. e volendo dare il $\frac{1}{2}$. s'aggiunge il $\frac{1}{2}$. e volendo dare il $\frac{3}{4}$. s'aggiunge il $\frac{3}{4}$. e volendo dare li $\frac{1}{2}$. s'aggiunge li $\frac{1}{2}$. come faccendone proua potrai vedere.

Propositione 10.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno a contanti vale lire 16. & in baratto si contò lire 17. e volse la metà in contanti, & il cento della lana

na si contò in baratto lir. 6. più che non valse a contanti, e fù il baratto vguale, domando che valse a contanti il cento della lana. Fà così, piglia la parte che vuole in contanti del suo baratto, cioè piglia la metà di 17. che è $8\frac{1}{2}$; e questo caualo di 17. resta $8\frac{1}{2}$. caualo ancora di 16. resta $7\frac{1}{2}$. hora tu vedi, che le lire $8\frac{1}{2}$. che ti restano sono lir. 1. più che le lire $7\frac{1}{2}$. però dirai così, se lir. 1. più viè da lir. $7\frac{1}{2}$. di contanti, da che verranno lir. 5. più che si contò il cento della lana? opera, verrà da 45. e tante lire valse il cento della lana a contanti.

Proposizione 11.

DVe vogliono barattare lana a panno, la canna del panno a contanti vale lir. 20. & in baratto si contò alcuna cosa, e di questo vuole $\frac{1}{2}$. in denari contanti, & il resto in baratto di lana. & il cento della lana a contanti vale lir. 48. & in baratto ne vuole lir. 56. si domanda la valuta del panno in baratto quanto sarà. Fà così, perche la valuta del panno in baratto non è nota, però ci conuene cominciare il baratto dalla lana, e diremo così, che se quel del panno vuol $\frac{1}{2}$. in denari, adunque quel della lana gli darà $\frac{1}{2}$. in denari, perche tanto vuol dire, vno vuole vna parte in denari, quanto l'altra le vuol dare quella tal parte, nel qual modo di lire, non c'è altra differenza da voler parte, al dar parte in denari, se non che nell'operare bisogna star auuertito; Laonde seruendoci del terzo auuertimento, qual dice, che volendo alcuno dare il $\frac{1}{2}$ in denari, bisogna aggiungere il $\frac{1}{2}$. del baratto all'istesso baratto, perche piglia il $\frac{1}{2}$. di lir. 56. ne viene lir. $56\frac{1}{2}$. quali aggiunte a lir. 56. di baratto, fanno lir. $74\frac{1}{2}$. aggiungi ancora le dette lir. $56\frac{1}{2}$. a lir. 45. di contanti, fanno lir. $65\frac{1}{2}$. dipoi dirai così, se lire $65\frac{1}{2}$. di contanti si mettono in baratto lir. $74\frac{1}{2}$. quanto si metteranno lir. 20. contanti del panno? opera, si metteranno lir. $22\frac{2}{3}$. e tanto si contò la canna del panno in baratto.

Soluila in quest'altro modo, cominciando pur dal baratto della lana, cauale lir. 48. contanti di lir. 56. di baratto, restano lir. 8. perche quel della lana deuè dare il $\frac{1}{2}$. a quel del panno, piglia il $\frac{1}{2}$. d'8. che è 2. e questo aggiungi a 48. di contanti, fanno lir. 50. dipoi dirai così, se lir. 50. di contanti si mettono in baratto lir. 56. che si metteranno lir. 20. di contanti del panno? opera, si metterà lir. $22\frac{2}{3}$. e tanto si contò la canna del panno in baratto.

Proposizione 12.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 16. & in baratto si contò lir. 20. e vuole $\frac{1}{4}$. in denari, & il cento della lana vale a contanti lir. 45. & in baratto si contò 10. duc. si domanda quante lire valse il ducato. Fà così, piglia il $\frac{1}{4}$. di lir. 20. che è lir. 5. cauale di lir. 20. restano lire 15. cauale ancora di lir. 16. di contanti, restano lir. 11. fatto questo dirai così se lir. 11. si mettono in baratto lir. 15. che si metteranno lir. 45? opera, si metteranno lir. $61\frac{1}{2}$. e queste sono vguale a 10. duc. partile adunque per 10. ne viene lir. $6\frac{1}{2}$. e tante lire valse il ducato.

Proposizione 13.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno valse a contanti vna quantita di lire, & in baratto si conto lir. 24. e di questo vuole $\frac{1}{4}$. in denari, & il cento della lana valse a contanti lir. 48. & in baratto si conto lir. 60. den ando quanto valse a contanti la canna del panno. Fa così, piglia il $\frac{1}{4}$. di lir. 24. che è il baratto del panno, ne viene lir. 6. cauale di lir. 24. restano lir. 18. e tanto dirai che mettesse in baratto la canna del panno, trattone la parte, che vuole in denari, dipoi dirai così, se lir. 60. di baratto vengono da lir. 48. di contanti, da che contanti verranno lir. 18. di baratto; opera, verranno o da lir. 14 $\frac{2}{3}$. e tanto fu il contanti d'vna canna di panno, trattone la parte, che domanda in denari, cioè il $\frac{1}{4}$. di 24. che è 6. adunque aggiungi lir. 6. che hebbe in denari sopra lir. 14 $\frac{2}{3}$. faranno lir. 20 $\frac{2}{3}$. e tanto valse la canna in contanti.

Proposizione 14.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 22. & in baratto si conto lir. 22. e vuole il $\frac{1}{4}$. in denari. & il cento della lana vale a contanti lir. 48. & in baratto si conto lir. 60. si domanda chi baratto meglio, e quanto per cento. Barattano o prima vn cento di lana a tanto panno, tu vedi, che libb. 100. di lana in baratto vagliono lir. 60. e la canna del panno vale lir. 24. in baratto; parti 60. per 24. ne viene 2 $\frac{2}{3}$. adunque diremo, che per 100. libb. di lana in baratto, noi haueremo canne 2 $\frac{2}{3}$. di panno, e così nel baratto faranno vguale, e ne sara di loro hauerà vantaggio. Hora tu vedi, che quel del panno, dando a quel della lana canne 2 $\frac{2}{3}$. di panno, gli viene a dare lir. 60. in baratto delle quali disse che voleva il $\frac{1}{4}$. in denari, pero piglia il $\frac{1}{4}$. di lir. 60. che è 15. le quali si deuen trarre di lir. 60. restano lir. 45. in baratto di lana, e queste vengono a esser la valuta di $\frac{1}{4}$. d'vn cento di lana; adunque quel della lana darà a quel del panno lir. 15. contanti per il $\frac{1}{4}$. che domanda in denari, e di più gli darà $\frac{1}{4}$. d'vn cento di lana, che a lir. 48. il cento a contanti, verranno lir. 36. le quali aggiunte a lir. 15. che gli da in denari, fanno lir. 51. e così diremo, che nel baratto sono vguale, perche cia scuno si dera, e dō in baratto robba per lir. 60. ma nel contanti non son del pari, perche quel della lana dà a quel del panno lir. 15. in denari, e lir. 36. in contanti di tanta lana, che in tutto tra denari, e lana sono lir. 51. in contanti, & esse riceue da quel del panno, canne 2 $\frac{2}{3}$. di panno, quali a contanti vagliono lir. 55. a lir. 22. la canna, adunque ne segue che quel della lana baratti meglio, perche per lir. 51. di lana riceue per lir. 55. di panno; e perciò dirai, se con lir. 51. si guadagna lir. 4. quarto si guadagnerà con lir. 100? opera, si guadagnerà 7 $\frac{2}{3}$. e tanto guadagnò per cento quel della lana.

Proposizione 15.

DVe barattano, l'vno ha Cotone, che il cento a contanti vale duc. 9. & in baratto lo mette duc. 12. e vuol dare la metà in denari contanti, e l'altro ha Gengeuo;

Gengeuo; che il cento a contanti vale duc. 15. domando quanto si douerà mettere in baratto, e per lib. 768. di Gengeuo quanto Cotone si haurà. Questa è la duodecima propositione de' baratti, che mette Fra Luca dal Borgo, il quale la solue così, e dice che uolendo dare la metà in contanti si aggiunga la metà del baratto a detto baratto, & al contanti ancora, però piglia la metà di 12. che è 6. aggiunto a 12. si 18. & il medesimo 6. aggiunto a duc. 9. di contanti, fanno duc. 15. dipoi dice se duc. 15. di contanti si mettono in baratto duc. 18. che si metteranno duc. 15. di contanti del gengeuo? opera, trouarai che si metterà duc. 18. e ciascun di loro dice che in tal baratto sarà vguale; la qual solutione è falsa, e perciò noi ci apparecchiamo a dimostrare tal' errore con la seguente proposta, fondata sopra la sua sopradetta. Riualtiamo adunque la ragione, e diciamo

Due barattano, l'vno ha gengeuo, che il cento vale a contanti duc. 15. & in baratto lo mette duc. 18. e di questo vuole la metà in denari contanti. Noi diciamo che vuole la metà in contanti, perche quel del Cotone gli ne vuol dare come di sopra habbiamo detto, e dandoli la metà in denari, bisogna che gli dia la metà di quel tanto, che vagranno libb. 768. di Gengeuo; adunque, se nella prima proposta si disse: che quel del Cotone vuol dare la metà in contanti, hora bisogna dire, che quel del Gengeuo vuole la metà in denari, che tutto torna il medesimo, si che nota bene questi termini; e l'altro ha Cotone, che a contanti il cento vale duc. 9. e perciò vuol sapere quanto si metterà in baratto, & ancora per lib. 768. di Gengeuo quanti ducati, e cotone douerà hauere. Fa così piglia la metà di duc. 18. che è quel che vale in baratto il Gengeuo: la qual metà è 9. il qual tratto di 18. resta 9. & il medesimo 9. che cauasti di 18. caualo ancora di 15. contanti, restano duc. 6. e così ci siamo seruiti del primo auuertimento, qual dice che bisogna cauare la parte che vno vuole in denari de vtroque. Fatto questo dirai così, se 6. di contanti, si mette 9. in baratto, che si metterà duc. 9. di contanti, che è la valuta del cento del Cotone? opera si metterà $12\frac{1}{2}$. e si douerà metter 12. secondo la conclusionne di Fra Luca: per la qual cosa chiaramente si conosce hauerla mal soluta, poiche alla proua non torna. Ma la sua vera solutione è questa, che volendo quel del cotone dare in baratto la metà in denari contanti a quel del Gengeuo, bisogna raddoppiare i denari del baratto, come nel quarto auuertimento s'è detto. Raddoppia duc. 12. fanno duc. 24. dipoi aggiungi d. baratto, cioè duc. 12. a duc. 9. del contanti, fanno duc. 21. e poi dirai così, se 21. si mette 24. che si metterà duc. 15. che vale il cento del gengeuo a contanti? opera, si metterà duc. $17\frac{1}{2}$. e tanto si metterà il cento del Gengeuo in baratto. Fanne proua riualtando la ragione, dicendo.

Due barattano, l'vno ha Gengeuo, che il cento a contanti vale duc. 15. & in baratto ne vuole duc. $17\frac{1}{2}$. e di questo vuole la metà in denari, & il resto in baratto di Cotone, & il cento del Cotone vale a contanti duc. 9. domando quāto si metterà in baratto. Seruiti hora del primo auuertimento, qual dice, che la parte, che vuole in denari, bisogna piglarla del baratto, e quella poi cauare del baratto, e del contanti; Piglia adunque la metà di $17\frac{1}{2}$. che è $8\frac{1}{4}$. il qual tratto di $17\frac{1}{2}$. resta $8\frac{1}{4}$. dipoi quel medesimo $8\frac{1}{4}$. che cauasti del baratto, caualo ancora del contanti, cioè di duc. 15. resta duc. $6\frac{1}{4}$. dipoi dirai così, se $6\frac{1}{4}$. si mette $8\frac{1}{4}$. che si metterà duc. 9. che è il contanti del cotone? opera, si metterà duc. 12. come voleuamo, e così habbiamo dimostrato che la proua torna, per la qual cosa non si può diffendere la solutione di Fra Luca. Resta hora a vedere per libb. 768. di Gengeuo quanto Cotone, e denari si hauerà; già noi habbiamo detto,

detto, che il cento del Gengeuo vale in baratto duc. $17\frac{1}{2}$. vedi adunque alla medesima ragione quanto varranno libb. 268. tronarai, che varranno duc. 131. 13. 2. de' quali ne deue hauere quel del Gengeuo la metà in denari contanti; Laonde pigliane la metà, che è duc. 65. 16. 17. e tanto douerà hauere in denari, che tratti di duc. 131. 13. 2. restano duc. 65. 16. 7. e di queste bisogna pigliarne tanto Cotone a duci. 12. il cento, che tanto si conto in baratto, opera, trouarai, che quel del Gengeuo douerà hauere libb. $548\frac{1}{4}\frac{1}{4}$. di Cotone, e ducati 65. 16. 7. in denari contanti.

Propositione 16.

DVe vogliono barattare pepe a Zuccaro, il cento del pepe vale a contanti duc. 36. & in baratto si conto alcuna cosa, & il cantaro del zuccaro vale a contanti duc. 24. & in baratto ne vuole duc. 32. e vuol dare il $\frac{1}{4}$. in denari, e li $\frac{1}{4}$. in zuccaro, domando quanto si metterà in baratto il cento del pepe, e per libb. 468. di pepe quanti denari, e zuccaro si trouerà hauere. Fa così, troua prima quanto si douerà mettere in baratto il cento del pepe, seruendoti del quarto auuertimento, ouero per più breuità, caua il contanti di quel che vale in baratto, cioè caua duc. 24. di duc. 32. restano duc. 8. e di questi pigliane il $\frac{1}{4}$. ch'è 2. e questi 2. aggiungi a duc. 24. di contanti, faranno duc. 26. dipoi dirai, se 26. si mette 32. che si metterà duc. 36. che è la valuta del pepe a contanti? opera, si metterà duc. $44\frac{1}{4}$. e tanto si contrà il cento del pepe in baratto. Fatto questo troua la valuta di libb. 468. di pepe a duc. $44\frac{1}{4}$. il cento in baratto, trouarai, che varranno duc. 207. 7. 2. $\frac{1}{4}$. e di questi quel del zuccaro dice, che ne vuol dare il $\frac{1}{4}$. in contanti a quello del pepe, per il che pigliane il $\frac{1}{4}$. ne viene duc. 51. 16. 9. $\frac{1}{4}$. ma li $\frac{1}{4}$. di denaro noi li pigliaremo per vn denaro intero, perche non ci può dare alcun errore, caua a dunque duc. 51. 16. 10. che deue hauere quel del pepe in contanti, di duc. 207. 7. 2. restano duc. 155. 10. 4. de' quali il padrone del pepe ne deue riceuere tanto zuccaro a duc. 32. il cantaro, opera dicendo così, se per duc. 32. in baratto mi danno libb. 141. di zuccaro, cioè vn cantaro, quanto me ne daranno duc. 155. 10. 4. opera, trouarai, che ti daranno libb. 734. di zuccaro, pigliando il rotto per intero, e così habbiamo trouato, che per libb. 468. pepe douerà hauere di contanti duc. 51. 16. 10. e libb. 734. di zuccaro.

Propositione 17.

DVe vogliono barattare lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 16. & in baratto si mette lir. 18. e di questo vuole il $\frac{1}{4}$. in denari, & il cento della lana vale a contanti lir. 50. domando quanto si metterà in baratto, acciò che sia vguale, e per canne 40. di panno quanti denari, e lana douerà hauere. Fa così, piglia il $\frac{1}{4}$. di quel che si mette in baratto la canna del panno, cioè di lir. 18. ne viene lir. 6. quali tratte di lir. 18. restano lir. 12. caua ancora le dette lir. 6. del contanti, cioè di lir. 16. restano lir. 10. dipoi dirai, se 10. si mette 12. che si metterà lir. 50? opera, si metterà lir. 60. e tanto si contrà il cento della lana in baratto, e sarà il baratto vguale. Fatto questo, troua quanto vagliono in baratto 40. canne di panno a lir. 18. la canna, trouarai, che var-

ranno

panno lir. 720. delle quali dice, che vuole il $\frac{7}{8}$. in denari; piglia adunque il $\frac{7}{8}$. di 720. ne viene lir. 240. e tante lire deve hauere in contanti, quali tratti di lir. 720. restano lir. 480. delle quali quel del panno deve riceuere tanta lana in baratto a lir. 60. il cento, dicendo così, se per lir. 60. io deuo hauere libb. 100. di lana, quante ne douerò hauere per lir. 480? opera, ne douerò hauere libb. 800. & in denari contanti douerò hauere lir. 240. e così farai le simili.

Propositione 18.

DVe vogliono barattare lana a panno, & vn di loro ha canne 100. di panno, che la canna a contanti vale lir. 20. & in baratto ne vuole lir. 24. e di tutto questo vuole in denari contanti lir. 800. & il resto vuole in tanta lana, e l'altro ha lana, che il cento vale a contanti lir. 50. domando quanto si contará in baratto, e quanta lana douerà dare per le dette 100. canne di panno.

Fà così, vedi prima 100. canne di panno quanto vagliono a contanti, & ancora in baratto, trouarai che a contanti varranno lir. 2000. & in baratto varranno lir. 2400. e di ciascuna di queste due valute cauurai lir. 800. che vuole in denari contanti, trahi adunque lir. 800. di lir. 2000. restano lir. 1200. dipoi trahi lir. 800. di lir. 2400. restano lir. 1600. di modo che si può dire che quel del panno di lir. 1200. vuol fare lir. 1600. che douerà adunque fare quello della lana di lir. 50? che tanto valse a contanti il cento, opera, trouarai, che farà lir. $66\frac{2}{3}$. e tanto si contará in baratto il cento della lana. Hor per vedere quanta lana douerà dare per 100. canne di panno, noi habbiamo che il detto panno vale in baratto lir. 2400. delle quali trattone lir. 800. che vuole in denari, restano lire 1600. per queste lire li deve dar tanta lana, a lir. $66\frac{2}{3}$. il cento, opera dicendo, se lir. $66\frac{2}{3}$. mi danno libb. 100. di lana, quanta me ne daranno lir. 1600? trouarai, che li douerà dare libb. 2400. di lana.

Propositione 19.

DVe barattano lana a panno, il cento della lana vale a contanti lir. 48. & in baratto si mette lir. 72. e la canna del panno a contanti vale lir. 15. & in baratto si mette lir. 20. si domanda chi di questi due meglio barattò, e volendo, che il baratto fusse vguale, qual di loro doueua domandare parte in denari, e che parte. Fà così, dicendo, se di 48. si fà 72. che si farà di 15? opera, si farà $22\frac{1}{2}$. e tanto si doueua contare la canna del panno in baratto, e sarebbe stato uguale, ma dice che si contò lir. 20. adunque il panno baratta peggio, e sempre quello che baratta peggio, deve hauer parte in denari; Hora per sapere che parte deve hauere il panno dalla lana, mette i contanti, & i baratti della lana, e del panno l'vno sotto l'altro come vedi, dipoi multiplica in croce il contanti del panno, via il baratto della lana, cioè 15. via 72. fà 1080. dipoi multiplica il contanti della lana, via il baratto del panno, cioè 48. via 20. fà 960. che tratto di 1080. resta 120. e questo salua, e perche il panno deve hauer la parte in denari, come quel che baratta peggio, perciò vattene alla lana che baratta meglio, e caua il contanti del suo baratto, cioè, caua lir. 48. di lir. 72. resta 24. e questo resto multiplicalo via il baratto di quel che baratta peggio, cioè via 20. che è il baratto

baratto del panno fa 480. e questo sarà partitore di 120. che saluasti, ne viene $\frac{1}{3}$ che schisati sono $\frac{1}{3}$. e così dirai che quel del panno deue hauere $\frac{1}{3}$. in denari contanti, & il resto in baratto di lana, e sarà il baratto vguale.

$$\begin{array}{r} 7 \quad 2 \\ 4 \quad 8 \\ \hline 2 \quad 4 \quad 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \quad 8 \\ 1 \quad 5 \end{array} \times \begin{array}{r} 7 \quad 2 \\ 2 \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad 4 \quad 2 \quad 0 \\ 4 \quad 8 \quad 0 \\ \hline 1 \quad 2 \quad 0 \\ 4 \quad 8 \quad 0 \\ \hline 1 \quad 2 \quad 0 \end{array}$$

Baratto meglio quello della lana, e perciò quel del panno douea domandare il $\frac{1}{3}$ in denari.

FAnne proua, dicendo così. Due barattano, & vn di loro ha panno, che vale a contanti lir. 15. & in baratto ne vuole lir. 20. e di questo vuole $\frac{1}{3}$. in denari, e l'altro ha lana, che il cento a contanti vale lir. 48. domando quanto si metterà in baratto, acciò che sia vguale.

Fà così piglia il $\frac{1}{3}$. di 20 che è 5. cauato di 20. resta 15, & il detto 5. cauato ancora di lir. 15. contanti, restano lir. 10. dipoi dirai se 10. si mette 15. che si metterà 48? trouarai, che si metterà 72. più, o meno, che ne venisse staria male.

Propositione 20.

DVe vogliono barattare, vn di loro ha libb. 80. di seta, che vale a contanti lir. 15. la libbra, & in baratto ne vuole lir. 20. & ha ancora 60. canne di drappi, che vale la canna a contanti lir. 20. & in baratto la mette lir. 30. e così vuol dare di contanti lir. 800. e l'altro ha panno, cioè perpignano, che vale la canna a contanti lir. 16. e Rascia, che vale a contanti lir. 30. la canna, e panno basso, che vale a contanti lir. 8. si domanda quanto si douerà mettere in baratto il Perpignano, la Rascia, & il panno basso, e quello, che ha la seta, vuol tanto Perpignano, che monti lir. 840. e tanta Rascia, che monti lire 3150. & il resto fino alla somma di quello che esso dà a quell'altro vuole tanto panno basso si domanda quanto perpignano, rascia, e panno basso douerà hauere per libbre 80. di seta, e canne 60. di drappi, e lire 800. sopradette.

Fa così, troua quanto vagliono 80. libb. di seta a contanti, a lir. 15. la libbra, trouerai che varranno lir. 1200. dipoi troua quanto varranno a contanti canne 60. di drappi a lire 20. la canna, trouerai che varranno lir. 1200. che sommate con lir. 1200. della seta fanno lir. 2400. dipoi troua quanto varranno in baratto libb. 80. di seta a lire 20. la libbra, trouerai che varranno lir. 1600. dipoi troua quanto varranno in baratto 60. canne di drappi a lir. 30. la canna, trouerai che varranno lir. 1800. che sommate con lir. 1600. di baratto della seta, fanno lire 3400. ma perche si disse che vuol dar di contanti lir. 800. somma adunque lire 800. con lir. 2400. di contanti, e le medesime lir. 800. formale con lir. 3400. di baratto faranno lir. 3200. de' contanti, e lir. 4200. di baratto, e così con que-

sto modo possiamo sapere quanto si metterà in baratto ciascuna mercantia di quell'altro, dicendo così, se lir. 3200. si mettono in baratto lir. 4200. che si metterà lir. 16. che tanto vale da canna del perpignano a cotante opera trouerai che si metterà in baratto lir. 21. la canna del perpignano. Potrai ancora far così, tor via due zeri a 3200. resta 32. e tor via due zeri a 4200. resta 42. e poi dire, se 32. si mette 42. che si metterà 16? opera, si metterà 21. perche togliendo via due zeri da ciascuna quantita, l'altre figure che restano sono nella medesima proportion che prima erano, e così non ti viene a maneggiare numeri si grandi.

Hor per veder quanto si metterà in baratto la rascia, dirai e così, se 32. si mette in baratto 42. che si metterà lir. 39. $\frac{1}{2}$ in baratto, e col medesimo modo, trouerai che il panno basso si metterà in baratto lir. 10. $\frac{1}{2}$. Dipoi per saper quanto perpignano si hauerà per lir. 840. dirai così, se per lir. 21. io ho vna canna di perpignano, quanto n'hauerò con lire 840. trouerai, che si hauerà canne 40. di perpignano, dipoi dirai, se con lit. 39. $\frac{1}{2}$. io ho vna canna di rascia, quante n'haurò con lir. 3150? opera, si haurà canne 80. di rascia, e perche dice che dell'aunzo vuole tanto panno basso, tu vedi che quel della seta, e de' drappi dà a quell'altro tra seta, e drappi in baratto lir. 3400. & in denari contanti li dà lir. 400. che in tutto li viene a dare lir. 4200. & esso per tal conto ne riceue in tanto perpignano lir. 840. & in rascia lir. 3150. che sommate insieme fanno lir. 3990. Laonde, tu vedi che li resta a dare lir. 210. per le quali gli deu dar tanto panno basso a lir. 10. $\frac{1}{2}$. la canna, che tanto vale in baratto, opera li douerà dare 20. canno di panno basso; Fanne proua a denar contanti, e lo vedrai.

Propositione 21.

DVe vogliono barattare, & vn di loro ha cinque pezze di panno, che ciascuna pezza a contanti val duc. 48. e l'altro ha lana, che il cento a contanti vale duc. 10. & in baratto ne vuole duc. 12. & vuole di contanti duc. 80. si domanda quanto douerà mettere in baratto la pezza del panno, e quanta lana si douerà hauere per le sopradette 5. pezze di panno, & 80. ducati contanti.

Fà così, ucdi prima quanto uagliano a contanti 5. pezze di panno, trouarai, che uagliano duc. 240. e perche quel del panno bisogna che dia a quel della lana duc. 80. contanti, somma 80. con 240. fanno duc. 320. e così diremo che quel del panno darà a quel della lana in contanti, tra panno, e denari duc. 320. per la qual cosa bisogna uedere quanto uarranno in baratto, dicendo, se 101. si mette in baratto 12. che si metterà 320? trouarai che si metterà duc. 384. e tanto uarranno in baratto, cinque pezze di panno insieme con 80. ducati. Hora questo del panno bisogna che dia a quel della lana duc. 80. caua adunque duc. 80. di duc. 384. restano duc. 304. per la ualuta di cinque pezze di panno in baratto, che la pezza uiene a ualere duc. 60. $\frac{2}{3}$. in baratto.

Resta a uedere quanta lana si hauerà, e già noi hauiamo detto, che quel del panno consegna a quel della lana in baratto tra denari, e panno duc. 384. e per questi ducati deu riceuere tanta lana. perche dirai così, se per 12. ducati mi darà libb. 100. di lana, quante me ne darà per duc. 384? opera, trouerai che li doueua dare libb. 3200. di lana. Prouala a denari contanti, dicendo se con 10. ducati io ho libbre 100. di lana, quanta n'hauerò con duc. 320. di contanti? trouerai che ti uerrà il medesimo.

Propositione

Proposizione 22.

DVe vogliono barattare, & vn di loro ha 4. balle di pepe, che valse a denari contanti due. 50. la balla, e l'altro ha cera, che il cento vale a contanti due. 25. & in baratto lo mette due. 32. e quel della cera vuole di contanti due. 60. domando quanto si deve mettere in baratto il pepe. Fà così, vedi quanto vagliono 4. balle di pepe a contanti, le quali vagliono due. 200. aggiungi due. 60. che bisogna dar di contanti a quel della cera, fanno due. 260. vedi hora quanto si metteranno in baratto, dicendo, se 25. si mette 32. che si metterà 260 trouarà che si metterà due. 332 $\frac{2}{3}$. che trattone due. 60. che deve dare in contanti, restano due. 272 $\frac{2}{3}$. per la valuta di 4. balle di pepe in baratto, parti 272 $\frac{2}{3}$. per 4. ne viene due. 68 $\frac{2}{3}$. e tanto valse in baratto la balla del pepe.

Proposizione 23.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno a contanti vale lir. 15. & in baratto si contò lir. 20. e di questo vuole il $\frac{1}{2}$. in denari, e li $\frac{1}{2}$. in lana, & il cento della lana vale a contanti lir. 43 $\frac{1}{2}$. & in baratto si contò tanto che quel del panno guadagnò 20. per cento, si domanda quanto si contò il cento della lana in baratto. Fà così, tu sai che altre volte s'è detto, che colui che guadagna 20. per cento, viene a guadagnare $\frac{1}{5}$. del suo capitale; però piglia il $\frac{1}{5}$. di lir. 15. che è il proprio capi ale di quel del panno, ne viene 3. aggiungilo al d. capitale farà 18. e così potremo dire, che quel del panno metta in baratto lir. 20. quel che vale a contanti lir. 18. ma perche dice che vuole il $\frac{1}{2}$. in denari, piglia il $\frac{1}{2}$. di quanto vale a baratto, cioè di lir. 20. che il $\frac{1}{2}$. è 5. caualo di 10. resta 15. caua ancora il detto 5. di 18. resta 13. e così dirai che quel del panno il suo contanti sia 13. cioè quel che val 13. lo vuol metter 15. che si douerà adunque mettere lire 43 $\frac{1}{2}$. che è il contanti della lana? opera, si douerà mettere lir. 50. in baratto il cento della lana.

Fanne proua in questo modo. Poniamo, che quel del panno baratti 10. canne di panno, che a lir. 15. la canna a contanti varràno lir. 150. & in baratto varranno lir. 200. delle quali ne riceue il $\frac{1}{2}$. in denari, cioè lir. 50. & il resto che sono lir. 150. li riceue in lana a ragione di lir. 50. il cento, che così vale in baratto, perciò dirai così, se per lir. 50. mi si peruiene libb. 100. di lana, quanto me se ne peruerà per lir. 150? trouarai, che me ne peruerà libb. 500. di lana, la quale a denari contanti, cioè a lir. 43 $\frac{1}{2}$. il cento, monta lir. 130. e così quel del panno riceue da quello della lana lir. 130. in contanti di lana, e lir. 50. in denari contanti, che in tutto riceue lir. 180. in contanti tra denari, e lana, e quel del panno dà a quello della lana canne 10. di panno, che a contanti vagliono lir. 150. la onde chiaramente si conosce il suo guadagno, e perche tu vedi apertamente, che guadagna 20. per cento, dirai così, se di lir. 150. io fo lir. 180. che farò di lir. 100? opera, farà lir. 120. delle quali trattene lir. 100. restano lir. 20. come voleuamo. Ma forse qualcuno hauendo riguardo alla 13. Proposizione de' baratti, che pone Fra Luca dal Porgo, penserà, che quella nostra sia fiata da noi mal'intesa, la qual sua proposizione dice così.

Due barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 8. & in baratto si contò lir. 9. e vuole il $\frac{1}{2}$. in denari, & il cento della lana vale a contanti lir. 30. & in baratto si contò tanto, che quel del panno guadagnò 5. per cento, domando quanto si mette in baratto il cento della lana. Il detto Fra Luca risolue, che il cento della lana si metterà in baratto lir. 34. alla qual cosa è falsa, e noi trouiamo, che offeruando il modo sopradetto, & ordine nostro, si metterà in baratto lir. 37 $\frac{1}{2}$. della qual differenza, la proua farà testimonianza dell'error suo. Perciò che è cosa manifesta, che se il baratto è giusto, tanto deu'essere quel che si dà, quanto quel che si riceue, & per viuolendo prouare tutt'i baratti di che sorte si sieno, conuenia che tanto fossero i contanti fra robbe, e denari che si dà; quanto il contanti fra robbe, & denari, & di quel che si riceue. E se li contanti dell'vno fusse più delli contanti dell'altro, allora il baratto non sarebbe giusto, perché se quello che tu dai, fusse più di quel che tu riceui, tu restaresti ingannato del baratto, & se quel che tu dai fusse meno di quel che tu riceui, ingannaresti il compagno, & perciò non volendo ingannar altri, non esser ingannato, conuen che sia tanto il contanti, che si dà, quanto il contanti, che si riceue. Ma il sopra letto baratto non può esser uguale, poiche dice, che quel del panno guadagnò a ragione di cinque per cento, adunque venne a riceuere più che non diede, & non può esser uguale. Vediamo hora se è vero, che è sopra il 34. 5. per cento, & prima poniamo che baratti 10. canne di panno, le quali in baratto vagliono lir. 90. adunque quel del panno viene a dare a quel della lana tanto panno per lir. 90. delle quali quel del panno ne vuole il $\frac{1}{2}$. cioè lir. 45. e li $\frac{1}{2}$ cioè lir. 45. le vuole in tanta lana, perché se non lo l'opinione di Fra Luca il cento della lana vale a baratto lir. 34. $\frac{1}{2}$. ne segue che per le lir. 45. l'ouera auere: li 13. 17 $\frac{1}{2}$. di lana, la quale a denari conanti cioè a lire 10. il cento, così fue s'è detto, varrà lir. 52 $\frac{1}{2}$. che aggiunte a lir. 90. che ha di contanti, fanno lir. 142 $\frac{1}{2}$. e tantelire. venne a riceuere in contanti la lana, & denari quel del panno, & offeruando 10. canne di panno a quel della lana, perché s'è detto, che la canna vale a contanti lir. 8. li viene a daro lir. 80. adunque lui dà lir. 80. & riceue lir. 82 $\frac{1}{2}$. che viene a guadagnare a ragione di 2 $\frac{1}{2}$. per cento, e non di sicome si propose, per il che chiaramente si conosce la detta sua soluzione esser falsa. Hor veniamo a prouar la nostra, & poniamo li più nete, che baratti 10. canne di panno, che a baratto vagliono lir. 90. delle quali ne riceue lir. 45. in contanti, cioè è la terza parte delle lir. 90. le riceue in tanta lana a lir. 37 $\frac{1}{2}$. il cento, che tanto habbiamo concluso dover si mettere in baratto, per le quali douera riceuere libb. 180. di lana, le quali a denari conanti cioè a lir. 30. il cento, vagliono lir. 54. le quali somma con lir. 80. che hebbe in denari conanti, fanno lir. 84. adunque quel del panno dà a quel della lana lir. 80. de' conanti in 10. pezze di panno, & esso riceue da quello la lana lir. 84. in contanti tra lana, & denari. Per la qual cosa si conosce che guadagna a ragione di 5. per cento, come si propose, si che manifestamente apparisce l'errore di Fra Luca.

Proposizione 24.

Due barattano lana a panno, il cento della lana vale a contanti lir. 30. & in baratto la mette lir. 40. e guadagna a ragione di 20. per cento, e la canna del

del panno vale a contanti $\text{li}.10\frac{1}{2}$. domando quanto si metterà in baratto. Fa così, tu sai che chi guadagna 20. per cento, guadagna il $\frac{1}{5}$ del suo capitale, però piglia il $\frac{1}{5}$ di $\text{li}.30$. suo capitale, che è $\text{li}.6$. aggiungilo a detto 30. fa 36. e così diremo, che quel che vale 36. lo mette 40. che douerà adunque mettersi $10\frac{1}{2}$ multiplica a $10\frac{1}{2}$. via 40. fa 422. e questo parti per 36. ne viene 12. e $\text{li}.12$. si comò in baratto la canna del panno.

Propositione 25.

DVe barattano, l'vno ha cera, ed l'altro ha pepe, & il cento della cera vale a contanti $\text{duc}.20$. & in baratto ne vuole $\text{duc}.24$. e di questo vuole il $\frac{1}{2}$ in denari, e $\text{li}.4$. in pepe, & il cento del pepe vale a denari $\text{duc}.40$. & in baratto si contò tanto, che quel della cera perse il $\frac{1}{5}$ del suo capitale, domando quanto si comò in baratto il cento del pepe.

Sappi che questa si solve cò ordine còtrario delle due propositioni sopradette, e perche dice che quel della cera perse il $\frac{1}{5}$ del suo capitale, però caua il $\frac{1}{5}$ di quello che la cera vale a contanti, che tu sai, che vale $\text{duc}.20$. che il $\frac{1}{5}$ è 4. il quale tratto di 20. resta 16. e così possiamo dire, che quel che a contanti vale 16. lo vuol mettere in baratto 24. si a perche di questo vuole il $\frac{1}{2}$ in denari contanti, però piglia il $\frac{1}{2}$ di 24. che è 6. caualo del detto baratto, cioè di 24. resta 18. caua ancora al detto 6. del contanti, cioè di $\text{duc}.16$. restano $\text{duc}.10$. fatto questo dirai così, se 10. di contanti, si mette in baratto 18. che si metterà $\text{duc}.40$. che tanto vale a contanti il cento del pepe, opera si metterà $\text{duc}.72$.

Questa sorta detta propositione è simile alla 14. proposta di baratti di Fra Luca, alla quale esso ha data falsa solutione, si come facendo proua della sua, e della nostra chiaramente si potrà conoscere. Hor faccisi la proua della nostra dicendo così.

Due barattano, & vn di loro ha cera, che il cento vale a contanti $\text{duc}.20$. & in baratto la mette $\text{duc}.24$. e di questo vuole il $\frac{1}{2}$ in denari, e l'altro ha pepe, che il cento vale a contanti $\text{duc}.40$. & in baratto ne vuole $\text{duc}.72$. si domanda chi baratta meglio, e quanto per cento, offerua il modo, & ordine della 14. nostra propositione, trouarai che baratta quel del pepe 25. per cento; adunque quel della cera perse a ragione di 20. per cento; perciò che chi guadagna 25. per cento, guadagna $\frac{1}{4}$ del suo capitale, e chi guadagna il $\frac{1}{4}$ del suo capitale, guadagna $\frac{1}{5}$ di quel che si troua, e così, chi perde 20. per cento, perde il $\frac{1}{5}$ del suo capitale, e chi perde il $\frac{1}{5}$ del suo capitale, perde quanto il $\frac{1}{5}$ di quel che si troua, adunque, se vno guadagna il $\frac{1}{4}$ del suo capitale, l'altro perde il $\frac{1}{5}$ del suo capitale, & è còuerso, che questo sia la verità, così si manifesta, e poniamo caso, ch'io guadagni 25. per cento, la qual cosa altro non vuol inferire, se non che s'io ti do 100. tu mi dai 125. laonde tu vieni a scapitare il $\frac{1}{5}$ di 125. che è il tuo capitale, & io guadagno 25. che è il $\frac{1}{5}$ di 100. mio capitale, adunque tu perdi il $\frac{1}{5}$ di quel che ti troui, & io guadagno il $\frac{1}{5}$ di quel ch'io mi trouo, e che sia così, tu vedi che dandonui $\text{duc}.125$. & io dandoti a te $\text{duc}.100$. tu vieni di 25. a far 100. che faresti adunque di 100? multiplica 100. via 100. fa 10000. e questo parti per 125. ne viene 80. per la qual cosa si manifesta, che quel della cera perde 20. per cento.

Ma quando questa proua non ti piace, quale è sicura, e bella, piglia quest'altra, e poni che quel della cera baratti libb. 600. di cera, la quale in baratto

vale duc. 144. a duc. 24. il cento, ma perche dice, che vuole il $\frac{1}{4}$. in denari, però piglia il $\frac{1}{4}$. di 144. che è 36. e duc. 36. riceverà da quel del pepe in contanti, e da duc. 36. fino in duc. 144. che v'è duc. 108. gli douerà dare tanto pepe a duc. 72. il cento in baratto; però dirai, se per duc. 72. io ricetto libbre cento di pepe, quanto ne douerò hauere per duc. 108? opera, douerà hauere libb. 150. di pepe, il quale a denari contanti, cioè duc. 40. il cento vale duc. 60. di modo che quel del pepe dà a quello della cera duc. 36. di contanti, e libb. 150. di pepe, che a contanti vagliono duc. 60. di maniera che in tutto gli viene a dare duc. 96. e quel della cera dà a quel del pepe libb. 500. di cera, che a duc. 20. il cento a contanti vale duc. 120. per la qual cosa si conosce che quel della cera perde, per ciò che per 120. ducati, che dà in tanta cera, ne ricoue 96. tra pepe, e denari, che viene a perdere duc. 24. e così dirai, se duc. 120. io ne perdo 24. quanti ne perderò di 100? opera, ne perderà 20. e tanto perse per cento quel della cera, e così habbiamo prouato in due modi, che quel della cera 20. perde per cento.

Nota, che quando vno perde alcuna parte, o tanto per cento, sempre trahi detta parte del suo capitale: e se guadagna aggiungila sopra il suo capitale, come nelle due proposte sopradette s'è dimostrato.

Proposizione 16.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 8. & in baratto si mette lir. 9. e vuole il $\frac{1}{4}$. denari, & il cento della lana vale a contanti lir. 30. & in baratto si conto tanto, che quel della lana perse 10. per cento, domando quanto si conto in baratto il cento della lana.

Questa è la 16. proposizione de' baratti descritta da Fra Luca del Borgo, & è falsa, poiche lui conclude, che si conterà in baratto lir. 33. laonde la proua sarà quella, che lo condannerà.

Poniamo, che quel del panno voglia barattare 15. canne di panno a tanta lana, le quali a contanti vagliono lir. 120. & in baratto vagliono lir. 135. ma dice che di queste ne vuole $\frac{1}{4}$. in denari, cioè lir. 45. & il resto, che sono lir. 90. le vuole in tanta lana, e perche s'è detto che la lana valse in baratto lir. 33. il cento, noi haueremo adunque per le dette lir. 90. libb. 272 $\frac{1}{4}$. di lana, per il che quel della lana conuien che dia a quel del panno lir. 45. contanti, e libb. 272 $\frac{1}{4}$. di lana, le quali a lir. 30. il cento a contanti varranno lir. 81 $\frac{1}{4}$. che aggiunte a lir. 45. faranno lir. 126 $\frac{1}{4}$. e tante lire darà quel della lana a quel del panno tra denari, e lana; & esso riceverà da quel del panno canne 15. di panno, che vagliono a contanti lir. 120. Per la qual cosa chiaramente si conosce, che egli perde. E volendo vedere quanto perde per cento, dirai così, se di 126 $\frac{1}{4}$. si fa 120. quanto si farà di cento? opera, si farà 94 $\frac{1}{4}$. e doueua far 90. a voler perdere 10. per cento, per il che si conclude la sua solutione esser falsa.

Il vero modo di soluer questa proposta, & ogn'altra simile, è questo, cioè; Noi habbiamo detto negli auuertimenti de' baratti, che chi perde 10. per cento, perde il $\frac{1}{10}$. del suo capitale, e se baratta vna mercantia ad vn'altra, & vno perda il $\frac{1}{10}$. del suo capitale, quell'altro guadagna il $\frac{1}{10}$. del suo capitale, e che questo sia il vero, ecco l'esempio, se noi daremo robbe per cento ducati, e ne riceveremo per 90. ducati la nostra perdita sarà il $\frac{1}{10}$. di cento, cioè 10. & il guadagno di quell'altro sarà il $\frac{1}{10}$. di 9. suo capitale, cioè 10. adunque per questa ragione si conclude, che quel del panno guadagna il $\frac{1}{10}$. del suo capitale, laonde piglia

piglia il $\frac{1}{2}$. del suo contanti, cioè di lir. 8. ne viene $\frac{1}{2}$. che aggiunti al detto contanti farà $8\frac{1}{2}$. e perche dice, che vuole il $\frac{1}{2}$. in denari, piglia il $\frac{1}{2}$. di quel che vale a baratto la canna del panno, cioè di lir. 9. che il $\frac{1}{2}$. è 3. cauato di detto 9. resta 6. caua ancora il detto 3. del contanti, cioè di $8\frac{1}{2}$. resta $5\frac{1}{2}$. e così diremo che quel che vale a contanti $5\frac{1}{2}$. si mette a baratto 6. che si douerà mettere adunque lir. 30. di contanti multiplica 30. via 6. & il prodotto parti per $5\frac{1}{2}$. ne viene $30\frac{2}{5}$. e tante lire si contò in baratto il cento della lana, e non lir. 33. come vuol Fra Luca.

Sentiamo esser chiamati al parragone, ai quali offeriamo la proua pronta, sicuro testimonio della verità. Poniamo che quel del panno baratti 15. canne di panno, le quali a contanti vagliono lir. 120. & in baratto lir. 135. delle quali ne vuole il $\frac{1}{2}$. in denari, cioè lir. 45. restano lir. 90. per barattarsi in tanta lana a lir. $30\frac{1}{2}$. il cento, che così habbiamo concluso douersi contare in baratto, con le quali lir. 90. si hauerà libb. 294 $\frac{1}{2}$. di lana, che a contanti, cioè a lir. 30. il cento varranno lir. 88 $\frac{1}{2}$. le quali aggiunte a lir. 45. di contanti, faranno lir. 133 $\frac{1}{2}$. e tante lire darà in contanti quel della lana a quel del panno tra lana, e denari, & esso riceue lir. 120. in contanti in 15. canne di panno, per il che si conosce manifestamente la sua perdita. Volendo hora sapere quanto perde per cento, dirai così, se di 133 $\frac{1}{2}$. si fa 120. che si farà di 100. opera, trouarai, che si farà 90. appunto, e così habbiamo dimostrato, che perde 10. per cento, come si propone.

Molti altri baratti sono dal detto Fra Luca mal soluti, i quali per breuità si lasciano indietro senza notarli.

Proposizione 27.

DVe barattano la lana a panno; la canna del panno vale a contanti lir. 18. & in baratto la mette lir. 20. e di questo vuole il $\frac{1}{2}$. in denari, & il cento della lana vale a contanti lir. 48. & in baratto la mette tanto, che esso guadagna 20. per cento, domando quanto mette la lana in baratto? Fa così. Tu sai, che chi guadagna 20. per cento, guadagna il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, perche 100. è capitale, e 20. il guadagno, il quale viene a essere il $\frac{1}{5}$. di cento, e se quel della lana guadagna il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, quel del panno perde il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, per le ragioni addotte di sopra, & è conuerso, chi perde il $\frac{1}{5}$. del suo capitale l'altro guadagna il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, per la qual cosa, se quel del panno perde il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, caua la sesta parte del suo contanti, cioè di lir. 18. restano lir. 15. e così diremo, che quel del panno di 15. vuol far 20. ma perche vuole il $\frac{1}{2}$. in denari contanti, caua il $\frac{1}{2}$. di 20. che è 5. di detto 20. resta 15. caua ancora detto 5. di 15. di 15. contanti, resta 10. dipoi dirai così, se di 10. si fa 15. che si farà di 48? che tanto valse la lana a contanti, opera si farà 72. e tante lire si messe il cento della lana in baratto.

Fenne proua in questo modo, baratta 6. canne di panno, le quali a lir. 20. di baratto la canna, varranno lir. 120. e di queste ne vuole il $\frac{1}{2}$. in denari, adunque li verrà lir. 30. che tratte di 120. restano lir. 90. delle quali deue hauere tanta lana a lir. 72. il cento, trouarai che n'hauerà libb. 125. la quale a denari contanti, cioè a lire 48. il cento, verrà lir. 60. adunque quel della lana darà a quel del panno lir. 30. di contanti, e lir. 60. in tanta lana, che in tutto faranno lir. 90. quel panno darà a quel della lana 6. canne di panno, che a denari contanti vagliono lir.

lir. 108. di maniera che esso darà per lire 108. e riccuera per lire 90. tra denari, e lana, laonde vedi, che quel del panno scapita lir. 18. per il che dirai così, se 90. innanzi ch'esso scapitasse era 108. che doueua esser 100? opera, doueua esser 120. de' quali perdendone 20. viene a perdere $\frac{2}{3}$. del suo capitale, il che è quanto gli occorreua dimostrare.

Propositione 28.

DVe barattano piombo a stagno, il cento del piombo vale a contanti lir. 16. & in baratto si contò lire 20. e di questo vuole $\frac{1}{4}$. in denari, & il cento dello stagno vale a contanti alcuna cosa, & in baratto si contò lir. 60. è per se a ragione di 20. per cento, domando quanto valse il cento dello stagno a contanti. Noi habbiamo che quel dello stagno perde 20. per cento, cioè il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, adunque quel del piombo guadagna $\frac{1}{5}$. del suo capitale, & ac cio che meglio s'intenda, poniamo ch'io ti dia vna mercantia, la qual vaglia 100. ducati, e tu ne dia vn'altra a me che vaglia 80. ducati, per la qual cosa è manifesto ch'io perdo 20. ducati, che sono il $\frac{1}{5}$. del mio capitale, e tu guadagni 20. che sono il $\frac{1}{5}$. del tuo capitale, cioè di ducati 80. Hor questo inte so aggiungi il $\frac{1}{4}$. di 16. al detto 16. farà 20. e così diremo che quel del piombo, il contanti che val 20. lo mette 24. ma perche dice volere il $\frac{1}{4}$. in denari, perciò piglia il $\frac{1}{4}$. del baratto cioè di 24. che è 6. e lo trarrà di 24. resterà 18. & il detto 6. cauato ancora del contanti, cioè di 20. resterà 14. e così diremo, se 18. di baratto vien da 14. di contanti, da che verrà 60. di baratto? opera trouerai, che verrà da 46. $\frac{2}{3}$. e tante lire valse il cento dello stagno a contanti.

Fanne proua in questo modo, baratta libb. 800. di piombo a tanto stagno, secondo le conuentioni. Vedi quanto vagliono 800. libbre di piombo in baratto a lire 24. il cento, trouerai che varranno lire 192. e di queste dice che vuole il $\frac{1}{4}$. in denari, cioè lire 48. che tratte da 192. restano lire 144. per le quali deuè hauere tanto stagno per quel che vale a baratto, e dirai così, se per lire 60. io ho libbre 100. di stagno, quanto n'hauerò con lire 144? opera n'hauerà libb. 240. il quale stagno guada quanto vale a contanti, cioè a lire 46. $\frac{2}{3}$. il cento, trouerai che varrà lire 112. & in oltre gli dà lire 48. in denari contanti, di modo che quello dello stagno viene a dare a quel del piombo, tra stagno, e denari, tanto, che a contanti vale lire 160. & esso riccuè da quel del piombo libb. 800. di piombo, che vale a contanti lire 16. il cento, e tutto varrà lire 128. per la qual cosa si conosce manifestamente che quel dello stagno perde, e volendo saper quanto per cento, dirai così, se per lire 160. ch'io dò a quel del piombo, mi rende indietro lire 128. in tanto piombo, che mi renderebbe di lire 100? opera, li renderebbe lire 80. adunque scapiterebbe lir. 20. che sono il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, e così hauia mo dimostrato che quel dello stagno perde 20. per cento.

Propositione 29.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno a contanti vale lire 16. & in baratto la mette lire 24. e di questo vuole $\frac{1}{4}$. in denari, & il cento della lana vale a denari contanti vna quantità di lire, & in baratto si contò lire 48. e trouossi

e trouuossi che quel del panno guadagnò a ragione di 25. per cento ; domando quanto vale a contanti il cento della lana . Perche dice , che quel del panno guadagna 25. per cento , che è il $\frac{1}{4}$. del suo capitale , però aggiungi il $\frac{1}{4}$. di 16. che è 4. al detto 16. farà 20. e così diremo . che quel del panno , quel che val 20. mette 24. ma perche vuole il $\frac{1}{4}$. in denar contanti , però piglia il $\frac{1}{4}$. del baratto , cioè di lire 24. che è 8. il qual tratto di 24. resta 16. e tratto ancora il medesimo 8. del contanti , cioè di 20. resta 12. e così dirai , se 16. di baratto vien da 12. di contanti , da che verrà 48. di baratto ? opera , verrà da 26. e tante lire valse il cento della lana a contanti . Fanne proua barattando vna quantità di canne di panno , o vna quantità di libbre di lana .

Proposizione 30.

DVe barattano , & vn di loro ha ferro , che il cento vale a contanti lire 24. & in baratto si contò lire 30. e l'altro ha panno che il braccio à contanti vale lire 6. & in baratto lo mette lire 9. & ancora ha seta , che la libbra a contanti vale lire 16. & in baratto ne vuole lire 20. & ancora ha seta doppia , che a contanti vale lire 9. la libbra , domando quanto si conterà in baratto , accioche quel del ferro habbia il $\frac{1}{4}$. in panno , $\frac{1}{4}$. in seta , & $\frac{1}{4}$. in seta doppia : Fa così baratta libbre 100. di ferro , che in baratto vale lire 30. delle quali se n'ha a dare $\frac{1}{4}$. in panno , $\frac{1}{4}$. in seta , & $\frac{1}{4}$. in seta doppia , delle quali ne toccherà lire 10. per ciascuna mercantia , dipoi tu sai che il panno vale a contanti lire 6. & in baratto si contò lire 8. però vedi le lire 10. che toccano al panno di baratto quanto s'hanno a contare a contanti , dicendo , se lire 8. di baratto vengono da lire 6. di contanti , da che verranno lire 10. di baratto ? opera , verranno da lire 7. $\frac{1}{2}$. e tanto si conteranno in contanti le lire 10. di baratto del panno ; dipoi darai così , se lire 20. di baratto vengono da lire 16. di contanti , da che verranno lire 10. di baratto della seta ? opera , verranno da lire 8. e tanto si conteranno in denari le lire 10. di baratto della seta . Hora aggiungi insieme lire 7. $\frac{1}{2}$. del panno a lir. 8. della seta , fanno lire 15. $\frac{1}{2}$. in contanti tra il panno , la seta , & a noi conuien trouare , che tra il panno , la seta , e la seta doppia faccino quanto vale il cento del ferro in denar contanti , cioè lire 24. Laonde , noi hauiamo per il panno , e per la seta sottile lire 15. $\frac{1}{2}$. le quali tratte di lire 24. restano lire 8. $\frac{1}{2}$. e tanto vi resta a contare il contanti di lire 10. di baratto della seta doppia , adunque lire 10. di baratto della seta doppia deuè valere a contanti lire 8. $\frac{1}{2}$. e perciò dirai , se lire 8. $\frac{1}{2}$. di contanti vagliono giustamente lir. 10. in baratto , quanto varranno lir. 9. perche tante valse a contanti la libbra della seta doppia ; opera , verranno lir. 10. $\frac{1}{4}$. e tanto si contò in baratto la libbra della seta doppia .

Fanne proua . Tu sai , che per il $\frac{1}{4}$. del panno , e per il $\frac{1}{4}$. della seta sottile , noi habbiamo in contanti lir. 15. $\frac{1}{2}$. e con la seta doppia ne douiamo hauere lir. 24. però dirai , se lir. 10. $\frac{1}{4}$. che si mette la seta doppia in baratto , vengono da lir. 9. di contanti , da che verranno lir. 10. per il $\frac{1}{4}$. che vuole quel del ferro in seta doppia ? multiplica 10. via 9. fa 90. e questo parti per 10. $\frac{1}{4}$. ne viene lir. 8. $\frac{1}{2}$. che aggiunte a lir. 15. $\frac{1}{2}$. fanno lir. 24. di contanti , che tanto vale il cento del ferro .

Proposizione 31.

DVe barattano, & vn di loro ha garofani che il cento vagliono duc. 160. e l'altro ha pepe, che il cento vale duc. 34. e zuchero, che il cento vale duc. 18. e cera che il cento vale duc. 20. e quello de garofani n'ha tanti che vagliono duc. 1000. e vuole delle dette mercantie tante dell'vna, quante dell'altra sorte, domando quante libb. n'hauerà di ciascuna sorte. Fa così, poni che pigli lib. 100. di ciascuna sorte, le quali deuì vedere quanto vagliono, e somma insieme le lor valute, trouerai che varranno in tutto duc. 72. e così diremo che libb. 300. tra pepe, zuchero, e cera, vagliono duc. 72. e noi vorremmo che fussero duc. 1000. Laonde dirai così se 72. fusse 1000. che farebbe 34. per il pepe, 18. per il zuchero, e 20. per la cera? per il che sono le valute del 100. di ciascuna mercantia, opera, trouerai che douerà hauer in pepe duc. $472\frac{2}{3}$. & in zuchero duc. 250. & in cera duc. $277\frac{2}{3}$. Her per vedere quante libbre n'hauerà di ciascuna sorte, dirai così se per duc. 34. io ho libb. 100. di pepe, quante n'hauerò con duc. $472\frac{2}{3}$. e doppo questo dirai così, se con duc. 18. io ho lib. 100. di zuchero quante libbre n'hauerò con duc. 250. e dipoi dirai così, se con duc. 20. io ho lib. 100. di cera quante n'hauerò con duc. $277\frac{2}{3}$? opera, trouerai, che douerà hauer di ciascuna sorte libb. 1388. $\frac{2}{3}$. e così farà le simili.

Proposizione 32.

DVe barattano, & vn di loro ha cannella, che il cento vale duc. 120. e l'altro ha pepe, che il cento vale duc. 20. & in baratto lo mette duc. 14. e zuchero, che il cento vale duc. 18. & in baratto lo mette duc. 10. e lana, che il cento vale duc. 10. & in baratto la mette duc. 12. domando, se qui della cannella, volesse la metà pepe, il $\frac{1}{3}$. zuchero, & il $\frac{1}{4}$. lana, quanto douerebbe mettere il cento della cannella in baratto. Fa così piglia il $\frac{1}{2}$. il $\frac{1}{3}$. il $\frac{1}{4}$. della valuta della cannella, cioè di duc. 120. hauerai per la metà 60. per $\frac{1}{3}$. 40. e per il $\frac{1}{4}$. 30. che somate insieme queste parti fanno 120. e noi volcuamo, che facessero 120. apunto, per ciò che doueremo partire 120. nelle predette parti, e c'è venuto diuiso 120. Laonde dirai così, se 30. fusse 120. che farebbe 60. e che 40. e che 30? opera trouerai che 60. farebbe 55. $\frac{1}{4}$. e 40. farebbe 36. $\frac{1}{3}$. e 30. farebbe 27. $\frac{1}{4}$. e così haueremo, che quella metà proportionata che vuole in pepe varrà a contanti duc. 55. $\frac{1}{4}$. & il terzo proportionato del zuchero varrà a contanti duc. 36. $\frac{1}{3}$. & il quarto proportionato della lana varrà a contanti duc. 27. $\frac{1}{4}$. che sommate insieme queste tre valute fanno ducati 120. che sono vguale alla valuta del cento della cannella. Fatto questo dirai così, se duc. 20. di contanti del pepe, si mette in baratto ducati 24. che si metterà duc. 55. $\frac{1}{4}$? opera, trouerai che si metterà 66. $\frac{1}{4}$. e tanto si conterà in baratto quella metà che vuole in pepe; dipoi per il zuchero dirai così, se 18. si mette 20. che si metterà 36. $\frac{1}{3}$. trouerai che si metterà 41. $\frac{1}{4}$. e tanto si conterà in baratto quella terza parte che vuole il zuchero; dipoi per la lana dirai così, se 10. si mette 12. che si metterà 27. $\frac{1}{4}$? opera trouerai che si metterà 33. $\frac{1}{4}$. e tato si conterà in baratto il quarto che vuole in lana; hor son a insieme tutte queste tre poste faranno duc. 140. $\frac{1}{4}$. & tato si douerà metter in baratto il cento della cannella, e sarà vguale il baratto.

Proposizione

Proposizione 33.

DVe barattario, & un di loro ha panno, e l'altro ha lana, e lino, e la canna del panno vale a contanti lir. 20. & in baratto ne vuole lir. 24. e di questo vuole $\frac{1}{2}$ di lana, e $\frac{1}{4}$ in lino; & il cento della lana vale a denari lir. 48. & in baratto si mette lir. 54. & il cento del lino a contanti lir. 40. domando quanto si metterà in baratto, e per canne 100. di panno quanto a lana, e lino si hauerà. Fà così, somma lir. 48. che vale a contanti la lana, con lir. 40. che vale a contanti il lino, fa no lir. 88. hora dirai così, se quel del panno di lir. 20. che vale a contanti la canna, ne vuol fare lir. 24. che si farà di lir. 88. che è il contanti della lana, e del lino; opera, trouarai, che si farà lir. 105 $\frac{1}{2}$. e tanto si mettesse a baratto tra il cento della lana, & il cento del lino; ma perche s'è detto che il cento della lana si n'esse in baratto lir. 54. però caua lir. 54. di lir. 105 $\frac{1}{2}$. restano lir. 51 $\frac{1}{2}$. etanto viene a esser messo in baratto il cento del lino. Hora per vedere quanta lana, e lino si hauerà, troua quanto vagliono canne 100. di panno in baratto a lir. 24. la canna, trouarai che varranno lir. 1920. delle quali vuole $\frac{1}{2}$ in lana, e $\frac{1}{4}$ in lino, perciò piglia il $\frac{1}{2}$ di lir. 1920. ne viene 480. e dirai così, 100. mi danno libb. 100. di lana, quanta n'ene daranno lir. 480? opera, ti daranno libb. 888 $\frac{1}{2}$. di lana; dipoi dice, che vuole $\frac{1}{4}$ in lino, però piglia $\frac{1}{4}$ di lir. 1920. ne viene lir. 480. e così dirai, se lir. 51 $\frac{1}{2}$. mi danno libb. 100. di lino, quanto me ne daranno lir. 1440. opera, ti daranno libbre 2790 $\frac{1}{2}$ di lino, e così hauerai risoluto la sopradetta domanda.

Proposizione 34.

DVe vogliono barattare seta a drappi, la libbra della seta vale a contanti lir. 16. fol. 4. & in baratto si mette con guadagno di 12. per cento, e la canna de drappi vale a contanti lir. 20. domando quanto si contrà in baratto, acciò che sia uguale. Tu vedi che il contanti della seta si mette in baratto con guadagno di 12. per cento, per la qual cosa si conosce, che di 100. vuol far 112. che si douerà adunque fare di lir. 200. n'ultimica 20. via 12. & il prodotto parti per 100. ne viene lir. 22 $\frac{1}{2}$. e tanto si metterà in baratto, dirai così, se di 100. si fa 112. che si farà di lir. 16 $\frac{1}{2}$? opera, si farà lir. 18 $\frac{1}{2}$. e tanto valse a contanti la libbra della seta, e fu il baratto uguale, tanne proua, e lo vedrai.

Proposizione 35.

DVe barattano lana a panno, il cento della lana vale a contanti lir. 45. & in baratto si contò lir. 50. al termine di 10. mesi, e la canna del panno vale a contanti lir. 20. & in baratto si contò lir. 24. domandasi a che tempo, cioè tra quanti mesi sarà pagato quel del panno. Tu vedi, che quel della lana di lir. 45. in 10. mesi, ne fa lir. 50. adunque lir. 45. in 10. mesi guadagnano lir. 5. e perciò fa di bisogno trouare quanto guadagna la lira il mese, dicendo così, se lir. 45. guadagnano lir. 5. cioè den. 1200. quanto guadagnerà vna lira? opera, attendo

1200.

1200. len. per 45. ne viene den. 26 $\frac{2}{3}$. e questi son guadagnati da vna lira in 10. mesi, parti adique den. 26 $\frac{2}{3}$. per 10. ne viene 2 $\frac{2}{3}$. e tanti den. guadagna la lira il mese, per la qual cosa, le lir. 20. che vale a contanti la canna del panno in vn mese guadagnaranno den. 53 $\frac{2}{3}$. cioè sol. 4 $\frac{2}{3}$. e noi vogliamo sapere in quanto tempo guadagnaranno lir. 4. che è la differenza del contanti del panno al suo baratto, perciò dirai così, se sol. 4 $\frac{2}{3}$. si son guadagnati in vn mese, in quati mesi saranno guadagnati sol. 80. cioè lir. 4. opera, partendo sol. 80. per 4 $\frac{2}{3}$. ne vien 18. e fra tanti mesi si può dire, che sarà pagato quel del panno.

Solui la per quest'altro modo più breue, il qual farà per regola del tre, dicēdo se lir. 5. son guadagnate da lir. 45. da quante lire saranno guadagnate lir. 4? che sono le differenze dei lor contanti, ai lor baratti opera, trouarai che saranno guadagnate da lir. 36. in 10. mesi sopra letti, e noi sapiamo certo, che son guadagnate da lir. 20. però dirai, se 20. fusse 36. che farebbe 10. mesi moltiplica 10. via 36. fa 360. che partito per 20. ne vien 18. e fra tanti mesi sarà pagato quel del panno.

Hor solui la per via delle propositioni in questo modo cioè, poni distesamente per ordine tutte le quantità, dicendo, se lir. 45. in 10. mesi hanno guadagnato lir. 5. domando lir. 20. in quanti mesi guadagnaranno lir. 4? Fa così, poni prima la cosa manifesta, ouer capitale, cioè quella quantità di lire, o scudi, o fiorini, e simili, che a te si nota, che in vn dato tempo habbia guadagnato, o meritato qualche cosa, e chet'al guadagno sia manifesto, che in questa nostra propositione la cosa manifesta, ouer capitale sarà lir. 45. perciò che a noi è noto il guadagno di esse, & il tempo, nel quale fanno detto guadagno, per il che poni prima lir. 45. e dipoi poni il suo tempo, cioè 10. mesi, dipoi quivi appresso poni il guadagno, che si fa in detto tempo, cioè lir. 5. dipoi poni quella quantità di lire, o ducati, che va a meritare, il che sarà vna cosa simile alla manifesta, ouer capitale, cioè simile alla prima quantità, che ponessti, che in questa nostra sarà lir. 20. e dopo questo poni il guadagno di dette lir. 20. cioè lir. 4. ci resta poi a sapere in quanto tempo le dette lir. 20. guadagnaranno lir. 4. alla medesima ragione, che le lir. 45. in 10. mesi hanno guadagnato lir. 5. & auerti d'osservare quest'ordine nel porre le dette quantità, perciò che vna sola, che tu non ponessti al suo luogo, i lineamenti, e dimostrazioni non ti fruirebbono, perciò che alcune volte le proposte saranno irregolari, cioè quel che va posto prima sarà dato doppo, e quel che va posto doppo sarà dato prima, e perciò ti cautamente cerca di farla regolare. Si sempre che la domanda della cosa simile alla manifesta richiede tempo, come fa questa, la qual richiede quanto tempo si douerà fare a quel del panno; dice si che la quantità del mezzo moltiplicata via la penultima quantità produrrà il partitore, il quale saluarai fin tanto che tu habbi moltiplicato la prima quantità via il suo tempo, & il prodotto moltiplicato ancora via l'ultima quantità, e quell'ultimo prodotto lo partirai per quell'ultimo partitore, che saluasti, e quel che te ne verrà sarà il tempo, che la proposta richiede; e perciò moltiplica 5. via 20. fa 100. e questo salua per partitore, dipoi moltiplica via l'ultima quantità, che è lir. 4. fa 180. il qual partirai per 100. che saluasti, ne vien 18. e fra tanti mesi sarà pagato quel del panno. In simili proposte moltiplica, e parti secondo le dimostrazioni, come qui di sotto vedi.

partitori.

4 5 — 10 — 5 — 20 — 4 domanda di tempo
 { ————— }
 Propositione

Propositione 36.

DVe barattano lana a panno, il cento della lana vale a contanti lir.45. & in baratto si contò lir.50. al tern ine di 10. mesi, e la canna del panno vale a contanti lir.20. & in baratto si messe vna quantità, tempo mesi 18.& in baratto si vguale, domando quanto si contò in baratto.

Per non tediarti sopra il trouar prin a qualche guadagna la lira il mese, la solueremo per via delle proportioni, così dicèdo, se lir.45. in 10.mesi si sopramettono lir.5. domando lir.20. in 18.mesi quanto si soprametteranno? procura sempre di mettere ordinaratamente tutte le quantità, come in questa si propone, di poi considera se la proposta den anda di tempo, o di guadagno; cioè in quanto tempo sarà il tal guadagno, o sia quanti mesi sarà pagato &c. e sempre che la ragione domanderà di tempo, oserua il modo della si piadeua proposta; e na se la proposta domanderà meritorio guadagno, si come richiede questa, e serua questo modo dicendo, se lir.45. in mesi 10. hanno guadagnato lir. 20. in 18. mesi, quanto guadagneranno? moltiplica 45. via il suo tempo, cioè 10. mesi, sarà 450. e questo salua per tuo partitore, di poi moltiplica il guadagno di lir.45. cioè lir.5. via quelle lire, che vuoi incinare, le quali sono lir.20. & il prodotto, che è 100. lo moltiplicai via quel tempo che vuoi meritare le dette lir.20. cioè via 18. mesi, che sarà 1800. e questo lo partirai per 450. che saluasti, ne verrà 4. e così diren o, che lir.20. in 18. mesi si soprametteranno lir.4. aggiungi adunque lir.4. a lir.20. faranno lir.24. et tanto ci ai che deuerà incere la canna del panno in baratto. Se la vuoi solucere per regola del tre in due volte, ouero con il trouare quanto guadagna la lira il mese, ti tornerà il medesimo, e questo serue per proua della sopradetta proposta.

45 -- 10 -- 5 -- 20 -- 18. domanda di
partitore. guadagno.

Propositione 37.

DVe barattano Pepe a Cera, il cento della cera vale a contanti vna quantità di ducati, & in baratto si contò duc.6. più che non valse a contanti tempo 12. mesi, & il cento del pepe valse a contanti duc.36.& in baratto si contò duc. 45. tempo 8. mesi, den adò quarto valse il cento della cera a contanti, & anco in baratto. In questa si conosce chiaro che che duc.36. guadagnano duc.9. in 8. mesi, bisogna hora trouare alla medesima ragione in 12. mesi da quanti ducati faranno guadagnarli 6. duc. cioè quel più che fu messo in baratto il cento della cera, e volendoli trouare con breuira, si così, dicèdo se duc.36. in 8.mesi guadagnano duc.9. domando duc.6. in 12.mesi da quanti duc. faranno guadagnari.

Questa è differente a ciascuna delle sopradette due proposte, perciò che si cerca di ritrouare il capitale di 6. ducati, e volendola solucere per regola delle 5. proportioni procura di metter sempre la quantità con l'ordine infraferito, quando la proposta non fusse data ordinata, e sempre la prima quantità, che tu poni, sia che sia la cosa manifesta, ouero primo capitale, cioè duc. 36. e dopo o

di questo poni il suo tempo, cioè 8. mesi, e dopo di questo poni il suo guadagno, cioè duc. 9. e dopo di questo poni quel guadagno del quale tu cerchi il suo capitale, cioè duc. 6. e dopo di questo (che sarà l'ultima quantità) poni il tempo di tal guadagno, cioè mesi 12. Fatto questo, moltiplica la quantità del mezzo, cioè il guadagno della prima quantità, ouero del primo capitale, che è 9. ducati, via l'ultima quantità che è il tempo di quel guadagno, del quale tu cerchi il capitale, cioè mesi 12. moltiplica a tu que 9. via 12. fa 108. e questo salua per tuo partitore, dipoi moltiplica la cosa manifestata, cioè duc. 36. via il suo tempo, che è mesi 8. fa 288. e questo moltiplica via il guadagno, del quale tu cerchi il capitale, che a duc. 6. farà 1728. e questo lo partirai per 108. che saluasti, ne vien 16. e tanti ducati furono il capitale di 6. ducati, adunque il cento della cera, diremo che valesse duc. 16. a contanti, & in baratto duc. 6. più, cioè duc. 22. & il baratto fu uguale.

$$\begin{array}{ccccccc} 3 & 6 & - & 8 & - & 9 & - & 6 & - & 12 & & \text{domanda} \\ & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & & & & \text{di capitale.} \\ & & & & & & & & & & \text{partitore.} \end{array}$$

Fanne proua, così dicendo, se duc. 36. in 8. mesi guadagnano duc. 9. si domanda duc. 16. in 12. mesi quanto guadagneranno, questa è posta in regola, offerua il modo della 36. la qual domanda di guadagno, trouerai che guadagneranno duc. 6. più, o meno staria male.

$$\begin{array}{ccccccc} 3 & 6 & - & 8 & - & 9 & - & 16 & - & 12 & & \text{dimanda di guadagno.} \\ & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & & & & \text{partitore.} \end{array}$$

Proposizione 38.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti vna quantità di lire, & al termine d'un anno si contò in baratto lir. 16. & il cento della lana vale a contanti lir. 40. & in baratto si contò lir. 50. tempo 20. mesi, si domanda che valse a contanti la canna del panno.

Fà cos, troua quel che guadagna la lana con vna lira in vn mese, dicendo, se di lire 40. in 20. mesi si fa lire 50. che si farà di lire 1. moltiplica 1. via 50. fa 50. e questo parti per 40. ne viene $1\frac{1}{4}$. e così diremo che vna lira guadagna $\frac{1}{4}$. di lira in 20. mesi, e noi voleuamo sapere qualche guadagnaua in vn mese, parti adunque $\frac{1}{4}$. di lira per 20. ne viene $\frac{1}{80}$. di lira, e tanto guadagna la lira della lana il mese; hora deu vedere quanto guadagnerà in tutto il tempo di quel del panno, cioè in 12. mesi, moltiplica $\frac{1}{80}$. via 12. mesi, fa $\frac{3}{20}$. e tanto guadagna vna lira in 12. mesi, che aggiunti $\frac{3}{20}$. a vna lira farà lire $1\frac{3}{20}$. e così diremo, se lire $1\frac{3}{20}$. tra guadagno, e capitale, viene da lir. 1. di capitale, da che capitale verranno lir. 16? opera, verranno da capitale di lir. $13\frac{1}{2}$. e tanto valse la canna del panno a contanti, fanne proua riuoltando la proposita.

Propositione 39.

DVe vogliamo barattare lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 12. & in baratto ne vuole lir. 16. al tempo di 6. mesi, e di questo vuole la metà in denari contanti in capo a detti 6. mesi, & il resto in lana, & il cento della lana vale a contanti lir. 40. & in baratto si contò lir. 50. e fu il baratto vguale, domando a quanto fu prestata la lira il mese, meritando semplicemente.

Sappi, che colui, che vuol parte in denari, la sua mercantia è sempre terminata, in que sto modo, cioè, che terminatamente ne vuol dare vna quantità della quale di quel che vale in baratto ne vuole, o il $\frac{1}{2}$. o il $\frac{1}{3}$. in denari &c. e perciò bisogna in questa coninciar da quel del panno, e presupporre, che ne voglia barattare 10. canne, le quali in baratto vagliono lir. 160. e di queste vuole la metà in denari, che sono lir. 80. e queste lir. 80. le deuè hauere di qua 6. mesi, e l'altre lir. 80. le vuole in tanta lana, la quale vale in baratto lir. 50. il cento in baratto, che per le dette lir. 80. ne douerà hauere libb. 160. le quali a denari contanti varranno lir. 64. Resta hora a vedere quanto vagliono a contanti le 10. canne di panno, che a 12. lir. la canna vagliono lir. 120. e tanto douerà dare quel della lana a quel del panno, ma lui non gli dà se non lir. 64. di contanti in libb. 160. di lana, adunque gli resta a dare da lir. 64. per fino a lir. 120. cioè lir. 56. e tanto gli douerebbe dar di resto in denari e tanti, & il baratto sarebbe vguale; Ma noi sappiamo che gli dette lir. 80. in capo di 6. mesi, adunque lir. 56. in 6. mesi tornarebbono lir. 80. di contanti, per il che tu vedi, che lir. 56. in mesi 6. guadagnarebbono lir. 24. di manierache vna lira guadagnarebbe $\frac{2}{3}$ di lira in 6. mesi, & in vn mese guadagnarebbe den. 17 $\frac{1}{3}$. & a tanti denari fu prestata la lira il mese.

Propositione 40.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno si contò in baratto lir. 8. più che non valse a contanti, & hebbe la metà in denari a tempo di 6. mesi, e l'altra metà in panno al presente. & il cento della lana valse a contanti lir. 40. & in baratto si messe lir. 50. e fu prestata la lira il mese a den. 17 $\frac{1}{2}$. si domanda quanto valse a contanti, & anco in baratto la canna del panno. Fa così poni, che quel della lana baratti libb. 100. le quali in baratto vagliono lir. 50. & in capo a 6. mesi bisogna che gli dia ancora lir. 40. contanti, accioche quel del panno habbia la metà denari, e la metà lana. Hora tu hai da inuestigare tutto quello che quel della lana dà a quel del panno di contanti, e prima, tu sai che li dà libb. 100. di lana, la quale a contanti vale lir. 40. e se lir. 50. che li deuè dare in capo di 6. mesi gli li dessè al presente, bisognarebbe farli lo sconto a den. 17 $\frac{1}{2}$. per lira il mese. Sconta adunque lir. 50. per 6. mesi a den. 17 $\frac{1}{2}$. la lira il mese, trouerai che torneranno lir. 35. e tante glie ne douerebbe dare al presente, cioè tante lire farebbono a contanti, le quali aggiunte a lir. 40. di contanti fanno lir. 75. laonde ne segue, che lir. 40. che sono la valuta d'vn cento di lana, e lir. 35. di denari contanti che dessè quel della lana al presente a quel del panno, li darebbe lir. 75. contanti, & in baratto li darebbe vn cento di lana che vale lir. 50.

R

c. lir.

lir. 50. di denari in capo di 6. mesi, che giunte insieme fanno lir. 100. adunque in baratto li darebbe lir. 100. e così diremo che lir. 75. contanti, tornano lir. 100. in baratto, di modo che verrebbe a soprammettere lir. 25. più che non vale a contanti, e perciò diremo così, se lir. 25. d'auanzo son venute da lir. 75. di contanti, da che vennero lir. 4. che si messè più la canna del panno? opera, venne da lir. 12. contanti, e tanto valse a contanti la canna del panno, & in baratto valse lir. 4. più, cioè lir. 16. fanne proua, e verratti benissimo.

Proposizione 41.

DVe vogliono barattare lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 20. & in baratto la mette lir. 24. & il cento della lana vale a contanti lir. 36. & in baratto la mette lir. 45. e dice a quel del panno, io voglio il panno al presente, e darotti la mia lana, e tal parte di denari contanti in capo a vn'anno, che tu verrai a guadagnare 10. per cento, si domanda che parte darà in denari contanti a quel del panno, acciò che guadagni 10. per cento. Fà così, perche quel panno guadagni 10. per cento, poni il $\frac{1}{10}$ di 20. che è il suo capitale sopra il detto 20. farà 2. e così diremo che di 22. farà 24. e quel della lana di 36. fa 45. Hor caua 22. di 24. resta 2. per il qual 2. parti per 24. ne vien 12. e questo salua da parte, hora fa per la lana, e caua 36. di 45. resta 9. per il qual 9. parti 45. ne vien 5. e questo salua, hora di questi due residui che hai saluati, cioè 12. è 5. parti il minore per il maggiore ne viene $\frac{5}{12}$. e così diremo che quel della lana desse a quel del panno $\frac{5}{12}$. in lana, e l'auanzo, cioè $\frac{7}{12}$. in denari contanti in capo dell'anno, e quel del panno guadagnò a ragione di 10. per cento.

Fanne proua, e poni che baratti 10. canne di panno, le quali vagliono in baratto lir. 240. e di questo vuole $\frac{5}{12}$. in denari che sono lir. 140. & il resto che sono lire 100. ne vuol tanta lana che vale lire 45. il cento, che per le dette lir. 100. haueà libb. 222. $\frac{2}{3}$. di lana.

Hora metti ogni cosa a contanti, noi hauiamo che quel della lana deue dare a quel del panno lir. 140. contanti, e lir. 222. $\frac{2}{3}$. di lana, che a lir. 36. il cento a contanti, varrà lir. 80. le quali aggiunte a lir. 140. fanno lir. 220. di contanti, e per queste lir. 120. lui diede 10. canne di panno, che a contanti vagliono lir. 200. & esso ne riceue lir. 220. per il che viene apunto a guadagnare 10. per cento.

Proposizione 42.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 16. & in baratto la mette lir. 20. a termine di mesi 8. e di questo vuole $\frac{1}{4}$. in denari contanti, e l'altro ha lana, che vale a contanti lir. 36. & in baratto la mette lir. 45. a tempo di 12. mesi, domando che parte deue chiedere quel della lana a quel del panno, acciò che il baratto sia vguale. Fà così, perche quel del panno vuole il $\frac{1}{4}$. in den. perciò piglia il $\frac{1}{4}$. di lir. 10. ne vien 5. cauato dal detto 10. resta 5. per il baratto, caua ancora il detto 5. di lir. 16. resta 11. per il contanti, e così diremo, che quel che vale a contanti lir. 11. lo mette lir. 16. di modo che lir. 11. in 8. mesi guadagnano lir. 5. vedi adunque quanto guadagna la lira il mese, trouarai che guadagna den. 13 $\frac{1}{4}$. vedi hora quāto guadagnano lir. 11.

in 12.

in 12. mesi a den. $13\frac{1}{2}$. la lira il mese, trouarai che guadagnano lir. $7\frac{1}{2}$. per la qual cosa diremo, che quel del panno dà 11. faccia $18\frac{1}{2}$. in vn' anno.

Restà da vedere, che parte domandò in denari quel della lana a quel del panno, perche peggio baratta chi di 36. fa 40. che chi d'11. fa $18\frac{1}{2}$ e perciò bisogna che sia ristorato in den. contanti, e volendo saper questo, poni il contanti, & il baratto di quel del panno, e di sotto poni il contanti, & il baratto della lana, come di sotto vedi, dipoi moltiplica i denari contanti dell' vno, via il baratto dell' altro, cioè moltiplica in croce, douerai moltiplicare 36. via $18\frac{1}{2}$. fa 666, dipoi moltiplica 10. via 40. fa 400. che tratto di 666. resta 226. dipoi tu sai, che quel del panno baratta meglio, perciò cauà 11. di contanti di 18. $\frac{1}{2}$. resta $7\frac{1}{2}$. e questo sarà partitore di 226. ne vien $30\frac{1}{2}$. e questi sono i contanti, che hebbe quel della lana, hor parti $30\frac{1}{2}$. per 40. che mette in baratto la lana ne viene 113. e tal parte domandò in denari contanti quel della lana a quel del panno, e su vguale il baratto, & il resto, cioè $1\frac{1}{2}$, hebbe in panno.

$$\begin{array}{r} 666 \\ 7\frac{1}{2}) \quad 440 \quad 0 \\ \hline 226 \end{array}$$

Proposizione 43.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 18. & in baratto la nette lir. 20. ten 106. mesi & il cento della lana vale a contanti lir. 36. & in baratto la canna lir. 48. donando quanto tempo se li deu fare, acciò che il baratto sia vguale. Fa così, solui la per via delle proporcioni, diccdo, se lir. 18. in 6. mesi guadagnano lir. 20. donando in quanto tempo guadagnaranno lir. 12? ricorri alla 35. nostra propositione, la qual den. à da di tpo come questa, trouarai, che si deu moltiplicare 1. via 36. fa 36. e questo salua per partitore, poi multipl. 18. via 6. fa 108. e questo multipl. via 12. fa 1296. qual parti per 72. che saluasti, ne vien 18. e tanti mesi si douerà far tpo a quel della lana,

$$18 \times 6 = 108 \quad 12 \times 36 = 432 \quad \text{domanda di tempo.}$$

Proposizione 44.

DVe barattano lana a panno, la canna del panno vale a contanti lir. 20. & in baratto si mette lir. 24. tempo 12. mesi, e di questo vuole il $\frac{1}{2}$. in contanti, & il resto in baratto di lana; & il cento della lana vale a contanti lir. 48. domando quanto si metterà in baratto tempo 9. mesi; e per canne 80. di panno quanti denari, e lana si haucrà. Fa così, cauà prima il $\frac{1}{2}$. che vuole in denari del suo baratto, cioè il $\frac{1}{2}$. di lir. 24. che è 6. resta 18. per il baratto, cauà ancora il detto 6. di lir. 20. resta 14. per il contanti, e così diren o che lir. 14. in 12. mesi si sopramettono lire 4. resta hora a vedere quanto si soprametteranno lire 48.

della lana in 9. mesi, perche metti in regola la ragione per via delle propo-
 sitioni, dicendo, se lir. 14. in 12. mesi guadagnano lir. 4. domando lir. 48. in 9.
 mesi quanto guadagneranno? ricorri alla 36. nostra propositione, la qual dom-
 anda di guadagno, trouarai, che conuien multiplicare lir. 14. via il suo tēpo, cioè
 in eli 12. f. 168. e questo salua per partitore. dipoi multiplica l'altre tre quantità
 l'vna via l'altra, come di sotto vedi, trouerai che faranno in tutto 1728. e questo
 parti per 168. che saluasti, ne vien 10. $\frac{2}{3}$. e tante lire vengono a guadagno le lir.
 48. in 9. mesi, le quali aggiunte alle dette lir. 48. fanno lir. 58. $\frac{2}{3}$. e tanto diremo
 che si contassè in baratto il ceto della lana. Hora bisogna a veder per 80. canne
 di panno quanti denari e lana si hauerà, vedi adunque quāto vagliono in barat-
 to 80. canne di panno a lire 24. la canna, trouerai che varranno lire 1920. delle
 quali dice che vuole il $\frac{1}{4}$. in denari, e perciò pigliane il $\frac{1}{4}$. che è 480. e tante li-
 re douerà hauere in denari contanti, e dell'auanzo che sono lire 1440. douerà
 hauere tanta lana; Laonde dirai così, se con lir. 58. $\frac{2}{3}$. (che vale il cento in ba-
 ratto) se li conuien dare libb. 100. di lana, quante se glie ne douerà dare con lire
 1440? opera, trouerai che ne douerà hauere libb. 2470. $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$. e così diremo, che
 quel del panno per 80. canne di panno, douerà hauere lire 480. in contanti, e
 libbre 2470. $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{3}$. di lana.

14--12 — 4--4 8--9.

P Arrà forse ad alcuni, che hauendo noi soluto molte propositioni, per regola
 del cinque; o vogliamo dir delle proportioni, nel le quali nō è interuenuto
 rotti, e che interuenendouene sia forse qualche grande intrigo, e perciò non
 formeremo la presente, doue interueranno rotti, dalla quale potranno com-
 prendere tutte l'altre, e così conosceranno che non è quel gran laberinto, che
 molti pensano, anzi scopriranno la gran sicurtà, e commodità che n'apporta;
 purchè l'operante sia instrutto nelle ragioni de' rotti.

Propositione 45.

D Ve voglion barattare seta a panno, la libbra della seta vale a denari lir. 15.
 fol. 12. & in baratto ne vuole lir. 18. fol. 16. tempo mesi otto, e giorni 12.
 e di questo vuole il $\frac{1}{4}$. in denari, e la canna del panno vale a contanti lir. 20.
 fol. 15. domando quanto si metterà in baratto, tempo mesi 12. e giorni 20.

Perche quel della seta vuole il $\frac{1}{4}$. in denari, piglia il $\frac{1}{4}$. di lir. 18. 16. ne vien
 lir. 4. 14. e questo caua del baratto, e del contanti, resta lir. 14. fol. 2. per il
 baratto, e per li contanti resta lir. 10. fol. 18. e così diremo che quel della seta di
 lir. 10. 18. in capo di mesi 8. e giorni 12. faccia lire 14. 2. doue tu vedi che vien
 a guadagnare lir. 3. 4. hora per via delle proportioni, o vogliamo dire per re-
 gola del cinque, dirai così, se lire 10. fol. 18. in mesi 8. e giorni 12. guadagna-
 no lir. 3. 4. domando lir. 20. 15. (cioè la valuta del panno a contanti) in mesi
 12. e giorni 20. quanto guadagneranno? Ricorri alla 36. nostra propositione la
 quale è simile a questa, & è domanda di guadagno, trouarai, che ti conuerà
 multiplicare la cosa manifesta, cioè lir. 10. 18. via il suo tempo, che sono mesi
 8. e giorni 12. & il prodotto sarà tuo partitore, qual saluerai, dipoi multiplica
 l'altre tre quantità l'vna via l'altra, e l'ultimo prodotto lo partirai per quel par-
 titore che saluasti, e quel che te ne verrà sarà il guadagno, che faranno le lire
 20. 15. in mesi 12. e giorni 20.

Ma

Ma per venir più presto alla cōclusione, reca i soldi in parte di lira, & i giorni in parte di mese, fatto questo ridurrà i sani a rotti, cioè di quella qualità, e natura di rotti, che i detti sani sono accompagnati, come qui di sotto vedi, dipoi moltiplica quei rotti l'vno via l'altro, secondo che la ragione richiede, e che le dimostrazioni ti significano.

Noi voleuamo terminar qui la dichiarazione della presente proposta, ma forse qualcuno direbbe che noi l'hauessimo passata troppo seccamente, ancorche dagl'intendenti sarà tal'hora biasimato questo nostro lungo dire, nulladimeno per intelligenza di chi non sà, c'è parso a proposito d'aggiunger questo codicillo, e perciò noua mēte diciamo che per la prima quantità noi haueremo $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5}$. e per la seconda $\frac{2}{3}$. e per la terza $\frac{1}{2} \frac{2}{3}$. per la quarta $\frac{1}{2} \frac{2}{3}$. e per la quinta, & vltima $\frac{1}{2} \frac{2}{3}$. hora moltiplica $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5}$. via $\frac{2}{3}$. fanno $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{2}{3}$. e questo saluarai per partitore senza ridurlo a sani, dipoi moltiplica $\frac{1}{2} \frac{2}{3}$. via $\frac{1}{2} \frac{2}{3}$. & il prodotto via $\frac{1}{2} \frac{2}{3}$. trouarai che faranno $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{2}{3} \frac{1}{2} \frac{2}{3}$. senza ridurli a sani, e questo partirai per $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{2}{3}$. che saluarai, e se tu vuoi schiarire le parti, cioè questi rotti, e poi partire sà in tuo arbitrio: parti adunque come s'è detto secondo l'ordine de' rotti, trouarai, che ne verrà lir. 9. sol. 3. d. en. 8. $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{2}{3}$. e tanto diremo, che le lir. 20. 15. guadagnino in 12. mesi, e 20. giorni, le quali aggiunte insieme con lir. 20. sol. 15. faranno lir. 29. 18. 8. $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{2}{3}$. e tanto si metterà la canna del panno in baratto, e questo medesimo ordine potrai offeruare in tutte l'altre simili proposte, doue interuenisse lire, soldi, e denari, a parte di denari, che per non confondere il lettore con più lunga dichiarazione l'habbiamo lassati; ma chi hauerà ingegno, da per se li saprà applicare, e risolvere, offeruando sempre i documenti dati da noi intorno a quelle quantità, che si deuono moltiplicare l'vna via l'altra.

$$10.(\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{2}{3}) \text{ --- } 8.(\frac{2}{3}) \text{ --- } 3.(\frac{1}{2} \frac{2}{3}) \text{ --- } 20.(\frac{1}{2} \frac{2}{3}) \text{ --- } 12.(\frac{2}{3})$$

$\begin{array}{r} \overline{10942} \\ \text{partitore.} \\ \underline{10} \end{array}$	$\begin{array}{r} \overline{1683381} \\ \underline{543} \end{array}$
--	--

per. $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{2}{3}$.

La canna del panno si metterà in baratto lir. 291. 8. 8. $\frac{1}{2} \frac{2}{3} \frac{4}{5} \frac{2}{3}$.

Proposizione 46.

DVe vogliono barattare lino a lana, il cento del lino vale a denari vna quantità di lire, & in baratto ne vuole lir. 48. tempo mesi 14 $\frac{1}{2}$. & il cento della lana vale a denari lir. 52 $\frac{1}{2}$. & in baratto ne vuole lir. 60. tempo 16. mesi, e di questo vuole il $\frac{1}{2}$. in denari, denando quanto valse a cotanti il cento del lino.

Fà così, vedi in a quanto guadagna vna lira in mesi 14 $\frac{1}{2}$. n a perche quel della lana vuole il $\frac{1}{2}$. in denari contanti, piglia prima il $\frac{1}{2}$. di lir. 60. ne viene lir. 15. le quali traua di lir. 6. restano lir. 45. e le dette lir. 15. cana ancora del contanti, cioè di lir. 52 $\frac{1}{2}$. restano lir. 37 $\frac{1}{2}$. e così diremo, che quel della lana di

K 3 lire

lire $37\frac{1}{2}$. in 16. mesi faccia lir. 45. adunque guadagna lir. $7\frac{1}{2}$. perche dirai così
 se lir. $37\frac{1}{2}$. in 15. mesi mi danno di guadagno lir. $7\frac{1}{2}$. domando lir. 1. in mesi 14.
 $\frac{1}{2}$. quanto guadagnerà, opera, trouarai, che guadagnerà sol. $3\frac{1}{2}$. e questi aggiu-
 gi a vna lira, cioè al capital di essi, farà lir. $1\frac{1}{2}$. e così per regola del tre di-
 rai, se lir. $1\frac{1}{2}$. tra guadagno, e capitale viene da contanti di lir. 1. da che co-
 tanti verranno lir. 40? opera, trouarai che verranno da lir. 40. sol. 12. den. $8\frac{1}{2}$.
 di contanti, e tanto valse a denari il cento del lino.

Proposizione 47.

D Ve barattano lana a panno, la canna del panno vale a denari contanti lir. 6.
 & a baratto vale lir. 10. termine 16. mesi, & il cento della lana vale a ba-
 ratto lir. 20. termine mesi 12. e si uguale il baratto, domando che valse il cen-
 to della lana a denari contanti.

Questa è la 25. proposizione de' baratti, che descrive Francesco Pagani da Ba-
 gnacavallo in vna sua opera messa in luce l'anno 1591. la qual proposizione ha
 poco intesa, e manco soluta, perciò che conclude, che il cento della lana valesse
 a denar contanti lir. $12\frac{1}{2}$. la qual cosa è falsa, e prouasi in questo modo, di-
 cendo, se lir. 6. di contanti si mettono in baratto lir. 10. tempo 16. mesi, le lire
 $12\frac{1}{2}$. di contanti quanto si metteranno in baratto tempo 12. mesi? opera, troua-
 rai, che si metteranno in baratto lir. $18\frac{1}{2}$. e si doue uano metter e lir. 20.

Fanne nouua proua, riuoltando la ragione per regola delle cinque proposi-
 zioni, trouarai, che la proua non tornerà. Ma volendo realmente trouare
 quanto vale a contanti il cento della lana, farai così. Troua prima quanto gua-
 dagna vna lira il mese, dicendo, se lir. 6. in 16. mesi guadagnano lir. 4. cioè la
 differenza che è da lir. 6. di contanti a lir. 10. di baratto, quanto guadagnerà vna
 lira? multiplica 1. via 4. fa 4. il qual parti per 6. ne vien $\frac{2}{3}$. d'vna lira in 16. mesi,
 ma noi vorremmo sapere quanto guadagnerà in vn mese, perche parti $\frac{2}{3}$. per
 16. ne viene $\frac{1}{12}$. e tanto guadagna vna lira in vn mese. Vediamo hora quanto
 guadagnerà in 12. mesi, cioè in tutto quel tempo, che fa il padrone della lana a
 quel del panno, multiplica adunque $\frac{1}{12}$. via 12. farà $\frac{1}{2}$. e tanto guadagnerà vna
 lira in vn'anno, aggiungasi $\frac{1}{2}$. a vna lira farà lir. $2\frac{1}{2}$. fra capitale, e guadagno.
 Laonde dirai così, se lir. $2\frac{1}{2}$. di baratto, viene di contanti, da che contanti ver-
 ranno le lir. 20. di baratto? opera, trouarai, che verranno da lir. $13\frac{1}{2}$. e tante
 lire direino che valesse a contanti il cento della lana. Fanne la proua, dicèdo,
 se lir. 6. in 16. mesi guadagnano lire 4. le lir. $13\frac{1}{2}$. in 12. mesi quanto guadagna-
 ranno? opera per regola delle cinque proposizioni, ouero in due volte per rego-
 la del tre, trouarai che guadagneranno lir. $6\frac{1}{2}$. le quali aggiunte a lir. $13\frac{1}{2}$. che
 valse il cento della lana a contanti, faranno lir. 20. apunto; adunque il cento
 della lana concluderemo, che valesse a contanti lir. $13\frac{1}{2}$. e non lir. $12\frac{1}{2}$. co-
 me vuole il Pagani, ergo &c.

Lir. 6. mesi 16. lir. 4. lire $13\frac{1}{2}$. mesi 12.



domanda di
 guadagno.

Proposizione 48.

DVe barattano. & vn di loro ha pezze 16. di panno, che la pezza vale a contanti duc. 50. & in baratto ne vuole duc. 60. & ancora ha libb. 100. di seta, che vale a contanti lir. 18. fol. 4. la libbra, & in baratto ne vuole lir. 22. 8. e vuol dar di contanti lir. 500. e l'altro ha garofani, che la libbra vale a contanti lir. 16. & ha pepe, che vale a contanti duc. 48. il cento, & anco ha cannella, che il cento vale a contanti duc. 54. domando quanto si metterà in baratto i garofani, il pepe, e la cannella. E volendo quel del panno, e della seta tanti garofani, che montino duc. 360. e tanto pepe, che monti duc. 400. e del resto volendo tanta Cannella fino all'ammontare di quel che gli vuol dare; si domanda quanti garofani, pepe, e cannella douerà hauere. Prima conuien vedere quanto vagliono a contanti 16. pezze di panno a duc. 50. la pezza, trouarai, che varranno duc. 800. dipoi vedasi quanto varranno in baratto a duc. 60. la pezza, trouarai, che varranno duc. 960. Fatto questo conuien vedere quanto varranno a contanti, & anco in baratto le 100. libbre di seta, che a lir. 18. 4. di contanti, & a lire 22. 8. di baratto la libbra, trouarai, che a contanti varranno lir. 1820. che sono duc. 260. & in baratto varranno lir. 2240. che sono duc. 320. hora somma insieme qualche monta a contanti il panno, cioè duc. 800. con il contanti della seta, che sono duc. 260. faranno duc. 1060. dipoi somma insieme qualche monta in baratto il panno, che sono duc. 960. con il baratto della seta, che sono duc. 320. faranno duc. 1280. e così habbiamo, che quel che vale a contanti duc. 1060. si mette in baratto duc. 1280. Ma perche quel del panno (oltre alle dette robbe) vuol dare duc. 500. sommarai 500. con 1060. faranno duc. 1560. & ancora sommarai 500. con 1280. faranno duc. 1780. hora ci conuien vedere quanto si metterà in baratto la libbra de' Garofani, per il che dirai così, se di duc. 1560. si fa duc. 1780. che si farà di lir. 167. trouarai che di lire 16. si farà lir. 18 $\frac{1}{2}$. e tanto si metterà in baratto la libbra de' Garofani.

Dipoi per sapere quanto si metterà in baratto il pepe, dirai così, se di 1560. si fa 1780. che si farà di duc. 187. che tanto valse il cento del pepe a contanti, trouarai, che di 187. si farà 54 $\frac{1}{2}$. e tanto si metterà in baratto il cento del pepe. Resta hora a sapere quanto si metterà in baratto il cento della cannella, e perciò dirai così, se di 1560. si fa 1780. che si farà di duc. 54. che tanto valse il cento della cannella a contanti, trouarai, che di 54. si farà 61 $\frac{1}{2}$. e tanto si metterà in baratto il cento della cannella. Hor volendo noi sapere quanti garofani, pepe, e cannella douerà hauere quel del panno, noi habbiamo che mette 16. pezze di panno, le quali vagliono in baratto duc. 960. & anco mette libb. 100. di seta, che similmente in baratto vagliono duc. 320. e di più mette in denari contanti duc. 500. che sommati tutt'insieme fanno duc. 1780. e tanti ducati viene a dare in baratto quel del panno tra robbe, e denari, de' quali uol tanti garofani, che montino duc. 360. e pepe che monti 400. che in tutto sono duc. 760. quali tratti di duc. 1780. restano duc. 1020. e per questi ducati douerà hauer tanta cannella.

Hor per veder quanti garofani douerà hauere per duc. 360. dirai così, se lire 18 $\frac{1}{2}$. mi danno libb. 1. di garofani, che tanto vale in baratto, quante libbre me ne douerà dare duc. 360. opera, riducendo i ducati a lire, trouarai che ti daranno libb. 138 $\frac{1}{2}$. di garofani, e per sapere quanto pepe douerà hauere, dirai

così, se duc. $54\frac{1}{2}$. mi danno libb. 100. di pepe, quante libbre me ne daranno duc. 400? opera, trouarai che ti daranno libb. $730\frac{1}{2}$. di pepe. Resta a sapere quanta cannella douerà hauere per duc. 1020. opera come di sopra dicendo, se duc. 61. $\frac{1}{2}$. mi danno libb. 100. di cannella, quante libbre me ne daranno duc. 1020. multiplica, e parti, trouarai che ti daranno libb. $1655\frac{1}{2}$. di cannella, e così habbiamo trouato quanto si metterà in baratto la libbra de' garofani, il cento del pepe, & il cento della cannella, & anco habbiamo risoluto quanti garofani pepe, e cannella douerà hauere quel del pãno per duc. 1780. i quali dà in valuta di baratto tra robbe, e denari a quel de' garofani, e questo vogliamo che basti intorno ai baratti, anzi inbaratti, poiche sono di gran fastidio, e di poco vso.

Del modo a consolar Oro, & Argento.

TVite le miniere, che producono Oro, o Argento, lo producono d'vna medesima bontà, e bellezza, quando sia dipoi perfettamente purgato; è ben vero, che più vna miniera, che vn'altra produce l'oro, ò l'argento più netto di Rame, o stagno, o piombo, ma purgati che sieno questi due metalli, e ridotto l'oro alla finezza di 24. carati, e l'argento a lega di onc. 12. tanto sarà fino, buono, e bello l'oro, o l'argento d'vna miniera, quanto quello d'vn'altra, e per oro fino s'intende quello col quale non sia mescolato alcun'altro metallo, come argento, e Rame, e quando si dice oro di 24. carati s'intende oro purissimo, cioè senza compagnia, e parte alcuna d'altri metalli, perche la maggior nobiltà del Oro è diuisa in 24. parti, che più alto non s'estende, e chiamasi carati. La maggior dignità dell'argento è diuisa in 12. parti, e chiamansi leghe. Nota, che per l'auuenire quando ci occorrerà scriuere carati lo scriueremo con questo carattere così K. per maggior breuità, e quando si dirà, quest'oro è di K. 18. si deu' intendere, che dett'oro sia $\frac{1}{2}$. oro puro, e netto, & il $\frac{1}{2}$. sia Rame, o argento, perche con altri metalli non si allega, ma con l'argento non mette conto allegarlo; e quando si dirà quest'argento è a lega d'onc. 12. si deu' intendere, che sia argento purissimo di copella senza compagnia di Rame, e quando si dirà quest'argento è a lega d'onze 8. si deu' intendere, che in vna libbra di quell'argento vi sia dentro onc. 8. d'argento puro, & il resto per fin in onze 12. cioè vna libbra, che v'è onc. 4. siano onze 4. di Rame, come metallo vile, facile a fondere con i due metalli nobili. & i pesi che si costumano tanto nell'oro, quanto nell'argento son queste cioè, libbra, & oncia, delle quali ne v'è 12. a vna lib. e doppo l'oncia, e ne segue il denaro, ouero danapeso, de' quali ne v'è 24. all'oncia, e doppo il denaro ne segue il grano, cioè tanto quanto pesa vn granel di grano, de' quali ne v'è 24. a vn denaro, e minor peso che vn grano in questi metalli non si costuma, e questo basterà per tua notitia, quanto all'intendere, che cosa sia lega, e carati.

Proposizione 1.

Egli è vn pezzo d'Argento, che pesa libb. 15. onc. 7. den. 16. e gra. 20. & è a lega di onc. 9. den. 16. e gra. 12. domando quanto Argento fino, è quanto Rame

Rame è in detto. Tu vedi che in vna libbra di detto Argento v'è dentro onc.9. den.18. e gra.12.d'argento fino, & il resto per fin in vna libbra è Rame, e perciò la soluerai per regola del tre, dicendo, se in vna libbra di detto argento v'è dentro onc.9. den.18. e gra.12.d'argento fino, quanto ne farà in libb.15. onc.7. den.16. e grani 20. Poiche noi sappiamo quanto argento fino è in vna libbra, ci conuiene saper ancora quanto ne sia in vn'oncia, in vn denaro, & in vn grano; e volendo saper questo, partirai onc.9. den.18. e grani 12. per 12. ne vien den.19. e gra.13. e tanto argento fino si troua in vn'oncia; hor per sapere quanto ne sia in vn denaro, partirai den.19. e gra.13. per 24. ne viene grani $19\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. E tanto argento fino si troua in vn denaro, e volendo sapere quanto ne sia in vn grano, partirai grani $19\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ per 24. ne viene $\frac{5}{8}\frac{1}{2}$. d'vn grano, e tanto argento fino si troua in vn grano. Resta hora a sapere quanto argento fino sia in tutto questo pezzo, e perciò multiplica libb.15. via onc.9. den.18. e gr.12. come al la fine di questa nostra dichiarazione puoi vedere, trouarai che faranno libb.12. onc.2. den.13. e gra.12. e tante argento fino sarà in 15. libb. hor volendo sapere quanto ne sarà in 7. onces, multiplica onc.7. via den.19. e gra.13. faranno onces 5. den.16. e gra.19. e tanto argento fino diremo, che si troui in 7. onces, dipoi volendo sapere quanto ne sarà in 16. denari, multiplica 16. via gra.19. $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. faranno den.13. e gra. $6\frac{3}{4}$. e tanto argento fino sarà in 16. den. dipoi per sapere quanto ne sarà in 20. grani, multiplica 20. via $\frac{5}{8}\frac{1}{2}$. d'vn grano, faranno grani $16\frac{1}{4}\frac{1}{2}$. e tanto argento fino sarà in 20. grani.

Fatto questo, somma insieme tutto l'argento, che hai trouato in tutt'i sopra detti pesi, trouarai che sarà la somma di libb.12. onc.8. den.19. e gra.23. $\frac{1}{4}\frac{1}{2}$. e tanto diremo, che sia l'argento fino, il qual si troua in detto pezzo, & il resto per fino alla principal somma, che si propone sarà Rame, il qual trouarai sottraendo vna quantita dall'altra, resterà libb.2. onces 10. denari 28. e gra.20. $\frac{1}{4}\frac{1}{2}$. e questo sarà il Rame, come meglio potrai comprendere nella sottoscritta dimostratione.

12)	9.	18.	12.	15.	7.	16	20.
24)	0.	19.	13.				
24)	0.	0.	19.	$\frac{1}{2}\frac{1}{4}$.			

0.	0.	$0.\frac{5}{8}\frac{1}{2}$.					
12	2.	13.	12.				
0	5.	16.	19.	libb. 15.	7.	16.	20.
0.	0.	13.	0.	libb. 12.	8.	19.	$23\frac{1}{4}\frac{1}{2}$.
0.	0.	0.	16.	$\frac{1}{4}\frac{1}{2}$.			
				Rame libb.	2.	10.	20.
							$20\frac{1}{4}\frac{1}{2}$.

Argento Libb. 12. 8. 19. $23\frac{1}{4}\frac{1}{2}$.

Proposizione 2.

E Gli è vn pezzo d'Argento orato, che pesa libb.6. onçe 4. den. 16. e grani 8. & è a lega di onçe 8. den. 10. e grani 8. per libbra, e tien d'oro, den. 4. e grani 6. per ogni libbra d'argento fino, si domanda quant'argento, & oro, e Rame è in detto pezzo. Nota che la sopradetta lega del sopradetto pezzo d'Argento s'intendè tra oro, & argento, e questo inteso operarai come nella prima proposizione, dicendo, se in vna libbra di detto argento v'è dentro onçe 8. den. 10. e grani 8. tra argento, & oro, quanto ne sarà in libb.6. onçe 4. den. 16. e grani 8? opera come nella sopradetta, trouarai che vi sarà libb.4. onçe 5. den. 20. e grani 22. tra oro, & argento, il qual tratto di libb.6. onçe 4. den. 16. e grani 8. resta lib. 1. onçe 10. den. 19. e grani 10. e tanto è il Rame, che si troua in detto pezzo d'argento. Hor per vedere quant'oro sia in detto argento, farai così, dicendo, se in vna libbra tra oro, & argento v'è dentro den. 4. e grani 6. d'oro, quanto ne sarà in libb.4. onçe 5. den. 20. e grani 22? che tanto peso l'argento trattone il Rame, opera nel sopradetto modo, trouarai che vi sarà duc. 19. e grani $1\frac{2}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$. d'oro, che tratto di libb.4. onçe 5. den. 20. e grani 22, resta libb.4. onçe 5. den. 1. e grani 20 $7\frac{1}{3}\frac{1}{3}\frac{1}{3}$. d'argento fino; e così habbiamo trouato quant'argento, & oro, e Rame sia in detto pezzo d'argento.

Proposizione 3.

VNo si troua libb. 15. d'argento fino, e vuol far moneta a lega di onçe $2\frac{1}{2}$. per libbra, domando quante libbre ne consolarà, e quanto Rame vi aggiungerà. Fa così, Prima delle dette libb. 15. d'argento ne farai onçe, che sono onçe 180. d'argento fino, dipoi dirai così, se onçe $2\frac{1}{2}$. d'argento puro, consolarà vna libbra di moneta, quante libbre ne consolarà onçe 180? multiplica 180. via 1. si pur 180. il qual partirai per $2\frac{1}{2}$. ne viene 72. e tante libbre di moneta consolarà con il sopradetto argento, e sarà a lega di onçe $2\frac{1}{2}$. hor per sapere quanto Rame vi aggiungerà; caua libb. 15. d'argento puro di libb. 72. di moneta, restano libb. 57. e tanto Rame dirai, che vi aggiungerà.

Proposizione 4.

VNo si troua libb. 57. di Rame, il quale vuol consolare con tanto argento fino, che faccia moneta a lega di onçe $2\frac{1}{2}$. per libbra, si domanda quante libbre di moneta consolarà, e quanto argento puro vi aggiungerà. Fa così, prima delle libb. 57. di Rame ne farai onçe, che sono libb. 684. hora deui vedere in vna libbra di detta moneta quanto Rame v'è dentro, caua onçe $2\frac{1}{2}$. d'argento (qual si troua in vna libbra di tal moneta) di onçe 12. restano onçe $9\frac{1}{2}$. e così diremo che in ogni libbra di quella moneta, che vuol fare, vi sarà dentro onçe $9\frac{1}{2}$. di Rame, per il che dirai così, se onçe $9\frac{1}{2}$. di Rame, fanno vna libbra di moneta, quante libbre ne faranno onçe 684. di Rame? parti 684. per $9\frac{1}{2}$. ne vien 72. e così dirai che le libb. 57. di Rame consolaranno libb. 72. di moneta, e sarà a
lega

lega di once $2\frac{1}{2}$. Hor per vedere quanto argento fino vi aggiungerà, caua libb. 57. di Rame di libb. 72. di moneta, restano libb. 15. e tanto argento fino vi aggiungerà, la qual conclusione serue per proua della sopradetta proposta.

Propositione 5.

VNo si troua libb. 36. d'argento, a lega di once $2\frac{1}{2}$. per libbra, del quale vorrebbe far moneta a lega di once $6\frac{1}{2}$. per libbra, si domanda con il sopradetto argento quante libbre di moneta consolarà, senza aggiuntione d'altro argento, e che sia a lega di once $6\frac{1}{2}$. Fà così, vedi prima quanto argento fino sia in libb. 36. che per ogni libbra v'è once $2\frac{1}{2}$. d'argento, adunque in lib. 36. vi sarà once 90. d'argento fino, e con ogni once $6\frac{1}{2}$. di questo argento, consolarà vna libbra di moneta, però parti 90. per $6\frac{1}{2}$. ne viene $13\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. e così diremo, che le libbre 36. d'argento sopradette, consolaranno libb. $13\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. di moneta, a lega di once $6\frac{1}{2}$. per libbra, senza aggiunta d'altro argento.

Propositione 6.

VNo si troua libb. 30. d'argento, a lega di once $4\frac{1}{2}$. per libbra, e lib. 20. d'un'altra sorte, il quale è a lega di once $5\frac{1}{2}$. per libbra, e vuole di queste due sorti d'argento far moneta, che sia a lega di once $7\frac{1}{2}$. per libbra senza aggiuntione d'altro argento, si domanda quante libbre di moneta si consolarà. Fà così vedi quanto argento fino si troua in libb. 30. a once $4\frac{1}{2}$. per libbra, trouarai che ve ne sarà once 135. dipoi vedi quanto argento fino si troua in lib. 20. a once $5\frac{1}{2}$. per libbra, trouarai, che vi sarà once 110. d'argento fino, il quale aggiungi insieme con once. 135. faranno in tutto once. 245. d'argento fino, del quale dice, voler fare moneta a lega di once $7\frac{1}{2}$. per libbra, adunque ogni once $7\frac{1}{2}$. di tal argento puro consolarà vna libbra di moneta, e perciò parti 245. per $7\frac{1}{2}$. ne viene 32. $\frac{2}{3}$. e tante libbre di moneta consolarà, e sarà a lega di once $7\frac{1}{2}$. & il rimanente resterà in Rame.

Propositione 7.

VNo si troua libb. 30. d'Argento a lega di once $4\frac{1}{2}$. per libbra, e libb. 20. d'un'altra sorte a lega di once $5\frac{1}{2}$. per libbra, e vuol ridurre tutto quest'argento a lega di once $7\frac{1}{2}$. con aggiunta d'argento fino, si domanda quanto argento fino vi si aggiungerà, e quante libbre ne consolarà. Fà così, troua prima quanto Rame è nel sopradetto argento, che nella prima sorte ve n'è once $7\frac{1}{2}$. per libbra, adunque in 30. libbre ve ne sarà once 225. di Rame, e nella seconda sorte essendoui once $6\frac{1}{2}$. di Rame per libbra, ne segue, che in 20. libb. ve ne sarà once. 130. il quale aggiunto insieme sarà in tutto once 355. di Rame, e la moneta, che costui vuol fare, vuol che sia a lega di once $7\frac{1}{2}$. per libbra, per il che si vede, che vuole che per ogni libb. di moneta vi sia once. $4\frac{1}{2}$. di Rame. Laonde per regola del tre dirai così, se once. $4\frac{1}{2}$. di Rame consolarano vna libbra di moneta, quante ne consolaranno once. 355. parti 355. per $4\frac{1}{2}$. ne viene $78\frac{1}{2}$. e tante libbre di moneta consolarà. Hor per vedere quanto argento fino vi aggiungerà, aggiungi il peso

peso delle due sorti d'argento insieme, cioè libb. 30. e libb. 20. faranno libb. 50. che tutte di libb. 78. $\frac{2}{3}$. restano libb. 28. $\frac{2}{3}$. e tanto argento fino vi aggiungerà. Fanne proua in questo modo, vedi prima quanto sia tutto l'argento fino, e prima in libb. 30. noi habbiamo detto, che ve n'è once 135. 2 on. 4 $\frac{1}{2}$. per lib. & in libb. 20. ve n'è on. 110. 2 on. 5 $\frac{1}{2}$. per libbra, e libb. 28. $\frac{2}{3}$. n'aggiunge del fino, le quali ridotte a once, sono once 346 $\frac{2}{3}$. le quali aggiunte tutt'insieme faranno once 591 $\frac{2}{3}$. d'argento fino, del quale vuol far moneta a lega d'once 7 $\frac{1}{2}$. per libbra, però parti 591 $\frac{2}{3}$. per 7 $\frac{1}{2}$. ne viene 78 $\frac{2}{3}$. e così trouiamo, che con il sopradetto argento si consolerà libb. 78. $\frac{2}{3}$. di moneta.

Propositione 8.

VNo si troua libb. 8. d'argento a lega di once 10. per libbra, e libb. 12. d'v^{ra} altra sorte a lega di once 8. per libbra, domando fondendolo insieme di che lega tornerà. Fa così, vedi prima quanto argento fino, è in quello di leghe 10. moltiplica 10. leghe via 8. libb. fa 80. once d'argento fino, dipoi vedi quanto n'è in quel di leghe 8. moltiplica 8. leghe via 12. libbre, fa 96. once d'argento fino, il quale giunto insieme con once 80. fanno in tutto once 176. d'argento fino, e questo parti per la quantità di libb. cioè 8. e 12. che fanno 20. parti adunque 176. per 20. ne viene 8 $\frac{4}{5}$. & a lega di once 8 $\frac{4}{5}$. diremo che tornerà il detto argento mescolato insieme, & il medesimo ordine terrai quando fusse Oro.

Propositione 9.

VNo si troua libb. 30. d'argento a lega d'once 8. per libbra, e vi vorrebbe aggiungere tanto rame, che tornasse a lega di once 7. si domanda quanto rame vi aggiungerà. Fa così, vedi quanto argento fino si troua in 30. libb. a on. 8. per libbra, moltiplica 30. via 8. fa 240. e questo parti per la lega, che vuol fare, cioè per 7. ne viene 34 $\frac{2}{7}$. e tante libbre peserà, dipoi il detto argento a lega di once 7. e prima era libb. 30. adunque vi aggiungerà libb. 4 $\frac{2}{7}$. di rame.

Propositione 10.

VNo si troua libb. 20. d'argento a lega d'once 7. e lo vuol mettere al fuoco, & affinarlo tanto, che torni a lega di once 10. domando quante libbre peserà così affinato. Fa così, moltiplica libb. 20. con la sua lega, cioè via once 7. fa 140. e questo parti per la lega, che vuol fare, cioè per 10. ne viene 14. e libbre 14. dirai che tornerà così affinato.

Propositione 11.

VNo si troua libb. 4. d'argento, a lega di once 8. e libb. 10. a lega di once 9. e libb. 16. a lega di once 10. e libb. 12. a lega di once 11. domando volendolo fondere, e mescolar tutto insieme di che lega tornerà. Fa così, prima vedi

vedi quanto argento nno sia in ciascuna delle sopradette quantità di libb. multiplicando separatamente le libbre via le leghe, trouerai che in libb. 4. vi sarà on-
ce 32. d'argento fino, & in libb. 10. ve ne farà once 90. & in libbre 16. ve ne
farà once 160. & in libbre 12. ve ne farà once 132. che aggiunto insieme tutto
questo argento fino sarà la somma di once 414. e questo lo partirai per la som-
ma di tutte le libbre sopradette che sono in tutto libbre 42. parti a. dunque 414.
per 42. ne viene 9. $\frac{2}{7}$. e così diremo che mescolato insieme il sopradetto argen-
to tornerà a lega di once 9. $\frac{2}{7}$. per libbra.

Propositione 12.

VNo si troua libb. 16. d'argento a lega di once 9. per libbra, domando quan-
to Rame vi aggiungerà, acciò che torni a lega di once 7. per libbra. Fà
così, vedi nelle sopradette libbre 16. d'argento quanto argento fino v'è multi-
plica libb. 16. via 9. leghe fa once 144. e questo parti per quella lega che vuol
che torni, cioè per 7. ne vien 20. $\frac{4}{7}$. e tante libbre peserà il detto argento, e farà
di leghe 7. e prima era libbre 16. adunque il Rame che vi aggiungerà, farà la
differenza che è da libbre 16. a libbre 20. $\frac{4}{7}$. cioè libbre 4. $\frac{4}{7}$. e tanto Rame vi
aggiungerà.

Propositione 13.

VNo compra libb. 20. d'argento di leghe 10. per duc. 225. domando vna lib-
bra di 8. leghe quanto costerà. Fà così, vedi quanto argento fino si troua
in 20. libbre, multiplica 20. libb. via 10. leghe, fa 200. e così dirai, se on. 200.
d'argento fino costano duc. 225. che costeranno on. 8. cioè vna libbra, nella qua-
le v'è dentro on. 8. d'argento fino, & il resto è rame, multiplica 8. via 225. fa
1800. e questo parti per 200. ne vien 9. e duc. 9. verrà la libbra quel di leghe 8.

$$\begin{array}{ccccccc} 20 & \text{---} & 10 & \text{---} & 225 & \text{---} & 8. \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\ \text{partitore.} & & & & & & \end{array}$$

Vno compra la libbra dell'argento di leghe 8. per duc. 9. si domanda volen-
damente comprare libb. 20. di leghe 10. quanti ducati costaranno; opera, costaran-
no duc. 225.

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \text{---} & 8 & \text{---} & 9 & \text{---} & 20 & \text{---} & 10. \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \\ \text{partitore.} & & & & & & & & \end{array}$$

Propositione 14.

VNo si troua argento di due sorti, che la prima sorte è a lega di once 8. e l'al-
tra è a lega di once 6 $\frac{4}{7}$. e vuol far libb. 50. d'argento, che sia a lega di once
9. e vuol tirare tanto dell'vna, quanto dell'altra sorte, si domanda quanto a; è-
to fino vi aggiungerà. Faccisi così, Noi habbiamo che la prima sorte è a lega
di

di once 7. adunque tien di rame once 4. per lib. & habbiamo, che l'altra forte è a lega d'once $6\frac{1}{2}$. adunque tien di rame once $5\frac{1}{2}$. per lib. dipoi somma insieme onc. 4. di rame, che tiene la prima forte, con onc. $5\frac{1}{2}$. che tien l'altra, faranno once $9\frac{1}{2}$. e questa salua. Hor vedasi quanto rame anderà in libb. 50. d'arg. a lega d'once 9. per libbra, trouarai che ve n'andrà onc. 3. per lib. adunque le libb. 50. vorranno onc. 150. di rame. Piglisi hora quell'onc. $9\frac{1}{2}$. di rame che saluasti, e dicasi così, se onc. $9\frac{1}{2}$ di rame consola vna libbra d'argento di ciascuna delle sopradette forti, quante libbre ne consolerà onc. 150. di rame? opera, trouarai che consolerà libb. $15\frac{1}{2}$. e tante libb. torrà di ciascuna forte. Hor per saper quāto argento vi aggiungerà, noi habbiamo che torrà di ciascuna forte lib. $15\frac{1}{2}$. adunque fra tutte due le forti ne torrà lib. $31\frac{1}{2}$. e lui ne vuol fare lib. 50. per il che li conuerà aggiungere da lib. $31\frac{1}{2}$. per fino a lib. 50. che vi sono lib. 18. $\frac{1}{2}$. e tanto argento fino vi aggiungerà.

Fanne proua in questo modo, vedi quanto argento tengono libb. $15\frac{1}{2}$. a lega di onc. 8. che è la prima forte, trouarai, che terranno onc. $126\frac{1}{2}$. dipoi vedi quanto argento tengono libb. $15\frac{1}{2}$. a lega di once $6\frac{1}{2}$. che è la seconda forte, trouarai che terranno onc. $102\frac{1}{2}$. che sommare queste due quantità d'once insieme, con le lib. $18\frac{1}{2}$. d'argento fino, che vi aggiunge, faranno in tutto once 450. e tanto argento fino tengono tutte le lib. 50. hor per vedere se è la verità, vedasi a once 9. d'argento fino per lib. che è la lega che vuol fare, quanto argento sarà in libb. 50. trouarai che ve ne sarà onc. 450. adunque la ragione sù giusta.

Proposizione 15.

VNo si troua argento di due forti, cioè a lega d'once 8. e d'once 9. per lib. e di queste due qualità ne vuol far lib. 50. che sia a lega di onc. 10. per lib. e vuol torre tre tanti di quel di leghe 8. si domanda quanto torrà di ciascuna forte, e quanto argento fino vi aggiungerà. Prima è da vedere quāto rame sarà in libb. 50. d'argento di leghe 10. che vi farà onc. 2. di rame per libbra, & in 50. libbre ve ne farà once 100. di rame, dipoi tu vedi che in quel di leghe 9. v'è once 3. di rame, & in quello di leghe 8. ve n'è once 4. ma perche quel di leghe 8. ne vuol tre tanti, che di quel di leghe 9. adunque in tre libbre di quel di leghe 8. vi farà once 12. di rame, le quali once 12. le sommarai con once 3. di rame, che tiene vna libbra di quel di 9. leghe, faranno once 15. di rame. Hor per regola del tre dirai così, se onc. 15. di rame mi danno vna libb. d'argento di quel di leghe 9. e libb. 3. di quel di leghe 8. quante libb. me ne daranno onc. 100? trouarai che ti daranno libb. $6\frac{2}{3}$. di quel di leghe 9. e libb. 20. di quel di leghe 8. che sono tre tanti di quel di leghe 9. Hor per sapere quanto argento vi aggiungerà, somma insieme libb. 20. con libb. $6\frac{2}{3}$. faranno libb. $26\frac{2}{3}$. le quali trarrai di libb. 50. restaranno libb. $23\frac{1}{3}$. e tanto argento fino vi aggiungerà.

Fanne proua, vedi prima quanto argento tengono le libb. 20. a onc. 8. per lib. trouarai che terranno onc. 160. dipoi vedi quanto argento terranno libb. $6\frac{2}{3}$. a onc. 9. per lib. trouarai che terranno onc. 60. dipoi somma l'onc. 160. con onc. 60. fanno 220. e queste le sommarai con libb. $23\frac{1}{3}$. d'argento fino (il quale gli conuiene aggiungere) quali ridotte a once, sono onc. 280. somma adunque insieme onc. 280. con onc. 220. faranno in tutto onc. 500. e tanto argento terranno le libb. 50. composte dalle 2. sopradette forti d'argento, dall'argento fino, che vi si douea aggiungere; per il che noi trouiamo similmente, che le lib. 50. d'argento, quali vuol fare a lega di onc. 10. per lib. tengono onc. 500. d'arg. nto fino, con era di bisogno prouare.

Proposizione

Propositione 16.

VNo si troua argento a lega di onc. 5. per libbra, e l'ha messo al fuoco, e l'ha affinato tanto, ch'è tornato libb. 18. il quale è a lega d'onc. 9. si domanda quanto argento era prima che l'affinasse. Fa così, multipl. libb. 18. via la sua lega, cioè via onc. 9. fa 162. e questo parti per 5. leghe ch'era prima, ne viene $32\frac{2}{5}$. et tante libbre pesaua prima il detto argento, quando era a lega di once 5.

Propositione 17.

L'Oncia dell'argento di copella vale lir. 5. $\frac{1}{2}$. domando quanto varrà l'uncia di leghe 10? Noi habbiamo già detto che tanto vuol dire argento di copella, quanto argento fino, e quanto argento di leghe 12. e perciò dirai così se l'uncia di quel di leghe 12. vale lir. 5. $\frac{1}{2}$. che varrà l'uncia di quel di leghe 10? multiplica 10. via 5. $\frac{1}{2}$. fa 52. $\frac{1}{2}$. e questo parti per 12. ne viene 4. $\frac{1}{3}$. e tante lire varrà l'uncia di leghe 10. Nota che il rame non si pregia, e se si pregiasse, bisognerebbe trovare la valuta di on. 2. di rame, le quali si trouano in vna libbra di leghe 10. e tal valuta aggiungerla alla valuta di once 1. d'argento di leghe 10.

Ma se la proposta dicesse così. L'uncia dell'argento di leghe 10. vale lire 5. che varrà la libbra di quel di leghe 7. valutando il rame sol. 12. la libbra. Fa così, vedi prima quel vale la libbra di quel di leghe 10. a lir. 5. l'uncia, trouerai che varrà lir. 60. dipoi perché in vna libb. d'argento di 10. leghe v'è once 2. di rame, che à sol. 12. la libbra, le dette due once varranno sol. 2. adunque l'argento fino varrà lir. 60. men 2. soldi, cioè lir. 59. 18. che partito per leghe 10. ne viene lir. 5. 19. 9. $\frac{1}{2}$. e tanto varrà l'uncia dell'argento puro senza rame; Hora bisogna vedere quãto rame è in vna libbra d'argento di leghe 7. hauera i che vi sarà on. 5. di rame le quali a sol. 12. la libb. vagliono sol. 5. e le 7. onc. d'argento fino lir. 5. 19. 9. $\frac{1}{2}$. l'uncia, varranno lir. 41. 18. 7. $\frac{1}{2}$. & à questo aggiungi sol. 5. (che sono la valuta di once 5. di rame) faranno lir. 42. 3. 7. $\frac{1}{2}$. e tanto varrà la libb. di leghe 7. valutando anco il rame.

Propositione 18.

VNo si troua argento di due sorti, che la prima sorte è a lega di on. 9. per libbra, e l'altra è a lega di once 5. e vorrebbe di queste due sorti far libb. 50. di moneta a lega di on. 8. per libb. si domanda quante libb. torrà di ciascuna sorte. 1. à così, poni prima la minor lega, cioè on. 5. & vn poco lontano verso man destra poni la maggior lega, cioè on. 9. & infra l'vna, e l'altra di queste leghe, poni alquanto di sopra la lega che vuoi fare, cioè on. 8. fatto questo caua 5. leghe d'8. resta 3. e queste poni sotto le 9. leghe, dipoi caua 8. leghe (che vuoi fare di 9. leghe resta 1. e questo poni sotto le 5. leghe, starà con e di sotto vedi, e così diremo, che quando ne piglierà 3. once di quel di 9. leghe, bisognerà che pigli oncie 1. di quel di 5. leghe, e quel che noi diciamo d'once, diciamo anco di libbre per esser la medesima proportionione infra di loro. Perche si conclude

conclude, che queste due sorti d'argento hanno a diuidere libb. 50. & vna, che è la maggior lega deuetirare 3. quando l'altra per 2. & è simile a vna proposta di compagnie la qual dicesse così. Die fanno compagnia, & vn di loro mette 1. & hanno guadagnar 50. si doman la che tocca per vno, somma 3. che mette il primo con 1. mette il secondo, fanno 4. e questo salua per partitore, di poi moltiplica 3. via 50. fa 150. il qual partito per 4. che saluasti, ne viene 37. $\frac{3}{4}$. e tante libb. torrà di quel di leghe 9. di poi moltiplica 1. via 50. fa 50. il qual partito per 4. ne vien 12. $\frac{1}{2}$. e tante lib. torrà di quel di leghe 5. così farai le simili.

$$\begin{array}{r} 8 \\ 5 \text{ -- } 9 \\ 1 \quad 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \quad 50 \\ \text{partitore.} \end{array}$$

Proposizione 19.

VNo si troua libb. 24. d'argento, che vale la libbra lir. 20. e libb. 30. che vale la libbra lir. 25. e lib. 36. che vale la libbra lir. 35. e lo vuol mescolare insieme, e dopo che l'ha mescolato vuol aggiungere al detto balzone vn'altra sorte d'argento, che vale la libbra lir. 14. e vuol torre tanto di quel di lir. 14. che il balzone vaglia poi lir. 15. la lib. domando quanto torrà di quel di lir. 14. la libbra, e quanto peserà tutto il balzone. Fa così, vedi quanto vale tutto il sopradetto argento ai sopradetti prezzi, trouarai che tutto insieme varrà lire 2490. hor vedi quanto vale vna libbra di questo argento mescolato, somma insieme tutte le sopradette libb. d'argento faranno libb. 90. parti 2490. per 90. ne viene lib. 27. $\frac{3}{4}$. e tante lire vale la libbra. Hora dirai così, Vno si troua lib. 90. d'argento, che vale la libbra lir. 27. $\frac{3}{4}$. e ne vuol aggiungere tante libbre d'vn'altra sorte, che vale la libbra lir. 14. che vuol che vaglia poi lir. 15. la libbra, si domanda quante libb. ve n'aggiungerà? Fa così, poni lir. 14. ch'è il minor prezzo, e verso man destra poni lir. 27. $\frac{3}{4}$. e fra l'vno, e l'altro prezzo alquanto più alto poni il prezzo che vuol che vaglia, cioè lir. 16. fatto questo caua lir. 14. di lir. 16. resta lir. 2. e queste le metterai sotto alle lir. 27. $\frac{3}{4}$. di poi caua lir. 16. di lir. 27. $\frac{3}{4}$. restano lir. 11. $\frac{1}{4}$. e queste poni sotto alle lir. 14. starà come di sotto vedi, di poi dirai così, quando si pigliarà libb. 2. di quel di lir. 14. quanto se ne douerà adunque pigliare per libb. 90. che ne vuol mescolare? moltiplica 90. via 11. $\frac{1}{4}$. & il prodotto parti per 2. ne viene 525. e tante libbre torrà di quel di lir. 25 la lib. quali aggiunte con libb. 90. faranno libb. 515. e tanto peserà il balzone.

Fanne proua dicendo. Vno si troua libb. 90. d'argento, che vale la lib. lire 27. $\frac{3}{4}$. e libb. 525. che vale la lib. lir. 14. domando mescolandolo insieme quāto varrà la libbra? moltiplica lir. 27. $\frac{3}{4}$. via libb. 90. fanno lir. 2490. di poi moltiplica lir. 14. via libb. 525. fanno lir. 7350. quali aggiunte con lir. 2490. fanno lir. 9840. e queste parti per libb. 615. che è il peso di tutto l'argento, trouarai, che ne verrà lir. 16. per la valuta d'vna libbra così mescolato.

$$\begin{array}{r} 24 \quad 20 \quad 480. \\ 30 \quad 25 \quad 750. \\ 36 \quad 35 \quad 1260. \\ \hline 90) \quad 2490. \\ \quad 27\frac{3}{4}. \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16. \\ 14 \quad 27\frac{3}{4}. \\ \hline 11\frac{1}{4} \quad 2 \\ 2 \quad 11\frac{1}{4} \quad 90. \end{array}$$

Propo-

Proposizione 20.

VNo si troua argento di leghe 10. e vuol far vna tazza che pesi libb. 4. e che sia a lega d'onc. 8. domando quanto Rame vi aggiungerà, quanto argento di 10. leghe piglierà. Fa così, vedi quanto argento fino entrerà in detta tazza, la qual pesando libb. 4. e douendo essere a lega di onc. 8. vi sarà onc. 32. d'argento fino, il quale volendo fare a lega d'onc. 10. parti 32. per 10. ne vien $3\frac{2}{5}$. e tante libb. torrà di quel di leghe 10. & il resto per fin in libb. 4. che v'è $\frac{2}{5}$ d'vna libbra torrà Rame.

Proposizione 21.

VNo si troua argento di leghe 6. e di leghe 8. vorrebbe di queste due sorte d'argento fare vn vaso che pesasse libb. 15. e fusse a lega di onc. 10. per libbra, domando quanto torrà di ciascuna sorte, e quanto argento fino vi aggiungerà. Fa così, poni distesamente tutte le leghe che ti troui, cominciando dalla minore, e seguendo gradatamente, come di sotto vedi, starà così, leghe 6. leghe 8. e leghe 12. cioè l'argento fino il qual vi deue aggiungere. Fatto questo considerà infra quali leghe cade, o ver si troua la lega che vuol fare, cioè le leghe 10. tu vedi che si troua infra l'8. leghe, e le 12. leghe, per il che poni in quel mezzo, cioè infra l'8. e l'12. (ma alquanto più alto) le 10. leghe, di cui caua 6. leghe di 10. leghe, resta 4. e queste poni sotto la maggior lega, perche bisogna scambiare la minore con la maggiore, e la maggiore con la minore, poni adunque sotto il 12. di poi caua 8. leghe di 10. leghe, resta 2. e questo poni sotto la maggior lega, cioè sotto il 4. che ponesti, e se tu hauesti altre leghe che fussero minori di quella lega che intendi di fare, cioè di leghe 10. tutte le doueresti trarre, si come tu hai tratto le sopradette, e tutti i resti li doueresti porre sotto la maggior lega, e poi sommarli insieme, la somma adunque 4. e 2. fanno 6. di poi caua le leghe che vuoi fare, cioè 10. della maggior lega che è 12. resta 2. e poni 2. sotto le 8. leghe, & ancora sotto le 6. leghe, e così diremo che ogni volta che si piglierà 6. once, o 6. libb. di quel di 12. leghe. bisognerà pigliare 2. once, o 2. libb. di quel d'8. leghe, e di quel di 6. leghe: laonde farai come vna compagnia, dicendo, quel di 6. leghe mette 6. e quel di 8. leghe mette 2. e quel di 12. leghe mette 6. che in tutto mettano 10. e noi voleuamo che mettessero 15. perciò che tanto deue pesare il vaso, opera, secondo l'ordine delle Compagnie, trouerai che di quel di 6. leghe ne torrà libb. 3. e di quel di 8. leghe ne torrà libb. 3. e di quel di 12. leghe ne torrà libb. 9. e così farai le simili.

$$\frac{6}{15} = \frac{6}{15} \left(\frac{10}{15} \right) + \frac{2}{15} + \frac{6}{15} = 15.$$

Proposizione 22.

MA se la proposta sopradetta fusse stata conditionata, come per esser in. lo voglio che si pigli tre tanti di quel di 6. leghe, che di quel d'8. leghe, si do-

fi domanda volendo fare il detto vaso, che pesi libb. 15. e sia a lega d'onze 10. quanto vi metterò di ciascuno argento, e quanto ven'aggiugnerò del fino. Poni le leghe per ordine come di sopra, dipoi caua la lega, che vuoi fare, cioè 10. dalla lega maggiore, che è 12. cioè l'argento fino; resta 2. e questo 2. tu sai che lo ponemo sotto il 6. e l'8. ma perche vuole 3. tanti di quel di 6. leghe, che di quel d'8. però poni il detto 2. sotto l'8. solamente, e volendone pigliar tre tanti di quel di 6. multipl. detto 2. via 3. fa 6. e così couerrà che di quel di 6. leghe ne pigli 6. onze, o 6. libbre, quanto di quello d'otto leghe ne pigliarà 2. onze, o 2. libbre. Fatto questo, caua le 6. leghe di 10. leghe resta 4. e perche di quel di 6. leghe ne piglia 3. tanti, però multiplica detto 4. via 3. fa 12. e questo poni sotto le 12. leghe, dipoi caua 8. leghe li 10. leghe resta 2. e questo poni sotto a quel 12. che ponesti sotto la maggior lega, e l'aggiungerai a detto 12. sarà 14. e così hauereмо concluso, che ogni volta che quel di leghe 12. cioè argento fino, ne pigliarà 14. libb. bisognerà che pigli di quel d'8. leghe 2. libb. e di quel di 6. leghe 6. libb. che sono appunto 3. tanti di quel d'8. leghe, e così per modo di compagnia dirai quel di 12. leghe mette 14. e quel d'8. leghe mette 2. e quel di 6. leghe mette 6. che in tutto mettono 22. e noi voleuamo che mettessero 15. offerua il modo sopradetto, trouarai che di quel di 12. leghe, ne pigliarà libb. $9\frac{1}{4}$. e di quel d'8. leghe ne pigliarà libb. $1\frac{1}{4}$. e di quel di 6. leghe ne pigliarà 3. tanti, cioè libb. $4\frac{1}{4}$. & il detto vaso sarà a lega d'onze 10. per libb.

Fanne proua dicendo, libb. $9\frac{1}{4}$. d'argento a lega d'onze 12. e libb. $1\frac{1}{4}$. a lega d'onze 8. e libb. $4\frac{1}{4}$. a lega d'onze 6. domando mescolandolo insieme di che lega tornerà; opera ne' modi detti, trouarai, che sarà a lega d'onze 10. per libbra.

	10.		
6.	8. (12.)	14. = 15.	
6.	2.	2	
	12	6	
	14	22	

Troua libbre $9\frac{1}{4}$. d'argento, e libbre $1\frac{1}{4}$. di quel di leghe 8. e libbre $4\frac{1}{4}$. di quel di leghe 6.

Proposizione 33.

VNo si troua argento a lega di onc. 3. di 4. di 6. di 9. e di 10. e vorrebbe libb. 60. di moneta, che fusse a lega d'onc. 8. si domanda quito torrà di cia'cuna sorte. Fa così, poni tutte le leghe del sopradetto argento per ordine, cominciando dalla minor lega, e seguendo fino alla maggiore, dipoi poni le 8. leghe che intendi di fare infra due delle sopradette leghe, ma alquanto più alto, cioè che vna sia minore d'8. leghe, e l'altra sia maggiore d'8. leghe, che sarà infra 7. e 9. fatto questo, comincia dalla minor lega, che è 3. e caua detto 3. d'8. resta 5. e questo poni sotto la maggior lega, che è 10. dipoi caua 8. leghe di 10. leghe resta 2. e questo poni sotto le 3. leghe; dipoi caua 4. leghe d'8. leghe resta 1. e questo poni sotto le 9. leghe, dipoi caua 8. leghe di 9. leghe, resta 1. e questo poni sotto le 4. leghe. Hora ci resta a legare vna sola sorte d'argento, che è quella di 6. leghe, la quale non ha compagnia minor di se, che non sia allegata, perche

ilche ci conuiene allegarla con vna delle due sorti, che sono maggiori di leghe 8. già allegate con le due sorti minori di leghe 8. hor sia che la vogliano allegare con quella di leghe 10. e direnno d'8. leghe cauane 2. leghe resta 2. e questo 2. poni sotto le 10. leghe, e l'aggiungerai con 5. che prima vi ponesti farà 7. dipoi cauane 2. leghe di 10. leghe resta 2. e questo poni sotto alle 6. leghe, e sappi che le 6. leghe le poteui scambiare, cioè allegare con leghe, si come hai fatto con le 10. e così direnno che quando di quel di 10. leghe ne pigliarà 7. bisognerà che di quel di 9. leghe ne pigli 4. e quel di 6. leghe ne pigli 1. e di quel di 8. leghe ne pigli 2. e così per modo di compagnia dirai quel di 10. leghe mette 7. e quel di 9. mette 4. e quel di 6. mette 2. e quel di 4. mette 1. e quel di 8. mette 2. che in tutto mettono 16. e noi voleuamo, che mettesero 60. e per ne' modi sopradetti, trouarai che di quel di 10. leghe ne pigliarà libb. 26 $\frac{1}{2}$. e di quel di 9. leghe ne pigliarà libb. 15. e di quel di 6. leghe ne pigliarà libb. 7 $\frac{1}{2}$. e di quel di 4. leghe ne pigliarà libb. 5 $\frac{1}{2}$. e di quel di 8. leghe ne pigliarà libb. 7 $\frac{1}{2}$. che tutto insieme farà libb. 60. e sarà a lega d'once 8. per libbra. I anne picua, fondendo tutte le libbre co' le lor leghe, e quei prodotti son nati insieme, dipoi fonderai le dette libbre 60. con leghe 8. e sarà il suo prodotto uguale alle sopradette leghe multiplicare, e son nate, piu, e nano che faceste staria nate.

$$\begin{array}{r}
 8 \\
 \hline
 \begin{array}{r}
 3. \quad 4. \quad 6. \quad 19. \quad 0. \quad 7. \\
 \hline
 2. \quad 1. \quad 2. \quad 4. \quad 5. \quad 4. \\
 \hline
 2. \\
 \hline
 7 \quad 2 \\
 \hline
 16.
 \end{array}
 \end{array}$$

partitore

Proposizione 24.

VNo si troua libbre 20. d'argento a lega d'once 6. e libbre 15. a lega d'once 4. e libbre 25. a lega d'once 1. e lo vuol mescolare insieme, e far nate a lega d'once 10. domando, quanto argento fino vi douerà aggiungere, e quante libbre sarà in tutto. Fa così, vedi prima quanto argento fino sono in tutte queste libbre 60. sopradette, che tanto pesano insieme giunte, fondilo contro le sue finezze, multiplicando le libbre via leghe, e poi somma insieme tutt'i prodotti fanno once 205. d'argento fino, le quali si trouano nelle libb. 60. sopradette, dipoi reca a once le libb. 60. sono once 720. fra rane, & argento, cauane hora once 205. d'argento fino, resta once 515. per il Rame puro, hora, perche dice, che vuol far moneta a lega d'once 10. adunque in vna libbra di detta moneta vi sarà once 2. di rame, e per la qual cosa diremo, che conuerà mettere once 2. di rame in ogni libbra di moneta, per ilche partirai 515. per 2. e viene 257 $\frac{1}{2}$. e tante libbre di moneta conolerà, cauane libb. 60. che prima pesano, restano libbre 257 $\frac{1}{2}$. e tante libbre d'argento fino dirai che vi douerà aggiungere, e che tutta la massa dell'argento peserà libbre 257 $\frac{1}{2}$.

Proposizione 25.

VNo si troua libb. 20. d'argento a lega d'once 5. libb. 25. a lega d'once 8. e libb. 60. a lega d'once 10. e vuole aggiungere sopra questo argento tanto d'vn'altra forte, il qual'è a lega di $\frac{1}{2}$. oncia per libbra; che possa far moneta a lega d'once 2. domando quanto ve ne douerà aggiungere. Fà così, vedi prima che lega torna tutto questo argento mescolato, fondilo contro le sue finezze, multiplicando 20. via 5. fà 100. e 25. via 8. fà 200. e 60. via 10. fà 600. hor somma insieme tutte queste fonditure fanno 900. e tanto argento fino diremo, che sia in libb. 105. sopradette, che tante sono giunte insieme, per il che parturai once 900. per libb. 105. ne viene $8\frac{4}{7}$. e di tal lega torneranno i detti argenti mescolati. Hora dirai così. Io mi trouo libb. 105. d'argento a lega d'once $8\frac{4}{7}$. voglio aggiungerne tanto di quello, che è a lega di $\frac{1}{2}$. oncia, che torrai tutto a lega d'once 2. Poni once $\frac{1}{2}$. & vn poco lontano verso man destra poni once $8\frac{4}{7}$. & infra queste due leghe, ma alquanto di sopra poni la lega, che vuoi fare, cioè once 2. di poi dirai $\frac{1}{2}$. oncia, quanto è meno d'once 2? tu vedi, che è meno once $1\frac{1}{2}$. e questo poni sotto le leghe $8\frac{4}{7}$. dirai once $8\frac{4}{7}$. quanto son più d'once 2? tu vedi che son più once $6\frac{2}{7}$. e queste poni sotto la lega di $\frac{1}{2}$. oncia, e così diremo, che per libb. $1\frac{1}{2}$. di quel di leghe $8\frac{4}{7}$. bifo gnarà pigliare libb. $6\frac{2}{7}$. di quel che a lega di $\frac{1}{2}$. oncia, e noi vogliamo sapere quanto ne douerà torre per libb. 105. onde per regola del tre dirai così, se libb. $1\frac{1}{2}$. ne vuole libb. $6\frac{2}{7}$. quanto ne vorranno libb. 105? multiplica 105. via $6\frac{2}{7}$. & il prodotto parti per $1\frac{1}{2}$. ne vien 460. e tante libbre doue à torre di quel di $\frac{1}{2}$. oncia, e consolarà in tutto libb. 565. di moneta, e farà a lega d'once 2. per libbra.

$$\begin{array}{rcl}
 20 & \text{---} 5 & \text{---} 100 \\
 25 & \text{---} 8 & \text{---} 200 \\
 60 & \text{---} 10 & \text{---} 600 \\
 \hline
 105 & & 900
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{rcl}
 & \frac{1}{2} & \\
 \hline
 & 8\frac{4}{7} & \\
 \hline
 & 6\frac{2}{7} & \\
 \hline
 & 1\frac{1}{2} &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 & 8\frac{4}{7} & \\
 & \frac{1}{2} & \times \frac{6\frac{2}{7}}{1\frac{1}{2}} = \frac{105}{1}
 \end{array}$$

Douerà torre libb. 460. di quel che è a lega di $\frac{1}{2}$. oncia, e consolarà in tutto libbre 565. di moneta, e farà a lega d'once 2. per libbra.

Proposizione 26.

LA libbra dell'argento. che è a lega d'once $11\frac{1}{2}$. vale duc. 8. e sol. 4. domando quanto varranno libb. 6. once 3. den. 12. e grani 16. d'vn'altra forte, che è a lega d'once 8? Fà così, troua prima quanto vale vn'oncia, e quanto vale vn denario, e quanto vale vn grano della prima forte nei mōdi già dati; partendo prima duc. 8. sol. 14. per 12. e tanto varranno l'oncia; e quel che ne viene parti per 24. e tanto varrà vn grano;

grano; trouarai che l'oncia varrà fol. 14. 6. & il denaro varrà duc. 7 $\frac{1}{4}$. & vn grano varrà $\frac{3}{4}$. d'vn denaro. Hora fà conto che l'argento il qual tu vuoi valutare fia della prima forte, cioè a lega d'once 11 $\frac{1}{2}$. valuta adunque ai detti pregi le sopradette libb. 6. onc. 3. duc. 12. grani 16. trouarai che varranno duc. 54. 15. 1 $\frac{1}{2}$. e così diremo che ualeffe tanti ducati se fusse a lega d'once 11 $\frac{1}{2}$. ma perche a lega d'once 8. però per regola del tre dirai così, se la lega d'once 11 $\frac{1}{2}$. mi dà duc. 54. 15. 1 $\frac{1}{2}$. quante mi darà la lega d'once 8? moltiplica once 8. via ducati 54. 15. 1 $\frac{1}{2}$. & il prodotto parti per 11 $\frac{1}{2}$. trouarai che ne verrà duc. 38. 1. 10. $\frac{1}{2}$. e tan o varranno le sopradette libbre a lega d'once 8.

12	8.	14.	0.	6.	3.	12.	16.
24	0.	14.	6.	6.	3.	12.	16.
24	0.	0.	7 $\frac{1}{2}$	6.	3.	12.	16.
	0.	0.	0 $\frac{1}{2}$	6.	3.	12.	16.
	0.	9.	4 $\frac{1}{2}$				
	0.	7.	3.				
	2.	3.	6.				
	12.	4.	0.				
12 $\frac{1}{2}$	54.	15.	1 $\frac{1}{2}$	8.			

• Vno si troua argento di leghe 10. di leghe 8. di leghe 6 $\frac{1}{2}$. di leghe 5. e di leghe 3. e vuol fare libb. 80. d'argento, che sia a lega d'onc. 7. e vorrebbe metterui libb. 12. di quel di leghe 10. e libb. 12. di quel di leghe 8. si domanda quanto argento vi metterà di ciascuna dell'altre tre forti. Ià così, vedi prima a libb. 12. di 10. leghe, e libb. 12. d'8. leghe mescolandolo insieme di che lega torrarà, trouarai, che torrarà a lega d'once 9. vedi hora quanto argento fino farà in libb. 80. sopradette a once 7. d'argento fino per libbra, trouarai che ve ne sarà once 560. nelle quali le libb. 24. che sono a lega d'onc. 9. ve ne portano onc. 216. che tratte d'onc. 560. restano onc. 344. e tanto argento fino contengono le tre altre forti d'argento, le quali a peso con il rame che v'è dentro sono libb. 56. perche tratte le libb. 24. delle libb. 80. restano libb. 56. parti adunque 344. per 56. ne vien 6 $\frac{1}{4}$. & a lega d'onc. 6 $\frac{1}{4}$. couerrà fare l'arg. il qual pesi libb. 56. hora sarai come nelle passate, ponendo prima leghe 6 $\frac{1}{4}$. e leghe 5. e leghe 3. come di sotto vedi, e perche la lega d'onc. 6 $\frac{1}{4}$. si troua infra la lega d'onc. 6 $\frac{1}{2}$. e la lega d'onc. 5. però poni 6 $\frac{1}{4}$. in quel mezzo, n'a alquanto più alto, di cui opera con e nelle passate, traendo, e cambiando i resti delle leghe: trouarai, che quando piglierà libb. 4 $\frac{1}{2}$. di quel di leghe 6 $\frac{1}{2}$. bisognerà che pigli $\frac{1}{2}$. d'vna libb. di quel di 5. leghe, e $\frac{1}{4}$. di quel di 3. leghe, che in tutto piglierà libb. 5. e lui deuua pigliare libb. 56. però opera per modo di compagnie, & hauera che di quel di leghe 10. ne piglierà libb. 12. e di quel di leghe 8. ne piglierà libb. 12. e di quel di leghe 5 $\frac{1}{2}$. ne piglierà libb. 48. e di quel di 5. leghe ne piglierà libb. 4. e di quel di 3. leghe ne piglierà libb. 4. che in tutto faranno libb. 80. e faranno a lega d'onc. 7. come la ragione demandaua. Fanne prova in questo modo; tu sai, che le libb. 24. sono a lega d'onc. 9. e le libb. 56. sono a lega d'onc. 9 $\frac{1}{4}$. fendi queste libbre contro le lor firezze, e quelle fenditure giunte insieme partire per libb. 70. ne verrà 7. e così ti sarai certificato, che le libb. 70. faranno a lega d'onc. 7. per libb.

$$\begin{array}{r}
 80 \quad \boxed{7} \quad 560 \quad 6\frac{1}{7} \\
 \\
 \begin{array}{r}
 24 - 9 \\
 \hline
 15
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 216. \\
 \hline
 344\frac{1}{7}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 6\frac{1}{7} \\
 \hline
 3\frac{1}{7}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 5. \\
 \hline
 1\frac{1}{4}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 3. \\
 \hline
 2\frac{1}{2}
 \end{array}
 \\
 \\
 \begin{array}{r}
 4\frac{2}{7} \\
 \hline
 5
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 4\frac{2}{7} \\
 \hline
 5
 \end{array}
 \\
 \\
 \begin{array}{r}
 14 \cdot 5 \cdot 6 \\
 \hline
 14
 \end{array}
 \\
 \\
 \text{partitore.} \quad 5.
 \end{array}$$

Propositione 27.

VNo si troua onçe 120. d'argento, a lega di onçe 8. del qual piglia vna quantà d'onçe, e l'affina tanto che torna a lega di onçe 11. dipoi queſt'argento affinato, l'aggiunge a quel che gli reſtò di 120. onçe, e lo fonde inſieme, & torna di 9. leghe, domando quant'onçe d'argento preſe, e quant'onçe peſarà quel di 9. leghe. Fa coſi, conſidera quanto tornarebbe onçe 120. volendolo affinar tanto che torni di 9. leghe, multiplica 120. via 8. leghe fa 960. e queſto parti per 9. ne viene 106. $\frac{2}{7}$. e tanto conuien che ſia tutto l'argento in vltimo. Reſta hora a veder quant'onçe d'argento di leghe 8. e quante di leghe 11. compoſe, e fuſe inſieme il qual tornò onçe 106. $\frac{2}{7}$. di leghe 9. che altro non vuol dire ſe non coſi.

Io mi trouo argento di leghe 8. e di leghe 11. e ne vorrei fare onçe 206. $\frac{2}{7}$. a lega di onçe 9. domando quanto torrò di ciaſcuna ſorte, poni 8. leghe; & 11. leghe, & in ſra queſte due leghe, (ma alquanto più alto) poni la lega che vuoi fare, cioè onçe 9. dipoi offerua i modi più volte dati, trouarai che di quel d'8. leghe ve ne farà onçe 72. $\frac{1}{4}$. e di quel d'11. leghe ve ne farà onçe 36. $\frac{1}{4}$. che giunte inſieme faranno onco 106. $\frac{2}{7}$. e faranno di 9. leghe. Hora trahi onçe 71. $\frac{1}{4}$. (il qual'è d'8. leghe) di onçe 120. reſtano onçe 40. $\frac{1}{4}$. e tanto fu quella quantità d'onçe, che preſe per affinarlo, che tornò d'11. leghe. O vero fa coſi, & hauerai il medefimo; vedi onçe 35. $\frac{1}{4}$. a lega di onçe 11. quant'onçe erano d'8. leghe prima che l'affinaſſe, multiplica 35. $\frac{1}{4}$. via 11. fa 391. $\frac{1}{4}$. e queſto parti per 8. ne viene 48. $\frac{1}{4}$. e tante onçe ne preſe per affinarlo, e quando l'hebbe fuſo, e meſcolato, e ridotto di 9. leghe peſò onçe 106. $\frac{2}{7}$. &c.

Propositione 28.

VNo compra l'oncia dell'argento di copella lin. 5. $\frac{1}{7}$. domando quanto varrà l'oncia di leghe 8. $\frac{1}{2}$. Altre volte habbiamo detto che l'argento di copella, ſ'intende

s'intende argento fino, e puro senza mescolamento di Rame; che è di 12. leghe, però dirai così, se 13. leghe vagliono $\text{li}r. 5. \frac{1}{2}$. quanto varranno leghe $8. \frac{1}{2}$? opera, trouerai che varranno $\text{li}r. 3. 16. 4. \frac{2}{3}$. e tanto varrà l'oncia di leghe $8. \frac{1}{2}$. E dicendo, l'oncia dell'argento di leghe 10. vale $\text{li}r. 4. \frac{1}{2}$. che varrà quel di leghe 6? fa come nella passata, dicendo, se 10. val $4. \frac{1}{2}$. che varrà 6? opera, varrà $\text{li}r. 2. \frac{1}{2}$.

Ma se la proposta dicesse così. L'oncia di 16. leghe vale lire 4. $\frac{1}{2}$. che varrà la libbra di quel di leghe 6? valutando la libbra del Rame soldi 18. questa è alquanto più difficile, però vedi prima quanto vale la libbra di 10. leghe, la qual viene a valere lire 5.1. e perche in vna libbra d'argento di 10. leghe vi dimora onçe 2. di Rame, il qual varrà soldi 3. adunque la libbra del detto argento varrà lire 5.1. meno 3. soldi, cioè lire 50.17. per il che l'oncia dell'argento fino viene a valere lire 5.1.8. $\frac{1}{2}$. Hora tu hai a considerare quanto Rame è in vna libbra d'argento di leghe 6. che v'è onçe 6. di Rame le quali vagliono sol. 6. e le 6. onçe d'argento fino a lire 5.1.8. $\frac{1}{2}$. l'oncia varranno lire 20. 30. 2. $\frac{1}{2}$. alle quali aggiuntoui soldi 9. che va le il Rame fanno lire 30. 19. 2. $\frac{3}{4}$. e tanto varrà la libbra dell'argento di leghe 6. insieme con il Rame.

Proposizione 29.

- V**No si troua argento di due sorti, che vna delle quali vale $\text{li}r. 56.$ la libbra, e l'altra vale lire 48. la libbra, costui ne vende fra tutte due le sorte. Fa così, poni che l'argento che vende sia tutto d'vna sorte, e vedi quanto vende la libbra, parti $\text{li}r. 324.$ per 6. ne viene $\text{li}r. 54.$ e tanto viene a vender la libbra l'vno per l'altro, dipoi dirai così; lo mi trouo argento che vale $\text{li}r. 48.$ la libbra, & argento che vale lire 56. la libbra, e ne vorrei far libbre 6. che vallessi lire 54. la libbra, de mando quanto torrò di ciascuna sorte. Poni 48. e 56. & in quel mezzo, (ma alquanto più alto) poni 54. si come più volte hai fatto nelle leghe; dipoi caua 48. di 54. resta 6. e questo poni sotto a 56. dipoi caua 54. di 56. resta due, e questo poni sotto a 48. e così dirai, che quando piglierà libb. 2. di quel di $\text{li}r. 48.$ la libbra, bisognerà che pigli libbre 6. di quel di lire 56. la libbra, che stante così ne piglierebbe libbre 8. & esso non ne deue pigliare, o vendere più che 6. libbre, e perciò dirai per modo di Compagnie, vno trahe per 2. e l'altro per 6. & hanno a partir 6. che tocca per vno? opera, trouerai che di quel di lire 56. ne vende libbre $4. \frac{1}{2}$. e di quel di lire 48. ne vende libbra 1. $\frac{1}{2}$. fanno proua valutandole a suoi pregi, & aggiungendo le valute insieme, faranno lire 324. più o meno che ne venisse, staria male.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r} 48 \\ \hline 2 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r} 56 \\ \hline 6 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r} 6 \\ \hline 2 \end{array}
 \end{array}$$

Proposizione 30.

- V**No compra la libbra dell'argento a lega di onçe 10. per ducati $8. \frac{1}{2}$. e poi compra libb. 20. d'vn'altra sorte per duc. 150. domando di che lega fu.

fa così, vedi prima quanto gli costa la libbra della seconda sorte, parti duc. 150. per 20. ne vien $7\frac{1}{2}$. e tanti duc. li costò la lib. di poi dirai se per duc. $8\frac{1}{2}$. io compro argento di 10. leghe, domando, per duc. $7\frac{1}{2}$. di quante leghe lo dojerò habere? multiplica $7\frac{1}{2}$. via 10. fa 75. e questo partirai per $8\frac{1}{2}$. ne viene $8\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. e così dirai, che le libb. 20. d'argento furono a lega d'once $8\frac{1}{2}\frac{1}{2}$. per libbra .


Proposizione 31.

VNo si troua libb. 4. d'argento a lega d'onc. 7. e libb. 6. a lega d'onc. 8. e libb. 10. a lega d'onc. 9. e lo vuol mescolare, & affinar tanto, che torni a lega d'onc. 10. domando quante libbre tornerà, e quanta varrà la libbra dell'affinato, se la libbra della prima sorte senz'affinarlo vale lir. 50. della seconda vale lir. 55. e della terza lir. 60? Fa così, vedi prima qua l'argento fino si troua in tutte le sopradette libbre, moltiplicando le leghe via le libbre, & i prodotti sommati insieme, trouarai, che saranno 166. e tant'onc. d'argento fino diremo che sia in tutte le sopradette libbre, ma perche dice, che lo vuol affinar tanto, che torni a lega d'onc. 10. però ogni 10. onc. d'argento fino, & onc. 2. di Rame fanno vna libbra d'argento di 10. leghe, parti adunque 166. per 10. ne viene $16\frac{1}{2}$. e tante libbre tornerà a lega d'onc. 10. Hora per veder quanto varrà la libbra, dirai così, se onc. 166. d'argento fino vagliono lir. 1130. (perciò che tanto vagliono tutte le sopradette libbre) che varranno onc. 10? perche 10. onc. habbiamo detto, che fanno vna libbra, atteso che ci s'incorpora onche 2. di Rame; multiplica 10. via 1130. & il prodotto parti per 166. ne viene 68. 1. $5\frac{2}{3}\frac{1}{2}$. e tanto varrà la libbra dell'argento affinato a lega di 10. onc.

Proposizione 33.

VNo si troua vino di 5. sorti, o vogliamo dire di 5. prezzi, che il barile della prima sorte vale lir. $3\frac{1}{2}$. e della seconda vale lir. 5. e della terza vale lire $6\frac{1}{2}$. e della quarta vale lir. 8. e della quinta vale lir. 9. e ne vorrebbe empire vna sorte di 60. barili, e metteruene di ciascuna sorte tanto che valesse il barile lir. 7. domando quanto torrà di ciascuna sorte. Fa così, poni distesamente tutti i prezzi sopradetti, cominciando dal minore, e poi seguitar per ordine, e quando nei sopradetti prezzi, cioè nelle sopradette lire v'interuenisse soldi, i quali tu non potessi recare in altra parte di lira, e che dessero fastidio all'operante, come poco esposto nelle ragioni de' rotoli, allora, & in tal caso potrai recare a soldi tutte le lire, e di poi operare come se fossero tutte lire. Hora tornando alla nostra dichiarazione, si dice che quando haurai posti tutti i prezzi per ordine, che tu consideri il prezzo, che vuoi che vaglia il barile del vino, cioè lir. 7. infra quali de' sopradetti prezzi si ritroua, tu hauerai che si ritroua infra lir. 6. e lir. 8. & in questo mezzo, ma alquanto più alto, poni lir. 7. come di sotto vedi, di poi le differenze che sono dalle lir. 7. ai maggior prezzi, le metterai sotto i prezzi minori, e le differenze che sono dalle dette lir. 7. ai prezzi minori, li metterai sotto i prezzi maggiori, come nell'allegar degl'argenti dimostriamo, e perche le lir. $6\frac{1}{2}$. non hanno scambio di poterle allegare, perciò stà in tuo arbitrio di allegarle con lir. 8. o con lir. 9. hora allegale con lir. 9. e così facendo, trouarai che

che quãdo pigliarà barili 4. di quel di lir.9. bisognerà che pigli barili 2. di que di lir.8. e barili 2. di quel di lir.6 $\frac{1}{2}$. e barili 1. di quel di lir.5. e barili 2. di que di lir.3 $\frac{1}{2}$. che in tutto ne verrebbe a pigliare barili 11. & esso ne voleva fare barili 60. Procedi hora per modo di compagnie, e trouarai quãto ne douerà pigliare di ciascuna sorte.




Di quel di lir.3 $\frac{1}{2}$. il barile ne torrà barili 10 $\frac{1}{2}$.
 E di quel di lir.5. ne torrà barili 5 $\frac{1}{2}$.
 Di quel di lir.6 $\frac{1}{2}$. ne torrà barili 10 $\frac{1}{2}$.
 Di quel di lir.8. ne torrà barili 10 $\frac{1}{2}$.
 E di quel di lir.9. ne torrà barili 11 $\frac{1}{2}$.

4
2
1
2
—
11.

Per altro modo ancora assai commodo, e bello possiamo peruenire alla notitia di quanti barili di vino torrà di ciascuna sorte, volendone fare vna botte di 60. barili, come di sopra s'è detto. Prima segna i prezzi gradatamente come di sopra s'è fatto, fra i prezzi minori, e i maggiori, tra alquanto più alto, segnarai lir.7. cioè il prezzo che vuoi fare, dipoi allega i prezzi minori cō i prezzi maggiori, in questo modo cioè, allega lir.3 $\frac{1}{2}$. ch'è il minor prezzo con lir.9. ch'è il valore della maggior sorte, e dirai così, lir.3 $\frac{1}{2}$. quanto son meno di lir.7? tu vedi che son meno lir.3 $\frac{1}{2}$. e perciò mette 2 $\frac{1}{2}$. sotto al 5. e sotto all'8. dipoi lega la seconda sorte, dicendo lir.5. quanto son meno di lir.7. tu vedi, che son meno lir.2. quali lir.2. metterai sotto a quel 2 $\frac{1}{2}$. che ponessti sotto all'8. e sotto al 9. dipoi allega la terza sorte, dicendo lir.6 $\frac{1}{2}$. quanto son meno di lir.7? tu vedi, che sono vna mezza lira meno, e però metti $\frac{1}{2}$. sotto quel 2. che è sotto all'8. & al 9. dipoi somma insieme quello che è sotto al 9. farà 6. somma ancora quel ch'è sotto all'8. farà pur 6. e questi salua. Fatto questo, lega i prezzi maggiori con i prezzi minori, dicendo così lir.9. quanto son più di lir.7? tu vedi che son più lir.2. perciò metti lir.2. sotto a lir.3 $\frac{1}{2}$. che è il minor prezzo, & il detto 2. poni anco sotto a lir.5. & a lir.6 $\frac{1}{2}$. dipoi dirai lir.8. quanto son più di lir.7? tu vedi che sono lir.1. più, e perciò metti lir.1. sotto a quel 2. che è sotto a 3 $\frac{1}{2}$. & a 5. & a 6 $\frac{1}{2}$. dipoi somma insieme quello che è sotto alle lir.3 $\frac{1}{2}$. e sotto alle lir.5. & alle lir.6 $\frac{1}{2}$. separatamente, trouarai che ciascuna di esse farà 3. dipoi somma insieme tutte queste somme, cioè 3. 3. e 6. e 6. che saluasti faranno 21. hora procederai per modo di compagnia, dicendo, se in barili 21. ve ne sono barili 3. di quello di lire 3 $\frac{1}{2}$. il barile, quanti barili ne douerà essere in barili

barili 60? moltiplica 60. via 3. fa 180. e questo parti per 21. ne viene 8. $\frac{4}{7}$. e tant barili torrà di quel di lire 3. $\frac{2}{3}$. il barile, dipoi dirai, se in barili 21. ve ne son barili 3. di quel di lire 5. quanti barili ne douerà essere in barili 60?

Opera, trouerai che ve ne douerà essere barili 8. $\frac{4}{7}$. e similmente barili 8. $\frac{4}{7}$. ne douerà torre di quel di lire 6. $\frac{1}{2}$. e nel medesimo modo opererai per i prezzi maggiori dicendo, se barili 21. mi danno barili 6. di quel di lire 8. quanto me ne daranno barili 60? trouerai che te ne daranno barili 17. $\frac{1}{2}$. e barili 17. $\frac{1}{2}$. ne torrà similmente di quel di lire 9. di maniera che noi habbiamo trouato, che torrà della prima sorte barili 8 $\frac{4}{7}$. e della seconda barili 8. e della terza barili 8 $\frac{4}{7}$. e della quarta barili 17. $\frac{1}{2}$. e della quinta barili 17. $\frac{1}{2}$. che in tutto sono barili 60.



Fanne proua, valutando la prima sorte a lire 3 $\frac{1}{2}$. il barile, e la seconda a lire 5. e la terza a lire 6 $\frac{1}{2}$. e la quarta a lire 8. e la quinta a lire 9. trouarai, che in tutto varranno lire 420. si come barili 60. a lire 7. il barile (che è il prezzo, che vuol fare) varrebbero lire 420. Ma alcuni diranno, che questa solutione non si scontra con la prima, e che o l'vna, o l'altra conuien che stia male, e noi diciamo, che ciascuna stà bene, come più facilmente ciascuno potrà comprendere, con questo essemplio, cioè. Fammi di 20. cinque parti, che moltiplicata la prima via 4. la seconda via 5. la terza via 6. la quarta via 7. e la quinta via 8. La somma di detti prodotti faccia 120.

Diuidasi 20. per 5. ne vien 4. per parte, moltiplica poi ciascuna parte via i numeri sopradetti, cioè 4. via 4. e 4. via 5. e 4. via 6. e 4. via 7. e 4. via 8. & i prodotti sommati insieme faranno 120.

Hor per vn'altro modo, diuidasi 20. in cinque parti, e poniamo che la prima parte sia 3. la seconda 5. la terza 4. la quarta 5. e la quinta 3. moltiplica la prima via 4. la seconda via 5. la terza via 6. la quarta via 7. e la quinta via 8. e dipoi somma i prodotti, faranno similmente 120. di maniera che habbiamo dimostrato, che se ben le parti son differenti, le somme de i lor prodotti sono vguale, e questo auuene perche qualche si toglie a vna parte si dà all'altra, e così interuene nella sopradetta propoſta, e ciascuna di dette solutioni stà bene, percioche la domanda non ci astringe a pigliar più d'vna sorte che d'vn'altra; ma pigliar di ciascuna sorte tanto che valutate distintamente secondo i prezzi, i lor prodotti sommati insieme faccino quanto farà a valutare tutte le sorte insieme, secondo quel prezzo che vuol fare.

Propoſitione

Proposizione 34.

VNo si trona staia 50. di grano, che vale lo staio lir. 5. fol. 16. e staia 36. che vale lo staio lir. 5. e staia 30. che vale lo staio lir. 4. e staia 100. che vale lo staio lir. 3. fol. 12. domando quante staia bisognerà mescolare con tutto il sopradetto d'v'n'altra forte, che vale lir. 6 $\frac{1}{2}$. lo staio, acciò che così mescolato vaglia lir. 6. lo staio.

Fà così, vedi prima quanto vale tutto il sopradetto grano, tronarai, che vale lir. 950. vedi hora quanto vale lo staio del mescolato, trouarai, che vale lir. 4. fol. 7. den. 11 $\frac{1}{2}$. ma per fuggir il fastidio di rotti, diremo lir. 4. fol. 8.

Hora dirai così. lo ho grano, che vale lo staio lir. 4 $\frac{3}{4}$. & ancora n'ho di quello, che vale lo staio lir. 6 $\frac{1}{2}$. e ne voglio fare vna certa quantità di staia, che vaglia lir. 6. lo staio, domando quanto torrà di ciascuna forte.

Fà così, poni lir. 4 $\frac{3}{4}$. e verso man destra vn poco lontano poni lir. 6 $\frac{1}{2}$. & infra questi due prezzi, ma alquanto più alto, poni il prezzo, che vuoi fare, cioè lir. 6. dipoi vedi le differenze, che sono dai prezzi, che tu hai, al prezzo, che vuoi fare, e quelle tali differenze le scambiarai, come nel consolar degl'argenti facesti, e trouarai, che quando tu pigliarai $\frac{1}{4}$. staio di quel di lir. 4 $\frac{3}{4}$. ti conuerà pigliare staia 1 $\frac{1}{2}$. di quel di lir. 6 $\frac{1}{2}$. lo staio, vedi adunque per staia 216. che ti tro' i di quel di lir. 4 $\frac{3}{4}$. quanto bisognerà mescolarne di quel di lir. 6 $\frac{1}{2}$. dicendo così, se $\frac{1}{4}$. di staio di quel di lir. 4 $\frac{3}{4}$. ne vuole staia 1 $\frac{1}{2}$. di quel di lir. 6 $\frac{1}{2}$. quanto ne vorrà staia 216 opera, trouarai, che ne douerà pigliare staia 691 $\frac{1}{2}$. di quel di lir. 6 $\frac{1}{2}$. lo staio.

Fanne proua, valuta staia 691 $\frac{1}{2}$. a lir. 6 $\frac{1}{2}$. varrà in tutto lir. 4492. 16. e la staia 216. che haueui prima, tu fai che vagliono lir. 950. che tutto insieme varrà lir. 5442. 16. e questa è la valuta di staia 907 $\frac{1}{2}$. Troua hora quāto varrà lo staio, trouarai, che varrà lir. 5. 19. 11. e doueua valer lir. 6. apunto; ma ricordati, che noi pigliamo den. 11 $\frac{1}{2}$. per vn soldo intero, e perciò non tornano le 6. lire apunto.

Proposizione 35.

LA canna del panno vale 4. duc. e la canna della rascia vale duc. 6. e la canna del velluto vale 10. duc. & vno vuol comprare di queste tre forti robe 80. canne per 480. ducati; si domanda quante canne ne torrà di ciascuna forte. Fà così, troua quanto vale vna canna mescolata di tutte le tre forti, dicendo in questo modo; se 80. canne di mescolato vagliono duc. 480. quanto varrà vna canna? opera, varrà duc. 6. e se pigliasse tutta rascia la qual vale duc. 6. la canna, spenderebbe i detti duc. 480. & hauerebbe 80. canne di rascia; ma perche dice che vuol di tutte tre forti tante canne, che montino duc. 480. perciò è necessario allegare ciascuna, e trouare le differenze del maggiore, del minore, e del mezzano prezzo, per ilche caua 6. ducati, che è il prezzo mezzano di duc. 10. che è il maggior prezzo, resta 4. e questa differenza la darai al panno, dipoi caua 4. ducati che è il prezzo minore di ducati 6. che è il prezzo mezzano resta 2. e questa differenza la darai al velluto, dipoi perche il prezzo mezzano non si può trarre del prezzo della rascia, conuerà trarlo di 10. restarà

restarà 4. e questa differanza la darai alla rascia, e così diremo che quando piglierà 4. canne di panno, piglierà 4. canne di rascia, e 2. canne di Velluto, dividasi hora con tal propositione le dette 80. canne, trouarai che piglierà 32. canne di panno, 32. canne di Rascia, e 16. canne di velluto.

Del consolar dell'Oro. Proposition. 36.

Dimostriamo al presente il modo del consolar dell'oro, il quale è molto simile a quello dell'argento, ma per maggiorcinte lligenza del lettore, formaremo le sequenti proposte.

Vno si troua lir. 8. d'oro di carati 16. e lo vuol mettere al fuoco, & affinarlo tanto, che torni libb. 6. si domanda di quanti carati tornerà. Sappi che questi due principali metalli, cioè oro, & argento, se son messi nel fuoco per affinarli sempre calano di peso, fin tanto che il Rame che in essi è incorporato se ne va, e quando con l'oro fusse incorporato dell'argento, e che quel tal'oro si metta al cimento reale, l'argento ancora si conumarà.

Horatornando al proposito nostro, multiplica 8. libbre via 16. carati, fa 128. e questo parti per libb. 6. che vuol che torni in vltimo quando sarà affinato, ne viene $21\frac{1}{3}$. e così dirai che il dett'oro tornerà di carati $21\frac{1}{3}$. Auuertisci, che quando la proposta fuissi data in tal modo, che partendo per libbre, che vuol che torni, ne venisse più di 24. allora dirai che sia buona proposta, perciòche l'oro fino non passa 24. carati, & in 24. parti, nominate carati, è diuisa la sua maggior finezza,

Ogni volta, che tu mescolarai insieme più forti d'oro, o d'argenti, e voglia sapere a che lega, o finezza torneranno così mescolati, multiplica sempre i pesi di ciascuna sorte via la sua lega, e quelle tali multiplicationi sommale insieme, e quella tal somma la partirai per la somma de' pesi di tutte le dette sorti, e quello che ne verrà sarà la lega, ouero finezza, che torneranno così mescolati.

Propositione 37.

VNo si troua once 16. d'oro di carati 18. si domanda quanto Rame tiene in tutto.

Dirai così, da 18. carati per fino in 24. carati (che è la maggior finezza) v'è carati 6. perchè se si conosce, che in vn'oncia del sopra dett'oro vi sia incorporato carati 6. di Rame. Laonde dirai così se in vn'oncia di tal'oro v'è carati 6. di Rame, quanto ne farà in 16. once? multiplica 16. via 6. fa 96. e tanti carati di Rame dirai che sia in 16. once, e perchè ogni 24. carati fanno vn'oncia, adunque li 96. carati faranno once 4. di Rame, & il resto farà oro fino.

Propositione 38.

VNo si troua once 16. d'oro di carati 19. e prima che l'affinasse pesaua once 20. domando di che finezza era prima. Fa così, multiplica 16. via 19. fa 304. e questo parti per 20. ne viene $15\frac{1}{5}$. e di tanti carati erano prima le 20. once.

Propositione

Proposizione 39.

VNo si troua onçe 20. d'oro di carati 15 $\frac{1}{2}$. lo vuol affinar tanto, che torni onçe 16. domando di quanti carati tornerà, multiplica 20. via 15 $\frac{1}{2}$. fa 310. e questo parti per 16. ne vien 19. e tanti carati tornerà.

Proposizione 40.

VNo si troua onçe 15. d'oro di carati 16. lo mette al fuoco, e tornò di carati 20. si domanda quant'onçe peso così affinato. Fa così, multiplica 15. via 16. fa 240. e questo parti per 20. ne vien 12. e tant'onçe peso così affinato.

Proposizione 41.


VNo si troua oro di carati 16. lo mette al fuoco, e tornolli di carati 20. e peso onçe 12. si domanda quant'onçe era prima. Fa così, multipl. 20. via 12. fa 240. e questo parti per 16. ne vien 15. e tant'onçe pesaua prima, & il medesimo ordine si terrà nelle proposte degli argenti, a ragion di leghe.

Proposizione 42.

VNo si troua onçe 20. d'oro di carati 16. e lo vorrebbe fare di carati 18. senza farlo colare al fuoco, si domanda quant'oro fino vi douera aggiungere. Fa così, poni sempre da vna parte le finezze dell'oro, o dell'argento, che tu hai, le quali passino la finezza che vuoi fare, e dall'altra parte poni le finezze, che son più basse, e che non arriuanò alla finezza che vuoi fare, & infra le maggiori e minori finezze, ma alquanto più alto, poni la finezza che vuoi fare, dipoi vedi la differenza che è dalla maggior finezza a quella che vuoi fare, e quella tal differenza metila sotto la finezza minore, e così la differenza, che è dalla lega, ouer finezza che vuoi fare alla finezza minore, la metterai sotto la finezza maggiore scambievolmente vna minore con vna maggiore, e succediuamente di grado in grado, trouarai le differenze, e così dirai, che tant'onçe, ouer libbre si torrà di ciascuna, acciò che si faccia la lega, ouer finezza, che si desidera.

Hor al proposito nostro poni K. 16. ch'è la finezza d'oro, che si troui, & vn poco lontano verso man destra poni K. 24. che è la maggior finezza dell'oro, che tu vuoi aggiungere, & infra queste due finezze, ma vn poco più alto, poni K. 18. che è la finezza dell'oro, che vuoi fare, starà come di sotto vedi, dipoi dirai così da 16. a 18. v'è 2. e questo poni sotto a 24. dipoi dirai, da 18. a 24. v'è 6. e questo poni sotto il 16. di modo che si può conoscere, che per ogni 6. onçe, o libb. di quel di 16. k. bisogna che se ne pigli 2. onçe, o libb. di quel di K. 24. che mescolato sarà poi di K. 18. e perciò dirai così, le onçe 6. di quel di K. 16. vuol onçe 2. di quel di K. 24. quanto ne vorrà onçe 20. ch'io me ne trouo di quel di 6. karati? multipl. 20. via 2. fa 40. e questo parti per 6. viene 6 $\frac{2}{3}$. e tant'onçe d'oro fino di 24. carati, bisognerà aggiungere a onçe 20. sopradetti, e sarà di carati 18. in tutto peserà onçe 26 $\frac{2}{3}$.


Vi douerà aggiungere
once $6\frac{2}{3}$. d'oro fino.



Proposizione 43.

VNo si troua Oro di carati 12. 13. 14. 16. 18. 20. 23. 24. e ne vuol far libbre, ouero once 60. di carati 19. domando volen foui mettere di cia scuna sorte, quanto ne douerà torre di ciascuna. Fà come di sotto vedi, metti per ordine tutte le finezze, cominciando dalla minore, per fino alla maggiore, & vltima, dipoi considera la finezza che tu vuoi fare, che è di carati 19. infra quali delle dette finezze si ritroua, tu vedi che si troua tra il 18. & il 20. e così poni 19. infra il 18. e'l 20. ma vn poco più alto, e così verranno poste tutte le finezze che son men di 19. carati da man si sinistra, e tutte le finezze, che son maggiori di 19. carati saranno da mandestra; ancorche non importi, che le minori, o le maggiori sieno più da vna banda, che dall'altra: basta solo che la finezza che vuoi fare, habbia da vn lato tutte le minori, e dall'altro tutte le maggiori finezze, per non generar confusione. Fatto questo, le differenze, che sono da ciascuna delle minor finezze; per fino a 19. carati le metterai sotto alle maggior finezze, e le differenze, che sono da 19. carati per fino a ciascuna delle maggior finezze, le metterai sotto alle minori scambieuolmente, vna minore con vna maggiore, e perche le maggiori finezze son tre, cioè 20. 23. 24. e le minori son cinque, cioè 12. 13. 14. 16. 18. resta 16. e 18. che non hanno con chi allegarsi delle maggiori, che non siano prima allegate, perciò stà in tuo arbitrio le differenze di queste due finezze di accompagnarle con due delle maggiori qual più ti piace, e quando tu allegassi queste due differenze con vna sola delle maggiori finezze qual più ti pareffe, le potresti allegare, che in ogni modo la ragione tornerrebbe, e se ben non tornasse la medesima quantità di libbre, che pigliaresti di ciascuna, basta che intieme giunte farebbono della finezza, la qual intendi fare, cioè di 19. carati; che questo è la sostanza della domanda; si che guarda che non ti caschi nel pensiero di dir come alcuni ignoranti hanno detto, che simili proposte sien false, poiche togliendo quantità d'oro differenti, e mescolandolo, torna d'vna medesima finezza, come mescolandone altre diuerse quantità in vna medesima proposta; e non considerano il libero arbitrio dell'operante, il quale può allegare le minor finezze con quali più li piace delle maggiori, come facendone proua (dando il prezzo alle libbre, ouero once) potrai vedere. Hora tornando al proposito nostro, noi diciamo, che la differenza da 16. a 19. è 3. il quale metterai sotto al 24. e la differenza, che è da 24. a 19. è 5. il qual metterai sotto al 16. dipoi la differenza che è da 18. a 19. è 1. il quale metterai sotto al 23. e la differenza che è da 23. a 19. la quale è 4. metterai sotto al 18. e così haurai trouato, che quando di quel di 12. carati ne pigliarà once 5. di quel di 13. carati ne pigliarà once 4. e di quel di 14. ne pigliarà once 1. e di quel di 16. ne pigliarà once 5. e di quel di 18. ne pigliarà once 4. e di quel di 20. ne pigliarà once 5. e di quel di 23. ne pigliarà once 7. e di quel di 24. ne pigliarà onc. 10. che in tutto ne verrebbe a pigliare onc. 41. & esso ne vuol fare vn corpo di onc. 60. procedi hora per via di compagnie, e trouarai quanto ne douerà torre di ciascuna sorte.

Douerà



Donerà torre della prima forte once $7\frac{3}{4}\frac{1}{2}$, e della seconda once $5\frac{1}{4}\frac{1}{2}$, e della terza onc. $1\frac{1}{4}\frac{1}{2}$, e della quarta onc. $4\frac{1}{4}\frac{1}{2}$, e della quinta onc. $4\frac{1}{4}\frac{1}{2}$, e della sesta onc. $7\frac{1}{4}\frac{1}{2}$, della settima onc. $16\frac{1}{4}\frac{1}{2}$, e dell'ottava onc. $14\frac{1}{4}\frac{1}{2}$.

Proposizione 44.

VNo si troua oro di K. 24. e vorrebbe fare vna tazza, che pesasse onc. $6\frac{3}{4}$, e fusse di K. 18. don ando quant'oro fino torrà, e quanto Rame vi aggiungerà. Fa così, poni che la tazza fusse tutta d'oro fino di 24. carati: multiplica 24. carati via onc. $6\frac{3}{4}$, fa 168. e tanti carati peserebbe la tazza, se fusse d'oro fino, ma perche dice, ch'è di K. 18. però non multiplica 18. via $6\frac{3}{4}$, fa 126. e tanti carati v'è dentro d'oro fino, e la differenza, che è da 126. a 168. la qual'è 42. farà Rame, e perche ogni 24. carati fanno vn'uncia parti 120. per 24. ne vien 5. e onc. 5. torrà d'oro fino, e onc. $1\frac{1}{4}$. di Rame. Poteti fare ancora in quest'altro modo, dicendo, se onc. 1 d'oro di K. 18. tiene di Rame K. 6. quanti ne terrà onc. $6\frac{3}{4}$ multipl. $6\frac{3}{4}$. via 6. fa 42. e questi sono 42. carati di Rame, i quali sono onc. $1\frac{1}{4}$. & il resto per fino in onc. $6\frac{3}{4}$. che v'è onc. 5. farà l'oro fino.

Proposizione 45.

VNo si troua oro di K. 18. e vorrebbe fare vna tazza, che pesasse onc. 9. e fusse di K. 20. si domanda quant'oro fino vi aggiungerà, e quanto terrà di quel di K. 18. Fa così, tu vedi che costui si troua oro di due forti, cioè di K. 18. e di K. 24. cioè l'oro fino; perciò poni K. 18. e contro a questi poni K. 24. & in quel mezzo, ma alquanto più alto, poni K. 20. che è la finezza della tazza, che vuol fare, sopra le differenze, che sono dalla finezza, che vuol fare alle finezze

ze, che si troui, e quelle tali differenze scambiale, dando quella della minor finezza alla maggiore, e quella della maggiore alla minore, come di sotto vedi, e trouarai, che quando pigliarà once 4. di quel di 18. carati, bisognerà che pigli once 2. di quel di 24. carati, quali fusi insieme faranno oro di 20. carati. Procedi hora per via di compagnie, trouarai, che di quel di 18. carati ne torrà once 6. e di quel di 24. carati ne torrà once 3. che giunte queste due forti insieme faranno once 9. di 20. carati.

$$\begin{array}{r} 18 \\ \hline 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 20 \\ \hline 24 \end{array}$$

Proposizione 46.

VNo si troua vna quantità d'once d'oro di K. 15. de' quali vorrebbe fare vna tazzza, che pesasse once 60. e fusse di k. 12. d'oro non lo quanto Rame vi metterà, e quant'once son quelle che si troua di k. 15. Fà così, vedi quant'once d'oro fino si troua in once 60. a 12. carati per oncia, multipl. 12. via 60. fa 720. e tanti carati d'oro fino sono in 60. once, parti hora 720. per 15. carati, ne viene 48. & once 48. diremo che si a l'oro, che si troua di 15. carati, Hora per veder quanto Rame vi aggiunge, caua once 48. d'oro, che si troua di 15. carati, di once 60. che ne vorrebbe fare, resta once 12. e tant'once di Rame vi metterà. Fane prova dicendo, lo mi trouo once 48. d'oro di k. 15. & once 12. di Rame di k. 0. (perche il Rame non è d'alcuna lega, o carati) domando mescolandolo insieme di che lega tornerà, multipl. 15. via 48. fa 720. e questo parti per 48. e 12. più, cioè per 60. ne vien 12. e di carati 12. tornerà mescolato il sopradetto oro.

Sappi, che se tu hauesti di più forte finezza, o pregi di robbe, e tu volessi ridurre a vna finezza, o ver pregio maggiore, che non è ciascuna delle parti, che ti troui, farà impossibile di poterla ridurre senza l'aiuto di maggior finezza, o pregio; e così per il contrario, se tu volessi ridurre a minor finezza, o pregio di ciascuna che ti troui, similmente farebbe impossibile senza l'aiuto di minor finezza, o pregio. Come per essemio, se tu hauesti oro di carati 14. o 16. o 18. e tu volessi far oro di carati 20. non è possibile per lo fare senza l'aiuto di qualche altro oro, che sia più fino, che di carati 20. e così, se tu lo volessi far torrare di carati 12. non è possibile poterlo fare, senza l'aiuto d'altro oro, che sia men fino, che di carati 12. si che bisogna star auuertito nelle proposte.

Proposizione 47.

IO mi trouo libb. 60. d'argento a lega d'once 11. e libb. 50. a lega d'once 10. e libb. 30. a lega d'once 8. e mi trouo anco argento a lega d'once 9. & a lega d'once 7. e vorrei metter tanto di questo di 9. once, e di 5. in tutte le sopradette forti, che tornasse a lega d'once 7. domando quanto ve ne douerò mettere di ciascuna, e quantelbbre ne consolarò in tutto. Questa è la 12. proposta, che mette Fra Luca, e si sforza di soluerla con aggiuntio di Rame, d'oro, e d'argento.

vn pezzo, & anco non la risolue; dipoi replica per vn'altro modo senza aggiuntione di Rame, e si dichiara in buona parte, e poi la lascia nell'arbitrio dell'operante. Hora hauendo noi considerato, che non è da lasciarla senza manifesta solutione, perciò bisogna prima vedere (mescolando tutte le sopradette libbre d'argento) di che lega torneranno, opera, multiplicando le leghe via le libbre, ciascuna da per se, & i prodotti sommati insieme, faranno 1400. e questo parti per la somma delle libbre che sono 140. trouerai che ne verrà 10. e così diremo, che tutte le sopradette libbre 140. d'argento mescolato insieme, farà a lega di once 10. fatto questo dirai così, io mi trouo argento a lega di once 5. & a lega di once 9. e libb. 140. a lega di once 10. & a questo ne vorrei aggiungere tanto di quel di 5. e di quel di 9. leghe, che fusse a lega di once 7. domando quanto torrò di ciascuna forte. Poni le tue leghe per ordine, cioè 5. 9. e 10. e perche la lega che tu vuoi fare, cioè 7. si ritroua infra 5. e 9. perciò poni 7. in quel mezzo, ma alquanto più alto; dipoi vedi le differenze, e scambiale vicissim, come di sotto vedi, e così trouerai che quando si piglierà di libbre 2. di quel di 10. leghe, bisognerà pigliare 5. di quel di 5. leghe, e libbre 2. di quel di 9. leghe; vedi adunque per libbre 140. ch'io me ne trouo di 10. leghe, quanto ne douerò pigliare di 5. leghe, dicendo, se per ogni 1. libb. io ne piglio 5. libb. quanto ne douerò pigliare per libbre 140? multiplica 140. via 5. fa 720. e questo parti per 2. ne viene 360. e tante libbre douerò pigliare di quel di 5. leghe, hora per veder quanto ne piglierò di quel di 9. leghe, tu vedi che per ogni 2. libbre di quel di 10. leghe, bisogna ch'io pigli libb. 2. di quel di 9. leghe, adunque per libb. 140. ne douerò pigliare libb. 140. Fanne proua, multiplica libb. 360. via 5. leghe fa 1750, dipoi multiplica libb. 140. via 9. leghe, fa 1260. dipoi multiplica libbre 140. via 10. leghe fa 1400. somma insieme questi prodotti, fanno 4410. e questo parti per la somma delle libbre, cioè per 630. ne vien 7. e così hauiamo trouato che mescolato insieme torna a lega di once 7. ma secondo l'operatione, e quel che mostra voler risolvere Fra Luca, la proua della sua solutione non tornerebbe, e perciò hauiamo voluto dimostrarre la solutione di tal proposta senza aggiuntion di Rame.

$$\begin{array}{r}
 \overset{7}{\text{r}} \quad \overset{7}{\text{r}} \quad \overset{7}{\text{r}} \\
 \text{5} \text{ --- } \text{9} \text{ --- } \text{10} \\
 \hline
 \text{3} \quad \text{2} \quad \text{2} \\
 \hline
 \text{5}
 \end{array}$$

Proua

350. -- 5.	1750.
140. -- 9.	1260.
140. -- 10.	1400.
630)	4410.

Partitore.

Douerò pigliare libb. 360. di quel di 5. leghe, e libb. 140. di quel di 9. leghe, e tutto il corpo ò bolzone dell'argento farà libb. 630. a lega di once 7. per libbra.

Propositione 48.

VNo si troua once 30. d'oro di K. 16. e ne vuol cauare once 6. di K. 24. domando di che finezza rimarrà il resto, fa così, vedi quant' oro fino si troua in once 30. multiplica 30. via 16. fa 480. k. d'oro fino, e similmete vedi quanti carati sono le 6. once, multiplica 6. via 24. fa 144. e questi le trarrai di 480. resterà

farà 336. il qual partirai per il peso che ti resta, cioè per once 24. ne verrà 14. e di tanti carati dirai che sia il resto. Nota, che se la proposta dicesse, che ne volesse cauare once 20. d'oro fino, cioè di 24. carati, volesse sapere di quanti carati rimanesse il resto, tu hai sempre a vedere done sia maggior quantità di carati d'oro fino. Di sopra, noi habbiamo detto, che in 30. once, vi sono k. 480. d'oro fino, vedi hora in 20. once quanti carati ve ne farebbe, multiplica 20. via 24. fa 480. adunque cauando once 20. cauarebbe tutto l'oro fino, e le 10. once che rimanesse farebbe rame, e se la proposta dicesse, che ne cauasse più di 20. once, farebbe cosa impossibile voler trarre vna cosa di doue non è, perciòche non vi farebbe tant'oro fino, quanto ne vorrebbe cauare.

Propositione 49.

VNo si troua once 30. d'oro di carati 16. costui vi mette dentro once 12. di Rame, si domanda di che finezza sarà tornato. Vedi prima quanti carati d'oro fino si troua in 30. once, multiplica 30. via 16. fa 480. carati, e questo parti per la somma de' pesi, cioè per once 30. d'oro, & once 12. di Rame, che in tutto sono once 42. parti adunque 480. per 42. ne viene $11\frac{2}{3}$. e di tanti carati sarà tornato.

Propositione 50.

VNo si troua once 18. d'oro, e non sò di che finezza sia, lo mette al fuoco, e tornasi once 15. di carati 20. si domanda di quanti carati era prima. Fà così multiplica once 15. che tornò via la sua finezza, cioè via K. 20. fa 300. e questo parti per l'once che era prima, cioè per 18. ne viene $16\frac{2}{3}$. e di tanti K. era prima.

Propositione 51.

VNo si troua once 30. d'oro, e non sò di che finezza sia, ma v'aggiunge once 15. d'oro di carati 20. e così mescolato tornò di carati 16. domando di che finezza erano le 30. once. Fà così, somma insieme tutte l'once che si troua, cioè 30. e 15. fanno 45. e questo multiplica via la finezza, che tornò tutto, cioè via carati 16. fa 720. dipoi fondi once 15. che vi aggiunge via la sua finezza, cioè carati 20. fa 300. e questo caua di 720. resta 420. e questo conuien che sia la fonditura di once 30. (che prima si trouaua) via la sua finezza; parti adunque 420. per 30. ne vien 14. e di tanti carati erano le 30. once.

Propositione 52.

VNo si troua once 30. di carati 14. & once 20. di carati 16. e vorrebbe di queste due sorti fare vn vaso con agguition d'oro fino, il qual vaso fusse poi di carati 20. domando quant'oro fino vi aggiungerà. Fà così, fondi, e mescola insieme once 30. & once 20. e vedi di che finezza tornerà così mescolato, multi-

plica 30. via 14. fa 420. poi moltiplica 20. via 16. fa 320. e questa somma co 420. fa 740. e questo parti per il peso dell'oro, che ti troui, cioè per once 50. ne vien 14 $\frac{2}{5}$. e di tanti carati farà così mescolato. Hora tu vedi quanto Rame dimora in once 50. di tal'oro, e prima vedi quanto ne dimora in vn'oncia, tiali carati 14 $\frac{2}{5}$ di carati 24. resta carati 9 $\frac{2}{5}$. e tanti carati dimora in vn'oncia, moltiplica adunque 9 $\frac{2}{5}$. via once 50. fa 460. e tanti carati di Rame dirai che dimora in 50. once d'oro, che si troua, ma perche dice, che il vaso da farsi vuol che sia di carati 20. adunque in vn'oncia d'oro di quel di carati 20. vi dimorerà carati 4. di Rame, perche dirai così, se carati 4 di Rame consolarano once 1 d'oro di carati 20. quant'once ne consolaranno carati 460? moltiplica 460. via 1. fa pur 460. il qual partito per 4. ne vien 115. e tant'once d'oro dirai che consolarà in tutto, e sarà di carati 20. caua hora once 50. d'oro, che si trouaua prima, d'once 115. che si troua in tutto, resta once 65. e così dirai che vi aggiungerà once 65. d'oro fino di carati 24. & il vaso peserà once 115. Fanne proua mescolando il fino, il quale vi aggiunge, con l'oro che prima si trouaua, e vedrai che tornerà di carati 20.

Propositione 53.

VNo si troua libbre 16. d'argento di leghe 8. si domanda quanto argento fino vi douerà aggiungere volendolo fare a lega d'once 10. Questa è simile alla sopradetta, perciò vedi prima quanto Rame dimora in vna libbra d'argento, che sia a lega d'once 8. tu vedi che da once 8. per fino in once 12. v'è once 4. & once 4. di Rame dimora in vna libbra del sopradetto argento, adunque in libbre 16. vi sarà once 64. di Rame, ma perche vuol far argento di 10. leghe, tu vedi, che in vna libbra di questo argento vi sarà once 2. Rame, perche dirai così, se once 2. di Rame s'incorpora, & allega vna libbra, cioè once 12. d'argento di 10. leghe, quanto argento bisognerà a volerli allegare con once 64. di Rame? moltiplica 64. via 12. fa 768. e questo parti per 2. ne viene once 384. che sono libbre 32. e tanto peserà tutto l'argento, e sarà a lega d'once 10. caua hora libbre 16. d'argento, che si trouaua prima, di libbre 32. restano libbre 16. e tante libbre d'argento fino vi doueua aggiungere, e sarà a lega di 10. once.

Propositione 54.

VNo vuol fare vna tazza d'oro, che pesi once 8 $\frac{1}{2}$. e che sia di carati 16. domanda quant'oro fino, e quanto Rame li bisognerà. Fa così, moltiplica 16. carati via once 8 $\frac{1}{2}$. farà 140. carati d'oro fino, e questo parti per 24. perche 24. carati fanno vn'oncia, ne viene 5 $\frac{2}{3}$. e tant'once d'oro fino li bisognerà, hor per sapere quanto Rame vi andará, caua once 5 $\frac{2}{3}$. d'once 8 $\frac{1}{2}$. restano once 2 $\frac{2}{3}$. e tant'once di Rame li bisognerà.

Propositione 55.

VN' Orefice ha accattato da vn' altro libbre 2. once 6. denari 20. e grani 9. d'oro di carati 20 $\frac{1}{2}$. e ne li vuol render d'vn'altra forte, che è di carati 24.

domanda quant'once ne li douerà rendere. Fa così, multiplica l'oro, che ha accattato via la sua finezza, & il prodotto parti per carati 16. trouarai, che ne verrà libb. 3. onc. 3. den. 12. e grani $13\frac{1}{2}$ e tant'oro li douerà rendere di 16. carati.

Proposizione 56.

VNo si troua once 4. e den. 20. d'oro di carati 18. & once 18. di carati 20. & once 7. den. 4. di carati 21. si domanda volendo fondere insieme di quanti carati tornerà, e quanto varrà la libbra, valendo l'oncia di 22. carati duc. 8. Fa così, vedi di quanti carati tornerà il sopradetto oro mescolandolo insieme, multiplica il peso di ciascuna sorte da per se, via la sua finezza, ouero carati, & i prodotti sommati insieme, fanno 597 $\frac{1}{2}$. e questi parti per la somma delle sopradette once, che sono in tutto once 30. ne viene $19\frac{1}{2}$. e di tanti carati sarà tornato il sopradetto oro mescolato. Hora per vedere quel che val. la libbra, dirai così se l'oncia di carati 22. vale 8. ducati, quanto varrà l'oncia di carati $19\frac{1}{2}$? multiplica, e parti, trouarai, che ne verrà ducati $7\frac{3}{4}$. e tanto varrà vn'oncia, troua dipoi la valuta d'vna libbra, multiplicando $7\frac{3}{4}$. via 12. farà ducati $86\frac{1}{4}$. per la valuta d'vna libbra.

Proposizione 57.

VNo si troua vn'oncia d'oro di carati 18. e lo vorrebbe fare di carati 22. senza aggiuntion d'oro fino, si domanda quanto li tornerà a peso. Fa così, tu sai che vn'oncia è diuisa in 24. denari, per il che multiplica 18. via 24. fa 432. e questo parti per la finezza, che vuol fare, cioè per carati 22. ne viene $19\frac{1}{2}$. e tanti denari li tornerà vn'oncia, e sarà di 22. carati.

Proposizione 58.

VNo si troua vno scudo di carati 21. il qual pesa 3. denari, cioè $\frac{1}{2}$. d'oncia, e vale lir. 7. fol. 10. Si domanda quanto varrà vn'altro scudo, che pesa den. 3. e grani 2. & è di carati 22. Fa così, dicendo, se di carati 21. vale lir. 7. fol. 10. che varrà di K. 22? opera, varrà lir. 7. 17. $\frac{1}{2}$. e tanto varrebbe se pesasse 3. denari appunto, ma perche pesa più, dirai così, se lo scudo pesasse 3. den. varrebbe lir. 7. 17. $\frac{1}{2}$. ma perche pesa den. 3. e grani 2. quanto douerà valere? multiplica, e parti ne verrà lir. 8. 1. 8. $\frac{1}{2}$. e tanto varrebbe lo scudo di maggior peso, e finezza.

Proposizione 59.

VNo haueua vna quantità d'oro di carati 16. lo messe al fuoco, e quando lo leuò, trouò che pesaua once 100. d'oro fino, si domanda quant'once era prima, che lo mettesse a fondere. Fa così, multiplica once 100. via 24. perche l'oncia dell'oro fino tiene 24. carati) farà 2400. e questo parti per 16. carati che era prima, ne viene 150. e tant'once dirai che fusse prima, che lo fondesse.

Proposizione

Proposizione 60.

LA libbra dell'Argento fino vale *lir. 56.* e la libbra del Rame vale *soldi 24.* & vno vuol batter moneta a lega di *once $3\frac{1}{2}$.* domando valendo il quattrino *4.* denari, quanti quattrini cauarà d'vna libbra. Fa così, dicendo, se *onc. 12.* d'argento costano *lir. 56.* quanto costaranno *onc. $3\frac{1}{2}$?* opera, costaranno *lir. 16. 6. 8.* dipoi tu vedi che in vna libbra di detti quattrini vi farà *onc. $8\frac{1}{2}$.* di Rame, il quale a *soldi 24.* la libbra varrà *sol. 17.* quali aggiunti a *lir. 16. 6. 8.* fanno *lir. 17. 3. 8.* e tanto varrà vna libbra tra Rame, & Argento, delle quali ne farai quattrini a *60.* quattrini per lira, trouarai che faranno quattrini *1031.* e tati ne cauarà d'vna libbra. Ma se la proposta dicesse, che spendesse in manifattura *sol. 30.* non si deue aggiungere i detti *sol. 30.* alle sopradette lire, come ha fatto Filippo Calandri, Autore veramente buono, ma perche non s'è dichiarato in nissuna delle sue proposizioni, perciò non possiamo sapere qual sia stata la sua intentione, nientedimeno argueremmo così, che se l'Artefice battesse i detti quattrini senza premio alcuno, conuerrebbe pur che d'vna libbra d'argento a lega di *once $3\frac{1}{2}$.* (valutàdo l'argento, & il Rame come di sopra) egli ne trahesse quattrini *1031.* perliche ne segue, che dandoli poi *sol. 30.* per sua manifattura, peruenga nelle mani del proprio padrone *sol. 30.* meno, & il detto Calandri ha aggiunto qualche spende in manifattura alla valuta dell'argento, e del Rame, e dice, che d'vna lira di detta moneta, ne cauarà tanti quattrini, quanti sono la valuta d'vna libbra d'argento di leghe *$3\frac{1}{2}$.* insieme con la manifattura. Ma se nella sua proposizione hauesse detto così, che spendendo *sol. 30.* in manifattura, quanti quattrini conuerrebbe che cauaſſe d'vna libbra di detto argento a voler stare in capitale, per poter assegnare al proprio padrone *1031.* quattrini, allora conuerrebbe aggiungere la detta spesa, come forse ha voluto intendete egli stesso, ma non s'è dichiarato.

Proposizione 61.

E Dicendo la libbra dell'argento fino vale *lir. 56.* e la libbra del Rame vale *sol. 24.* & vno vuol batter giuli a lega d'once *$10\frac{1}{2}$.* e costa di manifattura *lir. 4.* per libbra, e vuol guadagnare il *$\frac{1}{4}$.* del suo capitale, si domanda quanti giuli douerà battere con vna libbra di detto argento, valendo il giulio *sol. 13. den. 4.* Fa così dicendo, se *once 12.* d'argento fino, vagliono *lir. 56.* quanto varranno *once $10\frac{1}{2}$?* opera varranno *lir. 49.* dipoi vedi quanto varrà *once $1\frac{1}{4}$.* di Rame, che dimora in vna libbra di detto argento, trouarai che varrà *sol. 2.* i quali aggiungerai a *lir. 49.* & anco vi aggiungerai *lir. 4.* che spende in manifattura, faranno in tutto *lir. 53. sol. 3.* Nota che in questa si conuiene aggiungere la spesa, perciò che vuol cauar tanti giuli d'vna libbra, che guadagni il *$\frac{1}{4}$.* del suo capitale, e per suo capitale s'intende anco la spesa; piglia adunque il *$\frac{1}{4}$.* di *lir. 53. sol. 3.* & aggiungilo, farà in tutto *lir. 66. sol. 8. den. 9.* e di queste lire ne farai giuli, opera, faranno giuli *99.* & auanzarà *sol. 8. den. 9.* di detto argento, e tanti giuli bisognerà che caui d'vna libbra d'argento, a voler guadagnare il *$\frac{1}{4}$.* del suo capitale.

Proposizione 62.

VNo si troua onçe 30. d'oro di k. 15. & onçe 20. di k. 18. e vorrebbe di queste due forti farne vn corpo, e metterui tanto rame, che fusse di K. 12. domando quanto rame vi aggiungerà, e quanto peserà tutto l'oro in vltimo.

Fà così, fondi le due forti d'oro sopradetto, e vedi quanti carati d'oro fine dimora in tutte due le forti, trouarai che vi farà k. 8 10. d'oro fine, e lui dice, che vi vuole aggiungere tanto rame, che sia di k. 12. adunque ogni 12. carati d'oro fine consolarà vn'oncia tra oro, e Rame, per la qual cosa, parti 8 10. per 12. ne viene $67\frac{1}{2}$. e tant'onçe peserà in vltimo l'oro, che intende voler fare, e perche le prime due forti pesauano insieme onc. 50. aduque vi douerà aggiungere onc. $17\frac{1}{2}$. di rame.

Proposizione 63.

VNo si troua oro di due forti, etra tutte due pesano vna libbra, e la libbra del migliore vale duc. 96. e la libbra del men buono vale duc. 60. l'ha venduto tutto, e n'ha hauuto duc. 84. si domanda quant'onçe n'hauera di ciascuna forte.

Fà così, poni duc. 96. e duc. 60. & in questo mezzo, ma alquanto più alto, poni duc. 84. dipoi vedi le differenze, e scambiale, come più volte s'è detto, operando come se fussero leghe, o carati, trouarai, che quando gli darà onçe 14. di quel di duc. 96. la libbra, gli douerà dare onçe 12. di quel di duc. 60. la libbra; ma lui dice, che non ne vende se non onc. 12. tra tutte le forti, procedi hora per modo di compagnia, e trouarai, che quel di duc. 96. la libbra pesò onc. 8. e quel di duc. 60. pesò onc. 4. fanno proua valutandolo.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 8 \quad 4 \\
 9 \quad 6 \quad \quad 0 \quad 0 \\
 \hline
 2 \quad 4 \quad \quad 1 \quad 2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 2 \quad 4 \\
 1 \quad 2 \\
 \hline
 3 \quad 6
 \end{array}
 \end{array}$$

Hauera onçe 8. d'oro del migliore, e del men buono n'hauera onc. 4.

Proposizione 64.

VNo si troua oro di due forti, che tutte due pesano libb. 5. e la libbra del migliore vale duc. 96. e la libbra del men buono vale ducati 60. costui vende queste 5. libbre d'oro, e ne ricoue ducati 400. si domanda quanto n'hauera di ciascuna forte.

Fà così, vedi prima quanti ducati vende la libbra così mescolato, parti 400. per 5. ne viene 80. e tanti ducati vende la libbra l'vn per l'altro, dipoi poni duc. 96. e duc. 60. & infra questi due prezzi (ma alquanto più alto) poni 80. dipoi scambiale le differenze, & opera, come nella sopradetta, trouerai che della miglior forte ha uera libbre $2\frac{1}{2}$. d'oro, e della men buona n'hauera libbre $2\frac{1}{2}$.

Proposizione

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 80 \\
 \overline{) 96} \\
 20 \\
 \hline
 16
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 20 \\
 \overline{) 16} \\
 36
 \end{array}
 \end{array}$$

Propositione 65.

VNo si troua argento di quattro sorti, cioè a lega di once 6. di 9. di 10. e d'11. e ne vorrebbe fare libbre 100. a lega di once 8. e vorrebbe metterui dentro libb. 20. di quel di 10. leghe, si domanda quante libbre torrà di ciascuna dell'altre tre sorti. Perche dice che di quel di 10. leghe ne vuol mettere libbre 20. però t'è forza trouare quanto ne metterà dell'altre sorti. Riduci le tre sorti leghe cioè 6. 9. 11. a lega d'8. mettendo 8. infra 6. e 9. ma alquanto più alto, scambiando poi le differenze, come più volte s'è dimostrato, trouarai, che di quel di 6. leghe ne torrà 4. e di quel di 9. ne torrà 2. che in tutto ne torrà 6. e farà a lega d'8. e questo saluarai. Dipoi riduci la lega di 6. e di 10. a lega d'8. scambiando le differenze del modo sopradetto, trouarai, che piglierà libb. 2. di quel di 6. quando libb. 2. di quel di 10. che faranno libb. 4. a lega di once 8. & esso vi vuol mettere libb. 20. di quel di 10. leghe, adunque vi metterà ancora libb. 20. di quel di once 6. che in tutto faranno libb. 40. dalle quali fino in libb. 100. che ne vorrebbe fare, vi manca libb. 60. e queste si deuono distribuire nell'altre tre sorti, hora per sapere quanto torrà di quel di 6. di quel di 9. e d'11. opera per modo di Compagnia dicendo, di quel di 6. ne piglia libb. 4. quando di quel di 9. ne piglia libb. 2. e di quel d'11. ne piglia libb. 2. che in tutto ne piglia libb. 8. e uoi voleuamo che ne pigliasse libb. 60. trouarai che di quel di 6. leghe ne piglierà libbre 30. e libb. 30. ne prese con la lega del 10. che in tutto fa 50. e tanto ne piglierà di quel di 6. leghe, e di quel di 9. ne piglierà libb. 15. e di quel di 10. ne piglierà libbre 20. e di quel d'11. ne piglierà libbre 15. che in tutto faranno libbre 100. Fanne proua.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 8 \\
 \overline{) 60} \\
 15 \\
 \hline
 45
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 4 \\
 \overline{) 60} \\
 2 \\
 \hline
 8
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 8 \\
 \overline{) 100} \\
 20 \\
 \hline
 60
 \end{array}
 \end{array}$$

Propositione 66.

VN Mercante si troua vna Verga d'oro di libbre 25. $\frac{1}{2}$. il qual Oro tiene per libbra once 7. $\frac{1}{2}$. d'argento, & once 7. $\frac{1}{2}$. d'oro, & il resto è Rame, e troua della libb. dell'oro ducati 94. $\frac{1}{4}$. e della libbra dell'argento ne troua libb. 50. $\frac{1}{2}$.

Si domanda quanto monterà detta verga. Fa così, prima vedi quant'oro si troua in detta verga, dicendo, se in vna libbra di detta verga, si troua onçe $7\frac{1}{2}$. d'oro, quanto ne farà in libb. $25\frac{1}{2}$. opera, trouarai, che vi farà libb. 15. onçe $4\frac{1}{2}$. d'oro il quale valutarai a due. $94\frac{1}{2}$. la libbra, monterà due. 1459. 14. $10\frac{1}{2}$. dipoi per vedere quanto argento vi farà, dirai così, se in vna libbra di detta verga, v'è incorporato onçe $3\frac{1}{2}$. d'argento, quanto ne farà in libb. $25\frac{1}{2}$? opera, trouarai, che vi farà libb. 7. onçe $5\frac{1}{2}$. d'argento, il qual valutarai a lit. 50. $\frac{1}{2}$. la libbra; monterà lit. 377. 13. 11. delle quali farai ducati a lit. 7. per ducato, faranno duc. 53. 19. 1. $7\frac{1}{2}$. e questi l'aggiungerai con duc. 1459. 14. $10\frac{1}{2}$. sopradetti, faranno in tutto ducati 1513. 14. e tanto diremo, che monterà detta verga, non prezzando il Rame.

De'Viaggi.

Nel seguente Trattato si dimostrerà il modo, e maniera di soluere alcune proposte di Viaggi, mediante le quali ne possono formare infinite, anchora non siano casi occorrenti; nientedimeno, per ornamento dell'opera, e per soddisfazione dei Lettori, e studiosi formaremo le sequenti proposte, e prima.

Proposizione 1.

VNo si parte da Pescia per andare a Fiorenza, & ha in borsa vna quantità di grossi, costui giunse a Serraualle, si messe a giocare, e vinse tanto, che d'ogni grosso, che haueua ne fece 4. per la qual cosa allegro spese 5. grossi per suo vitto, partissi poi da Serraualle, e caminando giunse alla Furba, e quindi si pose a giocare, e vinse tanto, che d'ogni grosso che gli restò a Serraualle ne fece 4. e spese 5. grossi in beueraggio, dipoi si parte dalla Furba, e caminando giunse in Fiorenza, & andatosene in Baldracca, si pose a giocare, e vinse tanto, che d'ogni grosso, che gli restò alla Furba, ne fece 4. e spese per la Cena, & alloggio 5. grossi e la mattina quando fù leuato guardò nella borsa, e la trouò vota di denari, si domandò a con quanti grossi si parti da Pescia. Fa così, comincia dall'ultimo viaggio quando restò senza denari; tu vedi, che di necessità bisogna che gli ultimi 5. grossi, che spende siano tra capitale, e vincita, & il capitale conueni che sia tal quantità, che multiplicato via 4. faccia 5. apunto. Troua adunque vn numero, che multiplicato via 4. faccia 5. e per trouar tal numero parti 5. per 4. ne vien $1\frac{1}{4}$. e così dirai, che quando giunse in Baldracca haueua grossi $1\frac{1}{4}$. adunque con tanti grossi si parti dalla Furba, doue haueua speso 5. grossi, ai quali aggiuntoui grossi $1\frac{1}{4}$. che gli restò, fanno $6\frac{1}{4}$. e tanti grossi si trouò hauere alla Furba, tra quella che vi portò, a quelli che vinse, hor per sapere quanti n'haueua quando giunse alla Furba, parti $6\frac{1}{4}$. per 4. (perche d'ogni grosso ne fà 4.) ne viene $1\frac{1}{4}$. e con tanti grossi giunse alla Furba, adunque con i medesimi si parti da Serraualle, per il che si conosce, che prima, che a Serraualle spendesse 5. grossi, si trouaua tra capitale e vincita grossi $6\frac{1}{4}$. e volèdo sapere qual fuisse il suo primo capitale, parti $6\frac{1}{4}$. per 4. ne viene $1\frac{1}{4}$. e con tanti grossi dirai che si parti da Pescia il buon Mariuolo; e se la proposta dicesse, che d'ogni grosso ne facesse 5. o 3. &c. partiresti per 5. e per 3. quel che tu hai partito per 4. e verrebbe soluta benissimo la proposta. Fanne proua, e lo vederai.

Proposizione

Propositione 2.

VNo si parte di Fiorenza con denari, e v'è al Mercato d'Empoli, e d'ogni 7. fece 4. dipoi si parti, & andò a Castel Fiorentino, e de' denari, che si trouò d'ogni 7. fece 8. e dipoi andò a Siena, e d'ogni 10. fece 12. & alla fine si trouò duc. 240. si domanda con quanti ducati si parti di Fiorenza. Fà così, dicendo, se guadagnando d'ogni 10. si fà 12. a voler trouare qual sia il capitale di 240. bisogna riuoltar la proposita, e dire, se 12. tra capitale, e guadagno vien da 10. proprio capitale, da che capitale verrà 240. n moltiplica 240. per 10. fà 2400. il qual parti per 12. ne vien 200. e tanti denari haueua quando si parti da Castel Fiorentino. Trouiamo hora con quanti denari giunse in detto luogo; dicendo così, se 8. tra guadagno, e capitale vien da 7. capitale, da che capitale verrà 200. moltiplica 200. via 7. fà 1400. il qual parti per 8. ne viene 175. e con tanti denari si parte d'Empoli; Trouisi hora con quanti denari vi giunse, dicendo così, se 4. tra guadagno, e capitale, vien da 3. di capitale, da che capitale verrà 175. n moltiplica 175. via 3. fà 525. il qual partito per 4. ne viene 131 $\frac{1}{4}$. e con tanti ducati si parti di Fiorenza.

Propositione 3.

VNo si parte da Fiorenza con denari, e v'è a Siena per trafficare i detti denari, in tante mercantie, e guadagna 20. per cento, ritorna poi in Fiorenza, e spende nel viaggio il $\frac{1}{4}$. di tutto quello che si ritrouaua, e li restò duc. 100. si domanda con quanti ducati si parti di Fiorenza. Fà così, poni che si partisse di Fiorenza con 200. ducati, con i quali guadagna a ragione di 20. per cento, adunque guadagna duc. 40. aggiungili a 200. faranno duc. 240. e di questi cauaue il $\frac{1}{4}$. per le spese che fà nel ritorno, restano duc. 180. e noi voluiamo che restassero duc. 100. Laonde dirai così, se duc. 180. nu restano da duc. 200. ch'io m'approfi, da quanti ducati mi resteranno duc. 100. moltiplica 100. via 200. & il prodotto parti per 180. ne viene 111 $\frac{1}{4}$. e con tanti ducati si parti di Fiorenza.

Solui la in quest'altro modo, e prima troua vn numero, che trattome il $\frac{1}{4}$. resti 100. Fà così, agginngi il $\frac{1}{4}$. di 100. farà 133 $\frac{1}{4}$. e con tanti denari diremo, che si parti di Siena, de' quali se ne trarrai il $\frac{1}{4}$. che spese per il viaggio, restaranno 100. apunto, dipoi noi habbiamo che in Siena guadagno 20. per cento, per il che d'ogni 100. duc. ne fece 120. cioè d'ogni 5. fece 6. trouiamo adunque il capitale di 133 $\frac{1}{4}$. dicendo così, se 120. tra guadagno, e capitale vien da cento puro capitale, da che capitale verrà 133 $\frac{1}{4}$. ouero dirai così, se 6. vien da 5. da che verrà 133 $\frac{1}{4}$. opera, trouarai che quando giunse in Siena, si trouaua duc. 111 $\frac{1}{4}$.

Propositione 4.

VNo si parte di Fiorenza con denari, e v'è a Siena, e trafficando i suoi denari in mercantie guadagna a ragione di 20. per cento, e del guadagno spende ducati 40. & anco di detto guadagno le resta duc. 32. si domanda con quanti ducati si parti di Fiorenza.

fa

Fà così, somma insieme ducati 32. che li resta del guadagno, con ducati 40. che spende, fanno ducati 72. con i quali bisogna trouare il suo capitale, dicendo così, se ducati 30. di guadagno vengono da ducati 100. di capitale, da che capitale verranno ducati 72. di guadagno? opera, trouarai che verranno da duc. 360. e con tanti ducati disemo che si parti di Fiorenza.

Proposizione 5.

VNo si parte di Fiorenza con denari, e va à Siena, e li raddoppia, e spende duc. 15. dipoi si parte, e va à Pisa, e di 12. fa 14. e spende ducati 20. dipoi si parte, e va à Lucca, e perde a ragione di 20. per 100. e spende duc. 40. e restali duc. 150. si domanda con quanti ducati si parti di Fiorenza. Fà così, aggiungi ducati 40., che spende in Lucca, con ducati 150. che gli resta, fanno ducati 190. e tanti ducati haueua quando hebbe perso a ragione di 20. per 100. Troua hora quanti n'haueua prima che perdesse, dicendo così, se duc. 40. prima che perdesse erano duc. 100. quanti erano duc. 190. prima che perdesse? multiplica 190. via 100. & il prodotto parti per 80. ne viene 237. $\frac{1}{2}$. e tanti ducati haueua quando giunse in Lucca, ma perche in Pisa ne spese 20. aggiungi 20. con 237. $\frac{1}{2}$. fanno ducati 257. $\frac{1}{2}$. e questi si trouò hauere quando di 12. fece 14. troua hora con quanti ducati giunse in Pisa dicendo, se 14. vengono da 12. da che verranno 257. $\frac{1}{2}$. multiplica 257. $\frac{1}{2}$. via 12. & il prodotto parti per 14. ne viene 220. $\frac{1}{2}$. e con tanti ducati giunse in Pisa, ma perche in Siena ne spese 15. aggiungi 15. con 220. $\frac{1}{2}$. fanno 235. $\frac{1}{2}$. e tanti ducati si trouò in Siena quando hebbe raddoppiato quelli che vi portò, piglia adunque la metà di 235. $\frac{1}{2}$. ne viene 117. $\frac{1}{4}$. e con tanti ducati dirai, che si partisse di Fiorenza, e se la solucrai per le false positioni, ti verrà anco facilissima.

Proposizione 6.

VN Giocatore si parte di Fiorenza con vna quantità di grossi in borsa, e giunge a Prato, e mettesi a giuocare, e vince tanto, che d'ogni grosso, che haueua ne fece 3. e spese in vitto 4. grossi, dipoi si parte da Prato, e va à Pistoia, e mettesi a giuocare, e d'ogni grosso, che gli restò in Prato, ne fece 3. e spese in vitto 4. grossi, dipoi si parte di Pistoia, e va à Pescia, e mettesi a giuocare, e vince tanto, che d'ogni grosso ne fa 3. e spende in vitto 4. grossi, dipoi si parte da Pescia e va à Lucca, e ponli a giuocare, e vinse tanto che d'ogni grosso ne fece 4. e spese in vitto 4. grossi; e la notte mentre che dormina gli fu tolta la borsa con i denari, doue era dentro 20. grossi, e la mattina il pouero giocatore si trouò senza denari, si domanda con quanti grossi si parti da Fiorenza.

Fà così, comincia dall'ultimo, quando gl'è tolta la borsa, doue era 20. grossi, e 4. grossi haueua speso nella Cena, adunque prima che cenasse, si trouaua tra capitale, e vencia 24. grossi, e per trouare con che capitale giunse a Lucca, tu sai che d'ogni grosso ne fece 3. adunque 24. grossi vennero da capitale d'8. grossi, i quali si trouano partendo 24. per 3. e così dirai, che con 8. grossi si partisse da Pescia, ma hauendone spesi 4. in Pescia, aggiungili a 8. che ne portò seco fanno 12. e tanto in Pescia tra capitale, e vencia; e per sapere con che capitale giunse in Pescia, parti 12. per 3. ne vien 4. e con tanti grossi giunse in Pescia; Laonde


nc

ne segue, ehe con 4. grossi si partisse di Pistoia, e perche in Pistoia ne spese 4. aggiungili a quei 4. che portò seco fanno 8. e tanti grossi si trouò in Pistoia tra capitale, e venticita; e volendo sapere con che capitale giunse in Pistoia, parti 8. per 3. ne vien $2\frac{2}{3}$. e con tanti grossi si parti da Prato; ma perche in Prato ne spese 4. aggiungili a $2\frac{2}{3}$. che portò seco, fanno $6\frac{2}{3}$. e tanti grossi si trouò in Prato tra capitale, e venticita; e volendo hora sapere con che capitale giunse a Prato, parti $6\frac{2}{3}$. per 3. ne viene $2\frac{2}{3}$. e con tanti grossi si parti di Fiorenza. Potemasi soluer la sopradetta proposta per altre regole; come per la cosa, e per le false positioni, o vogliamo dire regole del Cataino, ma perche delle regole della co'a non è nostra intentione volerne trattare, e le regole del Cataino non l'habbian o ancor dimostrato, & ogn'altro modo, che hauessemo obseruato si seria forse generato confusione al Lettore, però c'è patto a proposito soluerla per regola del Gambero, cioè col tornarè addietro, operando come s'è dimostrato.

Propositione 7.

VN Mercante si parti di Fiorenza per far tre viaggi a guadagnare e'n suoi denari, e nel primo viaggio d'ogni ducato ne fece 2. e spese 4. ducati, e nel secondo viaggio d'ogni 2. ducati, che gli restò ne fece 5. e spese 4. ducati, e nel terzo viaggio d'ogni 4. ducati, che gli restò del secondo viaggio, ne fece 7. e spese 4. ducati, & alla fine di tutti tre i viaggi guardò quanti ducati haueua, e trouò che non haueua piu, nè meno di quelli che portò di Fiorenza, si domanda con quanti ducati si parti di Fiorenza, e quanti n'haueua in ogni viaggio. Fa così, perche nel primo viaggio d'un ducato ne fa 2. metti 1. sopra il 2. e perche nel secondo viaggio di 2. fa 5. metti 2. sopra il 5. e perche nel terzo viaggio di 4. fece 7. metti 4. sopra il 7. e perche in ogni viaggio spese 4. metti 4. sotto a ogni viaggio, come di sotto vedi. Fatto questo moltiplica li tre nominatori l'vno via l'altro, cioè 1. 2. 4. dicendo 1. via 2. fa 2. e questo poni sopra il detto 2. il quale moltiplica poi via 4. fa 8. e questo poni sopra il detto 4. dipoi moltiplica li tre denominatori l'vno via l'altro, cioè 3. 5. 7. dicendo 3. via 5. fa 15. e 7. via 15. fa 105. e di questo ne trarrai la moltiplicatione dell'i denominatori cioè 8. resta 97. e questo sarà partitore. Hor per trouar la partitione farai così, moltiplica 8. che è sopra il terzo viaggio, via li 4. ducati che spese nel medesimo terzo viaggio, fa 32. e questo metti da parte, poi moltiplica 2. che è sopra il secondo viaggio, via 2. ducati che spese nel medesimo secondo viaggio, fa 8. e questo moltiplica via 7. che è nel terzo viaggio fa 56. e questo mette da parte, dipoi moltiplica 1. che sta nel primo viaggio via 4. ducati che spese nel medesimo viaggio fa 4. e questo moltiplica via 5. che sta sopra nel secondo viaggio, fa 20. e questo moltiplica via 7. che sta nel terzo viaggio fa 140. e questo metti da parte, dipoi aggiungi insieme le tre moltiplicationi che ha messe da parte, cioè 32. 56. e 140. faranno 228. il qual parti per 97. ne viene $2\frac{2}{97}$. e tanti duc. portò di Fiorenza, e per saper quati duc. haueua in ciascun viaggio, fa così, perche d'ogni ducato nel primo viaggio fa 3. adunque di duc. $2\frac{2}{97}$. ne sarà $7\frac{4}{97}$. e perche ne spende 4. restano $3\frac{5}{97}$. e nel secondo viaggio, d'ogni 2. fece 5. adunque di $3\frac{5}{97}$. ne fece $7\frac{4}{97}$. e perche ne spende 4. restano $3\frac{5}{97}$. e nel terzo viaggio d'ogni 4. fa 7. adunque di $3\frac{5}{97}$. ne sarà $6\frac{4}{97}$. ma perche ne spende 4. restano $2\frac{2}{97}$. Questa è l'ultima parte, e sta si può soluer per le false positioni, ponendo che quando si parte di Fiorenza habbia quella quantità di ducati che piu ti piace.

Propositione



$$\begin{array}{r} 105 \\ 8 \\ \hline 97 \end{array}$$


$$\begin{array}{r} 32 \\ 56 \\ 140 \\ \hline 222 \\ 344 \\ \hline 222 \end{array}$$

Quando si parti di Fiorenza haueua $\text{duc. } 2\frac{1}{7}$.

Proposizione 8.

VN mercante si parti di Fiorenza per far tre viaggi alle fiere a guadagnar co i suoi denari, e nel primo vlaggio d'ogni 2. ducati fece 3. e spese 6. duc. e nel secondo viaggio, de' ducati che gli restò, d'ogni ducato si fece quattro, e ne spese 8. e nel terzo viaggio d'ogni tre ducati fece 5. e ne spese 9. & alla fine di tutti tre i viaggi, trouò, che non haueua se non la metà de' ducati, che portò di Fiorenza, si domanda quanti ne portò.

Fà così, perche nel primo viaggio d'ogni 2. duc. ne fece 3. metti 2. sopra 3. e di sotto metti li 6. duc. che spese, e perche nel secondo viaggio d'ogni ducato ne fece 4. metti 1. sopra 4. e sotto metti duc. 8. che spese, e perche nel terzo viaggio d'ogni 3. den. ne fece 5. metti 3. sopra 5. e di sotto metti den. 9. che spese, come di sotto vedi. Fatto questo multiplica li tre nominatori, cioè 2. 1. 3. l'vno via l'altro, dicendo 2. via 1. fa 2. e poni sopra il detto 1. dipoi multiplica quel 2. che ponesti sopra 1. via 3. farà 6. e poni 6. sopra il detto 3. e perche dice che alla fine de' viaggi trouò la metà de' denari, che portò di Fiorenza, però piglia la metà di quel 6. che ponesti sopra il terzo viaggio, che la metà di detto 6. è 3. e questo salua, dipoi multiplica li tre denominatori, cioè 3. 4. 5. l'vni via l'altro fanno 60. e di questo caua li 3. che saluasti, resta 57. e questo salua, che sarà il partitore. Hora bisogna trouare la partitione. Fà così, multiplica 6. che stà sopra il terzo viaggio, via den. 9. che stanno di sotto fa 54. e questo metti da parte, dipoi multiplica 2. che stà sopra il secondo viaggio, via 8. che stà di sotto, cioè via 8. den. che spese, fa 16. e questo multiplica via 5. del terzo viaggio fa 80. e questo metti da parte, dipoi multiplica 2. del primo viaggio, via duc. 6. che gli stà di sotto, fa 12. e questo multiplica via 4. del secondo viaggio, fa 48. e questo multiplica via 5. del terzo viaggio fa 240. e questo metti da parte. Hora somma insieme tutti tre quei prodotti, che hai messi da parte, cioè 54. 80. 240. fanno 374. e questo parti per 57. che saluasti per tuo partitore ne viene $6\frac{1}{7}$. e con tanti duc. si parti di Fiorenza. Fanne proua trouarai, che al fine de' 3. viaggi si trouò duc. $3\frac{1}{7}$.



$$\begin{array}{r} 60 \\ 3 \\ \hline 57 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ 80 \\ 240 \\ \hline 374 \\ 6\frac{1}{7} \end{array}$$

57. partitore.

Quando si parti di Fiorenza haueua $\text{duc. } 6\frac{1}{7}$.

Nota

Nota bene il soprauett'ordine, perciòche mediante quello potrai soluere qual-
 siuoglia propoſta di viaggi, la qual concludetſe che alla fine ſi trouaſſe la terza
 parte, o la quarta, o la quinta, di quello che portò ſeco, quando ſi parti della ſua
 Terra, dipoi offerua l'ordine ſopradetto, e mai ti fallirà.

Propoſitione 9.

VNo fece due viaggi, & al primo viaggio raddoppiò i ſuoi denari, & al ſecon-
 do viaggio di 3. fece 4. e trouoſſi in tutto duc. 160. ſi domanda con quanti
 ducati ſi parti di caſa ſua. Ancorchè per altri diuerſi modi ſi poſſa ritrouar la ſo-
 lutione ci ſon ili propoſte, nientedimeno ne diremo ſtarenno vn ſolo, il quale giu-
 dichiamo eſſer il più facile; operaremo adunque col tornare indietro, e diremo
 coſi; ſe nel ſecondo viaggio d'ogni 3. fa 4. ne ſegue, che 3. ſia capitale, e 4. ſia ca-
 pitale, e guadagno inſieme; però dirai coſi, ſe 4. tra guadagno, e capitale vien da
 3. di capitale, da che capitale uerra 160. che è pur guadagno, e capitale, multi-
 plica 3. via 160. fa 480. e queſto parti per 4. ne vien 120. e tanti ducati ſi trouò al-
 la fine del primo viaggio; hora perche dice che nel primo viaggio raddoppiò i
 ſuoi denari ne ſegue che i detti 120. duc. ſino il doppio di quelli che portò; per-
 ilche piglia la metà di 120. la qual è 60. e tanti ducati dirai, che hauetſe quando
 ſi parti di caſa.

Propoſitione 10.

VNo fece tre viaggi, & al primo viaggio raddoppiò i ſuoi denari, & al ſecon-
 do viaggio guadagnò a ragione di 10. per cento, & al terzo viaggio guada-
 gnò il $\frac{1}{4}$. di quel che ſi trouò al ſecondo viaggio, & in ultimo ſi trouò duc. 240.
 domando con quanti ducati ſi parti della ſua Terra. Potteſti argomentare, che
 partiſſe da caſa con vn ducato, & operare col darli il guadagno, che richiede, ma
 ſoluila per regola del gambero, cioè all'indietro; E perche dice che l'ultimo ſi
 trouò tra guadagno, e capitale duc. 240. e che guadagnò il $\frac{1}{4}$. di quel che ſi trouò
 alla fine del ſecondo viaggio, perciò noi diremo che quella quantità, che ſi trouò
 alla fine del ſecondo viaggio, fu capitale di 240. e perche altre volte s'è det-
 to, che chi guadagna il $\frac{1}{4}$. del ſuo capitale, guadagna il $\frac{1}{5}$. di quel che ſi troua,
 perciò piglia il $\frac{1}{5}$. di quel che ſi troua, cioè di duc. 240. ne vien 48. e queſto è il
 guadagno del terzo viaggio, che hebbe il ſecondo viaggio, e noi proporranno, che
 in queſto ſecondo viaggio guadagnafſe 10. per cento, che è il $\frac{1}{10}$. del ſuo capita-
 le, e chi guadagna il $\frac{1}{10}$. del ſuo capitale, guadagna $\frac{1}{11}$. di quel che ſi troua,
 adunque guadagnò $\frac{1}{11}$. di 240. che è $18\frac{2}{11}$. e queſto è il guadagno del ſecondo
 viaggio, cauà $18\frac{2}{11}$. di 200. reſta $181\frac{8}{11}$. e queſti ſon i denari che ſi trouò
 fatto che hebbe il primo viaggio, e perche ſi diſſe che al primo viaggio raddop-
 piò i ſuoi denari, adunque duc. $181\frac{8}{11}$. ſono il doppio de' denari che portò,
 per ilche piglia la metà di $181\frac{8}{11}$. la quale è $90\frac{4}{11}$. e queſti li trattar di ducati
 ſi $90\frac{4}{11}$. reſtano ducati $90\frac{4}{11}$. e con tanti ducati dirai, che ſi partiſſe della
 ſua terra.

Proposizione 11.

VNo fece tre viaggi, & al primo raddoppiò i suoi denari, e spese 12. & al secondo viaggio raddoppiò l'auanzo, e spese 14. & al terzo viaggio guadagnò il $\frac{1}{2}$. di quel che gli restò nel secondo viaggio, e spese 20. e restò senza denari, si domanda quanti denari haueua prima. Soluerai questa come la passata, cominciando dall'ultimo viaggio, e tornando indietro, e perche al fine del terzo viaggio spende 20. ducati, e resta senza denari; ne segue che i detti 20. duc. sieno capitale, e guadagno del terzo viaggio, e volendo trouare quale sia il capitale solo, fa così, tu sai, che s'è detto che chi guadagna il $\frac{1}{2}$. del suo capitale, guadagna il $\frac{1}{2}$. di quel che si troua; caua adunque il $\frac{1}{2}$. di 20. resta 10. e 10. duc. conuien che gli resti al secondo viaggio, doppo che spese duc. 14. e perciò aggiungi duc. 14. a duc. 10. fanno duc. 24. e 24. ducati si trouò hauere nel secondo viaggio prima, che ne spendesse 14. quali 30. duc. son capitale, e guadagno del secondo viaggio, e per trouare qual sia il suo capitale, tu sai che si disse che nel secondo viaggio raddoppiò i suoi denari, adunque li 30. duc. furono il doppio di quelli che gli restò nel primo viaggio, per la qual cosa si conosce, che al primo viaggio gli restò la metà di 30. cioè 15. e perche in questo primo viaggio spese duc. 12. aggiungi 12. con 15. fa 27. e duc. 27. furono capitale, e guadagno del primo viaggio inanzi che ne spendesse 12. hora questi duc. 27. sono il doppio del primo capitale, perche ne segue, che il primo capitale sia duc. 13 $\frac{1}{2}$. e tanti duc. haueua quando si parti da casa.

Proposizione 12.

VNo fa 3. viaggi, & al primo raddoppia i suoi denari, e spende duc. 16. & al secondo viaggio di 2. fa 3. e spende duc. 24. & al terzo viaggio spende a ragione di 20. per cento, e spese duc. 12. & alla fine si trouò hauere in borsa duc. 4. si domanda con quanti ducati si parti da casa. Soluerai questa come l'antidette, cominciando dall'ultimo viaggio, e tornando indietro come il gambero; argomentando così, che se nell'ultimo viaggio gli restò 4. duc. doppo che n'habbe spesi 12. ne segue che inanzi che gli spendesse n'hauesse 16. e questi duc. 16. gli restorno al terzo viaggio, doppo che hebbe perso a ragione di 20. per cento, e già tu sai che chi perde 20. per cento, perde il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, perde il $\frac{1}{5}$. di ciò che si troua duc. 16. adunque perde, tanto quanto è il $\frac{1}{5}$. di 16. cioè 4. quali aggiungi a 16. fanno 20. e questi sono li duc. che gli restò al secondo viaggio, doppo che hebbe speso duc. 24. aggiungi adunque duc. 20. che gli restorno con duc. 24. che spese, fanno duc. 44. e tanti duc. si trouò nel secondo viaggio, prima che ne spendesse 24. e questi duc. 44. son venuti dall'auanzo del primo viaggio, quando di 2. fece 3. perche ne segue che 2. sia capitale, e 3. sia capitale, e guadagno insieme, e perciò dirai così, se 3. tra guadagno, e capitale vien da 2. di capitale, da che capitale verrà duc. 44? multiplica 44. via 2. fa 88. e questo parti per 3. ne viene 29. e $\frac{1}{3}$. e questi duc. 29 $\frac{1}{3}$. son quelli che gli restorno del primo viaggio, doppo che hebbe speso duc. 16. aggiungi adunque duc. 16. che spende, con duc. 29 $\frac{1}{3}$. che gli restò, fanno duc. 45 $\frac{1}{3}$. e tanti duc. si trouò prima che ne spendesse 16. e perche si disse che nel primo viaggio raddoppiò i suoi denari, adunque se pigliarai la metà di 45 $\frac{1}{3}$. hauerai li ducati, che costui haueua da se, cioè duc. 22 $\frac{1}{3}$. Fanne proua, e o vedrai.

Proposizione

Proposizione 13.

VNo fece due viaggi, e nel primo viaggio guadagnò la radice del suo capitale, & al secondo guadagnò alla ragione del primo, & alla fine si trouò ducati 60. si domanda con quanti ducati si partì. Fa così, poni che si partisse con vna quantità di ducati, che habbia radice discreta, hor poni che partisse con ducati 25. pigliane la radice, che è 5. e tanto viene a guadagnare nel primo viaggio, aggiungi detto guadagno a 25. fa 30. e tanti ducati si trouò alla fine del primo viaggio, e perche al secondo viaggio dice che guadagna alla ragione del primo, e perche nel primo guadagna 5. che è il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, cioè di 25. così ancora nel secondo viaggio viene a guadagnare il $\frac{1}{5}$. di 30. che è il capitale, il qual si troua nel principio del secondo viaggio, piglia adunque il $\frac{1}{5}$. di 30. che è 6. aggiungilo a detto 30. fa 36. adunque alla fine del secondo viaggio si trouarebbe ducati 36. e noi habbiamo detto, che si trouò ducati 60. perche diui di così, se ducati 36. tra guadagno, e capitale del primo, e secondo viaggio, vengono da ducati 25. di capitale, da che capitale viene ducati 60. che gli restò? moltiplica, e parti, trouarai, che ne verrà ducati 41 $\frac{1}{5}$. e con tanti ducati dirai che si partisse da casa.

Fanne proua in questo modo, perche 41 $\frac{1}{5}$. non ha radice discreta, perciò comincia dall'ultimo viaggio, e torna indietro, e perche si troua rra capitale, e guadagno ducati 60. e nel primo viaggio si pose, che guadagnassi il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, il quale douea guadagnare ancora nel secondo viaggio, volendo guadagnare alla ragione del primo, adunque se nel secondo viaggio guadagna il $\frac{1}{5}$. del suo capitale, cioè di quel che troua alla fine del primo viaggio, ne segue che venga a guadagnare il $\frac{1}{5}$. di quel che si troua nel secondo viaggio, e perche si troua ducati 60. adunque ne guadagna il $\frac{1}{5}$. che è 10. per la qual cosa cava 10. di 60. resta 50. e questo fu il capitale del secondo viaggio o vogliamo dire il capitale, e guadagno del primo viaggio, adunque alla fine del primo viaggio si trouò ducati 50. e perche si disse che nel primo viaggio guadagnò della radice del suo capitale, e noi potremmo per detta radice $\frac{1}{5}$. e chi guadagna $\frac{1}{5}$. del capitale, ne segue che guadagni $\frac{1}{5}$. di quel che si troua, e perciò trouandoli ducati 50. a pigliarne il 6. che è 8 $\frac{1}{5}$. il qual tratto di 50. resta 41 $\frac{1}{5}$. come voluano: Piu bella, e n'astrenole sarebbe stata a soluerla per la cosa, ma già noi hauiamo detto non volermi trattare.

Proposizione 14.

VNo si parte da Casa sua con 12. grossi, e camina alquante miglia, & ad ogni miglio raddoppia in suoi denari, e spende 12. grossi, e giunto a vn certo termine del viaggio, si trouò senza denari, si e mandò quante miglia caminò. Fa così cerca di trouare le miglia intere, in questo modo, raddoppia 12. fa 24. cauane 14. resta 12. & hai già vn miglio, di poi raddoppia il rimanente, cioè 12. fa 24. cauane 12. resta 10. & hai già due miglia, e due rimangono, cioè, che li 12. grossi (nel primo miglio) si non mancati vn grosso, e nel secondo si non mancati due, e queste intendantio minutioni, hora raddoppia il rimanente, cioè

cioè 10. si 20. cauane 14. resta 6. & hai 3. miglia, e 3. minutioni, cioè la prima 1. la seconda 2. e la terza 4. che sono in continua proportionalità dupla, e si come la minutione del secondo miglio è dupla alla minutione del primo, cioè 2. a 1. così ancora tu vedi che la minutione del terzo miglio, che è 4. e doppia alla minutione del secondo miglio, che è 2. e consequentemente la minutione del quarto miglio deu'esser doppia alla minutione del terzo miglio, adunque la minutione del quarto miglio farebbe 8. ma non può minuir tanto, perciò che se tu raddoppi il rimanente, che è 6. farà 12. del quale non se ne può cauare 14. e però cauare le 3. minutioni giunte insieme, cioè 1. 2. 4. che fanno 7. cauare 7. di 12. resta 6. conuien che si minuisca appunto, acciò che resti nulla, adunque si bisogna trouare la minutione del quarto miglio, che è 8. come di sopra s'è detto, hor vedi 6. che parte sia d'8. trouarai che sarà $\frac{3}{4}$. adunque conuerà fare $\frac{3}{4}$. miglio, per il che concluderemo che facesse miglia $3\frac{3}{4}$. e restò senza denari.

Fanne proua, tu fai che alla fine di 3. miglia li resta 6. grossi, e se caminaua il quarto miglio li raddoppiua; che farebbono 12. de' quali non potrebbe spendere 14. ma perche tal solutione non si può dare senza l'aiuto della proportionalità, delle quali non hauendo noi trattato, nè meno intendiamo volerei ingolfare in esse, atteso che vogliamo solamente attendere all'utilità comune, della pratica mercatoria; perciò se ben da noi saranno formate assai proposte, le quali in Pratica non possono accadere, nulladimeno lo facciamo a fine di dilettere alcune volte a i Lettori; hora tornando al nostro proposito, diciamo che secondo esse proportionalità nel quarto miglio, non raddoppia i suoi denari, perche non camina vn miglio intero, ma camina solamente $\frac{3}{4}$. d'un miglio, per la qual cosa di 4. viene a far 7. adunque di 6. ne farà $10\frac{1}{2}$. e tanti grossi si farà in $\frac{3}{4}$. d'un miglio, & esso deu' spendere $\frac{1}{2}$. di 14. che sono $10\frac{1}{2}$. adunque gli viene a spendere tutti, e così resta senza denari.

Molte altre proposte di viaggi si potrebbe addurre, ma parendoci hauerne addotte a bastanza, faremo fine, e daremo principio col nome di Dio a dimostrare, che cosa sia Radice quadra, e come d'ogni numero si possa trarre la radice, o discreta, o sorda; e l'approssimante di esse radici, le quali in Aritmetica, e Geometria seruono a soluere infinite proposte, e questioni, cosa veramente bella, e degna d'esser messa in pratica da ciascuno; perciò che i Colonnelli, i Capitani, & i Sargenti, & ogni Officiale di guerra, fino a ogni minimo soldato, douerebbe procurar d'imparare a trarre la radice quadra di qualsiuoglia numero, per il gran beneficio, che ne può loro apportare, la qual serue a saper mettere con prestezza in ordinanza vna battaglia quadra, e quanti soldati bisogna metter per fila; serue ancora a conoscer le distanze, l'altezza, e profondità, & a molti altre cose importantissime.

Il Fine del Quarto Libro.

LIBRO 305

QUINTO

Del modo di trarre la Radice quadra di qualsiuoglia numero.



ADICE quadra non è altro (secondo Lionardo Pisano) che vn numero, il quale multiplicato in se medesimo faccia quel numero apunto, del quale vuoi trarre la Radice, come per esempio, la Radice quadra di 4. è 2. & il 4. si chiama numero quadrato, & il 2. si dice esser la radice quadra di detto 4. e se volessimo la Radice quadra di 16. diremo che sia 4. perche multiplicato 4. in se medesimo fa 16. & è proprio, come se volessimo dire vna superficie piana quadrata, la qual per ogni lato sia 4. braccia, dentro alla qual

superficie si descriueranno 16. quadretti a modo di scacchiere, i quali faranno vn braccio per ogni lato, adunque 16. farà numero quadrato, e 4. farà la sua radice, e la radice di 25. farà 5. e di 36. la radice sarà 6. auuertendo, che non tutt'i numeri hanno radice discreta, come per esempio se volessimo la radice di 20. diciamo non poterli trouare per apunto, e darla per numero; ma si può ben dare per linea con dimostratione geometrica, e queste tali Radici, le quali non si possono dar per numero, son dette da tutt'i Professori di queste discipline Radici sforde. Di tutt'i numeri adunque si possono trarre le radici, le quali faranno, o discrete, o sforde, ma le radici discrete non deriuano se non dai numeri quadri.

Hor sia, che volessimo trouare la Radice quadra di 576. In due modi si può trouare la detta Radice, il primo de' quali è questo, cioè a similitudine del partire a Galera, dipennando le figure adoperate; & il secondo modo è a similitudine del partire a danda; e prima come più intelligibile ai principianti dimostreremo il modo che si costuma secondo l'ordine del partire a danda.

Poni 576. come di sotto vedi, e dipoi comincia dall'ultima figura verso man destra, che è 6. fa vn punto sotto il detto 6. dipoi venendo verso man sinistra lascia vna figura, cioè il 7. senza putare, e fa vn puto sotto il 5. e così, se molte figure fussero, delle quali si volesse trarre la radice, andaresti facendo vn punto sotto a vna figura sì, e l'altra no, di quel tal numero: e tanti punti, quanti sarai col detto ordine, tante figure, ouero dighi ti verrò per la radice di quel numero, del quale la vuoi trarre; dipoi farai due linee congiunte a vso di quadra, e quelle le farai da man destra appresso a quel tal numero, del quale vuoi trarre la radice, per segnarti dentro i dighi, ouero figure della radice di tal numero, come di sotto vedi, dipoi comincia da man sinistra due è il 5. che ha il punto otto, e troua vn numero, che multiplicato in se, il suo prodotto s'appressa quanto più può al detto 5. il qual numero sarà 2. e questo 2. lo metterai chiaro a quelle 2. linee, o ri-

che, e gli diremo primo digito. Noi vsaremo dire primo digito, secondo digito, e terzo, e quarto digito &c. per non confondere chi legge; multiplica adunque questo primo digito in se, cioè 2. fa 4. e questo poni sotto il 5. e cauato di detto 5. resta 1. e cō quest' 1. accompagnarai il 7. che segue, farà 17. dipoi raddoppia il primo digito 1. e questo 4. mettilo sotto a detto digito, come vedi, dipoi deui vedere questo duplato, cioè 4. quante volte entra in 17. e n. sta, che bisogna metteruelo tante volte, che auanzi tanto, che accompagnarai l'auanzo col 6. che segue, il quale ha il punto sotto, che faccia tantotra l'auanzo, e quel 6. che se ne possa cauare il quadrato di quelle tante volte che metterai il 4. in 17. che sarà il secondo digito, hora dirai così, quanti 4. ch'ira in 17? tu vedi che vi va 4. volte, & auanza 1. e questo 4. lo metterai dentro alle due linee, e gli diremo secondo digito; dipoi multiplica il secondo digito, cioè 4. via il 4. duplato fa 16. che tratto di 17. resta 1. e con quest' 1. accompagnarai il 6. che segue, farà 16. del quale caua il quadrato del secondo digito, cioè 16. resta 0. ouero nulla, e così diremo che la radice di 576. sia 24. appunto, e quando vengono le radici per l'apunto, senza che auanzi nulla, si chiamano radici discrete, & il numero, del quale s'è tratto tal radice, si chiama numero quadrato.

E volendo cauare la radice quadra di 19025. Fa così, comincia da man destra, e fa vn punto sotto il 5. dipoi vieni verso man sinistra, puntando vna figura si, e l'altra no, cioè ad ogni due figure farai vn punto sotto, & haueai tre punti, per i quali diremo che tre figure, o digiti farà la radice di tal numero, e perche il punto che è a man sinistra contiene due figura, cioè 11. però bisogna trouare la radice d' 11. cioè vn numero, che multiplicato in se il suo prodotto s'appressi più che sia possibile al detto 11. il qual numero, ouero radice sarà 3. e questo tre lo metterai dentro alle due linee, e farà detto primo digito, multiplica poi il detto 3. in se, fa 9. il quale tratto d' 11. resta 2. e con questo 2. accompagnarai il 9. che segue del numero che vuoi prender la radice, farà 29. dipoi raddoppia il primo digito 3. e questo poni sotto al primo digito; cerca poi d'investigare questo 6. quante volte entra in 29. trouarai che v'entra 4. volte, & auanza 5. & al detto 4. gli si dirà secondo digito, il qual metterai dentro alle due linee, dipoi con il 5. che auanza accompagnarai il 0. puntato, che segue dopo il 9. farà 50. e di questo bisogna cauare il quadrato del secondo digito, cioè il quadrato di 4. ch'è 16. caua adunque 16. di 50. resta 34. e con questo 34. si deue accompagnare il 2. che non è puntato, e che segue dopo il 0. farà 342. hora tu hai dentro alle due linee due digiti, cioè 3. e 4. che senza separatione alcuna dicono 34. e questo l'addoppiarai farà 68. il quale segnarai sotto al primo duplato, procura poi d'investigare quante volte il 68. entra in 342. trouarai che v'entra 5. volte, & auanza 1. metti 5. dentro alle due linee, e sia detto terzo digito, e con quel 2. che auanza accompagna il 5. che segue, cioè l'ultima figura puntata farà 25. e di questo 25. bisogna cauare il quadrato del terzo digito, che è 5. & il suo quadrato è 25. caua adunque 25. di 25. resta zero, ouero nulla. Nota, che se di quel che ti resta della sottrattione, con la figura che s'accompagna a detta sottrattione, non facesse tanto che

5 7 6 (4 digiti.

4 4 duplati.

1 7
1 6

1 6
1 6

0.

che tu potessi cauare il quadrato di quel digito, che hai allora alle mani, in tal caso bisogna fare il digito minore. Ma volendo tu imparar presto a trarre la radice quadra di qualsiuoglia numero, procura che ti sia dimostrato il modo da qualcuno che la sappia trarre, altrimenti con lo studio solo, senza operare ti sarà cosa difficilissima. Noi diciamo questo per i principianti, e non per quelli che sono instrutti nella pratica d'Aritmetica, e Geometria; hora al proposito nostro diremo, che la radice quadra del numero sopradetto sia 345. apunto, e questa si dice radice d'intera, perche non auanza cos' alcuna.

Essempio dell' estrattione della radice quadrata.

Numero proposto	1 1 9 0 2 5.	(3 4 5.	Radice.
	9	6	
	2 9	6 8	duplati
	2 4		
	5 0		
	1 6		
	3 4 2		
	3 4 0		
	2 5		
	2 5		
	0 0		

Vogliamo hora dimostrare il modo di trar la Radice quadra di qualsiuoglia numero, secondo l'uso più comune, il quale è a similitudine del partire à Galera. Hor sia che volessimo trar la radice quadra di 119025. punterai le figure, secondo l'ordine sopradetto, e farai due linee, o righe, come nell'altre hai fatto, doue si possa metter dentro la radice, o vero i digitu che ti verranno in tal' operatione: fatto questo comincia à operare da man sinistra, tu vedi che il punto di man sinistra contiene due figure di sopra, cioè 11. e perciò troua la radice di 11. la qual radice sarà vn numero che multiplicato in se, il suo prodotto s'accosti più che si può al detto 11. trouerai che la sua radice sarà 3. e questo 3. lo metterai dentro a quelle due righe, e sarà il primo digito, & anco il detto 3. lo metterai sotto l'11. dipoi moltiplica detto digito, via detto 3. che ponesti sotto l'11. farà 9. il qual 9. senza porlo in alcun luogo, ma con la mente, lo cauera di 11. resta 2. poni 2. sopra il detto 11., e dipenna l'11. & il 3. che gl'è sotto. Fatto questo raddoppia il primo digito che è 3. fa 6. e questo 6. mettilo sotto il 9. che non è puntato, e sopra questo 6. trouerai due figure, cioè vna sopra il detto 6. e l'altra verso man sinistra, le quali non faranno dipennate, cioè il 2. che ti restò, & il 9. che è sopra il 6. le quali congiunte insieme, dicono 29.

studia hora d'investigare quante volte il digito 6. entra in 29. trouarai, che v'entra 4. volte, poni 4. dentro alle due righe, e farà il secondo digito, e similmente metterai il detto 4. sotto il o. che è puntato, dipoi douerai multiplicare il 4. che ponesti sotto il zero, via 6. che ponesti sotto il 9. fa 24. il quale senza porlo in alcun luogo, ma solo con la mente lo cauurai di 29. resterà 5. e poni 5. sopra il 9. e dipenna il 29. e 4. ancora, dipoi quel 5. che t'è auanzato accompagna- to col o. puntato, farà 50. de' quali bisogna cauare il quadrato del secondo digi- to, che è 4. & il suo quadrato è 16. il quale senza porlo in alcun luogo, ma solo co- la mente lo trarrai di 50. resta 34. poni 34. sopra 50. e dipenna il 50. hora a quel 34. che t'è auanzato accompagna il 2. che segue, e che non è puntato, faranno in- sieme 342. dipoi addoppia li due digiti, cioè 34. fanno 68. e questo poni sotto a dirittura del 342. vedi hora quante volte il detto 68. entra in 342. trouarai, che vi- uà 5. volte, e questo 5. lo metterai dentro alle due righe, e farà il terzo digito, & anco lo metterai sotto il 5. puntato, dipoi multiplica detto 5. via 68. fa 340. il quale senza porlo in ale- n luogo, ma solo con la mente lo trouarai, di 342. resta 2. poni 2. sopra 342. e dipenna il detto 342. & anco il detto 5. hora a quel 2. che t'è auanzato, accompagnarai il 5. puntato, farà 25. del quale bisogna cauare il quadrato del terzo digito che è 5. & il suo quadrato è 25. il qual tratto del sopra- detto 25. resta zero, o ver nulla.

E volendo cauar la radice di 32239684. comincia da man destra, e fa vn pun- to sotto la prima figura che è 4. e venendo poi verso man sinistra, ad ogni due figure farai vn punto sotto, che in tutto faranno 4. punti, e cosi diremo, che 4. figure, o ver digiti, ne verrà per la radice di detto numero, e perche il primo punto di man sinistra contiene due figure sopra, cioè 32. però bisogna trouare la radice di 32. e se il punto non contenesse altra figura che quella che fusse sopra a detto punto, allora bisognarebbe che tu trouassi la radice di quella figura sola; hora tornando al nostro operare, troua vn numero, che multiplicato in se, il suo prodotto s'appressi quanto più può a 32. il qual numero sarà 5. e farà il primo di- gito da metterli dentro alle due righe già fatte, come in altre habbiamo detto, & il detto 5. lo metterai ancora sotto al 2. del 32. cioè sotto il punto; fatto questo multiplica il digito in se fa 25. il quale senza porlo in alcun luogo, ma solo con la mente lo trarrai di 32. resta 7. e poni 7. sopra 32. e dipenna il 32. & il 5. che già è sotto, hora il 7. che ti restò di sopra accompagnalo col 2. che segue, e che non apuntato, farà 72. dipoi radoppia il primo digito fa 10. e questo metti sotto a di- rittura del 72. vedi hora questo 10. quante volte entra in 72. il quale non ha dub- bio alcuno che v'entrarebbe 7. volte, ma auanzarebbe 2. che accompagnarai col 3. che segue, e che ha il punto sotto farebbe 23. del qual 23. non li potrebbe cau- are il quadrato del secondo digito, cioè il quadrato di 7. che è 49. come l'ope- rare richiede, e perciò diremo che il 10. in 72. non ci possa per tal rispetto entrar più che 6. volte, e quando ancora al 6. interuenisse di non poter cauare il suo quadrato, diresti che il 10. in quel tal numero entrasse 5. volte &c. hora metti 6. che è il secondo digito, dentro alle due righe, & anco il detto 6. mettilo sotto al 3. puntato, dipoi multiplica detto 6. via 10. fa 60. il quale senza porlo in alcun luogo, ma solo con la mente trarrai di 72. resta 12. poni 12. sopra 72. e dipenna il 72. dipoi al 12. che ti restò acompagnali il 3. che segue, e che è puntato, farà 123. e di questo bisogna cauare il quadrato del secondo digito, che è 6. & il suo quadrato è 36. il qual senza porlo in luogo alcuno, ma solo con la mente lo trou- arai di 123. resta 87. Quando noi diciamo, che il tal numero si deue trarre 5

la mente senza porlo in luogo alcuno, non intendiamo vietare all'operante, che non lo possa porre fuor dell'operatione in qualche altra carta, e quindi trarlo come più gli piace, ma questo si dice per auuertimento, perciò che mescolando tali numeri con li duplati, si potrebbe generar confusione.

Hora tornando all'opera nostra, si disse, che tratto 36. di 123. restò 87. metti adunque 87. sopra 123. e dipenna il 123. & anco il 6. che è sotto il 3. puntato. Fatto questo l'87. che ti restò accompagna col 9. che segue, e che è senza punto farà 879. dipoi addoppia i digiti, cioè 56. fanno 112. e questo metti sotto a 879. con tal'ordine, che il numero venga sotto il numero, e le deciae sotto le decine, e le centinaia sotto le centinaia; dipoi vedi 112. quante volte entra in 879. trouarai che v'entra 7. volte, e questo sarà il terzo digito, il quale metterai dentro alle due righe, & anco il detto 7. lo metterai sotto il 6. puntato; dipoi multipl. detto 7. via 112. fa 784. che senza porlo in tal'operatione, lo trarrai di 879. resta 95. poni 95. sopra 879. e dipenna 879. & anco il 7. Nota, che quando tu multiplicasti 7. via 112. tu poteui così multiplicando trar figura per figura dell'869. come si fa nel partire a galera, ouero battello. Dipoi accompagna 95. con il 6. che segue farà 956. e di questo bisogna cauare il quadrato di 7. cioè il quadrato del terzo digito, che il suo quadrato è 49. il qual tratto di 956. resta 907. e dipenna l'altre figure adoperate, eccetto le figure de'duplati; dipoi a 907. che ti restò accompagna l'8. che segue, farà 9078. poi addoppia li tre digiti, fanno 1134. e questo poni sotto a 9078. con l'ordine detto, e cerca d'inuestigar quante volte 1134. entra in 9078. trouarai, che v'entrerà 8. volte, e quest'8. mettilo dentro alle due righe, che sarà il quarto digito, & il dett'8. mettilo ancora sotto il 4. puntato; dipoi multiplica dett'8. via 1134. e mentre tu lo multiplichi caua il prodotto a poco a poco di 9078. come se fusse vn partire a galera, trouarai che ti restarà 6. e con questo 6. che ti resta, accompagna il 4. che segue farà 64. de' quali bisogna cauare il quadrato d'8. cioè il quadrato del quarto digito, ch'è 64. adunque 64. di 64. resta niente, e così diremo che la radice quadra del suprapostoci numero sia 5678. e con quell'ordine potrai trouare la radice d'ogni maggior numero.

	o	o	o	o		
	x	8	8	8	o	o
	#	x	#	#	#	#
Numero propostoci	x	x	x	x	x	x
	8	o	8	2	#	4
	1	1	1	1	3	

15678. Radice.

Proua delle Radici Quadre.

E Volendo per la proua reale vedere se detta operatione stà bene, multiplica 5678. in se, & al producto si douerebbe aggiunger l'auanzo, quando nell'operatione auanzasse cos'alcuna, e tal producto sommato co' l'auanzo, douerebbe esser vguale al nostro propostoci; ma volendo la proua di tal'operatione, per la proua del 9. o del 7. Togli prima la proua dell'auanzo, che in questa supradetta n. 5 auanza cos'alcuna, e perciò poni zero sopra la crocetta, dipoi togli la proua della radice,

V 3

radice, cioè di 5678. gettando via i nouennari auanza 8. quadralo fa 64. del quale getta via i nouennari auanza 1. e poni 1. sotto la crocetta, dipoi somma 1. che è di sotto, con il 0. ch'è di sopra, fa pur vno, e poni 1. da man destra della crocetta, e con quest' 1. di man destra, si douerà scontrare la proua del propostoci numero, proua adunque il detto numero, gettando via i nouennari auanza 1. come di ragione doueua auanzare, il qual poni al sinistro lato della Crocetta, e se quando li somma insieme il numero sopra la crocetta, con il numero ch'è di sotto facessero piu di 9. conuerrebbe gettare via il 9. e l'auanzo si porrebbe da mano destra, e con quell' auanzo si douerebbe scontrare la proua del numero propostoci.

Par cosa ragioneuole, che dimostriamo il modo di trouar le radici forde, e l'appressamento di esse; hauendo fin qui trattato a bastanza delle radici discrete; Laonde volendo trouare dette radici, troua sempre la propria radice, come sopra s'è detto, e quando l'hauerai trouata, fanne la proua reale, e vedi di quanto passa il numero propostoci, & allora quel piu, cioè la differenza, che sarà dalla moltiplicazione della radice in se, al proposto numero, e tal differenza la partirai per il doppio della prima radice, che trouasti, e quello, che ti verrà per detto partimento, caualo di detta prima radice, & il rimanente sarà la radice seconda di detto numero, assai piu prossima che la prima; e volendola approssimar piu. Fa la proua anco di questa seconda radice, e vedi di quanto supera il numero propostoci, e quel piu che ti verrà, lo partirai per il doppio della seconda radice, cioè di quella, che t'ha dato tal differenza; e quello che ne verrà lo trarrai di detta seconda radice, & il rimanente sarà radice terza, assai piu prossima della prima.

E volendola piu prossima segui successiuamente quest'ordine, e guarda sempre di cauare gli auuenimenti delle pure radici, e non de' duplati, come per essempio.

Troua la propinqua radice di 12. Fa così, troua vn numero, il qual moltiplicato in se, il suo prodotto s'accosti piu che si può al detto 12. trouarai che quel numero sarà 3. e questo diremo che sia la radice di 12 il qual 3. moltiplicato in se fa 9. e di ragione doueua far 12. adunque manca 3. e questo 3. che manca lo porrai sopra vna linea, dipoi raddoppia la radice, cioè 3. fa 6. e questo 6. lo porrai sotto la linea, doue poni sti il 3. starà così $\frac{1}{2}$. schisati sono $\frac{1}{2}$. e così diremo che la prima, e propinqua radice di 12. sia $3\frac{1}{2}$. E sempre che trarrai la radice di qual si uoglia numero, quel numero poi che t'auanzara fuor di detta radice, lo metterai sopra vna linea, & il doppio di tal radice lo metterai sotto a detta linea; che altro non vuol dire, se non partir l'auanzo per il doppio della radice, e quel resto che ne peruiene s'accompagna con la radice di numero intero, e quella poi si dice esser prima radice di quel numero propostoci, e sopra tal prima radice ciascun'operante si ferma, senza trouar la piu propinqua, adunque noi habbiamo trouato che la prima radice di 12. è $3\frac{1}{2}$. fanne proua, moltiplica $3\frac{1}{2}$. in se fa $12\frac{1}{4}$. e noi vorremmo che facesse 12. apunto, per il che supera il detto 12. di $\frac{1}{4}$. e volendo noi trouare la radice piu propinqua, parti quel piu, cioè $\frac{1}{4}$. per il doppio della prima radice, cioè per il doppio di $3\frac{1}{2}$. che è 7. ne viene $\frac{1}{28}$. quale cauurai dalla prima radice, cioè di $3\frac{1}{2}$. resta $3\frac{1}{2}\frac{1}{28}$. e questa sia detta seconda radice di 12. cioè piu prossima che non è $3\frac{1}{2}$. e volendola trouare anco piu prossima, moltiplica questa seconda radice in se, cioè $3\frac{1}{2}\frac{1}{28}$. via $3\frac{1}{2}\frac{1}{28}$. fa $12\frac{1}{784}$. doue tu vedi, che supera 12. di $\frac{1}{784}$. e questo partilo per il doppio della seconda radice,

radice, la qual'è $3\frac{1}{2}$, che il suo duplato è $6\frac{1}{2}$, parti adunque $7\frac{1}{2}$ per $6\frac{1}{2}$, ne viene $1\frac{1}{2}$, e questo canale di detta seconda radice, resta $3\frac{1}{2}$, e questa sarà la terza radice di 12, cioè più propinqua che non è la prima, e la seconda; Fanne prova, trouarai che passerà, e supererà 12. $3\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{2} = 12\frac{1}{4}$, e così faresti per la quarta, e quinta radice, volendola più propinqua, ma è impossibile a trouarla, talmente, che moltiplicata in se faccia il medesimo 12. perche per l'apunto mai si trouarà. E volendo trouare la propinqua radice d'8. Se noi diceffimo, che la radice d'8. fusse 2. facendone proua auanzarebbe 4. si che vedi che ponendo questo 4. sopra vna linea, come nella passata s'è detto, e ponendoli sotto il duplato della radice, cioè il duplato di 2. ch'è 4. starebbe così $\frac{4}{4}$. che significa, & è vn'intero, e però quando in qualisia operatione nel trar delle radici t'auanzarà tanto, quanto il duplato di d. radice, allora ti reggerai secondo l'ordine infra scritto. Perilche volendo trouare la propinqua radice d'8. quell' intero, che ne viene in cambio di rotto, aggiungilo a 2. radice, farà 3. e diremo, che la radice sorda d'8. sia 3. il qual moltiplicato in se fa 9. e noi vorremo, che facesse 8. onde vedi che supera 8. d'1. e questa differenza, cioè 1. partilo per il doppio della radice, che ti dà tal differenza, cioè per il doppio di 3. ch'è 6. ne vien $\frac{1}{6}$. il qua. tratto di 3. resta $2\frac{1}{6}$. per la radice più prossima; si che non si deue rispondere al 3. prima radice, ma alla seconda, ch'è $2\frac{1}{6}$. il quale moltiplicato in se fa $8\frac{1}{9}$. e noi voleuamo che facesse 8. apunto; Hora se tu vuoi trouare la radice, più propinqua, parti il detto superfluo, cioè $\frac{1}{9}$. per il doppio di $2\frac{1}{6}$. cioè per $5\frac{1}{3}$. ne viene $\frac{1}{10}\frac{1}{3}$. il quale cauurai della seconda radice, cioè di $2\frac{1}{6}$. resta $2\frac{1}{6}\frac{1}{10}\frac{1}{3}$, e questa è la terza, e più propinqua radice d'8. che non è $2\frac{1}{6}$. Fane proua, moltiplicando $2\frac{1}{6}\frac{1}{10}\frac{1}{3}$. in se, fa $8\frac{1}{10}\frac{1}{3}$. e se la vuoi più propinqua osserua l'ordine sopradetto.

E volendo trouare la propinqua radice d'vn rotto, bisogna trouare la radice di due numeri, cioè di quello, che stà sopra la riga, il qual si dice denominante, e di quello che stà sotto la riga, al quale si dice denominatore, e dell'vno, e dell'altro bisogna trouare la sua radice, come de'sani s'è detto.

Fra Luca dice, che se l'vno di questi due numeri hauesse radice discreta, e l'altro non l'hauesse, che non si potrebbe per regola pratica trouar detta radice, se non a tastoni; e se, nè l'vno, nè l'altro numero hauesse radice discreta, molto peggiormente si trouarebbe, e noi ancora concorriamo con la sua openione; anzi si soggiunge esser cosa impossibile poter trouare la radice discreta di essi rotti, si come de'sani si disse; ma diciamo bene, che non a tastoni, ma per regola pratica, e ferma si può trouare la propinqua radice di qualsiuoglia rotto, ma non radice discreta, se già i numeri di detti rotti non hauessero ambedue radice discreta, come $\frac{4}{9}$. e $\frac{1}{4}$. e simili, che volendo noi la radice di $\frac{4}{9}$. piglia prima la radice di 4. il quale è sopra la riga, la qual radice è 2. e questo poni sopra vna riga, dipoi piglia la radice di 9. il quale è sotto la riga: la qual radice è 3. e questo lo metterai sotto a quella riga, doue mettesti il 2. starà così $\frac{2}{3}$. e tanto diremo che sia la radice discreta di $\frac{4}{9}$. e volendo la radice di $\frac{1}{4}$. osserua il medesimo ordine, trouarai, che farà $\frac{1}{2}$. e così farai in tutti gl'altri rotti, che haueranno radice discreta.

Ma volendo la radice di $\frac{9}{10}$. Fra Luca dice, che non si può dare per numero; perche solo il 9. che è sopra la riga ha radice, ma il 10. non l'ha, e se tu volessi la radice di $\frac{9}{10}$. manco si può dare, perche nissun di detti numeri ha radice; e noi habbiamo detto di sopra, che è impossibile a trouare le radici discrete di

finali rotti; Laonde non si potendo trarre le radici discrete, non si possono accordar per numero; ma diciamo bene, che non a tatonni (come vuol Fra Luca) ma per regola ferma si può dare la propinqua Radice di $\frac{1}{2}$. e volendola trouare, farai così, multiplica il denominante, via il denominatore, cioè 9. via 10. fa 90. e di questo pigliane la radice, che è quasi $\frac{1}{2}$. e questo partilo per il denominatore, cioè per 10. ne viene $\frac{1}{2}$. e questa sia la più propinqua, e prima radice di $\frac{1}{2}$. Fanne proua, multiplica $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. fanno $\frac{1}{4}$. doue tu vedi, che super-
 $\frac{1}{4}$ di $\frac{1}{2}$.

E volendo la propinqua radice di $\frac{1}{2}$. multiplica il denominante, via il denominatore, cioè 10. via 19. fa 190. e di questo pigliane la radice, che è quasi $13\frac{1}{2}$. e questo parti per il denominatore, cioè per 19. ne viene $\frac{1}{2}$. e questo sia la prima radice sorda di $\frac{1}{2}$. e se tu volessi la radice più prossima, operarai come nei sani facessi, parti la differenza per il doppio della radice, che la dà, e l'aumento caua di d. radice, & il rimanete sarà radice più prossima di quel tal rotto.

E quando tu volessi trouare con prestezza la radice d'un rotto, che il suo denominante fusse vn punto meno del suo denominatore, con $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. $\frac{3}{4}$. e simili, purché il denominante, cioè il numero sopra la riga, sia vn punto uano, e non più, che il numero, il quale sta sotto la riga, perciò che se fusse meno più d'un punto, tal regola non ti seruirebbe.

Hor volendo trouare con prestezza la radice di $\frac{1}{2}$. raddoppia il denominante, cioè 3. fa 6. & a questo aggiungi sempre 1. per regola serua, fa 7. e questo poni sopra vna riga, dipoi raddoppia il denominatore, cioè 4. fa 8. e questo poni di sotto la riga, doue ponessi il 7. starà così $\frac{7}{8}$. e così diemo, che la radice sorda di $\frac{1}{2}$ sia $\frac{7}{8}$. e così farai in tutti gl'altri rotti, e fino a che numero si voglia, purché il numero di sotto alla riga non sia maggiore più d'un punto, del numero di sopra.

E volendo trouare la radice d'un numero il qual fusse accompagnato con vn rotto; come volendo trouare la radice di $12\frac{1}{2}$. diccsi che bisogna ridurre i sani a rotti di quella specie, che è quel tal rotto, che accompagna detto numero, cioè, se il numero sarà accompagnato da quarti; ridurrai i sani a quarti, e se sarà accompagnato da quinti, ridurrai i sani a quinti &c.

Vedi hora 12. sani quanti quarti sono, multiplica 12. via 4. fa 48. & a questo aggiungi quel quarto, che l'accompagna, farà 49. quarti, si che dirai, che $12\frac{1}{2}$ sia $\frac{49}{4}$. e di questo bisogna pigliane la radice, come di sopra nei rotti soli facessi, e perche ambedue i numeri hanno radice discreta, perciò pigli di la radice di 49. la qual è 7. e questo metti sopra vna riga, dipoi prendi la radice di 4. la qual è 2. e questo poni sotto la riga, doue ponessi il 7. starà così $\frac{7}{2}$. che vuol dire sette mezzai, cioè $3\frac{1}{2}$. e questa è la radice discreta di $12\frac{1}{2}$. e così la radice di $13\frac{1}{2}$. è $3\frac{3}{4}$. la qual si troua col medesimo ordine; Nota, che se i numeri ridotti che sono a rotti, l'vno, e l'altro non hauesse radice discreta, o che vn di loro l'hauesse, e l'altro no, seruaua il medesimo, e la regola, come de' rotti soli si è detto, e così non la trouarai a tatonni, e perche l'esperienza è nostra d'ogni cosa, veniam o all'esperienza, e prima per la detta regola troua la radice di $2\frac{1}{2}$. multiplica il numero, che sta sopra la riga, via il numero, che sta sotto la riga, cioè 49. via 4. fa 196. pigliane la radice, ch'è 14. e questo parti per il numero, che è sotto la riga, ne viene $3\frac{1}{2}$. e questa è la radice discreta di $2\frac{1}{2}$. e volendo la radice di $20\frac{1}{2}$. riduci i sani a rotti, faranno in tutto $41\frac{1}{2}$. multiplica il denominante, via il denominatore, cioè 121. via 6. fa 726. di questo pigliane la radice, che è quasi 27. e questo parti per il denominatore, cioè per 6. ne viene $4\frac{1}{2}$. e questo diemo, che sia la propinqua radice di $20\frac{1}{2}$. e volendo trouare la propinqua radice di qual numero

ti piace, e sia accorpiognato con qual siueglia rotto, offerua il medesimo modo, che in questa hai fatto, e volendola più propinqua, parti la differenza per il doppio della radice, che la dà, e l'auuenimento caua di detta radice per regola trouata, e non a rasoni, & il rimanente sarà radice più propinqua.

La Estrattione delle Radici Cube.

Ancorche sia poco necessaria a questa nostra opera l'estrattione delle Radici Cube, nulladimeno non vogliamo mancare di dimostrare che cosa sia Radice Cuba, e come si troui in ciascun numero.

La Radice Cuba non è altro, che vn numero il quale multiplicato per se stesso, & il prodotto multiplicato via detto numero, ouero Radice, faccia il numero propostoci, dal quale si trasse detta Radice, come per esempio se ti fusse detto, Troua la radice Cuba d'8. dicesti, che la radice d'8 è 2. & il 2. si chiama radice, e l'8. si chiama numero cubo, perche multiplicato 2. via 2. fa 4. e questo 4. multiplicato via il detto 2. fa 8. che altro non ci rappresenta, se non vn corpo solido di 6. superficie, cioè 6. faccie, come vn dado, le quali faccie siano per ogni verso 2. braccia; Talche dal multiplicare 2. in se, che fa 4. ne causa la superficie prima d'vna f. l. faccia, e multiplicando poi la superficie d'vna sol faccia, cioè 4. via il medesimo 2. fa 8. e causa il numero cubo, e per maggior intelligenza, propongasi vn dado di pietra, o di qual'altra cosa ti piace, il quale sia lungo 2. braccia, largo 2. braccia, & alto 2. braccia, tornato ad angoli retti, si domanda quante braccia quadre corpore farà; cioè quanti dadi piccoli, che fussero lunghi vn braccio, larghi vn braccio, & alti vn braccio, si formerebbe in quel dado maggiore.

Non ha dubbio alcuno, che ogni semplice huomo conoscerà, che si formerebbe 8. dadi, d'vn braccio l'vno per ogni verso, e perciò se ti fusse detto, egli è vn dado, il qual è 8. braccia cube, cioè corpore, domando quante braccia è per ogni lato.

Il domandare quante braccia sia per lato, non è che domandar la radice cuba d'8. la qual è 2. come di sopra s'è detto, e la radice cuba di 64. è 4. perciò che multiplicato 4. in se, fa 16. e questo multiplicato via il detto 4. fa 64.

Ma volendo noi trouare la radice cuba d'vn numero molto maggiore, la qual radice sia di 3. ouero di 4. figure, doue fa bisogno trouare il numero cubico di ciascuna figura, che si porta dentro alle due righe, cioè d'igiti, i quali ci rappresenteranno la radice cuba del propostoci numero, diciamo, che volendo con prestezza trouare il cubo di essi d'igiti, secondo che l'operatione richiede, si bisogno prima mandar a memoria il numero cubo di ciascun d'igito, da 1. fino a 9. ouero tener questa tavoletta inanzi.

Digit. Numeri cubi di essi d'igiti.

1	—	1
2	—	8
3	—	27
4	—	64
5	—	125
6	—	216
7	—	343
8	—	512
9	—	729

Et acciò che tu veda l'vtilità, che n'apporta la presente tauoletta, propongaſi per eſſempio, che noi voſſimo trouare la radice cuba di queſto numero, cioè 42310542.

Prima comincia da man deſtra, e ſotto l'vltima figura, ch'è 2. farai vn punto, come nelle radici quadre faceſti, dipoi venendo verſo man ſiniſtra laſſa due figure ſenza puntare, che faranno il 4. & il 5. e farai vn punto ſotto il 0. dipoi ſeguendo verſo man ſiniſtra laſſa due figure ſenza puntare, che faranno l'1. & il 3. e fa vn punto ſotto il 2. e coſi procedere, ſe più figure fuſſero, e tanti punti quãti farai con tal'ordine ſotto il numero del quale vuoi trouare la radice, tanti digiti, ouero figure, conuien che ti venga dentro alle due righe per la radice cuba di detto numero; conſiderato, e fatto queſto, tira due linee, ouero righe da man deſtra, come nell'operare delle radici quadre.

Stiamo hora in dubbio, ſe douiamo dimoſtrare tal'eſtrattione di radici cube, ſecondo l'ordine del partire a galera con le figure dipennate, ouero ſecondo l'ordine del partire a danda; purche noi ci riſoluiamo a dimoſtrare il più facile, e men conuſo, il quale ſarà ſecondo l'ordine del partire a danda, doue non vãno figure cancellare, nè ineno ſi deue tenere a mente i tripli, e ſubſcripli; ma baſta hauer a memoria la ſopradetta Tauoletta, ſolamente per trouare i numeri cubici de' digiti.

Veniamo hora all'operatione, comincia da man ſiniſtra, e troua il primo punto, il qual'è ſotto il 2. doue tu vedi, che il detto punto contiene due figure ſopra, cioè il 2. ſopra a detto punto, & il 4. verſo la ſiniſtra parte, cioè 42. Troua hora vn numero, che multiplicato in ſe cubice, il ſuo prodotto ſ'appreſſi più che ſi può al detto 42. Se tu guardi nella tauoletta, trouarai che il detto numero ſarà 3. il qual multiplicato in ſe cubice fa 27. poni 3. dentro alle due righe, e farà il primo digito, dipoi poni 27. ſotto il 42. e caualo di detto 42. reſta 15. e tira giu il 3. figura ſeguente, & accompagnalo al detto 15. farà 153. dipoi quadra il 3. primo digito fa 9. tripla queſto 9. fa 27. vedi hora il detto 27. quãte volte entra in 153. e nota che biſogna che ti vadi tante (le qual volte ci rappreſenteranno il ſecondo digito) e che accompagnato il detto auanzo con l'1. che ſegue, ſe ne poſſa cauare il quadrato del ſecondo digito, & il detto quadrato ancora triplato, & il detto triplato multiplicato via il primo digito. Laonde, ſe noi poſſiamo, che il detto 27. entraſſe 5. volte in 153. non auanzarebbe tanto, che cò l'aggiuntione dell'1. che ſegue ſe ne poteſſe trarre quanto di ſopra ſ'è detto, e però diremo che il 27. entra 4. volte in 153. poni 4. dentro alle righe, e farà il ſecondo digito, il qual multiplicato via 27. fa 108. che tratto di 153. reſta 45. tira giu l'1. che ſegue fa 451. dipoi quadra il 4. ſecondo digito fa 16. tripla 16. fa 48. e queſto multipl. via il primo digito, ch'è 3. fa 144. che tratto di 451. reſta 307. e tira giu il 0. che ſegue, dou'è il punto ſotto ſarà 3070. e di queſto cauane il cubo del ſecondo digito, cioè il cubo di 4. guarda la tauoletta, che ſarà 64. il qual tratto di 3070. reſta 3006. e qui farebbe finita l'operatione della radice con due ſoli digiti, ſe altre figure non vi fuſſero; hora tira giu il 5. che ſegue, fa 30065. dipoi quadra li due digiti inſieme, cioè 34. fanno 1156. tripla queſto fa 3468. hor vedi quante volte 3468. entra in 30065. oſſeruando, che t'auanzi tanto che ſe ne poſſa trarre quel numero, che ſecondo l'ordine che di ſopra ſ'è detto, trouarai che v'entrerà 8. volte, poni 8. dentro alle due righe, che farà il terzo digito, e poi multiplica quell'8. via 3468. fa 27744. il qual tratto di 30065. reſta 2321. e tira giu il 4. che ſegue fa 23214. dipoi quadra il terzo digito cioè 8. fa 64. tripla queſto, fa

192. e questo multiplica via 34. primo, e secondo digito, fa 6528. che tratto di

23214. resta
16686. e tira
giù il 2. vlti-
ma figura, fa
166862. e di
questo caua
il cubo d'8.
vltimo digi-
to, guarda la
tauoletta ch'
è 512. resta
166350. e
questo sarà
l'auanzo, e
348. sarà la
radice cuba
del numero
proposto, &
acciò che
meglio tu l'
apprenda,
qui di sotto
ti si dimo-
stra l'ordi-
ne.

Numero proposto

Radice cuba.

4 2 3 1 0 5 4 2

(348.

2 7

1 5 3

1 0 8

4 5 1

1 4 4

3 0 7 0

6 4

3 0 0 6 5

2 7 7 4 4

2 3 2 1 4

6 5 2 8

1 6 6 8 6 2

5 1 2

1 6 6 3 5 0. auanzo.

E volendo fare la proua reale, multiplica 348. in se, & il prodotto multiplica via detto 348. & a quest' vltimo prodotto aggiungi l'auanzo di detta radice, e tornerà il proposto numero.

Ma volendo per la proua del 9. veder se tal' operatione stà bene, fa così, comincia dall'auanzo e di radice, e getta via tutt' i nouennari, che in esso si troua, trouarai, che auanza 3. fuor de' nouennari, il qual 3. poni sopra la crocetta, poi toglila proua della radice, cioè di 348. che la sua proua è 6. troua il num. cubo di detto 6. multipl. 6. in se, fa 36. e questo multipl. via detto 6. fa 216. e di questo prendi la proua per 9. auanza 0. il qual metti sotto alla crocetta, dipoi somma 3. che è sopra la crocetta, con il 0. che è di sotto fa pur 3. e poni 3. da man destra della crocetta, e se sommando insieme le dette figure, che stanno di sopra, e di sotto della crocetta, facessero piu di 9. getta via il 9. e l'auanzo poni da man destra di d. crocetta, e con quest' auanzo deue scontrarsi la proua del proposto numero.

Hora noi habbiamo 3. dalla destra della crocetta, togli dipoi la proua del proposto numero, gettando via i nouennari, trouarai, che auanza 3. come voleuamo il qual poni dal lato sinistro della crocetta.

Perche a molte propositioni nel pratico operare d' Aritmetica, e Geometria, non si poteua sodisfare senza l'aiuto delle Radici quadre, e cube, e senza la cognitione de' numeri quadrati, perciò hauendone noi per quanto sia di bisogno nell' opere della nostra pratica trattato a sufficienza, daremo principio a formare alcune propositioni di numeri quadrati, e di pregressioni, non perche sieno cose molto occorrenti, ma per ornamento dell' opera, e diletto ai giouani studiosi

dioli di queste discipline, ma prima diremo, che così sia progressione.

Progressione non è altro, che vn'aggiungimento di numeri, ascendendo vguualmente, cominciando dall'vnità, o dal 2. o da altro numero, come poco di sotto intenderai, acciò che la somma di essi numeri prestamente s'abbia; Sappi, che sono due specie di progressioni, vna delle quali è detta continua, ouero naturale, e l'altra è detta intercalata, ouero discontinua; la continua s'intende quando li numeri cominciano dall'vnità, & ascendendo non se ne lascia alcuno, come per esempio 1. 2. 3. 4. 5. 6. &c. doue sempre il numero seguente auanza il numero precedente d'vna vnità sola.

Progressione discontinua s'intende, quando i numeri cominciano pur dall'vnità, & ascendendo dal numero seguente al numero precedente v'è di differenza più d'vna vnità, come per esempio 1. 3. 5. 7. 9. 11. &c. e puole ancor questa hauer principio dal binario, così 2. 4. 6. 8. 10? & anco da altri numeri puol hauer principio.

E volendo con prestezza hauer la somma di tutte l'vnità, che nei lor numeri son contenute, daremo alcune regole, delle quali alcune seruono alla continua progressione, & altre alla discontinua, e dell'vna, e dell'altra sono due regole generali: si come ciascheduna in due diuersi modi può terminare, cioè in numero pari, & in numero dispari, le regole della progressione continua son queste, cioè quando l'ultimo numero di tal progressione sarà numero pari, sempre aggiungi

1. all'ultimo termine, e la somma la moltiplicarai via la metà di detto ultimo termine, & il prodotto sarà sempre tanto quanto la somma di tutt'i numeri ordinatamente posti da 1. per fino all'ultimo termine, si come in questa, dicendo 1.2.3.4.5.6.7.8. noi diciamo che tu aggiungi 1. all'ultimo termine, ch'è 8. fa 9. e questo moltiplica via la metà di detto ultimo termine, cioè la metà d'8. ch'è 4. fa 36. e tanto fanno a sommare insieme tutti li sopradetti numeri; la seconda regola della progression continua è questa, cioè, quando terminasse in numero dispari, come per esempio 1.2.3.4.5.6.7.8.9. all'hora dell'ultimo termine se ne fa due parti, le maggiori che si possa, e la maggior parte si moltiplica via il detto ultimo termine dispari, & il prodotto sarà la somma di tutte l'vnità contenute da 1. per fino all'ultimo termine, e perche questa termina in 9. ne farai due parti le maggiori, che si possa che l'vna farà 5. e l'altra 4. noi diciamo, che tu moltiplichi 5. cioè la maggior parte via 9. che è l'ultimo termine dispari, fa 45. per tutta la somma delli numeri, e se al detto 9. ultimo termine aggiungeui 1. faccua 10. e questo lo moltiplicauì poi via la metà di detto 9. ch'è 4½. faccua parimente 45. di maniera che, o termini in numeri pari, o dispari, aggiungendoui sempre 1. per regola generale, all'ultimo termine, come di sopra s'è fatto, e moltiplicandolo poi via la metà di esso ultimo termine, hauerai la somma dell'vnità contenute in tutti li numeri di detta progressione, e questo basti quanto alla continua, veniamo hora alla discontinua.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 6 \\
 7 \\
 8 \\
 \hline
 36
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 8 \\
 1 \\
 \hline
 9 \text{---} 4 \\
 \qquad \underbrace{\hspace{1cm}} \\
 36
 \end{array}$$

1. per fino all'ultimo termine, e perche questa termina in 9. ne farai due parti le maggiori, che si possa che l'vna farà 5. e l'altra 4. noi diciamo, che tu moltiplichi 5. cioè la maggior parte via 9. che è l'ultimo termine dispari, fa 45. per tutta la somma delli numeri, e se al detto 9. ultimo termine aggiungeui 1. faccua 10. e questo lo moltiplicauì poi via la metà di detto 9. ch'è 4½. faccua parimente 45. di maniera che, o termini in numeri pari, o dispari, aggiungendoui sempre 1. per regola generale, all'ultimo termine, come di sopra s'è fatto, e moltiplicandolo poi via la metà di esso ultimo termine, hauerai la somma dell'vnità contenute in tutti li numeri di detta progressione, e questo basti quanto alla continua, veniamo hora alla discontinua.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 2 \\
 3 \\
 4 \\
 5 \\
 6 \\
 7 \\
 8 \\
 9 \\
 \hline
 45
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 2) 9 \\
 \qquad 5 \text{---} 9 \\
 \qquad \underbrace{\hspace{1cm}} \\
 \qquad 45
 \end{array}$$

Della

Della progressione discontinua similmente si danno due regole, si comincia
due modi possono terminare, cioè in numero,
pari, o dispari, e terminando in numero pari,
come per esempio 2. 4. 6. 8. 10. 12. la regola
è questa dell'ultimo termine, che è 12. prendi-
ne la metà che è 6. e questo multiplica via il
numero, che immediatamente seguita dopo il 6.
qual'è 7. adunque multiplica 6. via 7. fa 42.
e tanto farà la somma di detta progressione
discontinua.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 4 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \\ 12 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2) \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{r} 12 \\ 6-7 \\ \hline 42 \end{array}$$

Ma quando tal progressione finisce in numero dispari, come questa 1. 3. 5. 7. 9. 11.
13. farai così, piglia l'ultimo termine che è
13. e fanne due parti le maggiori, che si può
senza romper l'unità, che l'una farà 6. e l'al-
tra farà 7. noi diciamo, che tu quadri la mag-
giore, cioè 7. fa 49. per la somma di tutte l'
unità da 1. per fino a 13. Vi sono ancora
molte altre regole da trouar la somma di tutte
l'unità tanto della continua, quato della dis-
continua progressione, ma per non tediare i
lettori la lasceremo nella penna.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \\ 5 \\ 7 \\ 9 \\ 11 \\ 13 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2) \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{r} 13 \\ 7-7 \\ \hline 49 \end{array}$$

Delle progressioni proporzionali, e prima della dupla.

Volendo sommare tutta l'unità della progressione dupla proporzionale, come
se fusse 3. 6. 12. 24. dicesti che bisogna cau-
uar 3. che è l'ultimo termine, di 24. che
è l'ultimo termine, resta 21. e questo resto
aggiungasi con il detto ultimo termine,
cioè con 24. fa 45. e tanto farà la somma
di tutte l'unità situate nella progressione
dupla proporzionale:

$$\begin{array}{r} 3 \\ 6 \\ 12 \\ 24 \\ \hline 45 \end{array} \quad \begin{array}{r} 24 \\ 3 \\ \hline 21 \\ 24 \\ \hline 45 \end{array}$$

E se cominciassè da vn, dicendo 1. 2. 4.
8. 16. 32. cauasi 1. di 32. resta 31. qual giu-
to con 32. ultimo termine fa 63. per la
somma di tutte l'unità, e così farai in al-
tre simili, e sieno di che grandezza si vo-
glio, e cominciando da qual numero le
pare, purchè dall'ultimo termine se ne
caui il primo, & il residuo si sommi in-
sieme con l'ultimo termine.

Della Progressione tripla proporzionale.

Volendo sommare tutte l'unità d'una progressione, che i termini della quale
sieno situati nella tripla proporzionalità continua, come per esempio 1. 3.
9. 27. &c. noi diciamo che bisogna cauare il primo termine, che è 1. di 27. resta
26. e di questo pigliane la metà ch'è 13. aggiungulo all'ultimo termine che è 27.

40

farà 40. per tutta la detta somma, e se cominciassè da 2. e dicesse così, 2.6.18.54. caua 2. di 54. resta 52. pigliane la metà, ch'è 26. e questo aggiungilo all'vltimo termine, ch'è 54. farà 80. per tutta la somma di dette vnità, contenute in detti termini.

$$\begin{array}{r}
 3 \\
 6 \\
 18 \\
 54 \\
 \hline
 80
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 2) \quad \begin{array}{r}
 54 \\
 52 \\
 26 \\
 26 \\
 54 \\
 80
 \end{array}
 \end{array}$$

Della progressione quadrupla proportionale.

Volendo sommare tutte l'vnità contenute in tutt'i termini posti nella continua proportionalità quadrupla, come a dire 1.4.16.64. cauifi 1. di 64. resta 63. e di questo piglia il se-

teuato

sto, che è 21. e questo aggiungi all'vltimo termine, che è 64. farà 85. per la somma di tutti detti termini. E se dicesse così, 2.8.32.128. caua 2. di 128. resta 126. pigliane il terzo, ch'è 42. e questo aggiungilo all'vltimo termine, ch'è 128. farà 170. per tutta la somma di detti termini, e così farai ciascun'altra per grande che sia.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 4 \\
 16 \\
 64 \\
 \hline
 85
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 2) \quad \begin{array}{r}
 64 \\
 63 \\
 31 \\
 31 \\
 64 \\
 85
 \end{array}
 \end{array}$$

Potremmo ancora dimostrare, come si possono hauere con prestezza le somme dell'vnità di tutti li termini della progressione quincupla, e sexouialtera, e molt'altre, come de'nun cri quadrati ancora, ma perche nelle propositioni della nostra Pratica non possono occorrere, perciò non ci estenderemo in altro, perciocche hauendo noi fatto disegno di compilare vn'operetta breue, non vorremmo che ci venisse fatto vn Catalogo, o vn Sommario, e con questo principieremo a mettere in pratica le progressioni nelle sottoscritte propositioni, acciò che la pratica operatiua delle cose già dette si venga a manifestare.

Due caminano per vn medesimo viaggio, & vn di loro camina ogni di 8. miglia, e l'altro li va dietro in questo modo, cioè, il primo di fa vn miglio, il secondo di fa 2. miglia, & il terzo di ne fa 3. e costogni di cre ce vn miglio, si domanda in quanti giorni il secondo giungerà il primo, e quante miglia haueran-

no fatto. Fà così, raddoppia sempre quelle miglia, che il primo fermamente camina, cioè raddoppia 8. fa 16. e di questo cauane sempre 1. per regola generale resta 15. & in tanti giorni il secondo giungerà il primo, e 15. miglia farà il secondo l'ultimo giorno, e volendo vedere quante miglia fanno; tu vedi che il primo in 15. giorni a 8. miglia il giorno caminà 120. miglia, e per il secondo somma tutte l'vnità, che sono contenute dai termini della progressione continua, da 1. per fino a 15. secondo la regola da noi dimostrata, trouarai che faranno 120. vnità, le quali vengono a essere 120. miglia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
—
120.

15
1.
—
16.
17.
—
120.

Due camminano per vn medesimo viaggio, & vn di loro camina fermamente ogni giorno 15. miglia, e l'altro li camina dietro in numero di pari ordinatamente ascendendo, cominciando dall'vnità, cioè il primo di fà vn miglio, il secondo ne fà 3. il terzo ne fà 5. & il quarto ne fà 7. e così cresce ogni di 2. miglia, finche lo giunge, domando in quanti giorni lo giungerà, e quante miglia farà il secondo l'ultimo giorno. Fà così, raddoppia le miglia, che fermamente camina il giorno il primo, cioè raddoppia 15. fa 30. cauane 1. per regola generale, resta 29. e tante miglia fece l'ultimo di il secondo, e lo giunse in 15. giorni, e volendone la proua, tu vedi che il primo in 15. giorni a 15. miglia il giorno, caminà 225. miglia, e per il secondo, sommarai insieme tutte l'vnità della progressione discontinua, cioè da 1. per fino a 29. (discontinua) che è l'ultimo termine, faccdo dell'ultimo termine due parti, le maggiori, che si possa, che la maggiore farà 15. la qual moltiplicata in se farà 225. e tante miglia caminò il secondo, adunque caminò tanto quanto il primo.

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
—
225.

Due camminano per vn medesimo viaggio, & vn di loro camina ogni giorno 20. miglia, e l'altro gli camina dietro in questo modo, cioè, il primo di fà vn miglio, il secondo di ne fà 4. il terzo ne fà 6. e così ogni giorno cresce 2. miglia, domando in quanti giorni lo giungerà, e quante miglia haueranno fatto. Fà così, caua 1. di 20. resta 19. E se vuoi sapere perche si deue trarre 1. di 20. non si trahe per altro. che per trouar la metà dell'ultimo termine pari della progressione discontinua, la qual metà è 19. a dunque l'ultimo termine farà 39. però dirai, che lo giungerà in 19. giorni, e che l'ultimo giorno il secondo farà 38. miglia.

E se ne vuoi
 la proua, fa
 così, piglia
 la metà del-
 l'ultimo ter-
 mine, cioè
 di 38. ne viē
 19. e questo
 multiplica
 via il nume-
 ro che im-
 mediarē viē
 doppio il 19.
 cioè 20. farà
 380. per tut-
 ta la somma
 dell'uità, e
 tate miglia
 fece ciaacu-
 no.

2
 4
 6
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20
 22
 24
 26
 28
 30
 32
 34
 36
 38

20
 1
 —
 19. 20
 3 8 0.

380.

Due caminano per vn medesimo viaggio, & il primo ogni di camina 30. miglia,
 e l'altro li camina dietro in questo modo
 cioè, il primo di fa 3. miglia, il secondo
 ne fa 6. il terzo ne fa 9. & il quarto ne fa
 12. e così ogni di cresce tre miglia, si do-
 manda in quanti di lo giungerà, e quante
 miglia faranno, e quante ne farà il secon-
 do l'ultimo giorno. Fa così, parti le mi-
 glia, che fermamente ogni di camina il
 primo, per il numero ascendente del se-
 condo, cioè parti 30. per 3. ne vien 10.
 raddoppialo fa 20. cauane 1. resta 19. per
 li termini, o vero numeri che bisognano
 per fino al triplato di 19. è 57. di maniera
 che da 3. fino a 57. ascendendo per ter-
 nario vi sono 19. termini, & in tanti di
 lo giungerà, e l'ultimo di il secondo farà
 57. miglia, & in tutto hauerà fatto 570.
 miglia. Fanne proua, aggiungi il primo
 termine che è 3. sopra l'ultimo termine
 che è 57. farà 60. pigliane la metà, che è
 30. e questo multiplica via tutti li termi-
 ni, quali sono 19. fa 570. ouero multipli-
 ca 60. via la metà de termini, cioè via 9. $\frac{1}{3}$. farà similmente 570. e tante miglia
 fece ciascuno.

3
 6
 9
 12
 15
 18
 21
 24
 27
 30
 33
 36
 39
 42
 45
 48
 51
 54
 57
 57 0.

57
 3.
 —
 2) 60.
 30. 19.
 57 0.

Due caninando per vn medesimo viaggio, & il primo camina ogni di 30. mi-
 glia, e l'altro li camina dietro in questo modo cioè, il primo di camina 5. miglia,
 il

il secondo di, ne camina 10. & il terzo ne camina 15. e così ogni di cresce 5. miglia, si domanda in quanti di lo giungerà, e quante miglia farà l'ultimo giorno.

Fà così, parti 30. miglia che camina ogni di il primo per l'ascendente dell' altro, cioè per 5. ne vien 6. raddoppialo fà 12. cauane 1. perche non v'entra l'vnità di questo conto; resta 11. per il numero de' termini, & in tanti di lo giungerà; per ciòche in detta progressione cominciando dal quinario, bisognano 11. termini, & il quincuplato d'11. cioè il moltiplicato d'11. via l'ascendente del secôdo ch'è 5. fà 55. e questo sarà l'ultimo termine della progressione, e conseguentemente sarà il numero delle miglia che fece il secondo l'ultimo giorno, e ciascuno farà 330. miglia, e se il secondo camminasse per senaria, o settennaria ascensione partiresti il fermo, cioè le miglia, che fermamente camina il primo per 6. o per 7. e seguiresti il medesimo ordine di questa.

Due camminano per vn medesimo viaggio, & il primo ogni di camina 13. miglia, & il secondo li camina dietro in questo modo, cioè, il primo di fà 3. miglia, il secondo ne fà 6. & il terzo ne fà 9. e così ogni di cresce 3. miglia finche lo giunge, si domanda in quanti lo giungerà, e quante miglia hauerà fatto. Volendo noi soluer questa per le regole fin' hora date, sarebbe cosa impossibile; perciò il numero delle miglia, che fà il primo ogni giorno, non si può partire per l'ascendente del secondo, che non ne peruenga rotti, cioè non si può partir 13. per tre, che non auanzi rotti; Laonde reggiti in quest' altro modo, e prima, vedi di accostar alle giornate dell'vno, e dell' altro più che sia possibile, per le regole sopradette, parti 13. per 3. ne vien 4 $\frac{1}{3}$. raddoppia questo, fà 8 $\frac{2}{3}$. cauane 1. resta 7 $\frac{2}{3}$. e di questo getta via il rotto, resta 7. apunto, & in tanti giorni faranno quasi del pari, doue che il primo in 7. giorni farà miglia 91. & il secondo ne farà 84. che sono 7. miglia meno; per ilche conuien che camini parte dell'ottaua giornata; la qual parte trouarai in questo modo, poni che ciascuno camini tutta l'ottaua giornata, adunque il primo caminerebbe 13. miglia, & il secondo caminerebbe 24. miglia; il qual verrebbe a camminare 11. miglia più, & a voler giungere il primo, bastaua che camminasse 7. miglia più, e perciò dirai così, se 11. miglia sono auanzate da vna giornata, in quanto tempo faranno auanzate 7. miglia? moltiplica 1. via 7. fà pur 7. e questo parti per 11. ne viene $\frac{7}{11}$. e tal parte caminara dell'ottaua giornata, adunque il secondo giungerà il primo in giorni 7 $\frac{7}{11}$. Fanne proua, trouarai che in detto tempo ciascun di loro caminara miglia 99 $\frac{7}{11}$. e così farai le simili &c.

Vno deue hauere da due suoi debitori vna quantità di ducati, e tanti ne deue hauere dall'vno, quanti dall'altro, & il primo s'accorda di rendergli ogn'anno 24. ducati, & il secondo s'accorda di rendergli il prim'anno duc. 6. & il second' anno duc. 12. & il terzo duc. 18. e così ogn'anno vuol pagare 6. duc. più, finche l'habbia finito di pagare; e così fece, & il creditore trouò alla fine, che ambedue i debitori lo finirono di pagare in vn medesimo tempo, si domanda quanti ducati

haucaua

hauera hauere da ciascuno, & in quanti anni fu pagato, e quanti ducati gli diede il secondo l'ultima paga. Fa così, parti duc. 24. per 6. cioè per il numero ascendente del secondo, ne vien 4. addoppialo fa 8. cauanci. resta 7. per li termini della progressione, & in tanti anni fu finito di pagare, e per sapere quanti ducati gli diede il secondo l'ultima paga; multipl. 7. via 6. cioè il numero ascendente del secondo via i termini della progressione, fa 42. per l'ultimo termine della progressione, e tanti ducati gli diede l'ultima paga: e per sapere quanti ducati douea hauere da ciascuno, multiplica 7. anni via duc. 24. che deu. dare ogn'anno il primo, fa 168. e per il secondo, somma il primo termine ch'è 6. con l'ultimo termine ch'è 42. fa 48. e questo multiplica via la metà dei termini, cioè via $2\frac{1}{2}$. fa 168. e di tanti ducati era debitore ciascuno &c.

Hauendo tu inteso le sopradette progressioni; le potrai applicare a formare molte propositioni, come per esempio

Vno vende due forme di cacao, con questa condizione, che della libbra della prima forma ne vuol soldi 8. e dell'altra forma, vuol della prima libbra soldi 4. e della seconda libbra ne vuol soldi 4. e della terza soldi 6. e così a ogni libbra vuol crescere due soldi, & alla fine trouò che tanti soldi toccò della prima forma, quanti della seconda, si domanda quanti soldi vendè, e quante libbre pesò ciascuna forma.

Fa così, cauà 1. d'8. resta 7. per li termini della progressione, e libb. 7. pesò ciascuna forma, che a soldi 8. la libbra; la prima forma varrà soldi 56. e per la seconda aggiungi 1. a 7. fa 8. il qual multiplica via il detto 7. fa 56. ma volendo trouare la somma delle dette vnità per le regole date, troua l'ultimo termine della progressione, ch'è 14. pigliane la metà ch'è 7. e questo lo multiplicarai via il numero, che immediate segue dopo il 7. ch'è 8. sarà 56. di maniche per diti si modi si troua la somma dell'vnità delle progressioni, come altre volte s'è detto.

Vno prende a cauare vn pozzo, il quale è fondo bracc. 16. per lir. 60. e quando n'ebbe cauato bracc. 12. trouò il maffo, e non potè più cauare, si domanda quante tiro deu. hauere. Perchè si dura più fatica a cauare il secondo braccio, che il primo, e similmente si dura più fatica a cauare il terzo, che il secondo, e conseguentemente cia'scun'altra parte più profonda, perciò deu. meritare più del secondo braccio, che del primo, e più del terzo, che del secondo, e volendo noi vedere proportionatamente quel che merita di bracc. 12. che n'ha cauato, fa così somma insieme tutte l'vnità, che sono nei termini della progressione continua da 1. fino a 16. per le regole date; trouarai che saranno 136. vnità, e tante fatiche conuerrebbe che durasse se lo cauasse tutto, secondo i patti; ma perchè non ne cauò più che 12. braccia, perciò bisogna vedere quante vnità sono nei termini della continua progressione da 1. fino a 12. doue sono 78. vnità, e tante fatiche durò in 12. braccia, che ne cauò; dipoi per regola del tre, dirai così, se per 136. fatiche douea hauere lire 60. quante ne doberà hauere per 78. fatiche? multipl. 78. via 60. & il prodotto parti per 136. ne vien lib. 34. $\frac{2}{3}$. e tato douerà hauere.

Vno si parte di Fiorenza, per andare a Lion di Francia, & ogni di camina 30. miglia, & in capo a 4. giorni vn'altro si parte di Fiorenza, e li camina dietro, &

in 12. giorni lo raggiunge, si domanda quante miglia fece il giorno questo secondo.

Fà così tu vedi, che il secondo raggiunge il primo in 12. giornate, e si parti 4. giorni doppo, adunque il primo caminò 16. giorni, quando il secondo 12. e tante miglia caminò il secondo quanto il primo, laonde il primo a 30. miglia il dì farà miglia 480. & il secondo fà le medesime miglia in 12. giorni, parti adunque 480. per 12. ne viene 40. e tante miglia fece ogni dì il secondo.

Vno si parte di Pefcia per andare a Roma, e non sò quante miglia si faccia il giorno, ma tre giorni doppo, li vā dietro, e camina ogni dì 20. miglia, e lo giunge in 7. giorni, si domanda quante miglia faceua il dì il primo.

Fà così, tu vedi che il secondo in 7. giorni a 20. miglia il giorno, farà 140. miglia, le quali il primo le viene ad hauer caminate in 10. dì, parti adunque 140. per 10. ne vien 14. e tante miglia dirai, che faceffe il giorno il primo &c.

Vno camina ogni dì 20. miglia, & vn giorno doppo, vn'altro gli camina dietro, in questo modo, cioè, il primo di fà vn miglio, il secondo ne fà 2. il terzo ne fà 3. & ogni dì cresce vn miglio, si domanda in quanti dì lo giungerà. Fà così, poni che il secondo giunga il primo in vna quantità di giorni, hor poni che lo giunga in 4. giorni, vedi per la progressione continua quante miglia farà in 4. dì il secondo; che son mandol'vnità da 1. per fino in 4. vi sono dieci vnità, adunque il secondo in quattro dì farebbe 10. miglia, & il primo perche haueua caminato vn giorno inanzi del secondo, hauerà caminato 5. giornate, nelle quali haueua fatto 100. miglia, dipoi dirai per regola del tre, se 10. miglia del secondo son fatte dal medesimo in 4. giorni, in quanti giorni ne farà 100? multiplica 100. via 4. fà 400. equisto parti per 10. ne vien 40. & in tanti giorni il secondo giungerà il primo, & hauerà fatte tante miglia il primo, quante il secondo, cioè 820. miglia.

Vno prende a cauate vn pozzo, il quale deu'esser fondo bracc. 10. per lir. 10. e n'ha canato tanto, che ha meritato lir. 4. si domanda quante braccia ne canò.

Fà così, troua quante vnità sono da 1. per fino in 10. bracc. trouarai, che vi sarà 55. vnità; laonde per regola del tre dirai et si, se per lir. 10. si deue durare 55. fatiche, per lire 4. quante fatiche bisognarà durare? multiplica 4. via 55. fà 220. il qual parti per 10. ne viene 22. fatiche son quelle, nelle quali deue hauere lir. 4.

Hor bisogna sapere quanti numeri son quelli in continua progressione, che sommati insieme faccino 22. Fà così, tu sai, che da 1. per fino in 6. vi sono 21. vnità, & infino a 22. vi manca 1. & il numero seguente al 6. è 7. doue quell'vnità che manca è $\frac{1}{2}$. di 7. adunque ne cauo bracc. $6\frac{1}{2}$. per lir. 4. e questo si conclude secondo l'appressamento di tal solutione.

Vno camina ogni dì 20. miglia, e doppo 5. giorni vno li vā dietro, e camina ogni dì 30. miglia, si domanda in quanti dì lo giungerà. Fà così, multiplica 20. via 5. fà 100. e tante miglia hauerà caminato il primo, auanti che il secondo parta, vedi hora quante miglia camina il secondo in 5. giorni, multiplica 30. via 5. fà 150. per la qual cosa ti conosee, che in 5. giorni il secondo camina 50. miglia più del primo; perciò dirai così per regola del tre, se 50. miglia sono racquistate in 5. giorni del secondo, in quanti giorni faranno racquistate 100. miglia, che era inanzi il primo? multiplica 100. via 5. fà 500. parti per 50. ne viene 10. & in tanti giorni il secondo giungerà il primo. Potetui operare ancora in questo modo, cioè, vedi quante miglia fà il primo in 5. giorni, il quale ne fà 100. e questo salua, dipoi caua le miglia, che camina il primo ogni giorno, di quelle che camina il secondo, cioè caua 20. di 30. resta 10. e questo sia partitore delle miglia cento, ne vien 10. & in tanti giorni il secondo giungerà il primo.

Da Fiorenza a Roma sono miglia 120. & vno si parte di Fiorenza per andare a Roma, e si il detto viaggio in 6. giorni, & vn'altro nel medesimo tempo si parte di Roma, per venire a Fiorenza, doue viene in 8. giorni, si domanda in quanti giorni si scontraranno, e quante miglia hauerà fatto ciascuno, quando si scontraranno. Fà così, aggiungi insieme le miglia che fà il giorno il primo, con quel che fà il secondo, fanno miglia 35. dipoi per regola del tre, dirai così, se 35. miglia son caminate da ambidue in vn giorno, in quanti giorni faranno caminate miglia 120? parti 120. per 35. ne viene $3\frac{1}{2}$. & in tanti giorni si scontraranno, e volendo sapere quante miglia hauerà fatto ciascuno, tu sai che il primo faceua ogni di 20. miglia, & il secondo ne faceua 15. che si trouano, partendo 120. per le lor giornate, per il che dirai, se in vn giorno il primo faceua 20. miglia, quante ne farà in giorni $3\frac{1}{2}$? multiplica $3\frac{1}{2}$. via 20. fà 68 $\frac{1}{2}$. e tante miglia fece il primo, & il secondo fece il resto fino in 120. le quali puoi trouare col medesimo ordine, che hai trouato quel del primo, trouarai, che il secondo. haueua fatto miglia 51 $\frac{1}{2}$. quando si scontrarono.

Due Testugini sono in vn piano, il qual'è lungo vn miglio, cioè mille passi, ma sappi che vn passo non si deue intendere vn di questi che comunemente fanno camminando gl'huomini, ma si deue intendere vna misura lunga braccia 3. la qual si chiama passo, come può testificare chi è itato a Roma, & ha veduto comprare, e vendere delle legna a Ripetta, o Ripa grande del Teuere, doue l'hauerà vedute misurare a passi, che così si vendono, la qual misura, ouero passo è lungo 3. braccia, con la qual misura si può credere che i Romani, i quali diedero legge al mondo, misurassero ancora le miglia, & ordinassero che mille di quei passi fusse vn miglio, e quanto questa cosa habbia del verisimile, si vede che in Toscana, & in molte altre parti si vende, e compra il panno, e molte altre cose, a braccia, & i Bottegari nelle loro botteghe hanno vna misura di due braccia, la qual chiamano passetto, significante che è minor del passo.

Et in oltre, in questa nostra Terra di Pescia, s'è fatto paragone in più luoghi, misurando le strade rispetto a' confini de' SS. Lucchesi, per poter portare inanzi, & indietro robbe, senza vscir de' termini con misure, assegnate da' Ministri, che tal'ordine haueuano, e doue per comune opinione antica, si fà che termini vn miglio, s'è misurato, e s'è trouato, che tremila braccia non sono arriuate a quel termine preciso, doue ordinariamente si tiene che termini vn miglio, ma le 3000. braccia hanno terminato circa 60. braccia indietro, e questo pensiamo che sia auuenuto per scarsità del braccio, e sopra 3000. braccia per ogni miglio s'è poi sempre vsato, e misurato doue ha fatto di bisogno. Habbiamo detto questo, perche molti che non fanno, pensano che miglio sia mille passi di quelli, che comunemente si fanno camminando, & adducono vna ragione ridicola, dicendo, che anticamente gli huomini doueuano esser talmente grandi, e che i lor passi eran così lunghi, che mille di quei passi faceuano vn miglio, ma non è così, anzi la vera è, come di sopra habbiamo detto.

Hor tornando alla nostra proposta, s'è detto, che sono due Testugini in vn piano lungo vn miglio, vna da capo, l'altra da piedi di detto piano, e vogliono andare ad incontrare per linea retta, e muouonsi a vn medesimo tempo, & vna camina ogni di $\frac{1}{2}$. di miglio, e la notte torna indietro $\frac{1}{4}$. di miglio, e l'altra camina ogni di $\frac{1}{3}$. di miglio, e la notte ne torna indietro $\frac{1}{6}$. di miglio. si domanda in quanti giorni si scontraranno. Fà così, vedi che parte di miglio caminaranno il di fra l'vna, e l'altra, detrattone quel che tornano indietro la notte; cioè, tu vedi che vna cami-

na ogni di $\frac{1}{4}$. di miglio, e la notte ne torna indietro $\frac{1}{4}$. e perciò caua $\frac{1}{4}$. di $\frac{1}{4}$. resta $\frac{1}{4}$. e tanto viene ad acquistare del camino ogni di la prima; e per l'altra caua $\frac{1}{4}$. d' $\frac{1}{4}$. resta $\frac{1}{4}$. e tanto viene a caminare ogni di la seconda; hora ag-
giungi $\frac{1}{4}$. con $\frac{1}{4}$. fanno $\frac{1}{2}$. e tanto camminano ogni di fra ambedue di quel
piano, hora dirai così, se $\frac{1}{2}$. d'vn miglio vien caminato da tutte due le Tes-
tugini in vn giorno, da quanti di sarà caminato vn miglio? parti 1. per $\frac{1}{2}$. ne
viene 10. e in tanti di si scontraranno, secondo Fra Luca, e Filippo Calandri;
ma salua loro intelligenza non è così, perche l'ultima giornata quando si scon-
trano, non deuono andar più oltre, e trapassarsi per hauer a tornare indietro la
notte a di nouo riscontrarsi; perciò che quando si sono scontrate insieme, cioè
arriuate a vn punto medesimo, non bisogna che tornino indietro, per hauer a cam-
minare il di seguente, tanto che si trapassino, perche la domanda dice, in quanti
di s'incontraranno; Che l'opinione de' sopradetti Autori sia falsa, lo prouiamo
con la solutione di questa; affermando ancor noi, si come essi dicono, che ogni
di (disfalcatoe quelle che tornano indietro la notte) fra ambedue camminano $\frac{1}{2}$.
d'vn miglio, per la qual cosa vedi vn poco in 9. giorni quanto caminarebbono,
moltiplica 9. via $\frac{1}{2}$. fa $\frac{9}{2}$. d'vn miglio; Laonde, chiara cosa è, che gli man-
ca a caminare $\frac{1}{2}$. d'vn miglio, a voler fare vn miglio intero, vedi hora quanto
cammineranno il decimo giorno senza tornare indietro, tu sai, che vna camina $\frac{1}{2}$.
d'vn miglio, e l'altra ne camina $\frac{1}{2}$. che tra tutte due vengono a caminare $\frac{1}{2}$. d'
vn miglio, & esse a volersi scontrare, basta che ne camminino $\frac{1}{4}$. laonde tu ve-
di, che se caminassero tutto il decimo giorno, non solo si scontrerebbono, & ar-
riua rebbono in vn medesimo punto, ma si trapassarebbono, e perche basta che si
scontrino, e non che si trapassino, però dirai così, se $\frac{1}{2}$. d'vn miglio, si camina
da tutte due le Testugini in vn giorno, senza ritorno indietro di notte, in quanto
tempo si caminerà $\frac{1}{2}$. che le manca a finire vn miglio? parti $\frac{1}{2}$. per $\frac{1}{2}$. ne vien
ne $\frac{1}{2}$. e della decima giornata ne camineranno $\frac{1}{2}$. e si scontraranno, adunque si
scontrataranno in giorni $9\frac{1}{2}$. Fanne proua, così multipl. 9. giorni via tutto quello,
che camminano il di (detrattoe quel che tornano indietro la notte) che sai che ca-
minano $\frac{1}{2}$. d'vn miglio però multipl. 9. via $\frac{1}{2}$. fa $\frac{9}{2}$. e tanto camminano al
netto in 9. giorni, e perche del camino, che fanno nei $\frac{1}{2}$. della decima giornata nò
tornano indietro niente, poiche non camminano fino alla sera, che si scontrano,
però piglia, o multipl. $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{2}$. che tanto caminarianno il di fra tutte due fa $\frac{1}{2}$.
il quale aggiunto a $\frac{1}{2}$. fanno vn miglio apunto, come voleuamo; Adunque le
solutioni di Fra Luca, e Filippo Calandri in queste simili propositioni son false,
perche in 10. giorni caminarebbono al netto $\frac{1}{2}$. cioè $\frac{1}{2}$. d'vn miglio; e per
li $\frac{1}{2}$. dell' vndecima giornata, noi habbiamo che per la giornata intera, senza
tornare indietro camminano $\frac{1}{2}$. però piglia $\frac{1}{2}$. di $\frac{1}{2}$. ne viene $\frac{1}{2}$. che rag-
giunto a $\frac{1}{2}$. fa 1. apunto, e doueua fare 1. apunto, e perciò è falsa.

E perche meglio tu conosca, che i sopradetti Autori hanno errato, nota la pre-
sente propositione, e solutione di essa, la qual è posta da Fra Luca nella sua mag-
gior opera a carte 42. caso 24. delle sue progressioni, qual dice così.

Vno ha da fare 10. miglia, & ogni di ne fa 2. e la notte ne torna indietro 1. si
domanda in quanti di giungerà in capo la via. Fa così, tu vedi, che fra il di, e
la notte fa vn miglio, però dirai, se vn miglio vuole vn di, che vorrà 10. ne vorrà
10. e di questo caua 1. resta 9. & in tanti giorni giungerà, perche l'ultima giorna-
ta non tornerà niente indietro, poiche è giunto, e questa diciamo che sta bene,
perche in 8. di, camina 8. miglia, e se il nono giorno camina 1. miglio, hauerà

fatto apunto 10. miglia; e così faresti, quando dicesse che il giorno fa 3. miglia, e la no te torna indietro 2. v'anderà in 8. giorni, di maniera che con queste sue solutioni, si può conoscere che argomenta contro di se, poiche nelle propositioni delle Formiche, e Gatti, e Topi, e Serpenti, da Filippo Calandri descritte, non è stato offeruato il medesim' ordine.

Vno ha messo per ordine in retta linea sopra il rigo bianco della Piazza di Pescia 101. Aranci lontani vn braccio l'vn dall' altro talmente che tengono di spatio 100. braccia per lunghezza, e se bene alcuni hanno detto 100. Aranci, dicesi che in 100. braccia vi anderà 101. Aranci, ò altri segni, e non 100. Fatto questo, dica vn' altro, se tu vuoi raccogliere tutti questi Aranci, a vn' vno, e metterli tutti in vn paniere, il qual paniere sta sempre fermo doue è il primo Arancio; io voglio caminar lontano di qui vn miglio, e tornare, prima che tu habbia finito di raccogliere tutti questi Aranci, e così giocorno vno scudo, si domanda camminando vguilmente chi vincerà lo scudo, e quante braccia farà ciascuno di loro. Hauendo poco prima detto che vn miglio è 3000. braccia, adunque quel che tolse a caminare vn miglio, e ritornare, farà due miglia, che sono 6000. braccia, e quel che tolse a raccorre gli Aranci, volendo sapere quante braccia di viaggio farà, multiplica sempre la quantità delle braccia, ò passi che tengono di spatio gli Aranci, in se, cioè 100. via 100. fa 10000. & a questo aggiungi la detta distanza di tutti gli spatij degl' Aranci, i quali spatij sono 100. farà in tutto 10100. e tante braccia conuerà caminare a quel che raccoglie gli Aranci, e quello che caminò due miglia fece 6000. braccia, adunque diremo, che questo vincesse lo scudo. Et in altro modo fa così, aggiungi 1. a 100. per regola generale, farà 101. e questo multiplica via il medesimo 100. farà 10100.

E se la proposta dicesse così. Vno ha posto 44. Aranci in retta linea lontani 2. bracc. l'vno dall' altro, dipoi gli vuol raccogliere, e portarli a vn per volta, e metterli in vn paniere acciò preparato, il quale sta saldamente doue è posto il primo Arancio, si domanda quante braccia di viaggio li conuerà fare, volendo soluer questa, & altre simili proposte, prima bisogna considerare quanti spatij sono, e se gli Aranci, ò altri segni posti faranno 44. gli spatij in se a detti segni faranno sempre vn meno de' detti Aranci, ò segni, cauà adunque per regola generale 1. di 44. resta 43. e tanti spatij sono di due braccia l'vno. Multiplica 43. in se fa 1849. dipoi se gli spatij sono di due braccia multiplica questo prodotto via 2. e se gli spatij fossero di tre, ò vero quattro braccia, il detto prodotto lo multiplicheresti via 3. ò vero via 4. secondo la disposizione degli spatij, multiplica adunque 1849. via 2. perche li spatij sopradetti sono di due braccia, farà 3698. e questo salua, dipoi multiplica la quantità degli spatij via quante braccia è ciascuno spatio, cioè se gli spatij faranno 43. e la distanza di ciascuno sia due braccia, multiplica 43. via 2. farà 86. e se gli spatij fossero di 3. ò vero 4. braccia l'vno, ti conuerrebbe multiplicare la quantità degli spatij via 3. ò vero via 4. &c. & il prodotto conuerrebbe aggiungerlo al prodotto che saluasti, aggiungi adunque 86. con 3698. che saluasti, farà in tutto 3784. e tante braccia diremo che facesse di viaggio chiunque raccogliesse gli Aranci, ò altri segni posti nel sopradetto.

E perche più chiaramente apparisca, che le sopradette regole da noi addotte, son vere, riguarda i sottoscritti segni, doue sono otto zero i quali significano 8. Aranci, ò vero segni, & i punti che sono sotto a essi, significano le braccia, mediante i detti segni, conoscerai che infra otto segni, sono 7. spatij, e quel che si dice d'vn numero piccolo, si dice d'ogn' altro numero maggiore, e perche da vn segno

segno all'altro noi poniamo che sia due braccia, però concludiamo che quello il qual vorrà raccogliere il secondo segno, e metterlo sopra il primo, li conuerà caminar 4. braccia, perche due braccia caminerà innanzi, e due indietro, e così sarà degli altri segni proportionalmente.

	4. 8. 12. 16. 20. 24. 28.	7. 7
4	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0	2
8		49
12		-----
16		98
20		14
24		-----
28		brac. 1 1 2.

brac. 1 1 2.

Due Formiche sono in vn piano, discosto l'vna dall'altra braccia 100. in linea retta l'vna dietro all'altra, e vogliono andare a vn monte di grano, il qual è lontano dalla prima Formica vna quantità di braccia, la Formica, che è più presso al monte, camina ogni di 5. braccia, e la notte ne torna indietro 3. e l'altra che è più discosto, camina ogni di 7. braccia, e la notte ne torna indietro 4. e così continuando il lor cammino ciascuna di esse giunse in vn medesimo tempo al monte del grano, si domanda quante braccia era discosto il monte del grano alla prima Formica, & in quanti di vi giunsero.

Fa così, vedi quanto camina il di la prima, detratt one qualche torna indietro la notte, trouerai che camina braccia due ogni giorno, e quella dietro camina cinque braccia il giorno, per il che tu vedi che la seconda s'accosta ogni di alla prima vn braccio, e però dirai così, se vn braccio s'è acquistato in vn giorno dalla seconda Formica, in quanti giorni faranno acquistate brac. 100. ? parti 100. per vno ne vien 100. & in tanti giorni giunsero ambedue a vn tēpo al mōte del grano.

Hora per vedere quante braccia era lontano il monte del grano dalla prima Formica, tu vedi che la seconda in 100. di a braccia 3. il giorno fece braccia 300. delle quali caua braccia 100. che era discosto la seconda dalla prima, resta 200. e tante braccia dirai che fuisse di scotto il monte del grano dalla prima Formica.

Questa proposizione la descriue Francesco Galigai Fiorentino, e la solue come di sopra habbiamo detto, ma secondo l'opinione nostra tal solutione, è falsa, se già non vuole intendere, che nell' vltima giornata, (se ben arriuanò la sera del pari a vn medesimo segno) in ogni modo deuino ritornare indietro la notte, e volendo egli intender questo, noi diciamo che tal solutione sta bene, ma perche la domanda dice in quanti giorni arriuaranno del pari al detto monte, adunque basta arriuarui, e perciò a noi non pare che (se vna sera arriuanò del pari a vn medesimo punto) deuino poi la notte ritornare indietro, poiche doue, & in quel luogo, che del pari, & in vn istesso tempo arriuanò vna volta, quiui bisogna presupporre che sia il monte del grano, e perche il centesimo giorno ogn'vna camina secondo la sua dispositione, e poi la notte tornano indietro quel tanto che la proposta dispone, e perciò tu vedi chiaramente che la mattina del centesimo primo giorno faranno insieme in vn medesimo tempo, e luogo, e questa è quella solutione che fà il detto Galigai la quale a noi non piace, hauendola qui esposta

a lauer d'altri. Ma volendo stare nei termini della domanda, noi diciamo che doue caminando inanzi, non tornando indietro, artiuaranno a vn punto in vn ist. sso tempo, quui bisogna proporre che sia il monte, il qual non deuono trapassare il giorno, per hauerui a ritornare la notte, e perciò si dice, che la prima formica della nostra proposta, cioè quella che era più presso al monte, in capo a 98. giorni si trouaua braccia 2. inanzi a quell'altra, che gli era dietro, detratone il calo della notte di ciascuna; viè poi che il 99. giorno, la mattina di buon'hora in vn medesimo tempo si mettono a caminare, e quella che era inanzi, tu sai che si disse che caminaua ogni di 5. braccia senza il calo della notte, adunque quel di caminara 5. braccia, le quali con l'aggiunta di 2. braccia che era inanzi all'altra faranno braccia 7. e quella che era adietro, tu sai che ogni di senza calo della notte caminaua braccia 7. perche il detto di, che sarà il 99. caminara 7. bracc. adunque si manifesta, e prouasi che la sera tutte due le dette formiche si ritroueranno a vn medesimo tempo in vn medesimo luogo, e perciò non accade che tornino adietro la notte, per hauer a caminare il centesimo giorno, e poi tornare indietro, per esser insieme vn'altra volta, perciò che basta giungere a vn medesimo luogo in vn medesimo tempo, e per vedere quanto era lontano il monte del grano dalla prima formica, tu così, piglia sempre vn giorno meno di quelli che penano a giungere al monte, dunque piglia 98. giorni, nei quali tu sai che la prima formica camina ogni di braccia 2. perche in 98. giorni camina braccia 196. e o il calo della notte, cioè detratone il calo, & il 99. giorno, tu sai che camina br. 5. le quali aggiunte con br. 196. fanno br. 201. e tante braccia dirai, che sùffice discosto il monte del grano dalla prima formica.

L'anne proua formando vna scala di punti, diuidendola a braccia, e le braccia a giornate, come nella seguente proposta per tua maggiore intelligenza potrai vedere.

Due formiche sono in vna sala, dou'è vn monte di grano, e l'vna di discosto all'altra 20. braccia, cioè vna dietro all'altra in linea retta, e tutte due caminano per la medesima linea alla volta del monte del grano, e quella ch'è inanzi camina ogni di braccia 3. e la notte torna indietro br. 1. e quella ch'è indietro braccia 20. camina ogni di 5. braccia, e la notte ne torna indietro braccia 2. così continuando il lor camino giunsero al monte del grano in vn medesimo tempo, si domanda in quanti giorni vi giunsero, e quante braccia era lontano il monte del grano alla prima formica.

Tu così, vedi quanto camina ciascuna ogni di, tratone il calo della notte, trouarai che la prima camina ogni di br. 2. e l'altra br. 3. adunque la seconda acquista ogni di vn braccio di quello spatio, ch'è intrapreso fra se medesima, e la prima, il quale spatio è 20. br. però dirai così, se in vn di acquista vn braccio di strada, in quanti di n'acquisterà 20. tu vedi che l'acquisterà in 20. e di questo caua 1. resta 19. rispetto l'vltima giornata, che non tornano indietro, perciò che quando giungono insieme a vn medesimo punto, & in vn istesso tempo, quui si presuppone che sia il monte, adunque non accade, che tornino indietro, per hauer a caminare il giorno seguente, e poi tornare indietro la notte a ritrouare il monte, perche due volte farebbono giunte insieme in due luoghi del pari, cioè in vn luogo nell'andare inanzi, & in vn'altro (ma non nel medesimo) nel fin del ritorno della notte, per la qual cosa si può comprendere, che Francesco Galigai habbia voluto inserire di condurre le dette formiche in vna mattina a vn medesimo tempo in vn istesso punto, al qual punto giungono nel ritorno della notte, Laonde

Laonde si conosce che hanuo trapassato il punto, e noi diciamo, che basta che v'arriuino del pari andando inanzi, e non tornando indietro, le quali vi giunsero in capo a 19. giorni la sera, come per la presente scala chiaramente ciascuno potrà comprendere, perchè in capo a 18. giorni la prima si troua inanzi a quell'altra bracc. 2. col calo della notte, cioè, che la mattina del decimonono giorno, prima che comincino a caminare la prima si troua inanzi bracc. 2. e noi sappiamo che in tutto in detto di farà bracc. 3. che con l'aggiunta di br. 3. che era inanzi faranno bracc. 5. e la seconda, noi sappiamo che ogni di camina bracc. 5. adunque per tutto il detto di caminerà 5. braccia, & haueà raggiunta la prima, per la qual cosa si conclude che in 19. giorni si troueranno del pari, in vn medesimo tempo, e luogo.

E volendo sapere quanto era discosto il monte del grano dalla prima formica, fa come nella sopra detta, caua 1. di 19. resta 18. della prima formica col calo della notte farà 36. bracc. & il decimonono giorno, tu fai che camina 3. bracc. le quali aggiunte a 36. faranno bracc. 39. e tante bracc. dirai che fusse discosto il monte di grano dalla prima formica.

Ma se le domande dicessero d'vna gatta a piè d'vn albero, e d'vn topo in cima di detto albero, ouero d'vn serpente a piè d'vna torre, e d'vn'altro in cima di detta torre, e che questi animali, che sono in terra salissero ogni giorno, o sul l'albero, o sulla torre $\frac{1}{2}$. braccio, o $\frac{1}{3}$. di braccio, e la notte ne scendessero $\frac{1}{4}$. di braccio, o $\frac{1}{5}$. di braccio, e che gli animali che sono in cima dell'albero, o della torre scendessero ogni giorno vna parte di bracc. e la notte tornassero indietro più che non scendono il giorno, e quella parte, che salisson quci di sotto non fusse maggiore (trattone il calo della notte) che quella parte, che tornano indietro quci di sopra, sarebbe cosa impossibile, che si scontrassero, oltre a che gli animali, che fussero in cima dell'albero, se scendessero $\frac{1}{2}$. braccio, non potrebbero tornare indietro $\frac{1}{3}$. perchè non vi farebbe tanto albero, & anco se l'albero fra l'vno e l'altro animale crescesse, starebbono più a riscontrarsi, e se calasse, tanto più presto si scontrerebbono, perchè il crescimento dell'albero si deuè cauare di quel che al netto caminano il di ambedue gli animali, e se l'albero calasse, tal calo lo douresti aggiun-

gare,

gere,

Giornate della formica che è inanzi.

monte del grano.

Giornate della formica che è indietro.

principe.

320

gere, perche s'accosterebbon più, perciò in simili proposte, ancorche sieno bagatelle, bisogna star con la mente desta.

Vna Lepre è inanzi a vn cane in vn piano 50. salti, cioè 50. salti di lepre, & il cane la seguita a salti, & ogni 5. salti del cane sono 7. salti della lepre, domando in quanti salti il cane giungerà la lepre, presupponendo che ambidui si mouino ad vn tempo. Fa così, tu vedi che ogni 5. salti del cane sono 7. della lepre, adunque il cane con ogni 5. salti n'acquista due di lepre, e perciò dirai così, se 2. salti di lepre sono acquistati da 5. salti del cane, da quanti salti di cane faranno acquistati 50. salti di lepre? multiplica 50. via 5. fa 250. e questo parti per 2. ne viene 125. & in tanti salti dirai che il cane giungerà la lepre.

Ma se li 50. salti, che era inanzi la lepre fossero salti di cane, la qual cosa non puol'essere, perche il cane non ha ancor caminato quello spazio intrapreso da esso alla lepre, ma presupposto che tale spazio sia 50. salti di cane, riducili a salti di lepre, dicendo così, se 5. salti di cane, sono 7. di lepre, quanti faranno 50. multiplica 50. via 7. fa 350. parti per 5. ne vien 70. salti di lepre che sono vguale a 50. salti di cane, dipoi dirai così, se 2. salti di lepre, sono acquistati da 5. salti di cane, da quanti faranno acquistati 70. opera, trouerai che faranno acquistati in 175. salti di cane, & in tanti salti la giungerebbe. Fanne prova. Ponì che ogni salto di cane sia 3. braccia, adunque 175. salti simili, faranno braccia 525. hora tu sai che la lepre era inanzi 70. salti de' suoi, che sono vguale a 50. salti di cane, adunque faranno braccia 150. e mentre che il cane fece 175. salti, anco la lepre ne fece 175. ma perche son più corti i salti della lepre, vengono a essere 125. salti di cane, & ogni salto essendo 3. braccia verranno a essere braccia 375. che con l'aggiunta di braccia 150. che era inanzi faranno braccia 525. per tutto il camino del cane.

Volendo duplare vn granello di grano in 32. giorni, come se ti fusse detto, vno deue dare a vn altro vna quantità di staia di grano in questo modo cioè, che il primo di, li deue dare vn granel di grano, il secondo ne li deue dare 2. il terzo 4. il quarto 8. il quinto 16. il sesto 32. e così ogni di raddoppia se fino in 32. giorni, si domanda quante staia di grano li douerà dare. Volendo la somma di tutte l'vnità che sono in 32. case, o vero termini della progressione proportionale dupla, fa così, troua prima la somma di tutte l'vnità che sono in 4. case, o vero termini, cioè 1. 2. 4. 8. tu vedi che sono 15. vnità, aggiungi 1. cioè il primo termine al d. 15. farà 16. e questo multiplica in se fa 256. cauane il primo termine, cioè 1. resta 255. per la somma di tutte l'vnità d' 8. termini, dipoi aggiungi 1. cioè il primo termine a 255. fa 256. multiplica in se, fa 65536. cauane 1. per il primo termine, resta 65535. per la somma di tutte l'vnità, contenute in 16. termini, dipoi aggiungi 1. cioè il primo termine a 65535. fa 65536. multiplica in se. fa 4294967296. cauane 1. per il primo termine, resta 4294967295. per la somma di tutte l'vnità, che sono in 32. termini di detta progressione, e tante granella di grano gli douerebbe dare, e volendo noi vedere quante staia sono.

Fa così, secondo il comun vso di Toscana, tu sai che vno scudo d'oro deue pesare 72. grani, de' quali scudi, ne va 69. a vna libbra, adunque vno scudo deue pesare $\frac{1}{4}$. d'oncia, in questo modo cioè, che ogni 8. scudi deuono pesare vn'oncia, e perciò diremo, che con simil proportionione in vna libbra di grano vi sia 6912. granella, & in vno staio il qual pesa 50. libbre, vi sarà 345600. granella, e questo farà partitore di tutta la soprad. soma d'vnità, parti adunque la soma di tutte l'vnità della progressione per d. partitore, trouerai che ne verrà staia 12427. & auanza 196096. grani, e tante staia, e granella diteno che gli douerà dare.

Prima che più oltre si proceda, e che si perueniga alle regole del primo apponere, e delle due false positioni, dimostreremo qualche piaceuolezza de' numeri quadrati, secondo che alla nostra pratica parrà che sia conueniente, ancorche senza la dimostratione de' numeri congrui, & i lor congruenti, e delle proportioni, e proportionalità non si possa peruenire alla solutione di molte, anzi infinite questioni, nieme dimemo anderemo formando alcune propositioni, e casi più facili, poiche (come altre volte habbiamo detto) non è nostra intentione voler trattare di esse proportioni, ne meno d'Algebra, & hauendo dichiarato, quando trattammo delle radici quadre, che cosa sia numero quadro, o quadrato, e così radice quadra, e cuba, non staremo hora nelle seguenti propositioni dirne altro.

Troua vn numero che trattone 7. resti quadrato, e giuntoui 15. faccia quadrato. Fa così, somma insieme 7. e 15. fanno 22. aggiungiui 1. per regola generale fa 23. pigliane la metà che è 11. $\frac{1}{2}$. moltiplica questo in se, fa 122. $\frac{1}{4}$. cauane il numero che vuoi aggiungere, cioè 15. resta 117. $\frac{1}{4}$. e questo è il numero del quale trattone 7. resta 110. $\frac{1}{4}$. che è quadrato, che la sua radice è 10. $\frac{1}{2}$. & aggiuntoui 15. fa 122. $\frac{1}{4}$. che è pur quadrato, che la sua radice è 11. $\frac{1}{2}$. e così farai le simili, &c.

Troua vn numero che trattone 18. resta quadrato, & aggiuntoui 18. faccia quadrato.

Fa così, piglia la metà di 18. che è 9. moltiplica in se fa 81. aggiungiui 1. per regola generale fa 82. e questo è quel numero del quale trattone 18. resta 64. che è numero quadrato la cui radice è 8. & al detto 82. aggiuntoui 18. farà 180. che è pur numero quadrato, la cui radice è 10.

Troua vn numero che giuntoui 16. faccia quadrato, e trattone 17. resti quadrato. Quando la quantità che vuoi trarre, farà 1. meno, o 1. più della quantità che vuoi aggiungere, reggiti sempre con questa regola generale, cioè, aggiungi insieme le quantità che vuoi aggiungere, e trarre, come 16. e 17. fanno 33. cauane 1. resta 32. pigliane la metà che è 16. moltiplica in se fa 256. e sopra questo aggiungi la quantità che vuoi cauare, cioè 17. fa 273. e questo diciamo che farà il numero al quale aggiuntoui 16. farà 289. che è numero quadrato, e trattone 17. resterà 256. che è similmente numero quadrato.

E se dicessi troua vn numero, che aggiuntoui 8. faccia quadrato, e trattone 7. resti quadrato, fa come di sopra, somma insieme 7. e 8. fanno 15. cauane 1. resta 14. pigliane la metà che è 7. moltiplica in se fa 49. e sopra questo poni la quantità che vuoi cauare, cioè 7. fa 56. e questo sia il domandato numero, del quale trattone 7. & aggiuntoui 8. resta, e fa numero quadrato. Ma habbi auuertenza, che tal regola non ti seguirà, se non quando la quantità che vuoi trarre sarà vn più, o vero vn meno della quantità che vuoi aggiungere, si come dell'vna, e dell'altra, s'è posto l'esempio.

Troua vn numero che trattone 9. resti quadrato, e giuntoui 9. faccia quadrato. Quando le quantità che vuoi aggiungere, e trarre, d'vn'altra quantità, faranno intra loro vguali, o pari, o dispari, sempre quadra vna di dette quantità quale ti piace; hor quadra 9. farà 81. aggiungiui 4. per regola ferma, fa 85. partilo per 4. ne viene 21. $\frac{1}{4}$. e questo sarà quel numero del qual trattone 9. resta 12. $\frac{1}{4}$. che è numero quadrato, & aggiuntoui 9. fa 30. $\frac{1}{4}$. ch'è pur numero quadrato.

Troua due numeri che dal quadrato dell'vno, al quadrato dell'altro, vi sia di differenza 15. apunto. Prima farai di 15. due parti intere, le maggiori che puoi, che vna di esse sarà 7. e l'altra sarà 8, e così haucrai trouato due numeri, che dal quadrato

quadrato dell'altro vi sarà di differenza 15. appunto. Fanne proua, quadra 7. fa 49. quadra 8. fa 64. cauane 49. resta 15. appunto. E se haueſſe detto che dal quadrato dell'vno al quadrato dell'altro vi fuſſe di differenza 17. ò vero 19. ò qualſiueglia altro numero diſpari, fareſti come di ſopra s'è detto. Ma ſe la differenza del quadrato dell'vno al quadrato dell'altro, fuſſe di numero pari, come a dire.

Troua due numeri che dal quadrato dell'vno, al quadrato dell'altro, vi ſia di differenza 40. appunto, in queſta biſogna tenere diuerſo modo da quello che poco di ſopra habbiamo detto. Fa coſi parti ſempre quella differenza, che vuoi trauare, per 4. parti adunque 40. per 4. ne vien 10. & a queſto aggiungi 1. fa 11. e del medefimo 10. cauà 1. reſta 9. e queſti, cioè 11. e 9. ſono quei due numeri, che dal quadrato dell'vno, al quadrato dell'altro, v'è differenza 40. appunto. Fanne proua, quadra 11. fa 121. quadra 9. fa 81. che tratto di 121. reſta 40. appunto.

E ſe dicceſſe che la differenza dall'vn quadrato all'altro fuſſe 18. parti 18. per 4. ne viene 4. $\frac{1}{2}$. cauane 1. reſta 3. $\frac{1}{2}$. e queſto ſarà vn numero, dipoi aggiungi 1. à 4. $\frac{1}{2}$. fa 5. $\frac{1}{2}$. e queſto ſarà l'altro numero. Fanne proua quadra 3. $\frac{1}{2}$. fa 12. $\frac{1}{4}$. dipoi quadra 5. $\frac{1}{2}$. fa 30. $\frac{1}{4}$. del qual trattone 12. $\frac{1}{4}$. reſta 18. appunto, che è la differenza de' quadrati.

Troua tre numeri quadrati, che giunti inſieme tutti tre faccino numero quadrato, e giunti inſieme il primo, e ſecondo faccino numero quadrato. A far queſta, & altre ſimili, comincia ſempre da vn numero intero diſpari, il quale habbia radice diſcreta, perche ſe fuſſe numero pari, tal regola non ſeruirebbe, hor poniamo che il primo numero diſpari, che habbia radice diſcreta ſia 9. del qual ſempre per regola generale cauane 1. reſta 8. pigliane la metà che è 4. e queſto quadra fa 16. il qual ſarà il ſecondo numero quadrato, che aggiunto al primo numero che è 9. fa 25. che è pur numero quadrato, hora per trouare il terzo numero quadrato, piglia il congiunto del primo, & ſecondo cioè 25. del qual cauane 1. reſta 24. pigliane la metà che è 12. e queſto quadra, fa 144. e queſto ſarà il terzo numero quadrato, che aggiunto con li due numeri ſopradetti ſarà 169. il qual è numero quadrato, e coſi diremo che li tre numeri quadrati, faranno 9. 16. 144. che giunti inſieme fanno 169. il qual è numero quadrato, e con queſt'ordine potrai formare le propoſte di quanti numeri quadrati ti piace, che giunti inſieme, la ſomma loro faccia numero quadrato.

Troua vn numero, che multiplicato via 8. & il prodotto partito per 2. $\frac{1}{2}$. ne venga 144. poni che quel numero ſia vna coſa, multiplica vna coſa via 8. fa 8. coſe, parti per 2. $\frac{1}{2}$. ne viene 3. $\frac{1}{2}$. e queſto è vguale a 144. parti adunque 144. per 3. $\frac{1}{2}$. ne viene 45. e queſto è il numero, che ſi cerca.

Troua vn numero, che multiplicato via 6. & il prodotto multiplicato via 8. & il prodotto partito per 2. $\frac{1}{2}$. ne venga 360. Poni che quel numero ſia vna coſa, multiplica via 6. ſarà 6. coſe, e queſto multiplica via 8. ſarà 48. coſe, e queſto parti per 2. $\frac{1}{2}$. ne viene 61. $\frac{1}{2}$. e queſto numero è vguale a 360. parti 360. per 61. $\frac{1}{2}$. ne viene 5. $\frac{3}{2}$. e queſto è il numero che ſi cerca.

Troua vn numero che diuiſo in quattro parti diſuguali, e poi ſommate le tre parti ſenza la prima faccino 16. e ſommate le tre parti, ſenza la ſeconda, faccino 18. e ſommate la tre parti ſenza la terza faccino 23. e ſommate le tre ſenza la quarta, faccino 24. ſi domàda il detto numero, e ciaſcheduna delle dette quattro parti.

Fa coſi, aggiungi inſieme 16. 18. 23. 24. fanno 81. e queſto parti per vn meno delle parti, cioè le parti deuono eſſere 4. & vn meno, faranno 3. e perciò parti 81. per 3. ne viene 27. e di queſto cauane 16. reſta 11. e tanto ſarà la prima parte, poi

poi di detto 27. cauane 18. resta 9. e tanto farà la seconda parte, poi di detto 27. cauane 23. resta 4. e tanto farà la terza parte, poi di 27. cauane 24. resta 3. e tanto farà la quarta, & vltima parte, il numero adunque farà la somma d' 11. 9. 4. 3. cioè 27. come di sopra.

Troua due numeri, che tanto sia $\frac{2}{3}$. dell'vno, quanto $\frac{1}{4}$. dell'altro. Fa così, multiplica questi due rotti in croce, e prima multiplica il 3. che è sopra la riga, via 6. che è sotto l'altra riga, fa 18. e questo farà vn numero di quelli che noi cerchiamo, dipoi multipl. 5. che è sopra la riga via 8. che sta sotto l'altra riga farà 40. e questo sarà l'altro num. del qual presone $\frac{1}{4}$. ne vien 15. e preso $\frac{2}{3}$. di 18. ne vien similmete 15. e così hai trouato 2. num. che tanto è $\frac{1}{4}$. dell'vno, quãto $\frac{2}{3}$. dell'altro.

Troua 2. num. che tanto sia il $\frac{3}{4}$. il $\frac{1}{2}$. e $\frac{2}{3}$. dell'vno, quanto li $\frac{2}{3}$. il $\frac{1}{3}$. e il $\frac{1}{4}$. dell'altro, domando i dd. numeri. Queste simili proposte si possono formare con quãti rotti ci piace, che non fa caso. Hora fa così, sòma insieme $\frac{3}{4}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{2}{3}$. fanno $\frac{25}{12}$. e se bene si poteua dire che facessero $1. \frac{1}{3}$. non bisogna ridurre tal rotto a sìm, ma bisogna lasciarlo stare propriamete come semplici rotti, dipoi somma insieme $\frac{3}{4}$. $\frac{1}{2}$. e $\frac{2}{3}$. fanno $\frac{25}{12}$. auuertendo che schifando la somma di detti rotti ti darãno num. differenti, ma hauerãno in ogni modo tutte quelle parti che domãderai, hora noi habbiamo per la somma de' primi rotti $\frac{25}{12}$. e per la sòma de' secodi $\frac{1}{3}$. multipl. il denominante del primo rotto, cioè 12. via il denominatore del secondo rotto, cioè 3. farà 1704. e questo poni sotto a $\frac{25}{12}$. perche farà quel num. che hauerà tutte le parti di quei rotti, che sòmati insieme fecero $\frac{25}{12}$. dipoi multipl. il denominante del secondo rotto, cioè 3. via il denominator del primo, cioè 60. fa 1380. e questo poni sotto a $\frac{1}{3}$. perche farà quel numero, che hauerà tutte le parti di quei rotti, che sommati insieme fecero $\frac{1}{3}$.

Fatto questo, prendi $\frac{2}{3}$. e $\frac{1}{4}$. di 1380. e gli auuenimeti sommati insieme farãno 1633. dipoi prendi $\frac{3}{4}$. e $\frac{1}{2}$. di 1704. e gli auuenimenti sommati insieme faranno similmete 1633. e così hauerai sodisfatto alla domãda sopradetta, & hauerai che il primo num. sarà 1380. del qual pigliãdone $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{2}$. e $\frac{2}{3}$. e giunte queste parti insieme, farãno tanto quãto a pigliare $\frac{2}{3}$. $\frac{1}{2}$. e $\frac{1}{4}$. di 1704. che è l'altro num. come vedi.

$$\begin{array}{r} 7 \ 1 \\ \hline 6 \ 0 \end{array} \times \begin{array}{r} 2 \ 3 \\ \hline 2 \ 4 \end{array}$$

primo numero. 1 3 8 0. 1 7 0 4. secondo numero.

$$\begin{array}{r} 4 \ 6 \ 0 \\ 3 \ 4 \ 5 \\ \hline 8 \ 2 \ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \ 1 \ 3 \ 6 \\ 2 \ 8 \ 4 \\ \hline 2 \ 1 \ 3 \end{array}$$

proua. 1 6 3 3. 1 6 3 3. proua.

Troua due numeri che multiplicati l'vno via l'altro, faccino 29. domando i detti numeri.

Fa così, poni che il primo num. sia 1. & il secondo 2. multipl. 1. via 2. fa 2. e per detto 2. parti 29. ne vien 14. $\frac{1}{2}$. e dirai che il primo num. farà radice di 14. $\frac{1}{2}$. e per trouare il secondo, che ponemmo fuisse 2. multiplica 2. in se fa 4. e questo multiplica via 14. $\frac{1}{2}$. fa 58. e radice di 58. dirai che sia il detto numero; Fanne proua, multiplica radice 14. $\frac{1}{2}$. via radice 58. come puri numeri. Fanno 841. pigliane la radice quadra, che è 29. apunto.



Fammi d'11. due parti, che facci tante a multiplicar la maggiore via 7. quanto la minore via 9. si domanda le dette parti. Fa così per regola generale, aggiungi sempre insieme quei due numeri che vuoi multiplicare, via i numeri delle parti, cioè somma insieme 7. e 9. fanno 16. e questo sarà tuo partitore, dipoi multiplica il maggior numero de' due, che hai formati, cioè 9. via 11. fa 99. e questo parti per 16. sopradetto, ne vien 6. $\frac{3}{4}$. per la maggior parte d'11. e la minore sarà il resto, cioè 4. $\frac{1}{4}$. Fanne proua, multiplicando 6. $\frac{3}{4}$. via 7. farà 43. $\frac{3}{4}$. e così multiplicando 4. $\frac{1}{4}$. via 9. farà 43. $\frac{1}{4}$. come era di bisogno.

Fammi di 17. due parti, che partito la maggiore per la minore ne venga 3. Fa così, per regola generale, poni sempre 1. sopra il 3. o altro numero che fusse in tuo luogo fa 4. e per questo parti 17. ne viene 4. $\frac{1}{4}$. e tanto sarà la minor parte, e la maggiore sarà il resto, fino in 17. cioè 12. $\frac{3}{4}$. Fanne proua, parti 12. $\frac{3}{4}$. per 4. $\frac{1}{4}$. ne viene 3. appunto.

Fammi di 24. due parti, che multiplicato la maggiore, via la minore faccia 9. tanti di quel che ne viene a partir la maggiore per la minore. Fa così, piglia la radice di quei tanti che vuoi che faccia, cioè la radice di 9. che è 3. e questa è la minor parte, e la maggiore sarà il resto fino in 24. cioè 21. Fanne proua, multiplica la minor parte che è 3. via la maggiore che è 21. fa 63. dipoi parti per 21. che è la parte maggiore per 3. che la parte minore ne vien 7. Laonde tu vedi chiaramente che 63. è noue tanti di 7. più, o meno, staria male, e se la proposta di cesser 5. tanti, la minor parte sarebbe radice 5. e se dicessi 6. tanti, la minor parte sarebbe radice 6. e se dicessi 7. tanti, la minor parte sarebbe radice 7. e sic in infinitum.

Fammi di 16. due parti, che dal quadrato dell'una, al quadrato dell'altra, vi sia di differenza 100. appunto. Fa così, multiplica il detto 16. in se, fa 256. cauane la differenza, cioè 100. resta 156. e questo parti per il doppio della quantità, cioè per il doppio di 16. che è 32. ne vien 4. $\frac{1}{2}$. e questo è il minor numero, & il maggiore sarà il resto fino in 16. cioè 11. $\frac{1}{2}$. fanne proua, quadra l'una, e l'altra parte, trouerai che la differenza de' quadrati sarà 100. appunto.

Fammi di 15. due parti, che partito la maggiore per la minore, ne venga otto appunto. Fa così, aggiungi sempre 1. per regola generale, a quel numero che vuoi che ne venga, cioè aggiungi 1 a 8. farà 9. e questo sarà sempre partitore della quantità, cioè di 15. parti adunque 15. per 9. ne vien 1. $\frac{2}{3}$. e questa è la minor parte, e la maggiore sarà il resto fino in 15. cioè 13. $\frac{1}{3}$. fanne proua, parti 13. $\frac{1}{3}$. per 1. $\frac{2}{3}$. ne viene 8. appunto. Et in altro modo farai così, poni vn numero a caso, il qual partirai per 8. cioè per quel numero che vuoi che ne venga, hor poni, che quel numero sia 16. il qual parti per 8. ne vien 2. e questo aggiungi al detto 16. farà 18. dipoi dirai così, se 18. vien da 16. da che verrà 15? opera, verrà da 13. $\frac{2}{3}$. e questa sarà la maggior parte, l'altra sarà il resto, come di sopra s'è detto.

Fammi di 18. due parti, che partito la maggiore per la minore, e quel che ne viene per detta partitione, multiplicato via 9. faccia tanto, quanto a multiplicare l'una parte via l'altra.

Fa così per regola generale, toglie sempre la radice di 9. o vero di quel numero che fusse in luogo del 9. piglia adunque la radice di 9. che è 3. e detta radice sarà sempre la minor parte, e la maggiore sarà il resto fino in 18. cioè 15. fanne proua, parti 15. per 3. ne viene 5. multiplica via 9. fa 45. dipoi multiplica l'una parte via l'altra, cioè 3. via 15. fa 45. come voleuamo.

Fammi di 19. due tal parti, che partito la maggiore per la minore, e l'aumento multiplicato via 12. faccia tre tanti della multiplicatione d'una parte in vn'altra, mandasi le dette parti.

Fa così, parti sempre 12. ò vero altro numero che in suo luogo fusse per quei tanti, cioè per 2. ne vien 4. e la radice di 4. che è 2. sarà la minor parte, e la maggiore sarà il resto fino in 19. cioè 17. Fanne proua, parti 17. per 2. ne viene 8. $\frac{1}{2}$. e questo multiplica via 12. fa 102. il qual salua, dipoi multiplica l'vna parte via l'altra, cioè 2. via 17. fa 34. del qual 34. tu vedi che 102. n'è tre tanti, come doueua.

Fammi di 20. quattro parti, che multiplicata la prima via 2. e la seconda via 3. e la terza via 4. e la quarta via 5. faccia tanto l'vna, quanto l'altra.

Fa così, troua vn numero che partito per quei numeri che vuoi multiplicare le sopradette parti, non auanzi rotti, cioè troua vn numero che partito per 2. per 3. per 4. e per 5. non auanzi rotti, volendolo trouare con prestezza, multiplica 2. via 3. fa 6. e questo multiplica via 4. fa 24. e questo via 5. fa 120. e questo sarà quel numero che partito per le sopradette quantità non auanza rotti.

Poteuasi ancora pigliar che quel numero fusse 60. il quale ha le medesime sopradette parti: hor piglia 120. partito per 2. ne vien 60. per 3. ne vien 40. per 4. ne vien 30. e per 5. ne vien 24. hor farai a modo di compagnia, dicendo. Quattro fanno compagnia il primo mette 60. il secondo 40. il terzo 30. & il quarto 24. & hanno a partire 20. cioè la quantità che vuoi diuidere in quattro parti, domandasi quanto toccherà per vno, opera nei modi già detti delle Compagnie, trouerai che la prima parte sarà 7. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. e la seconda 5. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. e la terza 3. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. e la quarta 2. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. che multiplicato ciascuna via quanto s'è detto, trouerai che sarà tanto l'vna, quanto l'altra, &c.

Fammi di 18. due parti, che tanto faccia la maggiore multiplicata via 5. quanto l'altra via 6.

Fa così, somma insieme 6. e 5. fanno 11. dipoi dirai, se 11. vien da 6. da che verrà 18? multiplica 18. via 6. fa 108. il qual parti per 11. ne vien 9. $\frac{1}{2}$. e tanto sarà la maggior parte; e per la minore simil-nen e dirai, se 11. vien da 5. da che verrà 18? opera, trouerai che verrà da 8. $\frac{1}{2}$. e tanto sarà la minor parte.

Ma con più breuità, poteuasi dir così. Due hanno a partir 18. cose, & vno ne deuè trar per 6. e l'altro per 5. si domanda che tocca per vno, opera per modum societatis, &c.

Fammi di 40. tre parti, che la prima alla seconda sia in proportionē si equaliera cioè la metà più, e la seconda alla terza sia in proportionē dupla, cioè il doppio.

Poni che la prima sia 3. la seconda conuien che sia 2. douendo la prima essere la metà più, e la terza conuerà che sia 1. douendo esser la seconda il doppio, somma insieme 3. 2. 1. fanno 6. e questo è vguale a 40. partasi 40. per 6. ne vien 6. $\frac{2}{3}$. e tanto vale la cosa; ma perche ponemo che la prima cosa fusse 3. perciò multipli. 3. via 6. $\frac{2}{3}$. fa 20. e tanto sarà la prima parte, e perche la seconda si pose due cose, multiplica 2. via 6. $\frac{2}{3}$. fa 13. $\frac{1}{3}$. e tanto sarà la seconda parte; e la terza ponemmo che fusse vna cosa, perciò multiplica 1. via 6. $\frac{2}{3}$. fa 6. $\frac{2}{3}$. e tanto sarà la terza parte.

Fammi di 60. tre parti, che la prima sia alla seconda in proportionē tripla, cioè tre tanti, e la seconda sia alla terza in proportionē dupla.

Poni che la terza parte sia vna cosa, la seconda adunque sarà 2. cose, e la terza la quale deuè essere triola alla seconda, sarà 6. somma insieme 1. 2. e 6. fanno 9. cose, e questo è vguale a 60. per 9. ne viene 6. $\frac{2}{3}$. e tanto sarà la terza parte, la seconda sarà il doppio, cioè 13. $\frac{1}{3}$. e la terza sarà tre tanti della seconda, cioè 40. che sommati insieme fanno 60.

Fammi di 24. tre parti, che le differenze di ciascuna sieno vguale, & il quadrato della maggiore sia vguale alla somma, ò ver congiunto de' quadrati dell'altra due

due parti; si domanda le dette parti. Fa così, piglia sempre il terzo di quella quantità che vuoi diuidere cioè di 24. che è 8. e tanto sarà la seconda parte, e per saper quanto sarà la terza parte, piglia sempre, per regola scritta $\frac{1}{3}$. della detta quantità, cioè di 24. che è 8. e questo aggiungilo alla seconda parte, e la prima sarà il rimanente fino in 24. che v'è 6. e così le differenze delle parti saranno vguali, & il quadrato della maggiore sarà vguale alla somma de' quadrati dell'altre due parti.

Fammi di 20. due parti, che il quadrato della minore, multiplicato via il quadrato della maggiore, faccia 1296. domando le dette parti. Fa così, piglia sempre la radice quadra di 1296. è vero d'altro numero che fusse in suo luogo, la cui radice è 36. di poi dirai, fammi di 20. due parti, che multiplicata l'vna via l'altra faccia terminatamente 36. fa adunque due parti vguali di 20. ne vien 10. per parte, multiplica vna di queste parti in se, è vero l'vna via l'altra, cioè 10. via 10. fa 100. e di questo cauane il numero terminato, cioè 60. resta 64. e di questo pigliane la radice che è 8. il quale aggiunto al dimezzamento di 20. cioè a 10. fa 18. e tanto sarà la maggior parte, e l'altra parte cioè la minore sarà il detto dimezzamento, cioè 10. men radice 64. la qual farà 2. & hauera sempre che la maggior parte sarà il detto dimezzamento della quantità più radice del rimanente, e la minore sarà il detto dimezzamento men radice del rimanente.

Fammi di 30. due parti, che la maggiore sia due tanti della minore meno 9. si domanda le dette parti. Egli è così manifesta che se alla maggior parte aggiungerà 9. farà due tanti della parte minore, e quel numero che sarà due tanti d'un altro numero, farà sempre $\frac{2}{3}$. di tutti due i numeri giunti insieme, adunque diremo che la maggior parte sia $\frac{2}{3}$. di 30. più $\frac{2}{3}$. di 9. meno 9. cioè $\frac{2}{3}$. di 30. sono 20. piglia hora $\frac{2}{3}$. di 9. che è 6. aggiungilo a 20. fa 26. cauane 9. resta 17. e tanta sarà la maggior parte, e la minor parte sarà il $\frac{1}{3}$. di 30. meno $\frac{2}{3}$. di 9. più 9. cioè piglia $\frac{1}{3}$. di 30. che è 10. cauane li $\frac{2}{3}$. di 9. cioè 6. resta 4. & a questo aggiungi 9. fa 13. e tanto sarà la seconda parte, e così hauera diuiso 30. in due parti, che la minore è 13. e la maggiore è 17. la qual viene a essere due tanti della minore meno 9. come era di bisogno.

Fammi di 30. due parti, che la minore sia $\frac{2}{3}$. meno 4. della maggiore, si domanda le dette parti.

Sappi, che se saranno due numeri, & vno di quelli sia $\frac{2}{3}$. dell'altro, quello sarà $\frac{1}{3}$. della somma di tutti due i numeri giunti insieme, adunque fra tutte due le parti sono 30. e perciò diremo che la minor parte sia $\frac{2}{3}$. di 30. e di più sia li $\frac{2}{3}$. di 4. meno 4. cioè $\frac{2}{3}$. di 30. sono 12. e li $\frac{2}{3}$. di 4. sono 1. $\frac{2}{3}$. che giunti a 12. fanno 13. $\frac{2}{3}$. cauane il 4. meno resta 9. $\frac{2}{3}$. e tanto sarà la prima parte.

Hor per trouar la seconda, hauendo detto che la prima sia $\frac{2}{3}$. di 30. adunque la maggiore conuerà che sia li $\frac{1}{3}$. di 30. più 4. meno $\frac{2}{3}$. di 4. cioè, piglia $\frac{1}{3}$. di 30. son 10. aggiungiui più 4. fanno 22. cauane $\frac{2}{3}$. di 4. resta 20. $\frac{2}{3}$. e tanto sarà la maggior parte, fanno proua.

Fammi di 18. due parti, che il quadrato della maggiore, partito per il quadrato della minore ne venga radice di radice 625. domando le dette parti.

Fa così, piglia sempre la radice della radice di 625. è vero di quel numero che fusse in suo luogo, la cui radice è 5. al qual per regola aggiungi 2. farà 6. e per questo 6. partirai quella quantità che vuoi diuidere, cioè 18. ne viene 3. e tanto fu la minor parte, il resto fino in 18. che v'è 15. sarà la maggior parte.

Fammi di 13. due parti, che multiplicato la radice dell'vna, via la radice dell'altra, ne venga la radice di 36. si domanda le dette parti. Fa

Fa così, diuidi 24 in due parti uguali ne vien 6. $\frac{1}{2}$. per parte, & vna di queste parti multipliecin se fa 12. $\frac{1}{2}$. & di questo uanno radice 3. resta radice 6. $\frac{1}{2}$. & di questo prendine la radice che è 2. $\frac{1}{2}$. il quale aggiunto a 6. $\frac{1}{2}$. fa 9. e tanto sarà la maggior parte, hor di detto 6. $\frac{1}{2}$. cauane 2. $\frac{1}{2}$. resta tre tanto sarà la minor parte, poteuasi ancora dir così, che la maggior parte sia 6. $\frac{1}{2}$. più radice, 6. $\frac{1}{2}$. e la minore sia 6. $\frac{1}{2}$. men radice 6. $\frac{1}{2}$. che è il medesimo.

Troua 2 numeri, che multiplicato il primo via 5. e l'altro via 9. & i lor prodotti giunti insieme facciano 32. Fa così, multipl. sempre de' due multiplicatori, il minore in se, cioè 5. fa 25. & questo caua di 32. resta 7. & questo parti per l'altro multiplicatore, che è 9. ne vien 3. e così dirai che il primo num. sia 5. & l'altro 3. che multiplicato il primo via 5. & il secondo via 9. i lor prodotti giunti insieme fanno 32. come era di bisogno. Fannosi di 62. cinque quantità proportionali, che multiplicata la prima in l'altre quattro, & la seconda in l'altre quattro, & la terza in l'altre quattro, & la quarta in l'altre quattro, & la quinta in l'altre quattro, & alla somma di dette multiplicazioni aggiuntoui, la superficie di ciascuna quantità, faccino il quadrato di 62. Prima faremo fondamenti sopra l'vnità, & diremo che la prima quantità sia 1. la seconda 2. la terza 4. la quarta 8. & la quinta 16. che somate insieme fanno 31. & inbi voleuamo 62. però per modum societatis diuidi 62. troderai che la prima quantità sarà 1. la seconda sarà 4. la terza 8. la quarta 16. & la quinta 23. le quali multipl. come di sopra s'è detto, & alla somma de' prodotti aggiuntoui la superficie di ciascuna fanno in tutto 3844. che è uguale al quadrato di 62. come voleuamdi.

Troua due numeri differenti, che faccino tanto a sommarli insieme, quanto a multiplicar l'vn via l'altro. Fa così, poni che il primo numero sia 2. & il secondo sia 3. fa 6. & di questo cauane 1. resta 5. & questo parti per il d. 2. ne vien 2. $\frac{1}{2}$. & tanto sarà il primo numero, & per il secondo, parti detto 5. per 3. ne vien 1. $\frac{2}{3}$. & tanto sarà il secondo numero.

Vno ha compro vna pezza di panno lunga braccia 20. & larga braccia due per ducati 40. domando vn'altra pezza che sia più corta, ma più larga, & alla medesima ragione della prima costi ducati 64. quanto sarà lunga, & larga.

Fa così, multiplica la lunghezza della prima pezza che è braccia 20. via la sua larghezza che è braccia 2. farà 40. & tante braccia quadre farà la prima pezza: di poi dirai così, & ducati 40. mi danno braccia 40. quadre di panno; quante braccia me daranno ducati 64. opera ti daranno braccia 64. quadre di panno del qual 64. pigliane la radice cuba che è 4. & tante braccia conuerrebbe che fusse larga 3. parti 64. per detto 4. ne vien 16. & tante braccia sarà lunga, &c.

Vno fece vn viaggio in 3. giorni, & il primo di cammino 20. miglia, & il terzo di cammino 45. miglia, si domanda quante miglia cammino il secondo giorno. In quella conuen trouar il mezzo proportionale fra due estremi, & in due modi si puot intendere, cioè Arithmetice, & Geometriche, & prima Arithmetice, aggiungi insieme questi due estremi, cioè 20. & 45. fanno 65. prendine la metà che è 32. $\frac{1}{2}$. & questo farebbe il mezzo proportionale Arithmetice fra 20. & 45. Ma Geometriche, multiplica l'vn estremo via l'altro, cioè 20. via 45. fa 900. & la radice quadra di 900. che è 30. farà il mezzo proportionale Geometrico infra 20. & 45. & ossidiremo, che il secondo giorno camminasse 30. miglia.

Vno fece vn viaggio in tre giorni, & il primo giorno cammino 32. miglia, & il secondo giorno cammino 48. miglia, si domanda quanto cammino il terzo giorno. Se di tre quantità continue proportionali, la prima, & seconda ci saranno note, & vorremo trouare la terza. Fa così, quadra la seconda, & il quadrato parti per

la prima, e l'aumento sarà la terza quantità proportionale, e perciò quadra 48. che è la seconda quantità, fa 2304. e questo parti per 32. che è la prima quantità, ne viene 72. e tante miglia dirai che facesse il terzo giorno.

Vno fece vn viaggio in tre giorni, & il primo di caminò vna quantità di miglia, & il secondo di ne caminò 60. & il terzo di ne caminò 90. si domanda quante miglia caminò il primo giorno.

Se di tre quantità continue proportionali la seconda, e terza ci saranno note, e vorremo trouare la prima; Fa così, quadra la seconda, & il quadrato parti per la terza, e l'aumento sarà la prima quantità proportionale. Quadra adunque 60. che è la seconda quantità fa 3600. parti per 90. che è la terza quantità, ne vien 40. e tante miglia fece il primo giorno.

Vno fece vn viaggio in tre giorni, & il secondo giorno caminò 60. miglia, e fra il primo, e terzo giorno caminò 130. miglia, domando quante miglia caminò il primo, & il terzo giorno. Se di 3. quantità continue proportionali la seconda sola ci sarà nota, e vorremo trouare la prima, e terza, delle quali ci sia noto solamente il lor congiunto. Facci così, diuidasi in due parti vguale il congiunto della prima, e terza quantità, e del quadrato d'vna di quelle parti se ne caui il quadrato della seconda quantità, e del resto se ne prenda la radice, hauremo che la prima quantità sarà il dimezzamento del congiunto della prima, e terza quantità, meno la radice della differenza de' quadrati, e la terza quantità sarà il detto dimezzamento più radice di detta differenza.

Prendi adunque la metà di 130. miglia, che fece tra il primo, e terzo giorno, ne vien 65. quadra 65. fa 4225. e di questo cauane il quadrato di 60. che è 3600. resta 625. e di questo prendi la radice che è 25. il qual tratto de' 65. resta 40. e tante miglia caminò il primo di, dipoi aggiungi il detto 25. a 65. fa 90. e tante miglia caminò il terzo giorno.

Vno fece vn viaggio in quattro giorni; & il primo di caminò 10. miglia, & il secondo ne caminò 20. & il terzo ne caminò 40. & il quarto ne caminò non so quante, si domanda quante miglia caminò il quarto giorno.

Se di quattro quantità continue proportionali, la prima, seconda, e terza, ci saranno note, e vorremo trouar la quarta, multiplica la terza, via la seconda, & il prodotto parti per la prima, e l'aumento sarà quarta quantità proportionale, e perciò multiplica 40. via 20. fa 800. parti per 10. ne viene 80. e tante miglia caminò il quarto giorno.

Vno fece vn viaggio in quattro giorni, & il primo di caminò 10. miglia, & il secondo ne caminò 20. si domanda caminando proportionalmente, quante miglia caminò il terzo, e quarto giorno.

Se di quattro quantità continue proportionali, la prima, e seconda, ci saranno note, e vorremo trouare la terza, e quarta, prima bisogna trouar la terza, multiplicando la seconda in se, & il prodotto partir per la prima, multiplica adunque 20. in se fa 400. e questo parti per prima quantità che è 10. ne vien 40. e tante miglia caminò il terzo giorno.

Hor per trouar la quarta quantità proportionale, multiplica la terza via la seconda, cioè 40. via 20. fa 800. e questo parti per la prima, cioè per 10. ne viene 80. e tante miglia caminò il quarto giorno.

Vn giovane è stato per Seruitore con vn Mercante quattro anni, & il primo, e secondo anno non sò quanto gli habbia dato di salario, ma sò bene che il terzo anno gli dette ducati 32. & il quarto anno gli dette ducati 64. si domanda quanti ducati gli dette il primo, e second'anno.

Se

Se di quattro quantità continue proportionali, la terza, e quarta ci faranno note, e vorremo trouare la prima, e seconda.

Fa così moltiplica la terza in se, & il prodotto partilo per la quarta quantità, e l'auenimento sarà la seconda quantità, come in questa, moltiplica 32. in se (che è la terza quantità) fa 1024. e questo parti per la quarta quantità che è 64. ne vien 16. e tanti ducati gli dette il second' anno, hor per trouare quanto gli dette il prim'anno, si dice che se di quattro quantità continue proportionali, la seconda, terza, e quarta, ci faranno note, e vorremo trouare la prima.

Fa così, moltiplica la seconda quantità in se, & il prodotto parti per la terza, e l'auenimento sarà la prima quantità proportionale, come in questa, moltiplica 16. in se, che è la seconda quantità, fa 256. e questo parti per la terza quantità che è 32. ne viene 8. e tanti ducati gli dette il primo anno.

Vn giouane è stato per Seruitore con vn Mercante quattro anni, e fra il primo, e quarto anno, gli dette di salario ducati 18. e fra il secondo, e terzo anno, gli dette di salario ducati 12. si domanda quanti ducati gli dette il primo, secondo, terzo, e quarto anno, separatamente.

Se di quattro quantità continue proportionali ci sarà noto il congiunto della prima, e quarta. & il congiunto della seconda, e terza, e noi vorremo sapere separatamente quanto sia ciascuna quantità.

Fa così, cubica il congiunto della seconda, e terza quantità, cioè il salario del secondo, e terzo anno, che è ducati 12. cubica 12. fa 1728. e questo partirai per il triplato del congiunto della seconda, e terza quantità, con l'aggiuntione a detto triplato del congiunto della prima, e quarta quantità, cioè fra il secondo, e terzo anno gli dette ducati 12. tripla 12. fa 36. hora a questo aggiungi il congiunto del salario del primo, e quarto anno, cioè ducati 18. fa 54. e questo sarà partitore di 1728. ne verrà 32. il qual salua da parte dipoi prendi la metà di 12. cioè del salario del secondo, e terzo anno, che la metà è 6. quadra vna di queste parti cioè 9. fa 36. e di questo quadrato cauane 32. che saluasti, resta 4. e la radice di 4. che è 2. più il dimezzamento del salario del secondo, e terzo anno, il quale è 6. che in tutto fa 8. diremo che gli dette di salario il terzo anno, & il salario del secondo anno fu il dimezzamento sopradetto, cioè 6. meno la radice del rimanente, che è 2. cioè 6. meno 2. che è 4. e tanto fu il salario del secondo anno, poi per il primo anno quadra 4. che è la seconda quantità fa 16. parti per la terza che è 8. ne viene 2. per il salario del primo anno, dipoi per il salario del quarto anno moltiplica il salario del secondo anno via il salario del terzo anno, cioè 4. via 8. fa 32. e questo parti per il salario del primo anno, che è 2. ne viene 16. e tanti ducati gli dette di salario il quarto anno.

Vn giouane ha seruito vn Mercante cinque anni, & il primo anno hebbe di salario ducati 16. & il quarto anno hebbe di salario ducati 256. si domanda quanti ducati hebbe il secondo, il terzo, & il quarto anno.

Se di cinque quantità continue proportionali, ci faranno note solamente la prima, e la quinta, e noi vorremo trouare l'altre, ci seruiremo delle sopradette, e prima farai così, moltiplica la prima quantità via la quinta, cioè 16. via 256. fa 4096. e di questo prendine la radice, che è 64. e tanto farà la terza quantità proportionale, cioè ducati 64. hebbe di salario il terzo anno.

Hora a noi è noto la prima, e terza quantità, se vorremo la seconda, moltiplica la prima via la terza, cioè 16. via 64. fa 1024. e di questo prendine la radice che è 32. e tanti ducati hebbe di salario il secondo anno; hora a noi è noto la prima,

prima, seconda, e terza quantità, se vorremo la quarta, multiplica la seconda via la terza, & il prodotto parti per la prima, cioè multiplica 32. (che è la seconda) via 64. che è la terza, fa 2048. e questo parti per la prima quantità che è 16. ne viene 128. e tanti ducati hebbe di salario il quarto anno.

Mediante queste ne potrai formare altre diverse, e di 6. e di 7. e di 8. quantità continue proporzionali.

Vn giovane ha seruito vn Mercante quattr'anni, & il prim'anno hebbe di salario vna quantità di ducati, & il second'anno hebbe ducati 9. e fra il primo, e terzo anno, hebbe ducati 16. e fra il secondo, e quarto anno, hebbe ducati 24. si domanda quanti ducati hebbe il primo, terzo, e quarto anno.

Di quattro quantità continue, o discontinue proporzionali, sempre il congiunto della prima, e terza, sarà tal parte del congiunto della seconda, e quarta, quale la prima sola della seconda sola. Adunque il congiunto del salario del primo, e terzo anno, sono duo. 16. & il congiunto del salario del secondo, e quarto anno, sono due. 24. douè tu vedi che 16. sono $\frac{2}{3}$ di 24. e perciò diciamo, che il salario del prim'anno deue esser $\frac{2}{3}$ del salario del second'anno, tu fai che sono ducati 9. troua adunque vn num. che sia $\frac{2}{3}$ di 9. piglia $\frac{2}{3}$ di 9. ne vien 6. e tanti ducati hebbe il prim'anno, e perche fra il primo, e terz'anno, hebbe due. 16. cauane 6. che n' hebbe il prim'anno, restano due. 10. per il terz'anno, e perche fra il secondo, e quart'anno hebbe due. 24. cauane 9. che n' hebbe il second'anno restano due. 15. per il quart'anno, e trouarai che il prim'anno hebbe due. 16. il second' 9. il terzo 16. & il quarto 24.

Vno Speciale vuol far fabbricare cinque pesi, che pesino sempre once sane, & da vn'oncia fino in once 221. si domanda la disposizione de' detti pesi, cioè di quanti once si douerà fare ciascun di loro.

Quando si vuol sempre pesare once sane, e che fra tutti li cinque pesi non passino once 121. di necessità bisogna fabbricarli in la proportion tripla, e volendo pesare vn'oncia di seta, o altra cosa, fa bisogno che fra quei cinque pesi ve ne sia vno che pesi vn'oncia apunto, e volendo fabbricare il secondo peso, raddoppia vn'oncia che pesa il primo fa due, & a questo aggiungi vno per regola fa tre, & once tre, douerà pesare il secondo, e volendo fabbricare il terzo peso, somma insieme l'once del primo, e del secondo, cioè once vna, & once tre fanno once quattro, e questo raddoppia fa once otto, aggiungi vno per regola fa 9. & once 9. douerà pesare il terzo peso, e volendo fabbricare il quarto peso, somma insieme l'once del primo, del secondo, e del terzo, cioè 1. 3. 9. fanno 13. e questo raddoppia fa 26. aggiungi vno per regola fa 27. & once 27. douerà pesare il quarto peso, e volendo fabbricare il quinto peso, somma insieme l'once del primo, del secondo, terzo, e quarto peso, cioè 1. 3. 9. 27. fanno 40. e questo raddoppia fa 80. aggiungi vno per regola fa 81. douerà pesare il quinto peso, e così con quest'ordine potrai fabbricare 6. 7. & altri 8. pesi, e disposti in once, o in libbre.

E volendo fabbricare cinque pesi disposti nella conuina proportion dupla, che pesino sempre libbre sane da vna libbra, o vero oncia, fino in 30. dirai, che bisogna fabbricarli così, cioè il primo che pesi vna libbra, il secondo due libbre, il terzo quattro, il quarto otto, & il quinto 16. e volendo pesare da vna libbra fino in 26. bisognarebbe farli così, 1. 2. 4. 8. 16. e volendo pesare con 6. pesi da vno fino in 26. saranno disposti così, 1. 3. 4. 8. 16. 32.

E volendo pesare con 7. pesi da 1. fino in 100. saranno disposti così, 1. 2. 4. 8. 16. 32. 37. e l'ultimo peso si troua sempre sommando prima tutti i duplati fino a quella quantità che vuoi poter pesare, e quella tal differenza sarà sempre quanto

quanto deue pesare l'ultimo peso, come volendo trouare il settimo peso solo, radetto, somma insieme tutti li duplati di 6. pesi, cioè 1. 4. 8. 16. 32. trouerai, che faranno 63. vnità, e da detto 63. fino in 100. v'è 37. e tante libbre, ò vero onçe dirai che douerà pesare il settimo peso, e si peserà sempre libbre sane da vna libbra fino in cento.

Regola del Cataino.

Tirati dal desiderio che habbiamo di non solamente giouare, ma diletta-
re ancora a tutti quelli che si compiacciono delle discipline Mathematiche, ci
siamo lasciati trasportare a formare le sopradette propositioni, le quali poche
volte possono occorrere, se non per modo di ragionamento, e di dispute per passar
tempo. Vogliamo hora con l'aiuto di Dio dar principio a trattar della regola,
detta in lingua Arabica Helcataym, e da noi detta il Cataino; il senso del qual
nome in nostra lingua non vuol dir altro, che Regola di due false positioni, cioè
semplice, e composta, tratteremo hora della semplice, e doppo che haueremo
addotti molti casi, e per detta regola semplice del Cataino soluti, tratteremo del-
la seconda cioè della composta, e la regola semplice del Cataino si nomina per
tutte le scuole publiche così, Regola del primo apponere, ò vero position sempli-
ce, e nota, che positione in questo luogo non vuol dir altro, che apporsi a vna
cosa, cioè apporsi a quanto costa, ò vale vna cosa, come per esempio a tua mag-
gior intelligenza formeremo le seguenti propositioni.

Troua vn numero che presone li $\frac{2}{7}$. e tratti poi di detto numero, resti $\frac{1}{5}$. ancor-
che per altri modi si possono soluere simili domande, nientedimeno, la vogliamo
dimostrare per vn sol ponere a caso, hor poni che li $\frac{2}{7}$. sien presi, e tratti di qual
numero intero, ò rotto ti piace, che non fa caso, ma per fuggir il trauiagliamento
de' rotti, poni vn numero intero qual ti pare, il qual numero poni che sia cinque
prendine $\frac{2}{7}$. ne vien 4. caua il detto 4. di detto 5. resta 1. e noi voleuamo che re-
stasse $\frac{1}{5}$. adunque ci siamo apposti al falso, hor volendo trouar la verità, dirai
così, se 1. che mi resta, vien da 5. ch'io m'apposi, da che verrà $\frac{1}{5}$. che mi douea
giustamente restare? multiplica $\frac{1}{5}$. via 5. fa 4. $\frac{1}{5}$. e questo parti per 1. ne viene
pur 4. $\frac{1}{5}$. e questo sarà quel numero, del qual se ne trarrai li $\frac{2}{7}$. di detto numero
resterà $\frac{1}{5}$. Fanne proua prendi $\frac{2}{7}$. di 4. $\frac{1}{5}$. ne viene 3. $\frac{1}{5}$. che tratto di 4. $\frac{1}{5}$. resta
 $\frac{1}{5}$. conie voleuamo. E se in luogo del 5. che ti apponesti tu hauesti posto vn rotto,
il medesimo ti veniuo, come per esempio, poni che il num. sia $\frac{2}{7}$. prendine $\frac{2}{7}$. ne
vien $\frac{4}{7}$. caua $\frac{1}{7}$. di $\frac{4}{7}$. resta $\frac{3}{7}$. e noi voleuamo che restasse $\frac{1}{5}$. adique il nostro
ponere fu falso, perciò in virtù della regola del tre troueremo il numero vero, di-
cendo così, se $\frac{3}{7}$. che mi resta, vengono da $\frac{4}{7}$. ch'io m'apposi, da che verranno
 $\frac{1}{5}$. che mi doueano restare? multiplica $\frac{1}{5}$. via $\frac{4}{7}$. & il prodotto parti per $\frac{3}{7}$. ne
vien 4. $\frac{1}{5}$. e di questo numero pigliandone $\frac{2}{7}$. e cauandoli di detto numero resterà
 $\frac{1}{5}$. apunto, come per il primo operare.

Essendo domandato a vn Capitano quanti soldati haueffe sotto il suo gouerno,
rispose così, che $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. & $\frac{1}{5}$. di essi faceuano apunto il num. di 4700. soldati, si do-
màda quanti soldati haueua. Fa così, roua vn num. che habbia le sopradette parti,
il qual num. sarà 60. e le dette parti faranno 20. 15. e 12. che sommate insieme fàno
47. per il che dirai così, se 47. vien da 60. da che verranno 4700? opera verranno
da 6000. e tanzi soldati haueua il detto Capitano

Vn maestro di scuola ha tanti scolari, che se n'hauessẽ altrettanti, e la metà, e'l terzo, e'l quarto di essi, & vn più hauerebbe apunto 112. scolari, si domanda quanti n'hauera. Fa così. Ttai quell'vn più di 112. resta 111. hor troua vn numero che raddoppiato, e presone la metà, il terzo, & il quarto, e giunto ogni cosa insieme faccino apunto 111. il qual numero poni che sia 12. raddoppialo fa 24. piglia del detto 12. le sopradette parti, cioè la metà, il terzo, & il quarto, sono 6. 4. 3. le quali sommate con 24. fanno 37. e noi voleuamo, che facessero 111. per il che dirai così, se 37. vien da 24. ch'io m'apposi, da che verrà 111. opera trouerai che verrà da 72. e tanti scolari diremo che hauessẽ.

Vno andando da Fiorenza in Sicilia, spese nel viaggio $\frac{3}{4}$. & $\frac{1}{2}$. de' suoi denari, e ritornato a casa trouò essersi auanzati ducati 36. si domanda quanti ducati portò con lui. Fa così, troua vn numero che trattone $\frac{3}{4}$. & $\frac{1}{2}$. resti 36. poni che tal numero sia 60. prendine $\frac{3}{4}$. & $\frac{1}{2}$. faranno 40. e 12. che giunti insieme fanno 52. e tratti di 60. restano 8. e noi voleuamo che restasse 36. per il che dirai in questo modo, se 8. mi resta da 60. ch'io m'apposi da che numero mi resterà 36? opera, trouerai che ti resterà da 270. e tanti ducati portò seco. Ma se alle volte auuenisse che le parti espresso nella propositione eccede l'vna, sarà impossibile poter soluere detta proposita.

Troua vn numero del qual presone $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{5}$. & $\frac{1}{6}$. e giunte insieme tutte queste parti faccino 522. Poni che quel numero sia 60. del qual pigliane le sopradette parti, ne verrà 30. 20. 15. 12. e 10. che somate insieme fanno 87. e noi voleuamo 522. per il che dirai così, se 87. vien da 60. ch'io m'apposi, da che verrà 522? opera, verrà da 360. e questo sarà il numero del qual presone le sopradette parti, e poi sommate insieme faranno 522.

Vno ha speso il $\frac{1}{4}$. de' denari ch'hauera, e gl'è restato ducati 17. si domanda quanti n'hauera, fa così, poni che hauessẽ ducati 24. prendine il $\frac{1}{4}$. che è 6. trai detto 6. di 24. resta 18. e noi voleuamo che restasse 17. perciò dirai così, se 18. mi resta per 24. ch'io m'apposi, da che quantità mi douerà restar 17? opera, ti resterà da 22. $\frac{3}{4}$. e tanti ducati hauera.

Vno ha speso il $\frac{1}{2}$. de' ducati ch'hauera, e 6. ducati più, e gl'è restato ducati 20. si domanda quanti ducati hauera.

Fa così, aggiungi ducati 6. a 20. fa 26. e tanti ducati hauera prima che non spendesse 6. adunque dopo che hebbe speso il terzo de' suoi denari gli restò 26. per il che dirai così. Troua vn numero che trattone il $\frac{1}{3}$. resti 26. poni che quel numero sia 30. prendine il terzo che è 10. caualo di 30. resta 20. e noi voleuamo che restasse 26. perciò dirai così, se 20. mi resta per 30. ch'io m'apposi, da che quantità mi resterà 26? opera ti resterà da 39. e tanti ducati hauera da prima.

Vno ha venduto vna pezza di panno per ducati 48. & ha guadagnato li $\frac{3}{4}$. di quel che gli costò, e 6. ducati più, si domanda quanto li costò. Fa così, tu vedi chiaramente che se non faccua mentione di 6. ducati più, l'hauerebbe venduta ducati 42. cioè 6. meno di 48. adunque in detto 42. v'è dentro incorporato li $\frac{3}{4}$. che guadagna del suo proprio capitale, perciò bisogna dir così.

Troua vn numero che aggiuntoui li suoi $\frac{3}{4}$. faccia 42. poni che il detto numero sia 12. prendine $\frac{3}{4}$. ne viene 8. aggiungili a detto 12. fa 20. e noi voleuamo 42. adunque il nostro ponere fu falso, e volendo trouare il vero, dirai così, se 20. vien da 12. ch'io m'apposi, da che verrà 42? opera, verrà da 25. $\frac{1}{2}$. e tanti ducati diremo che costasse la pezza del panno.

Vno compra 3. staia di biada per vna quantità di lire 10 staio, e staia 4. di grano

no per due tanti lo staio, che lo staio della biada, e tutto li costò lire 36. si domanda quanto li costò lo staio della biada, e lo staio del grano. Fa così, poni che lo staio della biada li costò lire 3. adunque lo staio del grano li costò lire 6. e stante così la verità tutta la biada li costerebbe lire 9. & il grano lire 24. che in tutto farebbono lire 33. e noi voleuamo lire 36. adunque il nostro ponere fu falso, e volendo trouare la verità dirai così, se lire 33. vengon da lire 3. ch'io m'apposi, da quante verranno lire 36? opera verranno da lire $3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$. e tante lire li costò lo staio della biada, e lo staio del grano li costò due tanti, cioè lire $6 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3}$. FINE proua.

Vno ha venduto staia 12. di biada, e staia 12. di grano, tutto per lire 96. & il grano l'ha venduto 3. tante della biada, domandasi quanto ha venduto la biada, e quanto il grano.

Fa così, poni che tutta la biada l'abbia venduta lire 12. adunque il grano l'hauerà venduto lire 36. che giunte insieme queste due valute fanno lire 48. e noi voleuamo lire 96. adunque il nostro ponere fu falso, e volendo trouare la verità dirai così, Se 48. vien da 12. ch'io m'apposi, da che verrà 96? opera, verrà da lire 24. e tanto vendè la biada, & il grano lo vendè tre tanti, cioè lire 72. che giunte insieme le valute fanno lire 96. come voleuamo.

Vn Mercante essendo andato a vna Fiera con denari guadagnò tanto che fra il capitale, e guadagno, fu tre volte più dell'i denari che portò seco, e dopo con questi denari andò a vn'altra Fiera, e guadagnò tanto, che fu 5. volte più di detto guadagno, e capitale; dipoi andò a vn'altra Fiera con tutti i denari, e guadagnò tanto, che il guadagno insieme con li denari che vltimamente haueua, tu quattro volte più di questi denari, e trouossi alla fine ducati 40. mila, si domanda quanti ducati portò alla prima Fiera. Fa in questo modo, troua vn numero che multiplicato via 3. & il suo prodotto via 5. e questo prodotto via 4. facci 40. mila. Poni che quel numero sia 12. il qual solo multiplichi via 3. farà 36. con il guadagno, e capitale della prima Fiera; dipoi multiplica 36. via 5. fa 180. con il guadagno, e capitale della seconda Fiera; dipoi multiplica 180. via 4. fa 720. con il guadagno, e capitale della terza Fiera, ma noi habbiamo detto, che si trouò alla fine della terza Fiera ducati 40. m. per il che dirai così, se duc. 720. tra guadagno, e capitale, vengono da duc. 12. ch'io m'apposi, da quanti duc. verranno 40. m? opera, trouerai che verranno da ducati 666. $\frac{2}{3}$. e tanti duc. portò seco alla prima Fiera.

Troua vn numero che multiplicato via 4. & il prodotto via 3. e questo prodotto via 6. & a quest'vltimo prodotto aggiuntoui 10. faccia 600. apunto. Fa così, leua 10. di 600. resta 590. e questo è quel numero che s'ha da produrre dalle multiplicazioni espresse nella proposta. Poni il numero che si cerca esser 6. multiplica 6. via 4. fa 24. e questo multiplica via 3. fa 72. e questo multiplica via 6. fa 432. e doueua produrre 590. per il che dirai così, se 432. vien da 6. ch'io m'apposi, da che verrà 590? trouerai che verrà 8. $\frac{2}{3}$. e questo è il numero che si cerca.

Vn maestro di scuola ha tanti scolari, che se a quelli s'aggiungesse la metà d'essi, e della somma se ne leuasse il quarto, restarebbono 99. scolari apunto, si domanda quanti scolari haueua. Fa così, poni che hauesse 60. scolari, prendine la metà che è 30. aggiungili a 60. faranno 90. e di questo cauane il quarto, cioè 22. $\frac{1}{2}$. restano 67. $\frac{1}{2}$. e noi voleuamo che restassero 99. per il che dirai così, se 67. $\frac{1}{2}$. mi resta da 60. ch'io m'apposi, da quanto mi resterà 99? opera, trouerai che ti resterà da 88. e tanti scolari diremo che hauesse quel Maestro di scuola.

Egli è vna Torre, la quale è alta vna quantità di braccia, e dal piano della terra fino al primo palco v'è il $\frac{1}{3}$. di tutta altezza, e dal primo palco al secondo v'è il $\frac{1}{4}$.

di tutta l' altezza, e dal secondo paleo al terzo v'è li $\frac{2}{3}$. di tutta l' altezza, e dal terzo paleo fino alla cima v'è brac. 12. si domanda quanto è alta la d. torre. Fa così, troua vn num. che trattone $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. e $\frac{2}{3}$. resti 12. apunto, poni, che quel num. sia 45. del qual pigliane le sopradette parti, faranno 15. 9. 10. che tratte di 45. resta 11. e noi voleuamo che restasse 12. perche dirai così, se 11. mi resta da 45. ch'io m'apposi, da che numero mi resterà 12. opera, trouerai che ti resterà da 49. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{3}$. & tan'e braccia diremo, che fuffi lunga la detta Torre.

Vnoha eompro braè. 30. di stametto, e brac. 40. di rascia di Fiorenza, ogni cosa per libb. 660. & ogni braccio di rascia costò il doppio di ciascuna braccio di stametto, si domanda quanto costò il braccio di ciascuna sorte. Fa così, poni che il braccio dello stametto li costò lir. 4. le 30. braccia adunque li costeranno lir. 120. & il braccio della rascia li costerà lir. 8. douendoli costare il doppio, perche ne feghe, che le 40. braccia li costeranno lir. 320. che in tutto faranno lir. 440. e noi voleuamo lir. 660. Laonde dirai così, se 440. mi vien da 4. ch'io m'apposi, da che mi verrà 660? opera, trouerai che il braccio dello stametto li costò lire 6. & il braccio della rascia li costò lire 12.

Il braccio del perpignano vale lir. 4. & il braccio della rascia vale lir. 9. & vno si troua lir. 117. delle quali vuol comprar perpignano, e rascia, e vuol tante braccia dell'vna, quanto dell'altra sorte, si domanda quante braccia n'hauerà di ciascuna. Poni che compri vn braccio di perpignano, & vn braccio di rascia, che ambedue insieme varranno lire 13. onde dirai così, se lire 13. mi danno vn braccio di perpignano, & vn braccio di rascia, quante braccia me ne daranno lire 117? opera, ti daranno braccia 9. di perpignano, e braccia 9. di rascia.

Il moggio dell'orzo vale lire 60. e lo stajo del grano vale lire 6. & vno si troua lire 624. delle quali vuol comprare orzo, e grano, e vuol tre tante staja di grano, che moggia d'orzo, si domanda quante staja di grano, e moggia d'orzo còprerà. Poni che compri vn moggio d'orzo, laonde pigliando vn moggio d'orzo, fa di bisogno che pigli staja 3. di grano il quale a lire 6. lo stajo vale lire 18. le quali sommate con lire 60. che sono la valuta d'vn moggio d'orzo, fanno lire 78. hora dirai così, se con lire 78. io compro vn moggio d'orzo, e staja 3. di grano, quanto me ne daràno lire 624? multiplica 1. via 624. fa pur 624. pari i per 78. ne vien 8. e moggia 8. d'orzo dirai che còprerà, e perche s'è detto, che per ogni moggio d'orzo vuol staja 3. di grano, multipl. 3. via 8. fa 24. e tante staja di grano dourà còprare.

Vno compra vna pezza di Rascia per ducati non sò quanti, dipoi la riuede per duc. 80. e fa suo conto, e troua che guadagna soldi 8. per ducato, & il ducato vale lir. 6. si domanda quanto li costò. Poni, che li costasse ducati 15. Laonde guadagnando sol. 8. per ducato, verrà a guadagnare sol. 120. che sono vn ducato apunto, aggiungilo a ducati 15. farà duc. 16. fra guadagno, e capitale, e noi voleuamo che facesse 80. ducati, adunque il nostro ponere iii falsi, & hora volendo trouare la verità diteno così, se duc. 16. fra guadagno, e capitale vengono da duc. 15. di capitale ch'io m'apposi, da che capitale verranno duc. 80? opera trouarai, che verranno da capitale di duc. 72. e tati ducati dirai, che li costasse la pezza di rascia.

Vno in Compagnia di Giovanni andorno a Cena a vna fonte, doue intorno a detta fonte risiede vna bella fima ragnaia, che rende il fonte opaco, & ombroso, e quiui intorno sono molte possessioni; Laonde vno di quei giouani andando per suo diporto per quei luoghi ameni, trouò il padrone di essi, a cui doppo i debbi saluti, e lunghi ragionamenti, domando se ci haueua delle frutte, & egli rispose che haueua delle pere molto belle, ma poche, e che erano al suo comando, e della

la compagnia; li giungendo appresso, andare a cena, ch'io ve le mandato per il mio lauoratore, ma prima ditemi quanti sarete alla fonte, accioche io ne mandi tante che almeno ne tocchi due per vno, a cui il giouane rispose, Noi siamo tanti se fussimo altrettanti, & il terzo, & il quarto di tanti, e con voi ancora noi faremo apunto 125. hor questo inteso, mandò tante pere, che ne toccò due per vno, si domanda quanti giouani erano alla fonte a cena. Fa così, poni che i giouani fussero che quantità ti piace senza il padrone, ma poni vn numero, che habbia le sopradette parti, cioè il $\frac{1}{2}$, & il $\frac{1}{3}$. hor poni che fussero 12. e perche disse, noi siamo tanti, che con altrettanti, adunque aggiungi altri 12. fanno 24. e poi disse il terzo di tanti, perciò piglia il $\frac{1}{3}$ di 12. ch'è 4. aggiungilo a 24. fa 28. dipoi disse il quarto di tanti, e perciò piglia il $\frac{1}{4}$ di 12. ch'è 3. aggiungilo a 28. fa 31. e noi voleuamo che fussesse 124. laonde dirai così, se 31. vien da 12. ch'io m'apposi, da che verrà 124? multiplica 124 via 12. & il prodotto parti per 31. ne vien 48. e tanti diremo, che fusseno i giouani, adunque bisogna che mandasse 96. pere.

Vno compra 10. limoni vn quantità di soldi l'vno, e li riuede tutti sol. 40. e guadagna vn soldo per limone, si domanda quanto li costò l'vno. Fa così, poni che vn limone li costò vn soldo, e perche dice, che riuendendoli guadagna vn soldo per limone, adunque vn limone lo riuederà soldi 2. e tutti li riuederebbe soldi 20. e di sopra s'è detto che gli ha riueduti soldi 40. adunque il nostro pottereti falso, e perciò dirai così, se soldi 20. fra guadagno, e capitale, vengono da soldi 21. (che è da vendita d'vn limone) che verranno soldi 40? multiplica 40. via 21. fa 840. parti per 20. ne vien 42. e tanti soldi dirai che vendesse vn limone, cauane soldi 1. che b'è di guadagno, restano soldi 3. per il costo d'vn limone.

Vn viuaiò ha due condotti d'acqua, de quali vno de detti condotti da se solo empie il detto viuaiò in 3. hore, e l'altro da se solo l'empie in 4. hore, si domanda sturandoli ambedue in vn medesimo tempo, in quant'hore empiranno il detto viuaiò. Fa così, poni che li detti due condotti sieno sturati 12. hore; onde stando sturati 12. hore il primo condotto empirerebbe il detto viuaiò 4. volte, & il secondo l'empirebbe 3. volte, e noi lo vogliamo empirre vna volta sola, per il che diremo così, se 7. vien da 12. ch'io m'apposi, da che verrà 12? multiplica 1. via 12. fa pur 12. il qual parti per 7. ne viene $1\frac{1}{7}$. & in hore $1\frac{1}{7}$. i detti condotti empirerebbono il detto viuaiò.

Vn Condotto d'acqua empie vna pila in 4. giorni, e quando è piena serrando il Condotto, e sturando il votatoio di detta Pila, si votarebbe in 11. giorni; si domanda essendo vota la pila, e sturando il condotto, & il votatoio in vn medesimo tempo, in quanti giorni sarà piena la detta pila. Fa così, Trua vna tenuta alla detta pila, e che tal tenuta si possa partire per li giorni sopradetti, cioè per 4. e per 11. senza che auanzi rotti, per men briga.

Hor poniamo, che la pila tenesse 44. barili, adunque il condotto vi metterebbe dentro ogni di 11. barili d'acqua, & il votatoio ne vorrebbe 4. barili il di, per il che si conosce, che ogni di il condotto metterebbe 7. barili d'acqua nella pila più che non vorrebbe il votatoio, e perciò dirai così, se barili 7. d'acqua rattenuti dalla pila in vn di, in quanti di ne ratterrà barili 44? parti 44. per 7. ne vien $6\frac{2}{7}$. & in tanti giorni concluderemo, che il d. condotto empirerebbe la d. pila.

Egli è vna fonte con due pile, vna sopra, e l'altra sotto, e la pila di sopra ha 3. canne, che gettano acqua nella pila di sotto, disposti in tal modo, che la prima canna empirerebbe da se sola la pila di sotto in vn'hora, e la seconda l'empirebbe in due hore, e la terza in 3. hore, e la pila di sotto ha 3. canne, che votano l'acqua

di detta pila, con tal dispositione, che la prima la voterebbe (essendo piena) in 2. hore, e la seconda la voterebbe in 3. hore, e la terza in 4. hore, si domanda, essendo vota la pila di sotto, e sturando tutte le canne a vn tratto, tanto quelle che empiono, quanto quelle che votono, in quant'hore sarà piena la di sotto. Fa così, troua prima vn numero che habbia tutte le parti intere denominate da quei numeri d'hore, cioè 2. 3. 4. il qual si trouerà, multiplicando vn numero via l'altro, cioè 2. via 3. fa 6. e quello multiplica via 4. fa 24. e quello sarà quel numero che partito per 2. per 3. e per 4. non auanza mai rotti; & il 12. ancora ha le medesime parti, e tanto serue vno quanto l'altro; ma quanto più con numeri bassi possiamo operare, tanto men briga n'apporta.

Hora poni che le canne della pila di sopra (essendo ferrate quelle della pila di sotto) empieressero la pila di sotto in 12. hore, adunque la prima canna l'empirebbe in vn di 12. volte, cioè 12. pile vguale a quella; e la seconda l'empirebbe, in vn di 6. volte, e la terza l'empirebbe 4. volte, hora somma insieme 1. 2. 6. 4. fanno 22. di maniera, che noi habbiamo che tutte le canne di sopra, in vn di, cioè in 12. hore empierrebbero 22. volte la pila di sotto, ò vero 22. pile vguale a quella, e questo salua.

Hora veniamo alla pila di sotto; tu vedi che la prima canna in vn di, cioè in 12. hore voterebbe la detta pila 6. volte, e la seconda canna similmente in vn di la voterebbe 4. volte, e la terza la voterebbe 3. volte; e queste tante volte le sommarai insieme, cioè 6. 4. 3. fanno 13. e tante volte si voterebbe la detta pila dalle 3. canne di sotto in 12. hore; hora caua 13. vote di 22. piene, restano 9. piene, e noi voleuamo vna sola piena; perciò il nostro ponere fu falso, e volendo la verità, per regola del 3. la trouerai dicendo così, se 9. pile si son fatte piene in 12. hore, da quante hore sarà fatta piena vna pila sola? multiplica 1. via 12. sapur 12. qual parti per 9. ne viene 1. $\frac{4}{3}$. & in tant'hore le 3. canne di sopra empierrebbero la pila di sotto, stando aperte le sue 3. canne.

Ma in simili domande, e da auuertire, acciò che tu non lauorassi in vano, perche se le canne di sotto fossero più veloci al votare, che quelle di sopra a empire, massi empirebbe, & anco quando lauorassero del pari, e così come s'è detto di 3. che empiono, e di 3. che votano; così poteua dire di 3. che empiono, e di 4. che votano, & è conuerso; e di 6. che empiono, e di 4. che votano, & è conuerso, & ancora poteui dire, che essendo piena la pila di sotto, & hauendo le sue 3. canne più veloci, e larghe al votare, che le 3. canne della pila di sopra a empire, in quant'hore la pila di sotto farebbe vota; & in somma con molte altre girando, si può proporre; le quali mediante queste tutte facilissimamente si possono risolvere.

Vna botte ha quattro cannelle, poste tutte in retta linea, vna sopra l'altra, cioè vna in fondo, l'altra più alta, l'altra più alta, e l'altra più alta, e dalla cima della botte fino alla prima cannella è il terzo di tutta la tenuta della botte, e dalla prima cannella alla seconda, e il quarto di tutta la tenuta, e dalla seconda cannella fino alla terza, e il quinto di tutta la tenuta, e dalla terza cannella fino alla quarta, cioè fino in fondo, e la tenuta del resto; dipoi si troua che la prima cannella vota la sua parte suprema in 12. hore, la seconda vota la sua parte in 24. hore, la terza vota la sua parte in 36. hore, e la quarta vota la sua parte in 48. hore, si domanda sturando tutte quattro le cannelle a vn tratto in quant'hore voteranno detta botte, essendo piena, e tenendo 60. barili.

Noi habbiamo posto la tenuta della botte che sia 60. barili, perciò che il detto numero ha interamente tutte le sopradette parti, cioè $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, ancorche si potesse porre

potte vn'altra tenuta; ma se haueffimo poſto, che teſeſſe 40. barili, in ogni mo-
do ci conuenia trouare vna tenuta, che haueſſe intieramente tutte quelle parti.
Hora noi habbiamo poſto, che la botte tenga 60. barili, adunque la parte ſupre-
ma tenendo il terzo dirutta, viene a tenere barili 20. e la ſeconda parte tenendo
il quarto di tutta, viene a tenere 15. barili; e la terza parte tenendo il quinto di
tutta, viene a tenere barili 12. e la quarta parte tenendo il reſto, verrà a tenere 13.
barili. Fatto queſto, vediamo poi quanto vota ciaſcuna cannella in 12. hore;
la prima tu fai, che vota 20. barili, e la ſeconda in 24. hore ne vota barili 15.
adunque in 12. hore ne voterà barili $7\frac{1}{2}$. e la terza in 12. hore ne voterà barili 4.
e la quarta in 12. hore ne voterà barili $3\frac{1}{4}$. che ſommati inſieme fanno barili 34.
 $\frac{1}{4}$; e tanti barili ne voteranno le quattro cannelle inſieme in 12. hore, e noi vor-
remmo, che ne votaſſero ſolamente barili 20. cioè la ſuprema parte; per il che
dirai coſi, ſe barili $34\frac{1}{4}$. ſon votati in 12. hore, in quant'hore faranno votati ba-
rili 20. opera, trouarai, che faranno votati in hore $6\frac{1}{2}\frac{2}{3}$. & in tant'hore tutt'a
quattro le canne haueranno vota la prima parte, e queſto ſalua.

Hora ci reſtano 3. canne, che poſſono lauorare, perche la prima è mancata,
vedi adunque le tre canne in quant'hore ne voteranno barili 15. che è la ſeconda
parte, tu fai che la ſeconda canna in 12. hore ne vota barili $7\frac{1}{2}$. e la terza canna
in detto tempo ne vota barili 4. e la quarta in detto tempo ne vota barili $3\frac{1}{4}$. che
ſommati inſieme fanno barili $14\frac{1}{4}$. e tanti barili ne voteranno in 12. hore le tre
canne che ſon reſtate, e noi volcuamo, che votaſſero ſolamente la ſeconda parte,
cioè barili 15. per il che dirai coſi, ſe barili $14\frac{1}{4}$. ſon votati in 12. hore, in quant'
hore faranno votati barili 15. opera, trouarai, che faranno votati in hore $12\frac{1}{2}\frac{2}{3}$.
& in tanto tempo queſte tre canne haueranno votato la ſeconda parte; e queſto
ſalua.

Hora ci reſtano due canne che poſſono lauorare, vedi adunque queſte due can-
nelle in quant'hore ne voteranno barili 12. che è la terza parte, tu fai, che la ter-
za canna in 12. hore ne vota barili 4. e la quarta in detto tempo ne vota barili
 $3\frac{1}{4}$. che ſommati inſieme fanno barili $7\frac{1}{4}$. e tanti barili ne voteranno in 12. hore
le 2. cannelle che ſon reſtate, e noi volcuamo che ne votaſſero barili 12. ch'è la
terza parte, per il che dirai coſi, ſe barili $7\frac{1}{4}$. ſon votati in 12. hore, in quant'hore
ſe ne voterà barili 12. opera, trouarai, che ſi voteranno in hore $16\frac{2}{3}$. & in tan-
to tempo le due cannelle haueranno voto la terza parte, e queſto ſalua. Cireſta
hora a votare la quarta parte, la quale è barili 13. e tu fai, che la quarta, & vltima
canna, ch'è in fondo non ha aiuto da neſſun'altra canna, e perciò voterà la ſua
parte in 48. hore; Dipoi ſomma inſieme tutte l'hore trouate, e ſaluate per la pri-
ma; ſeconda, terza, e quarta parte, trouarai, che faranno hore $86\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{4}\frac{1}{5}\frac{1}{6}\frac{1}{7}\frac{1}{8}\frac{1}{9}\frac{1}{10}$. che
ſono giorni $7\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{4}\frac{1}{5}\frac{1}{6}\frac{1}{7}\frac{1}{8}\frac{1}{9}\frac{1}{10}$. & in tant'hore, o giorni, come tu vuoi dire, le ſopra-
dette canne voteranno la detta botte,

Vno vuol macinare ſtaia 120. di grano, & il Molinaro ha tre macine, che vna
lauora più preſto dell'altra, e la prima, cioè quella, che vā più preſto lo macina-
rebbe in 4. giorni, e l'altra in 6. giorni, e l'altra in 12. giorni, ſi domanda volen-
dolo macinare con tutte tre le macine in quanti giorni lo macinaranno, e quan-
te ſtaia conuerà che ne metta per macina, accioche ſia finito tutto in vn mede-
ſimo tempo. Fà coſi, poni che tutte tre le macine macinaſſero il ſopradetto
grano in quanti giorni ti piace, ma poni vn numero, che ſi poſſa partire per 4.
per 6. e per 12. e che non auanzi rotte; hor poni che tutte le macine lo macinaſ-
ſero in 24. giorni, nel qual tempo la prima macina da ſe ſola lo macinerebbe
6. volte,

6. volte, e la seconda lo macinerebbe 4. volte, e la terza lo macinerebbe 2. volte, di maniera che, fra tutte le tre macine in 24. giorni lo macinerebbono 12. volte, e noi vogliamo che si macini solo vna volta, e perciò il nostro ponere fu falso, e volendo la verità dirai così; se 12. volte vien da 24. giorni ch'io m'apposi, da che verrà vna volta? multiplica 1. via 24. fa pur 24. qual parti per 12. ne vien 2. & in 2. giorni dirai che tutte tre le macine insieme macineranno il detto grano; e volendo poi saper quante staia ne macinerà ciascuna, dirai così, e prima, per la prima macina; se in 4. giorni ne macina staia 120. quante ne macinerà in 2. giorni? opera trouerai che ne macinerà staia 60. e per la seconda dirai così, se in giorni 6. ne macina staia 120. quante ne macinerà in giorni 2. opera, ne macinerà staia 40. e per la terza dirai così, se in giorni 12. ne macina staia 120. quante ne macinerà in giorni 2. opera ne macinerà staia 20. che in tutto saranno staia 120. e così faresti, se fossero 4. o 5. macine; o muratori che volessero fabbricare vna casa; o vero leoni, orsi, e lupi, che volessero mangiare vn bue, o vero fusse vna nave che hauesse 3. vele, e volesse fare vn viaggio, e simili altre bate descritte da diuersi persone per passatempo.

Vno domanda a vn'altro quanti denari si troua in borsa, & esso rispose, io n'ho tanti, che s'io n'haueffi tre volte tanti, e la metà, & il terzo, & il quarto di tanti, e 6. più, io hauerei apunto ducati 120. si domanda quanti ducati haueua.

Fa così, cauà 6. di 120. resta 114. e tanti ducati haurebbe hauuti senza li 6. più. Hor troua vn numero che multiplicato via 3. & aggiuntoui la metà, il $\frac{1}{2}$, & il $\frac{1}{4}$ di detto numero, e sommato ogni cosa insieme faccia 114. Poni che numero ti piace; purché habbia le sopradette parti integrali.

Hor poni che hauesse 12. ducati, multiplica via 3. fa 36. dipoi prendi la metà di detto 12. che è 6. dipoi pigliane il terzo che è 4. dipoi pigliane il quarto che è 3. somma insieme 12. 36. 6. 4. 3. fanno 61. e noi voleuamo che facesse 114. laonde il nostro ponere fu falso, e volendo trouar la verità dirai così, se 61. vien da 12. ch'io m'apposi, da che verrà 114. multiplica 114. via 12. fa 1368. il qual parti per 61. ne viene 22. $\frac{2}{3}$, e tanti ducati haueua; fanne proua.

Vno ha venduto vna quantità di braccia di panno a lire 4. soldi 15. il braccio, e tutto l'ha venduto lire 95. domando quante braccia n'ha venduto.

Fa così, poni che n'habbia venduto quante braccia ti piace, hor poni 4. braccia le quali a lire 4. e soldi 15. il braccio, varrebbero lire 19. e noi voleuamo lire 95. adunque il nostro ponere fu falso, per il che dirai così; se 19. vien da 4. ch'io m'apposi, da che verrà 95. opera trouerai che verrà da 20. e tante braccia di panno dirai ch'habbia venduto.

Vno ha tanti ducati, che se ne spendesse il $\frac{1}{2}$. il $\frac{1}{3}$. & il $\frac{1}{4}$. meno 12. ducati, gli resterebbe 36. ducati si domanda quanti ducati si troua.

Fa così, cauà 12. ducati di 36. resta 24. e tanti ducati gli resterebbe, se di tutta quella quantità che ha ne cauasse il $\frac{1}{2}$. il $\frac{1}{3}$. & il $\frac{1}{4}$. bisogna adunque trouare vn numero che trattone $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. resti 24. poni che quel numero sia 60. del quale prendendone dette parti sono insieme giunte 47. che tratto di 60. resta 13. e noi voleuamo 24. adunque il nostro ponere fu falso, per il che dirai così, se 13. mi resta per 60. ch'io m'apposi, per quanto mi resterà 24. opera, ti resterà per 110 $\frac{1}{2}$. e tanti ducati diremo che hauesse.

Troua vn numero che 7. ne sia li $\frac{1}{2}$. poni a tuo modo vn numero, del qual pigliane li $\frac{1}{2}$. e vedi se te ne vien 7. come per esempio, poni che il numero sia 10. prendine $\frac{1}{2}$. ne viene 8. e noi voleuamo 7. però dirai così, se 8. vien da 10. ch'io m'apposi,

m'apposi, da che verrà 7. opera, trouerai che verrà da 8. $\frac{1}{2}$. e tanto sarà il numero che 7. ne farà li $\frac{1}{2}$. fanno proua piglia $\frac{1}{2}$. di 8. $\frac{1}{2}$. ne vien 7. apunto.

Vn muratore toglie a fare vna Casa, con patto che il di che vi lauora guadagni soldi 24. & il di che non vi lauora, perda soldi 20. & in capo di 30. giorni il muratore hebbe finira la Casa, e non hebbe hauere, nè dare cos' alcuna, si domanda quanti di vi lauorò, e quanti non vi lauorò.

Volendo soluer questa, bisogna far di 30. due parti, che tanto faccia l'vna moltiplicata via 24. quanto l'altra via 20.

Hor fa così, poni due numeri a tuo modo, e sia l'vno 5. e l'altro 6. che moltiplicato 24. via 5. fa tanto, quanto 20. via 6. che l'vno, e l'altro fa 120. dipoi somma 6 e 5. fanno 11. e noi vorremo che facessero 30. per il che dirai così, se 11. fusse 30. che farebbe 5. e che 6. opera, trouerai che 5. farebbe 12. $\frac{1}{2}$. e tanti giorni vi lauorò, e 6. farebbe 16. $\frac{1}{2}$. e tanti giorni non vi lauorò.

Se la metà di 5. fusse 3. vorrei saper 5. di che numero fusse $\frac{1}{2}$. Troua prima vn numero che 5. ne sia $\frac{1}{2}$. trouerai che sarà 20. dipoi piglia giustamente la metà di 5. che è 2. $\frac{1}{2}$. e così dirai, se 2. $\frac{1}{2}$. fusse 3. che farebbe 20. moltiplica 20. via 3. fa 60. qual parti per 2. $\frac{1}{2}$. ne vien 24. e così diremo che 5. farebbe $\frac{1}{2}$. di 24. stante la sopradetta proposta.

Fammi questa 3. $\frac{1}{2}$. di tal numero fu $\frac{1}{2}$. che 5. ne fu $\frac{1}{2}$. domando 3. di che numero sarà $\frac{1}{2}$. prima vedi 5. di che numero fu $\frac{1}{2}$. trouerai che fu di 7. $\frac{1}{2}$. adunque ne seguirebbe secondo la proposta, che 3. $\frac{1}{2}$. fusse la metà di 7. $\frac{1}{2}$. e pur la vera, e propria metà di 7. $\frac{1}{2}$. è 3. $\frac{1}{2}$. hor vedi 3. di che numero sia $\frac{1}{2}$. alla medesima ragione, ma prima vedi quel che farebbe 3. dicendo, se 3. $\frac{1}{2}$. fusse 3. $\frac{1}{2}$. che farebbe 3. opera, trouerai che farebbe 3. $\frac{1}{2}$. e questo lo raddoppierà fa 6. $\frac{1}{2}$. e di questo numero il sopradetto 3. ne farebbe la metà, secondo la sopradetta proposta.

Fammi questa, se 5. fusse la metà di 9. che parte farebbe 7. di 12. prima piglia giustamente la metà di 9. che è 4. $\frac{1}{2}$. dipoi dirai se 5. fusse 4. $\frac{1}{2}$. che farebbe 7. opera, trouerai che farebbe 6. $\frac{1}{2}$. hor vedrà 6. $\frac{1}{2}$. che parte sono di 12. parti 6. $\frac{1}{2}$. per 12. ne viene $\frac{3}{2}$. e tal parte farebbe 7. di 12.

Vno compra vna quantità di braccia di panno tra rosso, e verde, tutto per lire 160. & il braccio del verde gli costa lire 2. e lo riuede lire 1. $\frac{1}{2}$. & il braccio del rosso gli costa lire 3. e lo riuede lire 4. se trouasi di guadagno, lire 20. domando quante braccia ne comprò di ciascuna sorte.

Fa così, poni che compri tante braccia dell'vna, quanto dell'altra sorte, hor poni che ne compri braccia 16. di ciascuna sorte, hauera che il verde li costerà lire 32. e lo riuedrà lire 24. & il rosso li costerà lire 48. e lo riuedrà lire 64. hor somma insieme il costo dell'vno, e dell'altro, fanno lire 80. dipoi somma insieme la vendita di ambedue le sorte fanno lire 88. doue tu vedi che guadagna lire 8. dipoi dirai così, se lire 8. di guadagno vengono da braccia 16. di panno di ciascuna sorte, da che verranno lire 20. opera trouerai, che verranno da braccia 40. e tante braccia comprò di ciascuna sorte, fanno proua.

Vno compra Fichi, e Noci, & in tutto spende 30. quattrini, & ha quattro Fichi al quattrino, e 6. Noci al quattrino, e riuede tre Fichi al quattrino, & 8. Noci al quattrino, e compra, e vende tanti Fichi, e Noci, che guadagna 3. quattrini, domando quanti Fichi, e Noci comprò. Fa così, poni che compri tanti Fichi, quante Noci, h r poni che compri 12. Fichi, e 12. Noci, che ogni cosa a lui costerà 5. quattrini, e noi voleuamo 30. quattrini, per il che dirai, se per 5. quattrini ho 12. Fichi, e 12. Noci, quanti n'hauerò per 30. quattrini, opera, se n'hauerà

72. e tanti Fichi, e tante Noci comprò. Fanne proua, guarda quanto riuende, 72. Fichi, e 72. Noci, trouerai che riuenderà ogni cosa per 33. quattrini, doue tu vedi che guadagna 3. quattrini apunto.

Vno compra vn braccio di panno, & vn braccio di rascia, tutto per lire 12. e dice che la rascia li pare il terzo meglio del panno, domando quanto costò il panno, e quanto la rascia.

Fa così, poni che il panno valesse vna quantità di lire, hor poni 1. e se la rascia e meglio il terzo, adunque varrà lire 4. & ambedue insieme varranno lire 7. dipoi dirai così, se 7. vien da 3. ch'io m'apposi, da che verrà 12. multiplica, e parti, ne vien $4\frac{1}{2}$. e tante lire valse il panno, e la rascia valse lire $6\frac{1}{2}$. fatta.

Vn Contadino vorrebbe presentare a vn Signore 60. pere, ma prima che arriuasse doue è il Signore, bisogna che passi per tre porte, & ad ogni porta vисти vna guardia, e la prima guardia vuole la metà di quello che il Contadino porta, e 12. pere più, e la seconda guardia vuole similmente la metà di quelle che gli son restate, e 12. pere più, e la terza guardia vuole la metà di quelle che gli son restate alla seconda porta, e 12. pere più, si domanda quante pere bisogna che porti il Contadino, ac ciò che neli resti 60. per presentare al Signore. Questa la soluerai col tornare indietro, cominciando dalle 60. pere che gli auanza, e perche alla terza, & vltima guardia dette la metà di quelle pere che haueua, e 12. più l'è ne restò 60. aggiungi adunque 12. a 60. fa 72. e queste sono la metà di quelle che haueua quando giunse alla terza guardia, adunque ne dette alla guardia 72. per il che ne segue, che quando giunse alla terza guardia n'hauesse 144. e con tante pere si parti dalla seconda guardia, e perche a detta seconda guardia ne dette più 12. della metà, e ne li restò 144. adunque prima che satisfacesse alla seconda guardia n'haueua 312. e con tante pere si parti dalla prima guardia, aggiungi 12. pere a 312. fanno 324. & hauendone date la metà alla prima guardia, adunque conuenne dargli 324. che giunte tutte insieme fanno 648. e tante pere li conuenne portare, acciò che ne li restasse 60. per donare al Signore, e così faresti, se dicessi che fusse vn giardino con tre porte, o vero guardie, & vno volesse portare fuori di d. giardino, due cose, & alla prima porta, douesse darne la metà, e 3. più, & alla seconda porta la metà del resto, e 2. più, & alla terza porta, la metà del resto, & vna cosa più, comincia dall'vltimo, cioè da 2. cose che vuol che gli resti, e tornando adietro, operando come nella sopradetta, trouerai, che gli conuerrebbe hauer 38. cose, acciò che ne li restasse 2. sole, e volendo che li restasse vna cosa sola, & il giardino hauesse 3. o 4. o ver 5. porte, il medesimo ordine conuerrebbe offeruare &c.

Vn Padre di famiglia, hauendo 5. figliuoli, e per la Natiuità di Nostro Sign. volendoli dar la mancia, come è solito, li chiamò tutti per ordine, cominciando dal maggiore al quale diede il $\frac{1}{2}$. di 25. giuli ch'haueua in borsa, & al secondo similmente diede il $\frac{1}{2}$. di quelli che gli restò, e così fece al terzo, al quarto, & quinto, si domanda quanti giuli li restò in borsa. Chiara cosa è, che se vno dà il $\frac{1}{2}$. di quel che ha, gli resta $\frac{1}{2}$. e perche sono 5. figliuoli, poni 5. volte $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. dipoi multiplica i denominatori l'vno via l'altro, fanno 1024. e questo multiplica via 25. fa 25600. e questo parti per la multiplicatione de' denominatori l'vn via l'altro, i quali fanno 3125. ne viene 8. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. e tanti giuli gli restò in borsa, fanne proua.

Vno domanda a vn altro quanti hore son sonate, e quello rispose, che la metà, & il terzo delle sonate, sono quanto il quarto, & il quinto di quelle ch' hanno a sonare, si domanda quanti hore eran sonate, e quante n'haueua a sonare. Fa così, aggiungi

a aggiungi insieme $\frac{1}{2}$. con $\frac{1}{4}$. fanno $\frac{3}{4}$. dipoi somma insieme $\frac{1}{2}$. con $\frac{1}{4}$. dell'vno, quanto $\frac{1}{2}$. Hora troua due numeri che tanto sia $\frac{3}{4}$. dell'vno, quanto $\frac{1}{2}$. dell'altro, multiplica in croce, trouerai che vno sarà 100. e l'altro 54. che summati insieme, fanno 154. e noi voleuamo 12. perche il giorno è diuiso in 12. hore, pero dirai così, se 154. fusse 12. che farebbe 54 $\frac{1}{2}$ opera, farebbe 4 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. e tante hore eran sonate, dipoi dirai così, se 154. fusse 12. che farebbe 100 $\frac{1}{2}$ opera, farebbe 7 $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{2}$. e tant'hore haueuano a sonare.

Vn Padre di famiglia venendo al fin della sua vita, chiamò tutti i suoi figlioli, dicendoli, io voglio diuidere tra voi tutti i denari ch'ionni ritrouo, e tu primogenito togli di quella cassa ducati 100. & il $\frac{1}{4}$. di ciò che vi rimane, e tu secondo, togli ducati 200. & il $\frac{1}{4}$. di ciò che vi rimane, e tu terzo, togli ducati 300. & il $\frac{1}{4}$. di quel che vi rimane, e così li chiamò tutti per ordine, e diede ducati 100. più all'vno, che all'altro, e poi il $\frac{1}{4}$. di quelli che vi rimaneuano, e così diuise tutti i denari, e doppo la sua morte ciaschun di loro si trouò hauere haunto vguale quantità di ducati, cioè tanti l'vno, quanto l'altro, domando quanti ducati erano nella cassa, e quanti erano i figliuoli, e quanti ducati toccò a ciascuno. Questa la risoluerai in questo modo, cauà l'vnità che è sopra la riga d' $\frac{1}{4}$. di detto 6. che è di sotto, resta 5. e tanti figliuoli haueua, e se hauesse detto $\frac{1}{4}$. doueui cauare 1. di 5. e se hauesse detto $\frac{1}{2}$. doueui cauare 1. di 7. &c. & il resto farebbe la quantità de' figliuoli che hauerebbe.

Hora il sopradetto residuo 5. multiplicalo in se, fa 25. e questo multiplica via ducati 100. che fece pigliare al primo, fa 2500. e tanti ducati haueua nella cassa, e perche tu veda che ne tocca tanti all'altro, cauà da ducati 100. che dà al primogenito di 2500. resta 2400. e di questo ne deuè pigliare il $\frac{1}{4}$. che è 400. li quali aggiunti con ducati 100. fanno ducati 500. e tanti ducati toccherà a ciascuno. Proua da te stesso gl'altri: ma se la proposta hauesse detto che pigliasse $\frac{1}{2}$ o $\frac{2}{3}$. o $\frac{1}{3}$. o $\frac{3}{4}$. e simili, cioè che sopra la riga di tal rotto fusse più dell'vnità, noi diciamo tal proposta non poterli solure, e similmente quando dicessi al primo pigliane 100. e l' $\frac{1}{4}$. di quelli che vi resta, & al secondo dicessi pigliane 200. e l' $\frac{1}{4}$. di quelli che vi resta, & al terzo dicessi, pigliane 300. e l' $\frac{1}{4}$. di quelli che vi resta, e che sempre crescesse 200. o variasse, ancor questi concludiamo non esser solubili.

E se dicessi che al primo figliuolo desse il $\frac{1}{4}$. de denari della cassa, e duc. 100. più, & al secondo il $\frac{1}{4}$. di quelli che vi resta, e duc. 200. più, & al terzo desse il $\frac{1}{4}$. di quelli che vi resta, e duc. 300. più, e così seguendo fino all'vltimo figliuolo, per saper quanti erano i figliuoli, e quanti ducati erano nella cassa, e quanti ne toccherà per vno: farai come nella sopradetta, cauà 1. di 6. resta 5. e tanti figliuoli haueua, poi multiplica il detto residuo 5. via il detto 6. fa 30. e questo multiplica via duc. 100. che di più prese il primogenito, fa 3000. e tanti erano i denari della cassa: e volendo vedere quanti ducati toccherà per vno, piglia il $\frac{1}{4}$. di 3000. ne vien 500. al qual aggiungi duc. 100. che prese il primo fa duc. 600. e tanti ne toccò al primo, dipoi cauà 600. di 3000. resta 2400. del qual pigliane il $\frac{1}{4}$. per il secondo, ne vien 400. che con l'aggiuntione di ducati 200. che hebbe di più fanno 600. e tanti ne tocca al secondo, dipoi col medesim'ordine, troua da te gl'altri.

Ma se dicessi al primo figliuolo pigliane il $\frac{1}{4}$. e 100. ducati più, & al secondo similmente dicessi piglia $\frac{1}{4}$. del resto, e 300. ducati più, e che crescesse 200. ducati a ciascuno, dicti si che non farebbe solubile, perciò che volendo che dette proposte sieno solubili, bisogna (se vuol che l'vn doppo l'altro habbia duc. 200. o ducati 300.) che dia ancora al primo il $\frac{1}{4}$. e duc. 200. o duc. 300. secondo che vuol

vuol dar più a vno che ad vn' altro, come per esempio, accio meglio s'intenda, se delle al primo $\frac{1}{2}$ e ducati 200. più, conueniente al secondo dia $\frac{1}{2}$ e ducati 400. più, e se al primo delle $\frac{1}{2}$ e ducati 400. più, al secondo bisogna che dia $\frac{1}{2}$ e ducati 800. e così si fare a ciascuno proportionalmente, altrimenti non si potranno soluer.

Alcuni Peregrini, andando in peregrinaggio, e stanchi del tanto caminare, si fermarono per riposarsi all'ombra d'un bellissimo Arbore, & vno di essi ficcandoli in terra il suo Burdon, percossè a caso vna lapida coperta da poca terra, e sentendo rimbombare il terreno, tornò di nouo a percuotere in detto luogo, e scinzendo il medesimo, cominciò con i compagni a tor via la terra, & scopersero vna lapida di marmo, nella quale erano incise alcune lettere, e s'ignò laonde desiosi di veder quel che sotto a detta lapida fusse, tanto s'affaticarono, che l'alagreno, vi trouorono sotto vn vaso di Terra pieno di ducati, di che molto allegri, e contenti, contarono i detti ducati, dipoi gli diuifero in questo modo: Il maggiore di loro prese li $\frac{1}{2}$ de' detti ducati, e 100. ducati più, & il secondo tolse $\frac{1}{3}$ del resto, e 200. ducati più, & il terzo tolse $\frac{1}{4}$ del resto, e 300. ducati più, e così con questo ordine ciascun di loro prese la parte.

Fatto questo trouoroso che tanti ducati haueua l'vno, quanti l'altro, e nel vaso vi restò tanti ducati che furono vguale alla metà d'vna di quelle parti, che toccò a ciascun di loro, il qual residuo volsero che seruisse a dispensare, e fare Elemosine, a quanti altri Peregrini, e pouere persone che trouauano; si domanda quanti ducati trouarono nel vaso, quanti Peregrini erano, e quanti ducati toccò a ciascuno, e quanti ne dispensarono a i poueri.

Fa così, cauà il denominante del denominatore, cioè cauà 2. d'11. resta 9. e questo multiplica via 11. fa 99. questo multiplica via ducati 100. prese il primo di più, fa 9900. e questo parti sempre per il quadrato del denominante del sopradetto tutto, o d'altro tutto che in suo luogo fusse, cioè, per il quadrato di 2. che è 4. ne viene 2475. e tanti ducati era in detto vaso, dipoi parti il detto per il sopradetto 2. ne viene 4. $\frac{1}{2}$. e per il quarto intero piglierai per quattro Peregrini, e quel $\frac{1}{2}$. che auanza è vguale a vn mezzo Peregrino, cioè la metà di quel che tocca a vn di loro, perche non si può dire vn mezzo Peregrino, e così diremo che fussero quattro Peregrini, & a ciascun di essi toccò ducati 550. e ne restò nel vaso per dispensare a i poueri, ducati 275.

Alcuni Mercanti, ritrouandosi in Sicilia caricorno sopra vna Naue diuerse mercantie, e particolarmente vna quantità di sacca di grano, la qual Naue conuersero a Limorno, & il Padron del Nauilio volendo esser pagato del porto, disse a vno di detti Mercanti, quante sacca di grano hanete caricato? & egli rispose, io non me ne ricordo y ma sò ben che s'io pigliarò $\frac{1}{2}$ di tutto questo grano, e facea 18. più, s'io pigliarò apunto la mia parte, e resterà nella Naue tanto del mio grano, che seruirà per pagamento del nolo ch'io ti deuo, voltatosi poi al secondo, disse, e voi quanto grano hauete caricato? a cui rispose, che il suo carico era $\frac{1}{2}$ del resto è 36. sacca più, e che rimaneua ancora nella Naue tanto di suo grano, che era per il pagamento del porto che gli deuua, dipoi voltatosi al terzo, disse, e voi quante sacca di grano caricaste? & egli rispose, che tolta via la parte del primo, e del secondo, il suo grano sarà $\frac{1}{2}$ del resto, e facea 54. più, e rimarrà ancora tanto del suo grano che seruirà per pagamento del nolo, e così col medesimo ordine gli fu risposto da ciascun mercante, per la qual cosa ogn'vn di loro col medesimo ordine leuò via la sua parte, e restò nella Naue tanto grano, che fu vguale.

vguale alli $\frac{3}{4}$, d'vna di quelle parti, che leuò cia scuno, si domanda quante sacca di grano caricorno in tutto, quanti sũono i Mercanti, quante sacca ne caricò, e scaricò ciascuno, e quante sacca ne restò nella naue per nolo del Padrone.

Fa così, cauà il denominante del denominatore, cioè caua 3. di 20. resta 17. e questo multipl. via detto 10. fa 170. e questo multipl. via sacca 18. che piglia di più il primo farà 6120. e questo parti sempre per il quadrato del detto denominante 3. che il suo quadrato è 9. ne viene 680. e tante sacca di grano diremo che caricassero in tutto, dipoi parti il sopradetto 17. per il sopradetto 3. ne viene $5\frac{2}{3}$. e per il 5. intero, diremo che fussero cinque mercanti, e per li $\frac{2}{3}$. che auanzano, diremo che sũono vgnali a $\frac{2}{3}$. d'vn mercante, cioè alli $\frac{2}{3}$. di quel che tocca a vn di loro, e così habbiamo trouato che furono cinque mercanti, e che sta tutti caricarono sacca 680. di grano, delle quali ciascuno ne caricò sacca 136. e ciascuno poi ne caud di naue sacca 120. e ne restò in naue sacca 80. che sono appunto li $\frac{2}{3}$. d'vna parte di quelle, che scaricorno a Liorno.

Quarto Muratori in sei giorni hanno fatto otto canne di muro, si domanda sette muratori in dieci giorni, quante canne ne faranno.

Queste sono ragioni doppie, le quali si soluono in due volte per la regola del tre, ma è più breue, e bella a soluerla per regola delle cinque propotioni, ponendo per ordine la proposta, come di sotto vedi. multiplicando poi secondo i lineamenti, e prima multiplica le prime coe agenti, e manifesto l'vna via l'altra, cioè quattro Muratori via 6. giorni fa 24. perche i Muratori & i giorni son cose agenti, e questo salua per partitore, dipoi multiplica la cosa patiente, cioè 8. canne via le seconde cose agenti, le quali non hanno ancora operato, cioè sette Muratori, multiplica adunque 8. via 3. fa 24. e questo multiplica via 10. giorni, fa 240. il qual partito per 24. che saluasti, ne viene 10. e tante canne di muro farebbono 7. Muratori in 10. giorni.

4 . 6 . 8 . 7 . 10 .

partitori .

Cinque Caualli in 7. giorni hanno mangiato stia 10. d'orzo, si domanda 8. caualli, in quanti giorni ne mangiaranno stia 20? Questa, & ogn'altra simile in due modi si possono soluer, e prima per regola del tre dirai così, se 5. Caualli mangiano stia 10. d'orzo, quante ne mangiaranno 8. Caualli opera, ne mangiaranno stia 16. dipoi dirai così, se stia 16. son mangiate in 7. giorni, in quanti giorni, faranno mangiate stia 20? opera, trouarai che farebbono mangiate in giorni 8. $\frac{2}{3}$. Hor soluila per regola delle propotioni, multiplicando l'vna via l'altro, e partendo come per le dimostrazioni qui di sotto puoi vedere.

partitori .

5 . 7 . 10 . 8 . 20 .

Quattro macine in 10. giorni hanno macinato sacca 20. di grano, si domanda, sacca 120. in 12. giorni da quante macine saranno macinate; Fa così, poni

2

350 L I B R O
 poni per ordine la proposta come vedi, cioè 4. 10. 80. 120. 12. dipoi moltiplica il primo patiente, cioè sacca 80. via l'ultimo agente, il quale non ha ancora operato, cioè 12. giorni, fa 960. questo salua per partitore, dipoi moltiplica il primo agente via il secondo, i quali hanno operato, cioè 4. via 10. fa 40. e questo moltiplica via il grano, che s'ha a macinare, ch'è il secondo patiente, cioè sacca 120. moltiplica adunque 120. via 40. fa 4800. il qual parti per 960. che saluasti ne vien 5. e da tante macine saranno macinati 120. sacca di grano in 12. giorni.

partitori
 4. 10. 80. 120. 12.

Poteuasi soluere ancora per regola del tre, dicendo, se 80. sacca son macinate da 4. macine, da quante macine saranno macinate sacca 120? opera saranno macinate da 6. macine, e questo farebbono in 10. giorni, e noi voleuamo sapere da quante macine farebbono macinate in 12. giorni, per il che ne seguì, che crescendo tempo, conuien che manchino le macine, e perciò dirai così, se 12. giorni fussero 10. che farebbono 6. macine, multipl. 6. via 10. fa 60. il qual parti per 12. ne vien 5. e da 5. macine sarebbe macinato in 12. giorni il sopradetto grano.

Nel tempo che l'Inclita Città di Venetia fù tribolata dal male Contagioso trattandosi di ciò fra molti galant'huomini con infinito lor dispiacere; si mosse vno da parte di poco ingegno, e ripieno di malignità, quasi nouel Timone Ateneise; il qual Timone mentre visse mai parlò, se non poco, e malc; sic me fece in Atene, che nella sua vltima vecchiezza, si lassò intendere, che voleua in publico parlare al popolo; Laonde ciascuno si sforzò di presentarsi in piazza, e sopra i palchi, per sentire quel che volesse dire vn vecchio di cento anni, il qual non era più statò sentito parlare, eccetto vna volta da vn suo conoscente. e del medesimo vmore, il quale improuisamente andò a definire col detto Timone, e postosi a mensa senza parlare nessun di loro; pur al fin l'amico disse, noi stiamo pur ben soli, a cui Timone rispose: sicotto, ma meglio starei se tu non ci fussi. Essendo adunque ridotto tutto il Popolo in Piazza, Timone andò in mezzo, e salito sopra vn banco per poter meglio esser visto, & inteso, disse con voce alta. Io faccio intendere a tutti, che Alcibiade vuol guastare vn suo Giardino, doue in mezzo di esso vi sono le forche, come voi sapete, e quiui vuol fabbricare vn Palazzo, perciò prima che mandi a terra le forche, se nessuno n vuole appiccare, sollecciti, e non perda tempo, e così detto si parti senza dir altro. I posteri tornando al sopradetto maligno, disse, io vorrei che venisse vna peste vniuersale, la qual durasse 10. giorni, e ne morisse 10. per cento il giorno, al quale da i Circostanti fù risposto, e noi vorremo che la peste venisse a te solo, e tu viuessi tanto con essa, quanto durarebbono a viuere quelli che rimanesero illesi, & i posteri ancora, quando pur tal'influsso seguisse, per il che tu potessi conoscere, che non si farebbe del resto, anzi ne rimarrebbe quasi il terzo, hor perche chiaro apparisca che così sarebbe.

Poniamo che tutti gl'huomini del mondo siano cento, de quali il primo di ne morirebbe 10. e restarebbono 90. & il secondo di a ragione di 10. per cento ne morirebbe 9. e restarebbono 81. & il terzo di ne morirebbe 8. $\frac{1}{2}$. e restarebbono

Quando lo staio del grano valqua lire $4\frac{1}{2}$, si faceva la piccia del pane, che fosse di peso once 32, si domanda, valendo lo staio lire 7. 15: di quante once si dovèrà far la piccia,

Edicendo così. Quando lo staio del grano valeua lir. 6. si faceua la piccia del pane che pesaua onçe 24. si domanda valendo lir. 4. di quant' onçe si douera fare?

E dicendo così. Quando lo stato del grano valeua lir. 6. si faceua la piccia del pane, che pesaua onçe 24. si domanda facendo la piccia, che pesi onçe 36. quante lire douerebbe valere lo stato del grano? Risolta la proposta dicendo; se onçe 36. fussoro onçe 24. che sarebbono lire 6? multiplica 6. via 24. fa 144. il qual parti per 36. ne viene lir. 4. e tante lire douerebbe valere lo stato.

Quando lo staio del grano valeua lir. 4. il pane d'once 10. valeua 6. quattrini,
li domanda valendo lo staio lir. 3. quanto douerà valere il pane, che pesa once 12?

23

Quando

4. 1. 0.
partitore.

6. 3. 12.

Quando lo staio del grano valeua lir. 4. il pane di onçe 10. valeua 6. quattrini, domandasi, valendo lo staio lir. 3. quant' onçe douerà pesare il pane di 6. quattrini?

Fa così, poni per ordine la proposta, cioè lire 4. onçe 10. quattrini 6. lire 3. e quattrini 6. dipoi multipl. e parti, secondo le dimostrazioni delle linee, & haurai che douerà pesare onçe 12. e per altro modo potrai dir così, se lir. 3. fussero lir. 4. che farebbono onçe 10. opera farebbono onçe 12. come per il primo operare.

4. 1. 0.
partitore.

E Dicendo, Lo staio del grano val. ua lire 4. & il pane di onçe 10. valeua 6. quattrini, dipoi mutò prezzo, e si fece il pane di onçe 16. per 8. quattrini, si domanda a che prezzo venga lo staio del grano.

Questa si può fare per due volte la regola del tre, risoltandola così dicendo, se onçe 16. fussero onçe 10. che farebbono lire 4. opera, farebbono lire 2. e tanto douerebbe valere lo staio del grano. a dare onçe 16. di pane per 6. quattrini, ma dice che si vende 8. quattrini, e perciò lo staio del grano viene a valer più, perche dirai così, se 6. quattrini vengono dal prezzo di lire 2. da che prezzo verranno 8. quattrini, opera verranno dal prezzo di lire 3. e tanto dirai, che valse lo staio del grano, a dare onçe 16. di pane per 8. quattrini, e volendola risolvere per regola delle proporzioni, si c. s. poni ordinatamente la proposta, cioè lire 4. onçe 10. quattrini 6. onçe 16. e quattrini 8. dipoi multiplica secondo le dimostrazioni delle linee, come di sotto vedi, & haurai similmente che lo staio del grano vale lire 3. e.

partitore.

Vne Fornito ha com. 10 vn moggio di grano per lire 95. e dà onçe 2. di pane per 2. quattrini, dipoi ne compra vn altro moggio per lire 144. e dà onçe 10. di pane. si domanda quanto lo douerà far pagare. Fa così, fondi le lire con l'onçe, e se multiplica 95. via onçe 2. fa 192. dipoi multipl. lire 144. via onçe 10. fa 1440. dipoi dirai così, per regola del tre, se 192. tra lire, & onçe mi fanno pagare il pane 2. quattrini, quanto lo faranno pagare 1440. pur tra lire, & onçe? multipl. 1440. via 2. & il pr. di tutti i parti per 192. ne vien 15. e tanti quattrini si pagherà il pane di 10. onçe, & il medesimo si verà, se la soluerai per regola delle proporzioni, e col medesimo ordine di fondere potrai soluerle molte altre sopra dette, le quali tu potrai provare.

Ite M. reanti nel grano vna Barca a portar grano, con patto che ne carichi tanto l'vno, quanto l'altro, & il primo si continui col l'adone della Barca a dargli

dargli di nolo $\frac{1}{3}$. del suo grano, & il secondo di dargli il $\frac{1}{4}$. & il terzo di dargli il $\frac{1}{5}$. & il Padrone della Barca, hebbe fra tutti tre staia 94. di grano, si domanda quanto fu il carico della Barca. Poni che ciascheduno ne carichi staia 60. delle quali dandone il primo al Padrone della Barca $\frac{1}{3}$. ne li verrebbe a dare staia 20. & il secondo dandone il $\frac{1}{4}$. gli verrebbe a dare staia 15. & il terzo dandogli il $\frac{1}{5}$. gli verrebbe a dare staia 12. talche fra tutti tre insieme, gli verrebbero a dare staia 47. e noi habbiamo detto che il Padron della Barca hebbe in tutto staia 94. di grano; perliche dirai cosi; se 47. vien da 60. ch'io m'apposi, da che verrà 94. moltiplica 94. via 60. fa 5640. il qual parti per 47. ne viene 120. e tante staia di grano caricò ciascuno, e tutto il carico della Barca, fu 360. staia di grano.

Vno ha tre Botte, e fra tutte tre tengono vna quantità di barili di Vino, e la prima tiene la metà di tutte tre le tenute, e la seconda tiene il $\frac{1}{3}$. di tutte tre, e la terza tiene barili 24. si domanda quanti barili tengono fra tutte tre le botte insieme. Fa così, poni che fra tutte tre le botti tenghino quel la quantità di barili che ti piace; ma poni vn numero che habbia interamente le sopradette parti, cioè $\frac{1}{2}$. & $\frac{1}{3}$. hor poni che tutte tenessero barili 12. che alla sopradetta ragione, la prima terrebbe barili 6 e la seconda terrebbe barili 4. le quali ambedue insieme terrebbero barili 10. che infino a 12. che noi ci apponemmo v'è 2. e tanto verrebbe a tenere la terza botte; ma perche noi dicemmo, che teneua barili 24. perciò il nostro ponere fu falso, perliche dirai cosi, se 2. di resto, vien da 12. ch'io m'apposi, da che verrà 24. opera, trouerai che verrà da 144. e tanti barili teneuano fra tutte tre le botte; perciò che la metà, & il terzo di 144. sono 120. che tratto di 144. resta 24. per la tenuta della terza botte, e la prima botte dirai che tiene barili 72. e la seconda 48. e nel medesimo modo faresti, se si proponesse vn vaso di tre pezzi, che il piede pesasse il $\frac{1}{3}$. di tutto il vaso, & il coperchio pesasse il $\frac{1}{4}$. di tutto il vaso, & il corpo, o la coppa pesasse libbre 12. &c.

Vn Mercante con ogni terza parte del suo capitale guadagna $\frac{1}{3}$. di detto capitale, e dipoi nel ritorno guadagna il $\frac{1}{4}$. di tutto quel che si troua; cioè del capitale, e del guadagno insieme, & alla fine si trouò ducati 138. si domanda il primo capitale. Per voler soluer questa, & altre simili, poni che si troui vna quantità di ducati qual più ti piace, hor poni che si troui ducati 60. che a guadagnare $\frac{1}{3}$. con ogni terza parte, guadagnerà ducati 9. li quali aggiunti a ducati 60. fanno ducati 69. fra capitale, e guadagno; del qual dice che nel suo ritorno ne guadagna il $\frac{1}{4}$. che è 23. il quale aggiunto a 69. fa 92. e noi volcuamo che facesse 138. perliche dirai cosi; se ducati 92. vengono da ducati 60. ch'io m'apposi, da che verranno 138. opera, verranno da ducati 90. e tanto fu il suo primo capitale.

Ali Bafsà, Capit. Gener. del Gr. Turco, venne con potentissima Armata Nauale nel Golfo di Lepanto, ad inoltrarsi nell' Armata Cristiana, doue Ali fu morto, e rotta, e fracassata tutta l' Armata; e Mameth Rahi Bafsà fuggì, & andò dal Gran Turco, e disse come l' Armata era rotta, e che il $\frac{1}{3}$. de' Soldati erano morti, & il $\frac{1}{4}$. tra feriti, & ammalati, & il $\frac{1}{5}$. f'itti prigionì, e che con lui n'eran fuggiti, e saluatisi 13000. si domanda quanti Turchi erano in tutta l' Armata. Fa così, poni che fossero che numero ti pare, purchè habbia le sopradette parti, cioè $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. hor poni che fossero 60. de' quali prendine il $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{4}$. ne viene 20. 15. e 12. che sommati insieme fanno 47. il qual tratto di 60. resta 13. e noi voleuamo che restasse 13000. perliche dirai cosi, se 23. mi restino da 60. ch'io m'apposi, da che mi resteranno 13000. opera, trouerai che ti resteranno da 60000. e tanti Turchi dirai che fossero in tutta l' Armata.

Due giovani vāno a trouar vn sartò per farsi fare vn giubbòn per vno, & il sartò ha tela di due forti, che della prima ne vuole lire 24. del braccio, della quale vn di loro ne prese tãta per farsi vn giubbone, e l'altro giouane volse dell'altra forte la quale il sartò vendeua in questo modo cioè, del primo braccio ne voleua sol. 6. e del secondo sol. 12. e del terzo soldi 18. e così d'ogn'altro braccio ne voleua sol. 6. più; & alla fine trouorno, che tãto spese l'vn quanto l'altro, e tante braccia ne tolse l'vno, quanto l'altro; si domanda quanto spese ciascheduno, e quãte braccia ne presero. Fà così, poni sol. 24. che fermamente vale il braccio della prima forte, il qual parti per 6. ch'è la valuta del braccio dell'altra forte, ne vien 4. e questo raddoppia fà 8. e di questo cauane 1. per regola generale, resta 7. e tante, braccia ne tolse ciascheduno, adunque il primo giouane togliendone braccia 7. a soldi 24. il braccio, spese lir. 8. e tanto spese ancora il secondo. fanno proua.

Vno ha messo in Fiorenza 70. carrate di Vino, e per pagar la gabella n'ha dato vna carrata meno 32. scudi, & vn'altro ve n'ha messo 200. carrate, e per la gabella n'ha dato vna carrata, e 20. scudi; si domanda quanto valse la carrata, e quanto speso di gabella per carrata. Fa così dicendo, se 70. carrate pagano vna carrata meno 32. scudi quanto pagarāno 200. carrate? opera, trouerai che doueran pagare carrate $2\frac{2}{7}$. di vino meno duc. $91\frac{1}{7}$. e noi hauiamo detto che paga vna carrata, e 20. scudi più, perciò aggiungi 20. a $91\frac{1}{7}$. fanno scudi 111. $\frac{1}{7}$. e questi li paga per non dare vna carrata, e $\frac{2}{7}$. di vino; adunque $1\frac{2}{7}$. valse scudi 111. $\frac{1}{7}$. per ilche vna carrata venne a valere scudi 60. laonde il primo pagandone vna carrata meno 32. scudi, viene a pagare scudi 28. in tutto, e volendo sapere quanto paga per carrata, parti scudi 28. per 70. ne viene soldi 8. a oro, e tanto pagò per carrata. Proua per il secondo, il quale ne dà vna carrata, che sono scudi 60. e di più scudi 20. fanno scudi 80. il qual partito per 200. ne viene soldi 8. a oro.

Vno ha messo in Fiorenza 60. balle di lana, e per pagar la gabella bisogna che ne vendesse balle $2\frac{1}{2}$. & vn'altro ve ne messe 40. balle della medesima forte, e per la gabella dette vna balla di lana, e 24. ducati più, si domanda quanto valse la balla della lana, e quanto si pagò di gabella per balla. Fà così, dicendo, se di 60. balle, io ne pago balle $2\frac{1}{2}$. quante ne douerò pagare di balle 40. multipl. 40. via $2\frac{1}{2}$. fa 100. il qual parti per 60. ne viene balle $1\frac{2}{3}$. e tanta lana douerebbe pagare, & egli ne paga vna balla sola, e 24. ducati più, adunque $\frac{2}{3}$. d'vna balla valsero duc. 24. per ilche vna balla intera venne a valere duc. 36. hor volèdo saper quanto si pagò di gabella per balla; tu vedi che le balle $2\frac{1}{2}$. del primo a ducati 36. la balla varranno duc. 90. & egli deue pagare per 60. balle perciò parti duc. 90. per 60. ne vien duc. $1\frac{1}{2}$. e tanto si pagò di gabella per balla; prouala per il secondo.

Sono due numeri che sommati insieme fanno 17. e partito il maggiore per il minore, ne viene 29. si domanda quali sono i numeri.

Questa non vuol dir altro se non così. Fammi di 17. due parti, che partito la maggior per la minore ne venga 29. e volendo trouare le dette parti, terrai quest'ordine, non solo in questa proposta, ma in ogn'altra simile; e prima, aggiungi 1. per regola generale. a 29. fa 30. dipoi parti 17. per 30. ne viene $\frac{1}{2}\frac{2}{5}$. e questo è il minor numero, ò vero parte, e da $\frac{1}{2}\frac{2}{5}$. per fino in 17. v'è $16\frac{1}{5}$. e questo sarà il maggior numero. Fanne proua.

Due hanno denari in questo modo cioè, che li denari del primo sono $\frac{4}{5}$. di quelli del secondo, e li denari del secondo sono duc. 10. più di quelli del primo, si domanda quãti ducati haueua ciascheduno. Questa non vuol dir altro, se non che li denari del primo sono duc. 10. meno che li $\frac{4}{5}$. de' denari del secondo;

per

per la qual cosa ne regue, che li 10. ducati sieno $\frac{1}{7}$. di ciò che si troua il secondo: adunque il secondo haueua ducati 50. & il primo n'haueua 40.

Egli è vn vaso d'argento, che il piede, & il coperchio pesa il $\frac{1}{7}$. & il $\frac{1}{7}$. di tutto il vaso: & il resto pesa libbre 16. si domanda quanto pesa tutto insieme.

Fa così troua vn numero che habbia le sopradette parti, il qual sarà 12. che il $\frac{1}{7}$. è 4. & il $\frac{1}{7}$. è 3. somma insieme 4. e 3. fanno 7. che per fino a 12. v'è 5. di resto, e noi voleuamo 16. per il che dirai così, se 5. mi resta per 12. ch'io m'apposi, per quanto mi resterà 16. multiplica 16. via 12. fa 192. il qual parti per 5. ne viene 38. $\frac{2}{5}$. e tante libbre pesò tutto il vaso insieme. Fanne proua piglia il $\frac{1}{7}$. & il $\frac{1}{7}$. di 38. $\frac{2}{5}$. trouerai che saranno 22. $\frac{2}{5}$. che tratto di 38. $\frac{2}{5}$. resta 16. apunto.

Egli è vn Pesce, che il capo pesa la metà de' $\frac{2}{7}$. di tutto il Pesce, e la coda pesa $\frac{1}{7}$. de' $\frac{2}{7}$. di tutto il Pesce, & il busto pesa once 96. si domanda quanto pesa tutto. Fa così, perche dice che il capo pesa la metà de' $\frac{2}{7}$. di tutto, perciò prendi la metà di $\frac{2}{7}$. la quale è $\frac{1}{7}$. e questo salua; dipoi dice, che la coda pesa il $\frac{1}{7}$. de' $\frac{2}{7}$. di tutto; perciò prendi il $\frac{1}{7}$. di $\frac{2}{7}$. il quale è $\frac{1}{14}$. hora tu hai che il capo pesa $\frac{1}{7}$. di tutto, e la coda pesa $\frac{1}{14}$. di tutto, per il che bisogna trouare vn numero, che habbia $\frac{1}{7}$. e $\frac{1}{14}$. il qual numero sarà 60. prendine $\frac{1}{7}$. ne vien 25. dipoi prendine $\frac{1}{14}$. ne vien 16. il qual sommato con 25. fa 41. il qual tratto di 60. che noi ci apponemmo resta 19. e noi voleuamo che restasse 96. perciò dirai così, se 19. mi resta per 60. ch'io m'apposi, per quanto mi resterà 96. multipl. 96. via 60. & il prodotto parti per 19. ne viene 303. $\frac{1}{19}$. e tante once dirai che pesasse tutto il pesce.

Troua vn numero che multiplicato via 7. & il prodotto partito per 9. ne venga 25. fa così, poni che il numero sia vna cosa multiplicata via 7. fa 7. cose, e questo parti per 9. ne vien $\frac{7}{9}$. di cosa, e questi sono vguale a 25. parti 25. per $\frac{7}{9}$. ne vien 32. $\frac{1}{9}$. e tanto sarà il numero &c.

Troua vn numero che multiplicato in se, & il prodotto multiplicato via 7. faccia 85. $\frac{1}{7}$. fa così, poni che il numero sia vna cosa multiplicata in se fa vn censo, multiplica via 7. fa 7. censi, vguale a 83. $\frac{1}{7}$. parti 83. $\frac{1}{7}$. per il numero delli censi, cioè per 7. ne viene 12. $\frac{1}{7}$. e la radice di 12. $\frac{1}{7}$. che è 3. $\frac{1}{7}$. su il numero, che multiplicato in se, & il prodotto via 7. fece 83. $\frac{1}{7}$. come voleuamo.

Troua vn numero, che il suo quinto multiplicato via 6. faccia 20. Fa così, poni che il numero sia vna cosa, prendine $\frac{1}{5}$. ne viene $\frac{1}{5}$. cosa, multiplica via 6. fa 1. $\frac{1}{5}$. cosa vguale a 20. parti 20. per il numero delle cose, cioè per 1. $\frac{1}{5}$. ne vien 16. $\frac{1}{5}$. e tanto fu il numero, ma soluila in quest' altro modo, poni che il numero sia 10. prendine il $\frac{1}{5}$. che è 2. multipl. via 6. fa 12. e noi voleuamo 20. perciò dirai così, se 12. vien da 10. ch'io m'apposi, da che verrà 20. multipl. 20. via 10. fa 200. il qual parti per 12. ne viene 16. $\frac{1}{3}$. per il numero addimandato.

Vn Signore si troua ducati 16. centouentimila, e vol assoldar gente per 18. mesi, a duc. 5. per soldato il mese; si domanda quanti n'assolderà. Fa così, multiplica 18. via 5. fa 90. e tanti ducati vorrà vn soldato in 18. mesi, dipoi parti 720000. per 90. ne viene 8000. e tanti soldati assolderà.

Vn Molinaro ha vna macina, che in 18. hore macinarebbe staia 90. di grano, e con vn'altra macina, insieme con la prima lo macinarebbe in 10. giorni si domanda in quati giorni la seconda macina da se sola macinarebbe il soprad. grano. Fa così, parti 10. per 18. ne viene $\frac{5}{9}$. e $\frac{5}{9}$. del detto grano macinarebbe la prima macina, e la seconda ne macinarebbe $\frac{4}{9}$. cioè staia 40. e questo lo macinarebbe in 10. giorni; per il che dirai così, se staia 40. di grano macina in 10. giorni, in quanti ne macinerà staia 90? multipl. 90. via 10. fa 900. e questo parti per 40. ne vien 22. $\frac{5}{10}$. & in tanti giorni la seconda lo macinarebbe tutto.

Vno

Vno vende vna pezza di panno a tre persone, & il primo n'hebbe il $\frac{1}{3}$. il secondo $\frac{1}{3}$. & il terzo il resto, che fu bracc. 24. per lire 96. si domanda quanto valse tutto il panno, e quant'era lunga la pezza.

Fà così, somma $\frac{1}{3}$. con $\frac{1}{3}$. fanno $\frac{2}{3}$. e tal parte della pezza hebbero tra il primo, e secondo, & il resto, cioè $\frac{1}{3}$. che sono vuali a 24. bracc. l'hebbe il terzo, parti 24. per $\frac{1}{3}$. ne viene 43 $\frac{2}{3}$. e tante braccia era lunga la pezza: adunque tra il primo, e secondo hebbero la differenza, che è da 24. fino in 43 $\frac{2}{3}$. che v'è braccia 19 $\frac{2}{3}$. le quali a lire 4. montano lir. 78. $\frac{4}{3}$. che con l'aggiuntione di lire 96. fanno lir. 174. $\frac{4}{3}$. e tanto valse la pezza.

Vno ha compro 5. braccia di panno, e gli costò lir. 20. e pagò il braccio tante lire, tanti soldi, e tanti denari, cioè tante lire, quante gli diede del braccio, gli diede anco tanti soldi, e tanti denari, che in tutto fecero la somma di lire 20. si domanda quante lire, soldi, e denari pagò il braccio.

Fà così, tu vedi chiaramente, che il braccion non gli può costare più che lire 4. delle quali ne farai denari, che sono 560. dipoi poni che il braccio lo paghi lire 1. 1. 1. de quali farai denari, che sono den. 257. e questo sarà partitore di 960. ronnarai, che ne verrà 3. $\frac{2}{3}$. $\frac{2}{3}$. e così dirai, che il braccio di quel panno lo pagasse lir. 3. $\frac{2}{3}$. $\frac{2}{3}$. e sol. 3. $\frac{2}{3}$. $\frac{2}{3}$. e den. 3. $\frac{2}{3}$. $\frac{2}{3}$. fanno proua.

Braccia 4. di panno, e due. 6. costano lir. 50. e brac. 8. e due. 8. simili costano lir. 78. 13. 4. si domanda quante lire valse il ducato, e quanto il braccio del panno. Fà così, ragguglia le cose, cioè raddoppia 4. braccia di panno, e 6. ducati fanno brac. 8. e due. 12. e questo tra il panno, e ducati, di necessità varranno lire 100. e noi habbiamo, che brac. 8. di panno, e due. 8. vagliono lir. 78. 13. 4. per il che, caua brac. 8. due. 8. e lir. 78. 13. 4. di brac. 8. due. 12. e lir. 100. resta brac. 0. due. 4. e lir. 21. 6. 8. le quali lire vengono a essere la valuta di detti 4. duc. parti adunque lir. 21. 6. 8. per 4. ne viene lir. 5. 6. 8. e tanto valse il ducato, hor per vedere quanto valse il braccio del panno, tu sai che 8. braccia di panno, e 8. duc. vagliono lir. 78. 13. 4. vedi adunque quanto vagliono 8. duc. a lir. 5. 6. 8. il ducato, trouerai che vagliono lir. 42. 13. 4. & il resto per fino in lir. 78. 13. 4. che v'è lir. 36. sono per la valuta d'8. braccia di panno, parti lir. 36. per 8. ne viene lire 4. $\frac{1}{2}$. e tanto valse il braccio del panno.

Dieci dozzine di stringhe più due soldi, vagliono soldi 20. meno 5. dozzine, si domanda quanto valse la dozzina.

Fà così, ragguglia le parti in questo modo cioè, aggiungi 5. dozzine a ciascuna parte, haurai dalla prima a parte dozzine 15. più 2. soldi, e dall'altra haurai soldi 20. appunto, perciò che se a sol. 20. meno 5. dozzine tu aggiungi 5. dozzine, fanno sol. 20. appunto: hor caua sol. 2. di ciascuna parte; haurai dalla prima parte 15. dozzine appunto, e dall'altra parte sol. 18. li quali sono la valuta di 15. dozzine, parti sol. 18. per 15. ne vien sol. 1. $\frac{1}{3}$. e tanto dirai che valesse la dozzina le stringhe.

E dicendosi, le 3. pere, e 2. quattrini vagliono 12. quattrini meno 2. pere, si domanda quanto valse vna pera: questa è simile alla sopradetta, perciò farai così, ragguglia le parti in questo modo cioè, aggiungi 2. pere a ciascuna parte, hauerai dalla prima parte, 5. pere, e 2. quattrini: e dall'altra parte haurai 12. quattrini appunto, dipoi caua 2. quattrini da ciascuna parte, hauerai dalla 1. parte 5. pere appunto, e dall'altra 10. quattrini appunto, li quali saranno la valuta di 5. pere, parti 10. per 5. ne vien 2. e tanti quattrini valse vna pera.

Vno ha venduto tante pere per sol. 20. e troua che se n'hauesse date 2. meno al quattrino che non fece, n'haurebbe hauuto sol. 24. si domanda quante pere haueua.

E se non s'hauesse hauuto sol. 24. si domanda quante pere haueua e quante

e quante ne dette al quattrino. Fa così, caua sol. 20. da sol. 24. resta sol. 4. e tanti soldi toccaua più, se daua 2. pere meno al quattrino, e perciò dirai così, se 12. quattrini mi danno 2. pere, che mi daranno 60. quattrini, cioè sol. 20. opera, ti daranno 10. pere, e tante se ne doueua dare al quattrino la seconda volta, adunque la prima volta ne dette 2. più, cioè 12. al quattrino, hora per saper quant'erano le pere, dirai così, se per 1. quattrino s'è dato 12. pere, quante ne farà date per 60. quattrini? opéra, trouerai che n'hauerà date 720. e tante pere haueua, e la prima volta ne dette 12. al quattrino, e se ne daua 2. meno al quattrino, n'hauerebbe ritratto soldi 4. più che non fece.

Vno ha compro vnà quantità di pere per sol. 20. e l'ha riuendute, e n'ha date 2. meno al quattrino, che egli non hebbe, & ha guadagnato a ragion di 20. per 100. si domanda quante pere comprò, e quante n'hebbe al quattrino. Questa è simile alla soprad. per la qual cosa dirai così, chi guadagna 20. per 100. guadagna il $\frac{2}{10}$. del suo capitale, adunque si viene a guadagnar il $\frac{2}{10}$. di sol. 20. che sono sol. 4. e tão vien ad hauer guadagnato per hauerne date 2. meno al quattrino; laonde dirai così, se 12. quattrini mi danno 2. pere, quante me ne darãno 60. quattrini? cioè sol. 20. opera trouerai che ti darãno 10. pere, e tante ne dette al quattrino; adunque lui n'hebbe 2. più, cioè 12. e per saper quante pere comprò multipl. 60. quattrini via 12. fa 720. e tante pere comprò, che a 12. pere al quattrino gli costorno sol. 20. e dandone effo 10. al quattrino ne toccherà sol. 24. e così habbiamo trouato che guadagna lir. 4. apunto, cioè a ragione di 20. per cento come si proposè.

Le 4. vuoua vagliono 9. quattrini, le 10. pere vagliono 3. quattrini, & vno si troua 204. quattrini, e vuol comprare tante pere, quante vuoua, si domanda quante vuoua, e pere si comprerà. Fa così, poni che compri vn'huouo il qual varrà quattrini $2\frac{1}{4}$. e perche comprando vn'huouo, deue ancora comprare vna pera, e valendo le 10. pere 3. quattrini, vna pera varrà $\frac{3}{10}$. d'un quattrino, che sommati con quattrini $2\frac{1}{4}$. che fon la valuta d'un'huouo, fanno quattrini $2\frac{1}{2}$. per ilche dirai così, se quattrini $2\frac{1}{2}$. mi danno vn'huouo, & vna pera, quant'huoua, e pere mi daranno quattrini 204? multiplica 204. via $2\frac{1}{2}$. fa pur 204. il qual partito per $2\frac{1}{2}$. ne viene 80. e così dirai che per li 204. quattrini hauerà 80. vuoua, & 80. pere, fanne proua &c.

Vno ha compro vna quantità di pere, & ogni 5. pere l'ha pagate 3. quattrini, di poi l'ha riuendute, & ogni 6. pere l'ha vendute 5. quattrini, e le pere che comprò furon tante, che guadagnò soldi 18. 8. si domanda quante pere comprò.

Fa così dicendo, se 5. pere li costano 3. quattrini, che gli costeranno 6. pere, multiplica 6. via 3. fa 18. il qual parti per 5. ne viene $3\frac{6}{5}$. e tanti quattrini costarono al compratore le 6. pere, & effo le riuende 5. quattrini, adunque vi guadagna quattrini $1\frac{3}{5}$. per ilche dirai così, se quattrini $1\frac{3}{5}$. di guadagno vien da 6. pere, ch'io ho riuendute, da quante pere verranno guadagnati soldi 18. 8? o vero 5. quattrini, multiplica 56. via 6. fa 336. il qual parti per $1\frac{3}{5}$. ne vien 240. e da tante pere furon guadagnati soldi 18. 8.

Vno compra 3. pere 5. quattrini, e riuende 7. pere 13. quattrini, si domanda se guadagna, o perde, e comprandone per soldi 60. quante pere douerà hauere, e quanto guadagnarà.

Fa così dicendo, se 3. pere gli costano 5. quattrini, quãto gli costeranno 7. pere? multipl. 7. via 5. fa 35. il qual parti per 3. ne vien $11\frac{2}{3}$. e tanti quattrini costorno a lui le 7. pere, & egli le riuende 13. quattrini, adunque vi guadagna quattrini $1\frac{1}{3}$. hor per veder quante pere cõpra con sol. 60. dirai così, se cõ 5. quattrini si cõpra 23. pere quante

quante se ne comprerà con 180. quattrini? opera, trouerai che si comprerà 108. pere, e volendo veder quanto vi guadagnerà dirai così, se 7. pere mi danno di guadagno quattrini 1. $\frac{1}{2}$. quanto mi daranno di guadagno 108. pere? opera, trouerai che ti daranno di guadagno quattrini 20. $\frac{1}{2}$. che sono sol. 6. $\frac{1}{2}$. e volendo sapere quanto guadagna per cento, dirai così, se con sol. 60. si guadagna sol. 6. $\frac{1}{2}$. quanto si guadagnerà con 100? trouarai, che si guadagnerà a ragione d'11. $\frac{1}{2}$. per cento.

Vno compra 7. pere 13. quattrini, e riuede 3. pere 5. quattrini, n'ha comprate, e vendute tante, che ha perso soldi 6. $\frac{1}{2}$. si domanda quante ne comprò.

Fà così, dicendo se 7. pere costano 13. quattrini, quanto costaranno 3. pere? opera, trouarai che costaranno quattrini 5. $\frac{1}{2}$. e lui le riuede 5. quattrini apunto, adunque sopra 3. pere vi perde $\frac{1}{2}$. d'un quattrino, e volendo sapere sopra quante pere perse sol. 6. $\frac{1}{2}$. dirai così, se $\frac{1}{2}$. d'un quattrino mi vengon di perdita da 3. pere, da quante pere mi verranno di perdita quattrini 20. $\frac{1}{2}$? multiplica 20. $\frac{1}{2}$. via 3. & il prodotto parti per $\frac{1}{2}$. ne vien 108. e tante pere dirai, che comprò.

Vn gentil huomo piglia vn giouane per suo seruitore, al quale s'obliga di dare duc. 12. l'anno, & vn mantello, Accade che il detto seruitore non lo serue se non mesi 4. $\frac{1}{2}$. e d'accordo si parte, e per il suo seruito il padrone gli diede il mantello, si domanda quanto valse. Tu vedi, che se finiu l'anno, hancua ancora duc. 12. adunque per mesi 7. $\frac{1}{2}$. che non serui, meritaua duc. 12. perche dirai così, se in mesi 7. $\frac{1}{2}$. meritaua duc. 12. quanto douerà hauer meritato in mesi 4. $\frac{1}{2}$. multipl. 4. $\frac{1}{2}$. via 12. fa 54. qual parti per 7. $\frac{1}{2}$. ne vien 7. $\frac{1}{2}$. e tanti duc. costò il mantello.

Vn'altro s'accordò per duc. 20. l'anno, & vn vestito, e quando fu in capo di mesi 8. $\frac{1}{2}$. d'accordo si parti, & hebbe per il suo seruitio il vestito, e 12. ducati, si domanda quanto valse il vestito.

In due modi si puol'operare, & hauere la solutione di tal proposita; e prima, tu vedi che se finiu l'anno haueua ancora duc. 8. adunque in mesi 3. $\frac{1}{2}$. hauebbe meritato duc. 8. perche vedi alla medesima ragione quanto ha meritato in mesi 8. $\frac{1}{2}$. dicendo, se in mesi 3. $\frac{1}{2}$. meritaua ducati 8. quanti n'ha meritiati in mesi 8. $\frac{1}{2}$? opera, trouarai che doueua hauere duc. 19. $\frac{1}{2}$. e lui n'ha hauuti duc. 12. & il vestito, adunque da 12. per fino in 19. $\frac{1}{2}$. che v'è duc. 7. $\frac{1}{2}$. valse il vestito. Hor soluila per quest'altro modo dicendo, se in mesi 12. doueua hauere duc. 20. & vn vestito, quanti ducati, e che parte di vestito douerà hauere in mesi 8. $\frac{1}{2}$? opera, douerà hauere duc. 14. $\frac{1}{2}$. e $\frac{1}{2}$. del vestito, e noi sappiamo che ha hauuto duc. 12. & il vestito, per la qual cosa si dice, che $\frac{1}{2}$. del vestito, e duc. 14. $\frac{1}{2}$. vagliono duc. 12. & vn vestito intero; onde ragguglia le parti cioè, caua 12. duc. di 14. $\frac{1}{2}$. resta 2. $\frac{1}{2}$. e tanti ducati venne a valere il resto del vestito, che fu $\frac{3}{4}$. parti adunque 2. $\frac{1}{2}$. per $\frac{3}{4}$. ne viene duc. 7. $\frac{1}{2}$. per la valuta del vestito.

Vn'altro s'accordò per lire 48 & vn mantello l'anno, & in capo d'8. mesi d'accordo si parti, & hebbe lir. 30. & il mantello, si domanda quanto valse il mantello.

Tu vedi, che se seruia ancora 4. mesi, haueua lir. 18. piu, le quali perse per non seruire 4. mesi, perche dirai così, se in 4. mesi meritaua lir. 18. quante n'hauerà meritate in mesi 8? opera, trouerai che hauerà meritato lir. 36. e noi habbiamo detto, che hebbe lir. 30. & il mantello, adunque il mantello si contò lir. 6.

Vn'altro s'accordò per duc. 30. & vn vestito l'anno, & in capo di mesi 3. $\frac{1}{2}$. d'accordo si parti, & hebbe il vestito, che valeua duc. 3. piu che non haueua meritato; si domanda quanto valeua il vestito. Tu vedi, che se finiu l'anno hauebbe hauuto duc. 30. & anco li duc. 3. che valse di piu il vestito, che in tutto sarebbono duc. 33. etanti ne perse per non hauer seruito mesi 8. $\frac{1}{2}$. perche dirai così, se

in

in mesi $8\frac{1}{2}$. meri vna duc. 33. quanto meritarà in mesi $3\frac{1}{2}$? opera, trouarai che meritarà duc. $12\frac{1}{2}$. & a questi aggiungi duc. 3. che hebbe a rendere al padrone, fanno duc. $16\frac{1}{2}$. e tanto dirai che valesse il vestito.

Vn'altro s'accordò per 4. anni, & il prim'anno gli diede di salario duc. 2. & il quart'anno gli diede duc. 16. domando quanto gli diede il secondo, & il terzo anno. Questa non vuol dir altro, se non che sono 4. numeri proportionali, che il primo è 2. & il quarto è 16. e si domanda del secondo, e del terzo. Fa così, poni che il second'anno hauesse di salario vna cosa, moltiplica il salario del primo anno, via il salario del quarto anno, cioè 2. via 16. fa 32. e questo parti per il salario del second'anno, cioè per vna cosa, ne vien 32. esimi d'vna cosa per il salario del terzo anno, dipoi quadra il salario del second'anno, cioè vna cosa, farà 1. censo, e questo sarà vguale alla multiplicatione del primo nel terzo, cioè a 2. via 32. esimi d'vna cosa, che fanno 64. e leua i rotti, moltiplicando per il denominatore l'altro estremo dell'agguagliamento, cioè 1. cosa, via 1. censo, farà 1. cubo, che sarà vguale a 64. e perciò parti 64. per 1. ne viene il medesimo 64. e la radice cuba di 64. sarà il salario del second'anno, cioè duc. 4. & il salario del terzo anno sarà il prodotto del primo anno nel quarto, e partito per il secondo, cioè 2. via 16. fa 32. partito per 4. ne vien 8. e tanti ducati hebbe di salario il terzo anno.

Vn'huomo d'Arme prese vn seruitore per 3. anni, con patto di darli in capo al tempo lir. 300. vn cauallo, vna corazza, & vna spada, accadde, che lo seruì solamente 26. mesi, e gli diede lir. 160. il cauallo, la corazza, e la spada, e fu pagato; & il cauallo valeua per 4. corazze, e la corazza valeua per 4. spade, si domanda quanto valse il cauallo, la corazza, e la spada. Chiara cosa è, che se lo seruìua 10. mesi più haueua lir. 300. il cauallo, e l'arme, cauà lir. 160. che ha hauute di lir. 300. che doueua hauere, restano lir. 140. e queste guadagnaua in 10. mesi; per ilche dirai così, se in 10. mesi guadagnaua lir. 140. quante n'hauerà guadagnate in mesi 26. moltiplica 26. via 140. & il prodotto parti per 10. ne viene lir. 364. e tante lire (senza far mentione d'arme, e cauallo) meritarebbe in 26. mesi, delle quali n'ha hauute lir. 160. che tratte di lir. 364. restano lir. 204. per la valuta del cauallo, e l'arme. Diuidi hora lir. 204. in tre parti, e che la seconda sia 4. tanti della prima, e la terza sia 4. tanti della seconda, poni, che la prima parte sia vna cosa, la seconda sarà 4. cose, e la terza sarà 16. cose, diu idi per modum societatis, hauerai, che la spada valse lir. $9\frac{1}{2}$. e la corazza lir. $38\frac{1}{2}$. & il cauallo lir. $155\frac{1}{2}$.

Va Seruitore rubba al Padrone alcune cose, e fuggesi, e camina ogni di 30. miglia, & in capo di 3. giorni il Padrone li camina dietro, e fa ogni di 35. miglia, si domanda in quanti giorni lo giungerà. Fa così, moltiplica 30. miglia, che fa ogni di il Seruitore via 3. giorni fa 90. e tante miglia haueua caminato prima che il Padrone si mouesse per andarli dietro, dipoi tu vedi, che il Padrone ogni di acquista 5. miglia più del Seruitore, però parti 90. miglia per 5. ne vien 18. & in tanti giorni lo giungerà.

Vn Signore si troua hauere 4200. caualli da combattere, a' i quali da di paga duc. 20. per lancia il mese, si domanda quanti ducati li bisognerà, volendoli soldare per 15. mesi. Fa così, reca prima i caualli a lance, che ogni 3. caualli fanno vna lancia, parti 4200. per tre ne viene 1400. lance poi moltiplica 1400. via 20. fa 28000. e tanti ducati vogliono in vn mese, e per 15. mesi ne vorranno 420000. &c.

Vn Signore si troua 2400. caualli, e gli dà di paga duc. 20. per lancia il mese, si domanda con duc. 320000. per quanti mesi li potrà soldare. Reca prima i ca-

ualli

ualli a lance, partendo 2400. per 3. ne viene 800. lance, poi moltiplica 800. via 20. fa 16000. e tanti ducati li bisognerà in vn mese, parti hora duc. 320000. per 16000. ne viene 20. e tanti mesi si potrà soldare.

*Questo fattomi dall' Illust. Sig. Cavaliere Marc'-
Antonio Cecchi da Pescia mio Padrone.*

PONIAMO caso, Forestano mio, che vna Fortezza sia assediata, e dentro vi sia 200. soldati, e la prouisione che hanno sia tale, che gli possa bastare 10. mesi dando 20. once di pane il giorno per soldato, & habbino auuiso tale, che in capo a quel tempo saranno soccorsi, ma quando sieno poi in capo di mesi 7. e giorni 20. habbino nouuo auuiso di non poter esser soccorsi, se non vn mese doppo, che non pensauano, cioè in capo d' 11. mesi, vi domando hora, in tal caso, quant' once di pane si douerebbe dare il giorno per soldato, acciò che gli bastasse per fino al soccorso del secondo auuiso. Per rispondere a ciò farei così, di 10. mesi sopra-detti ne farei giorni, che sono 300. e similmente di 7. mesi, e 20. giorni, ne farei giorni, che sono 230. è questo è il tempo passato, dipoi trarrei 230. giorni di 300. restano 70. giorni, e questo è il tempo che manca per fino in 10. mesi, al qual tempo aspettauano il soccorso, ma per il secondo auuiso, che hanno hauuto, gli conuiene aspettare vn mese più, cioè 30. giorni, i quali aggiungerci con 70. giorni, e faranno giorni 100. hor bisogna quella prouisione, che doueuan dispendere in 70. giorni, dispendarla in 100. e direi così, se 100. fusse 70. che sarebbe once 20. moltiplicarei 20. via 70. & il prodotto partirei per 100. e ne verrà 14. & once 14. di pane bisognarebbe dare il giorno per soldato, a voler che durasse vn mese più.

Vn Gentiluomo già vecchio, ritrouandosi a vna sua Villa, e dilettandosi grandemente del giuoco di palla, chiamò due giouani Contadini, e disse, eccoui 4. ducati, giuocateli qui in mia presenza alla palla, e chi di voi prima vince 8. giuochi, voglio, che habbia vinto li 4. ducati, e così cominciarono a giocare, e quando vn di loro hebbe vinto 6. giuochi, e l'altro 3. si perse la palla, e non poterono finire, & il Gentiluomo disse, eccoui i denari, diuideteli tra voi, si domanda quanti ne toccherà per vno.

Nel risolvere simili propositioni son diuerse l'openioni, però questa a noi pare la più retta, e la più comune, e prima diremo così, che quello il quale vorrà li 4. ducati, bisognerà che vinca 8. giuochi, e l'altro non ne può vincer più che 7. perciò che fra di loro non può correre più di 15. giuochi. Laonde il primo vincendo 5. giuochi, viene a vincere $\frac{5}{7}$. cioè $\frac{5}{7}$. de' 4. duc. & il secondo che vince 3. giuochi, viene a vincere $\frac{3}{7}$. cioè $\frac{3}{7}$. de' detti 4. duc. di manitache tra il primo, e secondo vengono a vincere $\frac{5}{7}$. de' 4. duc. per la qual cosa chiaramente si conosce, che vi resta $\frac{2}{7}$. i quali non sono affaticati, ne giuocati, ne vinti da nessun di loro, e perciò bisogna diuiderli per metà, di $\frac{2}{7}$. piglia adunque la metà, ch'è $\frac{1}{7}$. & aggiungili a $\frac{5}{7}$. fanno $\frac{6}{7}$. e tal parte ne tocca al primo, e l'altra metà, cioè $\frac{3}{7}$. aggiungili a $\frac{3}{7}$. fanno $\frac{6}{7}$. e tal parte ne tocca al secondo. Hora diuidasi 4. ducati per modum societatis, dicendo così, il primo deue trarre per 17. & il secondo per 13. de' detti 4. ducati, opera, trouarai, che il primo douea habere ducati $2\frac{2}{7}$. & il secondo duc. $1\frac{2}{7}$. e questa è la vera soluzione di simili proposte.

Tre soldati essendo dentro ad vna Fortezza per la quale andando a spasso, trouorono vno scudo, e ciascuno di loro lo voleua, pur alla fine s'accordorono che si douesse giocare alle pallottole, con patto, che chi di loro vincerà prima 14 giochi chi habbia vinto lo scudo, cioè lire 7. accadde che quando il primo hebbe vinto 10. giuochi, il secondo 8. & il terzo 5. gli conuenne andare in guardia, & si manda in che modo sarà douere che diuidino il detto scudo, e che parte ne toccherà a ciascuno.

Fa così, prima vedi, quanti giuochi posson fare al più fra tutti tre, chiara cosa è che vn di loro bisognaua che vincesse 14. giuochi a voler vincer lo scudo, e gli altri due puol esser che vinchino 13. giuochi per vno, adunque il più che posson fare fra tutti tre sono 40. giuochi, de quali il primo hauendone vinti 10. sono $\frac{1}{4}$. di tutti, & il secondo hauendone vinti 8. sono $\frac{2}{5}$. & il terzo hauendone vinti 5. sono $\frac{1}{4}$. che giunte insieme queste tre parti fanno $\frac{3}{4}$. e tal parte dello scudo hanno vinto fra tutti tre, del quale gli mancò loro il tempo da vincere il resto cio $\frac{1}{4}$. e questa parte non essendosi ancora giocata, nè vinta, & affaticata da nissun di loro, il douere vuole che si diuida vgnalmente per terzo, e perciò predi il $\frac{1}{4}$. di $\frac{1}{4}$. ne viene $\frac{1}{16}$. e tal parte deuì aggiungere alla prima parte data di sopra a ciasc. n di loro; la qual aggiunta che l'haurai, trouerai, che al primo ne li toccherà $\frac{1}{4}$. al secondo $\frac{2}{5}$. & al terzo $\frac{1}{4}$. e se vuoi sapere quante lire toccherà a ciascuno, vedi separatamente ciascuna delle sopradette parti quante lire sono, multiplica $\frac{1}{16}$. via lire 7. fanno lire 2. 14. 10. e tante lire toccò al primo, & al secondo gli toccò lire 2. 7. 10. & al terzo lire 1. 17. 4. che in tutto sono lire 7. e questa ci pare che sia la vera solutione, e non quella come vuol Fra Luca nella proposta che fa del giuoco della palla, e nel giuoco di tirar con la balestra, la qual propone così, e dice.

Son tre giovani i quali fanno a balcistrare a chi prima di loro fa 6. colpi meglio quello habbia da vincer 10. ducati, e quando il primo hebbe fatto 4. colpi, il secondo 3. & il terzo 2. non voglion far più, e d'accordo voglion partir la propolta si domanda quati ne toccherà per vno. Il detto Fra Luca dice così, che il più che posson fare fra tutti tre sono 16 colpi, perche puol esser che tutti tre sieno a 5. colpi, & vno poi se ne farà per hauerne 6. adunque de' 16 colpi che posson fare in tutto il primo n'ha 4. che sono $\frac{1}{4}$. di tutti, il secondo n'ha 3. che sono $\frac{3}{8}$. & il terzo n'ha 2. che sono $\frac{1}{4}$. dipoi egli diuide 10. ducati in questo modo cioè, al primo ne dà $\frac{1}{4}$. che sono duc. 2. $\frac{1}{2}$. al secondo ne dà $\frac{3}{8}$. che sono duc. 1. $\frac{3}{4}$. & al terzo ne dà $\frac{1}{4}$. che sono duc. 1. $\frac{1}{4}$. i quali sommati tutti insieme fanno duc. 5. $\frac{1}{4}$. e questi gli trache di duc. 10. restano duc. 4. $\frac{1}{4}$. li quali diuide per modo di Compagnia dicendo; il primo mette 4. cioè per 14. giuochi vinti, & il terzo mette 3. & il secondo mette 2. & hanno a diuidere duc. 4. $\frac{1}{4}$. de quali al primo ne tocca duc. 1. $\frac{1}{4}$. e questi agglugi con duc. 2. $\frac{1}{2}$. che di sopra gli toccorono, fanno duc. 4. e tanti ne vuol che ne tocchi al primo, la qual cosa poteua fare in vna volta sola dicendo. Il primo deue trar per 4. il secondo per 3. & il terzo per 2. & hanno a partire duc. 10. de quali al primo toccherebbe duc. 4. $\frac{1}{4}$. come di sopra s'è detto.

Ma noi non approuiamo questa sua openione, e conclusioni, perciò che li duc. 4. $\frac{1}{4}$. i quali non si son vinti da nissun di loro, esso gli diuide per rata de' colpi fatti i quali non vi ha parte alcuna, auresso che i colpi fatti meritano vna parte de' detti denari, e l'altra parte che non s'è affaticata da nissun di loro, non è douer diuidere la seconda la rata de' primi colpi, ma si bene diuidela vgnalmente per terzo, in questo modo cioè.

Noi habbiamo detto che il primo hauendo vinto 4. giuochi, ò vero colpi, viene ad hauer vinto il $\frac{1}{2}$. de' tutti i colpi che si poteuon fare, cioè il $\frac{1}{2}$. di 16. e così viene a vincere il $\frac{1}{2}$. di tutto quel che giuocano, & il secondo ne viene a vincere $\frac{1}{4}$. & il terzo $\frac{1}{4}$. che giunte insieme tutte queste parti, fanno $\frac{3}{4}$. e tal parte vengono a l'hauer vinto fra tutti tre de' detti 10. ducati, & il resto cioè $\frac{1}{4}$. non essendo vinti da nessun di loro, perciò conuien diuidere $\frac{1}{4}$. egualmente in tre parti, che ne viene $\frac{1}{12}$. per parte i quali aggiunti con $\frac{1}{4}$. che n'hauera vinto il primo per li 4. colpi fatti, fanno $\frac{1}{3}$. e tal parte douerebbe hauere il primo de' detti 10. ducati.

Aggiungi per il secondo, e per il terzo, nel medesimo modo, trouerai, che al secondo ne toccherebbe il $\frac{1}{3}$. & al terzo ne toccherebbe $\frac{1}{3}$. Piglia adunque per il primo $\frac{1}{3}$. di 10. ducati, ne viene ducati 3. $\frac{2}{3}$. e tanti si dice che ne toccherebbe al primo, & al secondo, gli toccherebbe due. $\frac{2}{3}$. & al terzo due. $\frac{2}{3}$. i quali sommati insieme, fanno ducati 10. e questa teniamo che sia la vera soluzione, e non opemione, e dica altri ciò che vuole.

Due giocano a 10. partite, ò vero 10. giuochi, & il primo n'ha guadagnate 7. e l'altro 9. accade certo inconueniente, che non posson finire, se vuoi sapere quel che ciascuno douerà hauere del deposito fa così, dissalca 7. da 10. resta 3. similmente dissalca 9. di 10. resta 1. la progression continua di 3. e 6. è quella d'1. è 1. partendo adunque il deposito in 7. parti 6. toccano al secondo, & 1. parte al primo.

Questa la propone, e dispone Gio. Francesco Peherone nel modo sopradetto, e noi diciamo, che al primo toccherà $\frac{2}{3}$. del deposito, & al secondo $\frac{1}{3}$. si come per le sopradette ragioni habbiamo dimostrato.

Quattro compagni giuocano alla palla a 60. il giuoco, a 15. per caccia, a due per banda, e giocando, quando che l'vna parte hebbe 45. e l'altra hebbe 15. occorre che si perse la palla, e non poteron finire il giuoco, & andaua da scommessa 8. scudi, domando quanto toccherà per parte di detti denari. Qui sta la 23. propositione descritta dal Pagani da Bagnacavallo nel suo trattato delle due false positioni. La soluzione che esso gli dà è questa cioè, dice che la maggior quantità di cacce, che fra tutte due le parti si posson fare sono 7. di maniera che la parte che ha 45. viene hauere $\frac{2}{3}$. delle dette 7. cacce, e similmente la parte che ha 15. viene hauere $\frac{1}{3}$. delle dette cacce, dipoi egli somma insieme $\frac{2}{3}$. con $\frac{1}{3}$. fanno $\frac{3}{3}$. fatto questo procede per via di compagnia dicendo, se $\frac{2}{3}$. guadagnano scudi 8. quanto douerà guadagnare $\frac{1}{3}$. della prima parte, & $\frac{1}{3}$. della seconda? e così conchiusile, che alla prima parte toccherà scudi 6. & all'altra parte scudi due, e doppo questa conclusione n'adduce due altre in suo favore, ma pur simili alla sopradetta, le quali per breuita non vogliamo perder tempo a descriuerle, per essere tutte opemioni erronee.

Ma perchè del detto Pagani nell'ottaua sua propositione, poco indietro alla sua sopradetta ha descritto, che due Giuani giuocano al Taouliero 18. ducati (i quali insieme ne hauereuon trouata a caso in vna borsa) con patto, che gli douesse hauere chi li loro vinceua prima 8. giuochi, e questa la conclude diueramente alla sopradetta, e perciò di noi si aduce questa sua contraditione.

Perciò che nella propositione del giuoco del Taouliero, dice che il primo di loro che vincerà 8. giuochi, vincerà ancora li 18. ducati, e che vn di loro vinse 6. giuochi, e l'altro ne vinse 5. di sol perfero i dadi, e non poterono finire, per il che si domanda quanti ducati toccherà per vno, la soluzione di questa propositione dice esser questa cioè, che tutti due poteron fare 15. giuochi, e non più, perchè quello

quello che hauesse. into li denari bisognaua che vincesse 8. giuochi, e l'altro compagno il più che potesse vincere sariano itati 7. giuochi, onde perche il primo ha vinto 5. giuochi, di ragione viene a vincer $\frac{5}{7}$ de detti 18. ducati, & il secondo hauendo vinto 5. giuochi, viene a vincer $\frac{5}{7}$ de detti 18. duc. di maniera che fra il primo, e secondo vengono a vincere $\frac{10}{7}$ de detti denari, sò che vi resta ancora $\frac{8}{7}$ de detti 18. duc. i quali non sono itati vinti, nè affaticati da nessun di loro, e perciò il douer vuole, che questo resto si diuida per metà.

Parti adunque $\frac{8}{7}$ per metà, ne viene $\frac{4}{7}$ a quali aggiungi alli $\frac{5}{7}$ del primo fanno $\frac{9}{7}$, e tal parte tocca al primo compagno de 18. duc. e similmente gli altri $\frac{3}{7}$ li aggiungerai a $\frac{5}{7}$ faranno $\frac{8}{7}$, e tal dirai che tocchi al secondo de detti 18. duc. perliche piglia $\frac{8}{7}$ di 18. ne viene due. $\frac{9}{7}$ per il primo compagno, e similmente per il secondo piglia $\frac{8}{7}$ di 18. ne viene due. $\frac{8}{7}$. e tanti ne toccherà al secondo.

Hor questa è quella solutione, che il detto Pagani dà alla sopradetta propositione, qual conclusione è quella che a noi piace, & approuiamo per buona. Ma perche le solutioni di simili proposte consistono nell'opinioni, e l'opinioni, & i pareri essendo varj, però lasciaremos tal giudicio a più fau, & intendenti, perche a noi basta hauer detto il parer nostro, e dimostrato questa sua contradictione. La ragione che alcuni adducono in contrario è qui ita, cioè, dicono, che chi ha più giuochi, e più vicino al poter finire, e conseguire il tutto, e perciò gli si conuien tirare di quei denari per rata de' giuochi vinti, e noi diciamo che la Fortuna si può riuoltar presto, e fuorir quell'altro a vincer al tutto, si come infinite volte s'è visto, e vedesi, tanto nel giuoco di palla, come in ogn'altro, ma molto più nelle cose di guerra, si come dottamente ne dimostra l'Aristo in persona di Carlo con questi due versi.

Così Fortuna ad Agramante arrese,

Ch'vn'altra volta a Carlo assedio mise.

Il qual hauendo assediato Agramante, si riuoltò talmente la fortuna, che Agramante in vn attimo ruppe l'esercito di Carlo, e nuouamente l'assedio in Parigi.

Vn fatto cucirebbe vna veste in 16. giorni, e l'altro la cucirebbe in 12. giorni, e se questi due fatti pigliassero vn compagno, fra tutti tre la cucirebbono in 4. giorni, si domanda in quanti giorni il terzo compagno cucirebbe la veste da se solo.

Perche fra tutti tre la cucirebbono in 4. giorni, & il primo solo la cucirebbe in 16. giorni, adunque in 4. giorni ne cucirebbe $\frac{1}{4}$. & il secondo $\frac{1}{3}$ che giunt insieme queste due parti, fanno $\frac{7}{12}$ e tal parte ne cucirebbono in 4. di, fra il primo, e secondo, perliche ne segue che il terzo compagno cucirebbe il resto, cioè $\frac{5}{12}$. laonde, dirai così, se $\frac{1}{4}$ d'vna veste si cucirebbe in 4. giorni, in quanti giorni si cucirebbe vna veste intera? multiplica 4. via 4. fa 16. il qual parti per $\frac{7}{12}$ ne viene $\frac{64}{7}$. & in tanti giorni il terzo compagno cucirebbe la veste.

Vn ho compro 3. pezze di drappi, cioè raso, velluto, e broccato, e la pezza del raso gli costò vna quantità, e la pezza del velluto gli costò due tanti, e la pezza del raso, e la pezza del broccato gli costò due tanti che la pezza del velluto, e fra tutte costorno due. 360. domanda quanto costò ciascuna pezza da per se.

Fà così, poni che la pezza del raso costasse vna quantità di ducati qual ti piace, hor poni che costasse due. 4. adunque la pezza del velluto costò due. 8. e la pezza del broccato due. 16. che in tutto fanno due. 28. e noi voleuamo due. 360. perliche dirai così, se due. 28. vengono da due. 4. ch'io m'apposi, da che verranno dueati 360? multipl. 360. via 4. fa 1440. il qual parti per 28. ne viene due. $\frac{540}{7}$. e tanto costo

costò la pezza del raso, e per la pezza del velluto dirai cost, se due, 28. vengono da due. 8. ch'io m'apposi, da che verranno due. 360. multipl. 360. via 8. fa 2880. il qual parti per 28. ne viene due. 102. $\frac{2}{3}$. e tanto dirai che costasse il velluto, e la pezza del brocca, o costò ducati tanti, cioè ducati 205. $\frac{2}{3}$. che fra tutte tre fanno la somma di ducati 360. apunto.

Tre giovani hanno Rascia d'vna medesima sorte, & il primo n'ha 8. braccia, & il secondo n'ha 6. braccia, & il terzo n'ha 4. e vanno a vn fatto per tutti vna cappa per vno, & il fatto dice, ci auanza tanta Rascia, che io potrò fare anco vna cappa per me, e così fece 4. cappe d'vqual grandezza, e per la sua diede loro lire 31. $\frac{2}{3}$. e disse haueri pagati, si domanda quante ne toccherà per vno.

Fa così, tu vedi che fra tutti tre haueua braccia 18. di Rascia, delle quali faccendone 4. cappe, ne viene a toccare braccia 4. $\frac{2}{3}$. per cappa, adunque il fatto hebbe da loro braccia 4. $\frac{2}{3}$. di Rascia, le quali valsero lire 31. $\frac{2}{3}$. & il braccio venne a valere 7. e perche il terzo compagno misse solamente 4. braccia di Rascia, e nella sua cappa n'andò braccia 4. $\frac{2}{3}$. tu bisogno che pagasse $\frac{2}{3}$. braccio di Rascia, che valse lire 3. $\frac{2}{3}$. le quali aggiunte a lire 31. $\frac{2}{3}$. fanno lire 35. le quali si denono diuidere in fra il primo, e secondo; L'onde perche il primo ne misse 8. braccia, e nella sua cappa n'andò braccia 4. $\frac{2}{3}$. conuenne, che li fusse pagato braccia 3. $\frac{2}{3}$. di Rascia la qual valse lire 24. $\frac{2}{3}$. e tante ne toccò al primo, e perche il secondo misse braccia 6. di Rascia, e nella sua cappa n'andò braccia 4. $\frac{2}{3}$. restò ad essere pagato di braccia 1. $\frac{2}{3}$. che valse lire 10. $\frac{2}{3}$. e tante ne toccò al secondo, & il terzo pagò $\frac{2}{3}$. braccio di Rascia, come di sopra s'è detto.

Quattro soldati vorrebbero comprar 4. caualli, de quali il primo vale due. 30. il secondo due. 36. il terzo due. 40. & il quarto due. 48. e nessun di loro ha tanti ducati, che possa comprare alcun di questi caualli, ma con i denari del secondo, del terzo, e del quarto, comprerebbono il cauallo di 30. ducati, e con i denari del terzo, del quarto, e del primo, comprerebbono il cauallo di 36. ducati, e con i denari del quarto, del primo, e del secondo, comprerebbono il cauallo di 40. ducati, e con i denari del secondo, del terzo, e del primo, comprerebbono il cauallo di 48. ducati, si domanda quanti ducati haueua ciascuno.

Fa così, somma insieme tutte quattro le valute de' caualli, cioè 30. 36. 40. 48. fanno 154. e questi parti per vn meno che non sono li soldati, cioè per 3. ne vien 51. $\frac{2}{3}$. e tanti ducati haueuano fra tutti quattro i soldati, e perche con i denari del secondo, terzo, e quarto, poteuan comprare il cauallo di 30. ducati, ne segue che il primo soldato hauesse la differenza che è da 20. a 51. $\frac{2}{3}$. cioè due. 21. $\frac{2}{3}$. e perche con i denari del terzo, quarto, e primo, poteuan comprare il cauallo di 36. ducati, ne segue che il secondo hauesse la differenza che è da 36. a 51. $\frac{2}{3}$. e perche con i denari del quarto, primo, e secondo, poteuan comprare il cauallo di 40. ducati, ne segue che il terzo hauesse la differenza che è da 40. a 51. $\frac{2}{3}$. cioè ducati 11. $\frac{2}{3}$. e perche con i denari del secondo, del primo, e del terzo poteuano comprare il cauallo di 48. ducati, ne segue che il quarto hauesse la differenza che è da 48. a 51. $\frac{2}{3}$. cioè due. 3. $\frac{2}{3}$. e così hauiamo trouato, che il primo haueua due. 21. $\frac{2}{3}$. il secondo due. 15. $\frac{2}{3}$. il terzo due. 11. $\frac{2}{3}$. & il quarto due. 3. $\frac{2}{3}$. sanne proua.

Vno volendo comprare da vn Vetraio tre tazze di cristallo, disse al padrone che effesse tu mi vuoi dare tre tazze a mia electione, io ti voglio dare della prima tazza la metà de' denari ch'io mi trouo, e $\frac{2}{3}$. giulio più, e della seconda tazza ti voglio dare il $\frac{1}{3}$. de' denari, che mi resta, e $\frac{2}{3}$. d'vn giulio più, e della terza tazza ti voglio dare il $\frac{1}{4}$. de' denari, che mi resta, e $\frac{2}{3}$. d'vn giulio più, e così fece, e dopo ch'ebbe

pagate

pagate le tazze nel sopradetto modo, trouò che gli era restato due giuli, si domanda quanti denari haueua in borsa, e quanto costò ciascuna tazza.

Arguirai così, che quando pagò l'ultima tazza diede al Vetraio $\frac{1}{2}$. d'un giulio e gli restò 2. giuli, adunque prima che desse $\frac{1}{2}$. d'un giulio haueua giuli $2\frac{1}{2}$. e questo si trouò doppo ch'hebbe dato il $\frac{1}{2}$. di ciò ch'haueua, perciò bisogna trouare vn numero, che trattone il $\frac{1}{2}$. resti $2\frac{1}{2}$. onde portemo, che questo numero fusse 4. cauane il $\frac{1}{2}$. resta 3. e noi voleuamo che restasse $2\frac{1}{2}$. per il che dirai così, se 2. di resto, vien da 4. ch'io m'apposi, da che verrà $2\frac{1}{2}$? opera, trouarai che verrà da 3. tanti, e tanti giuli gli restò, doppo ch'hebbe pagato la seconda tazza.

Hora sopra li detti 3. giuli aggiungiui $\frac{1}{2}$. d'un giulio, che diede di più per la seconda tazza, farà $3\frac{1}{2}$. dipoi ti conuien trouare vn numero, che trattone il $\frac{1}{2}$. di d. numero resti $3\frac{1}{2}$. poni che quel numero sia 3. cauane $\frac{1}{2}$. resta 2. e noi voleuamo che restasse $3\frac{1}{2}$. per il che dirai così, se 2. di resto vien da 3. ch'io m'apposi, da che verrà $3\frac{1}{2}$? opera, trouarai che verrà da 5. e tanti giuli gli rimase, doppo ch'hebbe pagata la prima tazza, & a questi 5. giuli aggiungiui $\frac{1}{2}$. giulio, che diede di più per la tazza, farà $5\frac{1}{2}$. hora ti conuien trouare vn numero, che trattone la metà resti $5\frac{1}{2}$. poni che quel numero sia 8. del qual cauane la metà resta 4. e noi voleuamo che restasse $5\frac{1}{2}$. onde dirai così, se 4. di resto vien da 8. ch'io m'apposi, da che verrà $5\frac{1}{2}$? opera, trouarai che verrà da 11. e tanti giuli diremo che hauesse prima che comprasse alcuna tazza, troua da te stesso quāto costò ciascuna, e trouarai che la prima li costò 6. giuli, la seconda 2. e la terza 1. fanno proua, e così farà.

E se la risoluerai per le due false positioni ti verrà benissimo, e cō minor fatica.

Vno ha compro 7. tazze di vetro, e 9. tazze di cristallo, nelle quali ha speso 50. grossi, e la tazza di cristallo costò 2. grossi più, che la tazza di vetro, si domanda quanto valse la tazza di ciascuna sorte. Fa così, multipl. 9. tazze di cristallo via 2. grossi, fa 18. et tanti grossi li costarono più le tazze di cristallo, che quelle di vetro, e questi 18. grossi cauati di 50. restano grossi 32. e questo rimanente è la valuta delle 7. tazze di vetro, e delle 9. di cristallo, cioè di 16. tazze in tutto, parti adunque 32. per 16. ne vien 2. e tanti grossi valse la tazza di vetro, e quella di cristallo si disse, che valeua 2. grossi più, adunque valse 4. grossi.

Vno ha compro vna quantita di tazze di cristallo, in questo modo cioè, le 3. tazze l'ha pagate 4. grossi, e n'ha comprate tante, che se riuendesse poi 4. tazze per 6. grossi, vi guadagnarebbe 18. grossi, si domanda quante ne comprò.

Fà così dicendo, se 3. tazze vagliono 4. grossi, che varranno 4. tazze? opera, trouarai che varranno grossi $4\frac{2}{3}$. e noi proponemmo, che le riuendesse 6. grossi, adunque sopra 4. tazze vi guadagnarebbe $\frac{2}{3}$. d'un grosso, perciò dirai così, se $\frac{2}{3}$. d'un grosso si guadagnarebbono sopra 4. tazze, da quante tazze peruerrebbe il guadagno di 18. grossi? multipl. 18. via 4. fa 72. e questo parti per $\frac{2}{3}$. ne vien 108. e tante tazze comprò.

Vno ha compro vna quantita di pere per 4. quattrini l'vna, dipoi riuède e ciascuna pera tanti denari, quante erano le pere, che comprò, e trouossi haueuer guadagnato sol. 35. si domanda quante pere comprò. Fà così, di sol. 35. che ha guadagnato fanno denari, che sono den. 420. dipoi farai denari di 4. quattrini, ch'è il costo d'vna pera, sono den. 16. e di questo prendi la metà, ch'è 8. qual multipl. in se, fa 64. e questo aggiungi cō 420. farà 484. del qual prendi la rad. ch'è 22. & a questo aggiungi l'altra metà de' sopradetti 16. den. farà 30. e tante pere conpro.

Ritrouandomi in Pisa in casa del Sig. Cau. Marcantonio Cecchi da Pescia, con interuento del Sig. Pier Francesco suo figliuolo, e trattandosi fra di noi delle qua-

tà continue proportionali, il d. Sig. Pier Francesco, mi disse, Forestano, perche io so, che hauete già tanti anni atteso alla professione d'Aritmetica, haurò caro, che mi cauiate vn dubbio, ch'io ho nella mente, e questo è, che trouandomi pochi giorni sono in Fiera per mio spasso, viddi vn Gentilhuomo, che voleua comprare vn'anello da tn'Orfice, e l'Orfice ne domandò 60. scudi, & il Gentilhuomo gli offerse 40. scudi, doue che sopra questo caso eleffero vna persona terza, che giudicasse qual fusse il giusto prezzo.

Laonde da quel tale fu data la sentenza del Villano, cioè date in quel mezzo, la qual cosa a me non piacque, anzi che io pensaua che douesse trouare vn prezzo proportionale fra 40. e 60. che per non hauer'io cognitione delle multiplicationi, e partitioni, che s'vsano nell'Abbaco tacqui, senza metterci parola, e perciò hauerò caro, che mi diciate qual'è il numero proportionale fra 40. e 60.

A che risposi, che in due modi si può intendere il mezzo proportionale fra questi due estremi, cioè Aritmeticamente, e Geometricamente.

Se vogliamo intendere Aritmeticamente, il mezzo proportionale fra 40. e 60. sarà 50. si come giudicò il sopradetto eletto dalle parti; ma se vogliamo intendere Geometricamente il mezzo proportionale sarà la radice quadra del prodotto d'un estremo nell'altro, cioè 40. via 60. fa 2400. la cui radice è 49. e tanto sarebbe il numero proportionale fra questi due estremi, se bene alcuni, i nomi de' quali non mi si ricorda, ho visto ch'hanno offeruato diuerso modo, il quale è questo cioè, trarre 40. di 60. resta 20. e moltiplica 20. via 40. fa 800. dipoi aggiungere insieme 40. con 60. fanno 100. e partire 800. per cento ne vien 8. e questo aggiungerà a 40. fa 48. e questo direbbono, che fusse il giusto prezzo, ma io non so d'onde tal regola, e modo d'operare s'habbino tratto; ma so ben questo, che Fra Luca, e molti altri Autori, e principalmente il Megaresi nella 16. del sesto, dice così.

Quando saranno 3. quantità continue proportionali, e la prima, e terza sia nota, e vorrai trouare la seconda, prendi la radice del prodotto della prima nella terza, e quella sarà la seconda quantità. E con ciò restarono tutti sodisfatti.

Fauola di Francesco Galigai,

DVe vanno per vna via, e trouano vn'ampolla di Balsamo, la qual tiene 8. once, delle quali a ciascun di loro tocca 4. once, e per diuidere d. Balsamo in altri vasi, o strumenti da pesare, che due ampolle vota, che l'vna quando è piena tien 5. once, e l'altra tiene 3. once, si domanda in che modo diuiseranno il detto Balsamo, acciò che nessuno sia ingannato.

Prima empì l'ampolla di 3. once, e subito votala dentro all'ampolla di 5. once, poi riempi l'ampolla di 3. once di quello dell'ampolla di 8. once, & haueraì nell'ampolla di 8. once, 2. once, e nell'ampolla di 5. once ne sarà 3. once, e l'ampolla di 3. once sarà piena, poi vota quella di 3. once sopra quella di 5. tanto che sia piena, & in quella di 3. once ne restarà vn'oncia, poi vota l'ampolla di 5. once sopra quella d'8. once, doue n'erano restate due once. & haueraì nell'ampolla di otto once, 7. once, e nell'ampolla di 3. once ve ne sarà 1. oncia, e quella di 5. once sarà vota, poi vota il balsamo, ch'è nell'ampolla di 3. once, il qual'è vn'oncia, dentro all'ampolla di 5. once, & haueraì in quella di 5. once 1. oncia, & in quella d'8. once 7. once, e quella di 3. once sarà vota, poi empì l'ampolla

polla di 3. once di quello dell'ampolla d'8. once, & hauerai che nell'ampolla di 8. once vi resterà 4. once, il qual toccherà a vn di loro, e l'altro voterà quel ch'è nell'ampolla di 3. once sopra quello, ch'è nell'ampolla di 5. once, e sarà poi nell'ampolla di 5. once 4. once, qual toccherà all'altro.

Vogliamo dimostrare la diuisione del detto Balsamo con maggiore breuità, che non ha fatto il Galigai; Prima empi l'ampolla di 3. once, e voterò sopra l'ampolla di 5. once, torna poi di nuouo a riempire l'ampolla di 3. once, e voterò sopra quella di 5. once, & hauerai piena l'ampolla di 5. once, & in quella di 3. once sarà vn'oncia, vota l'ampolla di 5. once sopra quella d'8. once, e quell'oncia, ch'è nell'ampolla di 3. vota sopra quella di 5. & hauerai l'ampolla di 3. once vota, e l'ampolla di 5. once hauerà vn'oncia, e quella d'8. n'hauerà 7. dipoi empi l'ampolla di 3. once, hauerai, che in quella d'8. ne resterà 4. e così sarà di uolo.

Ragione appostata.

Tre pouere donne Contadine portorno a vendere dell'vuoue, e la prima haueua 57. vuoua, e l'altra n'hauuea 37. e l'altra n'hauuea 17. e quella che n'hauuea 57. beffando quella che n'hauuea 17. gli disse tu toccherai tanti pochi quattrini, che t'era meglio non venire al mercato, & essa rispose, che voleua vendere le sua vuoua il medesimo prezzo che essa venderebbe le sue 57. e che voleua toccare tanti quattrini quanto lei, e così disse ancora quella che n'hauuea 37. si domanda in che modo doueranno vendere le sopradette vuoua, accioche tocchino tanti quattrini l'vna, quanto l'altra.

Vna simil propositione descriue sinulmente Francesco Galigai, e dice non esserui regola alcuna a soluerla, ma che solo si mette per passatempo di scolari, e per ragionamento intorno al fuoco l'inuerno quando rincresce. La sua proposta è di 10. di 30. e di 50. Arancie, i quali li fa vendere la prima volta a 7. al quattrino & il residuo gli fa vendere 3. quattrini l'vno, e ciascuno de' venditori tocca 10. quattrini, e noi hauiamo posti numeri differenti, cioè 17. 37. e 57. e se farino che la prima volta le sopradette donne diano 7. vuoua al quattrino, la prima toccherà 8. quattrini, & auanzerà vn'vuouo, e la seconda toccherà 5. quattrini, e gl'auanzerà 2. vuoua, e la terza toccherà due quattrini, e gl'auanzerà 3. vuoua, dipoi se venderanno questi residui tre quattrini l'vuouo, la prima toccherà tre quattrini d'vn vuouo che gli rimase, & 8. quattrini haueua presi prima, che in tutto saranno 11. quattrini, e la scōda se venderà 6. quattrini le 2. vuoua che gli restarono, toccherà ancor lei 11. quattrini, e se la terza venderà 9. quattrini le 3. vuoua che gli rimasero, ancor lei toccherà 11. quattrini, e così ciascuna di loro hauerà venduto l'vuoua vn medesimo prezzo, e tanti quattrini n'hauerà ritratto l'vna, quanto l'altra.

E se porremo che vna Donna habbi 8. vuoua, vn'altra 22. vn'altra 36. & vn'altra 50. e vendendole la prima volta a 5. al quattrino, & il residuo 3. quattrini l'vno, medesimamente ciascuno di loro toccherà 10. quattrini.

Ancorche puoi dir che fussero due Dōne, e che vna di loro hauesse 50. vuoua, e l'altra 10. e che le vendessero vn medesimo prezzo l'vna, che l'altra, e che quella che n'hauuea 10. pigliasse il doppio denari di quella che n'hauuea 50. si domanda in che modo venderanno le dette vuoua.

Poni che la prima volta ciascuna di loro ne desse 7. al quattrino, per il che ne segue, che quella che n'hauea 50. toccherà 7. quattrini, e gli auanzerà vn' vuouo, e quella che n'ha 10. toccherà vn quattrino, e gli auanzerà 3. vuoua, le quali venderà poi 13. quattrini l'vno, che faranno 39. quattrini, & vn quattrino haueua, preso prima, faranno 40. quattrini, e la prima venderà 12. quattrini vn' vuouo, che gli restò, e 7. quattrini haueua presi prima, faranno 20. quattrini, e così hauiamo trouato che quella che haueua 10. vuoua, toccò il doppio denari di quella che n'haueua 50. e le venderono vn medesimo prezzo.

Ancora puoi dire che fussero due donne, e che vna di loro hauesse 50. vuoua, e l'altra n'hauesse 11. e che vendessero vn medesimo prezzo, e che quella che n'haueua 11. toccasse 3. tanti denari di quella che n'haueua 50. Poni che quella di 50. ne desse 7. al quattrino, e così quella che n'haueua 11. & il residuo di ciascuna si vendesse 20. quattrini l'vuouo, trouerai, che quella che n'haueua 11. piglia 81. quattrini, e quella di 50. ne piglierà 27. e così hauiamo trouato, che quella che n'haueua 11. toccò 3. tanti denari di quella che n'haueua 50.

Ancora puoi dire che fussero due donne, e che vna di loro hauesse 50. vuoua, e l'altra n'hauesse 13. e quella di 13. toccasse 5. tanti denari di quella che n'haueua 50. Poni che la prima volta ne desse 7. al quattrino, e quelle che gli restorno, le vendino 34. quattrini l'vno, & haurai che quella di 50. toccherà 41. quattrini, e quella di 13. ne toccherà 205. che sono 5. tanti dell'altra.

Ancora puoi dire che fussero 4. donne, & vna hauesse 8. vuoua, l'altra 22. l'altra 36. e l'altra 50. e le vendessero vn medesimo prezzo, e che quella che n'hauesse 8. toccasse quattro tanti denari di quella che n'hauea 50. e due tanti di quella che n'haueua 36. e 10. quattrini più di quella, che n'haueua 22. Poni che la prima volta ne diano 5. al quattrino, e quelle che gli restorno le vendino 13. quattrini l'vno, & hauerai la solutione della propolla, e c'è da te stesso ne puoi formare quante ti piace, senza che più oltre ti offendiamo a dimostrarle.

Vna donna haueua vn panier d'vuoua, le quali voleua vendere, e da vno che le voleua comprare, gli fu domandato quante vuoua haueua, & ella disse nol sapere, ma quando le contaua a 2. a 2. n'auanzaua 1. & a 3. a 3. n'auanzaua 1. & a 4. a 4. n'auanzaua 1. & a 5. a 5. n'auanzaua 1. & a 6. a 6. n'auanzaua 1. & a 7. a 7. non n'auanza nessuno, si domanda quante vuoua haueua. Fa così moltiplica 6. via 7. fa 42. & a questo aggiungi 1. fa 43. e questo moltiplica via 7. fa 301. e tante vuoua dirai che hauesse nel panier.

E se hauesse detto che contandole a 2. a 2. n'auanzasse 1. & a 3. a 3. n'auanzasse 2. & a 4. a 4. n'auanzasse 3. & a 5. a 5. n'auanzasse 4. & a 6. a 6. n'auanzasse 5. & a 7. a 7. non n'auanzasse nessuno. Faresti così, troua vn numero che partito per 2. per 3. per 4. per 5. e per 6. non auanzi cosa alcuna, il qual numero sarà 60. del qual cauane 1. resta 59. hora deui sapere se 59. partendolo per 7. auanza alcuna cosa, o no, e trouato che auanza 3. e non doueua auanzare cosa alcuna, perciò dirai il numero 59. non esser quel che si cerca; ma a detto 59. aggiungi 60. che è il num. che di sopra trouasti, faranno 119. e tante vuoua dirai ch'hauesse nel panier.

E dicendo, vno si troua tanti ducati, che contandolia a 2. a 2. n'auanza 1. & a 3. a 3. n'auanza 2. & a 4. a 4. n'auanza 3. & a 5. a 5. n'auanza 4. & a 6. a 6. n'auanza 5. & a 7. a 7. n'auanza 6. & a 8. a 8. n'auanza 7. & a 9. a 9. n'auanza 8. & a 10. a 10. n'auanza 9. & a 11. a 11. non n'auanza nessuno, si domanda quanti ducati hauea.

Fà così, troua vn numero, che partito per tutti i numeri da 2. per fino in 9. non auanzi cosa nessuna, e questo lo trouerai moltiplicando i detti numeri l'vno

via l'altro, cioè 2. via 3. fa 6. e questo vi 14. fa 24. e questo via 5. fa 120. e questo via 6. fa 720. e l'ultimo prodotto trouarai che sarà 362880. del qual cauane 1. resta 362879. e tanti ducati dirai, che hauesse.

¶ E dicendo vno si troua tanti ducati, che contrandoli a 3. a 3. non n'auanza nessuno, & a 5. a 5. non n'auanza, & a 7. a 7. non n'auanza, & a 9. a 9. non n'auanza, & a 11. a 11. n'auanza 10. si domanda quanti ducati haueua.

Fà così, troua vn numero, che partito per 3. per 5. e per 9. non auanzi cos'alcuna, opera nel modo sopradetto, trouarai, che il detto numero sarà 945. e tanti ducati dirai ch'hauesse, e così da te stesso potrai formare molte altre propositioni simili, ma auerti, che non ci trouarai regola ferma, ma più presto a ratton, perciò che mutando modo nel contare, e negli auanzi, bisogna mutar modo d'operare, si come habbiamo fatto nelle sopradette &c.

¶ Se vno pensasse vn numero, et uolessi sapere quello che ha pensato, dirai che sempre lo multiplichi via 3. & il prodotto lo parta per 2. e se auanza rotto, digli che lo lasci andare, e quel che gli viene a parir. et adirai che lo multiplichi via 3. & il prodotto lo parta per 2. e se auanza rotto, digli che lo lasci andare; doue tu cautamente deu' confidare, se in tutte due le volte che facesti partit per 2. gli auanz. rotto. et in tutte due gli vien rotto, tieni a mente 1. per 2. rotto, e se la prima volta, e non la seconda gli vien rotto, tieni a mente 3. e se la seconda volta, e non la prima gli vien rotto, tieni a mente 2. dipoi deu' saper da lui quante volte il 9. entra in quell'ultimo auuenimento, cioè in quel che gli viene la seconda volta quando parte per 2. e per ogni volta che v'entra 9. tieni a mente 4. quali aggiungi a quel numero che tenesti a mente de' rotti, e verratti quel num. che colui si pensò.

¶ Hor poni che pensassi 9. dirai che lo multiplichi via 3. fa 27. il qual parta per 2. ne vien $13\frac{1}{2}$. dirai che lasci andare quel $\frac{1}{2}$. resta 13. il qual multiplichi via 3. fa 39. e questo lo parta per 2. ne viene $19\frac{1}{2}$. dirai che lasci andare quel $\frac{1}{2}$. e perché in tutte due le volte è auanzato rotto, terrai a mente 1. dipoi deu' vedere quante volte il 9. entra in 19. che è l'ultimo auuenimento, tu vedi che v'entra 2. volte, e quel che auanza dirai che lasci andare, e come s'è detto per ogni 9. che v'entra, tieni a mente 4. adunque per 2. noue, terrai a mente 8. al qual aggiungi quell'1. che tenesti a mente de' rotti, sarà 9. apunto per il numero, che si pensò.

E se per vn'altra regola vuoi ritrouare ogni numero che il compagno pensasse, come per esempio, poni che pensi 9. dirai che lo multiplichi via 2. fa 18. aggiungeli 5. fa 23. multipl. via 5. fa 115. aggiungeli 10. fa 125. multiplichi via 10. fa 1250. e di questo dirai che ne caui 350. resta 900. il qual resto dirai che ti manifesti, e sappi che per ogni centinaio s'ha a pigliar 1. adunque 900. sono 9. centinaia, il qual 9. rappresenta quel numero, che quel compagno pensò. E per vn' altro modo ancora si potrebbe sapere quel che vn pensasse, ma vogliamo, che ti contenti di questi per non esser tediousi.

¶ E se l'amico pensassi $\frac{1}{2}$. dirai che lo raddoppi, fa $1\frac{1}{2}$. & a questo aggiunga 5. fa $6\frac{1}{2}$. e questo multiplichi via 5. fa $32\frac{1}{2}$. & a questo aggiungani 10. fa $42\frac{1}{2}$. e questo multiplichi via 10. fa 425. ed i questo ne caui 350. resta 75. e sempre quel che resta bisogna che ti si manifesti, il qual resto tu cautamente lo deu' partir per 100. parti adunque 75. per 100. ne vien $\frac{3}{4}$. apunto per il numero che l'amico pensò.

¶ Ancora poni, che vno pensasse $8\frac{1}{2}$. di che lo raddoppi fa $17\frac{1}{2}$. aggiungani 5. fa $22\frac{1}{2}$. multipl. via 5. fa $112\frac{1}{2}$. aggiungeli 10. fa 122 $\frac{1}{2}$. multipl. via 10. fa 1225. del qual cauane 350. resta 875. e questo bisogna che ti manifesti, il qual tu cautamente parti per 100. ne viene $8\frac{1}{2}$. e questo è il numero pensato.

12
13
3615
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Se vno gettasse sopra vna tauola 3. dadi, e tu volessi sapere quanti punti scuopre come per esemplo, poni che scuopra 6. 5. 4. dirai che raddoppi il maggior punto cioè 6. fa 12. aggiungi 5. fa 17. multipl. via 5. fa 85. & a questo aggiungi i punti del secondo dado, cioè 5. fa 90. & a questo aggiungi 10. fa 100. e questo multipl. via 10. fa 1000. & a questo aggiungi i punti del terzo dado, cioè 4. farà 1004. del qual cauane 350. resta 654. e perche le centinaia sono 6. dirai che li più del primo dado furon 6. e perche le decine son 5. dirai che i punti del secondo dado furon 5. e perche il numero che resta è 4. dirai che i punti del terzo dado furon 4.

E volendo appresso alcuni grossolani dimostrare di far miracoli, col ritrouare alcuni numeri, cioè inuestigar quanti denari resterà in borsa a vna persona, dopo alcune spese artificiosamente fatte. come per esemplo dicèdo a vn'amico che pensi vn numero, ouero vna quantità di denari qual più gli piace, & egli risponda, io l'ho pensato, e tu gli dirai che gli raddoppi, & egli dica io gli ho raddoppiati, etu gli dirai che ne aggiunga 30. o qual numero più ti piace, & egli dica, io ve l'ho aggiunti, dipoi dirai che ne spenda la metà, & egli dirà io gli ho spesi, dipoi dirai che ne spenda tanti quanti fu il primo numero, ouero quantità che pensò, & egli dirà io gli ho spesi, doua tu subbitamente dirai che gli farà restato in borsa 15. cioè la metà di quel numero manifestò, che gli facesti aggiungere. Hor sia che l'amico pensasse, ouero hauesse in borsa 18. ducati, dirai che gli raddoppi, fanno 36. & a questo dirai che aggiunga 30. farà 66. e di questi dirai che ne spenda la metà, restaranno 33. dipoi dirai che ne spenda tanti quanti fu il numero che pensò, il qual fu 18. gli resterà 15. apunto; perciò che gli resterà sempre la metà di quel numero manifestò, che gli farai aggiungere.

Ancora dimostreremo, come per arte di numeri si può trouare vn'anello ascoso fra vna quantità di persone, e trouare chi l'ha, in qual dito della mano, & in qual modo. Prima accomodarai i detti huomini in fila, o a cerchio, e da vno de' capi si principio, il qual capo a te deu' esser noto: poniamo che il capo di d. fila sia da man destra, e contando da d. capo verso man sinistra l'habbia il settimo huomo nel quarto dito della man sinistra, cioè quello che è vicino al mignolo, qual vi è ad esser il nono dito, cominciando a contar le dita dal dito mignolo della man destra, e dire 1. (tenendo le palme delle mani volte verso terra) e contar per ordine fino al dito, dou'è l'anello. Hauendo notati questi auuertimenti, cometti a vno di essi, che tacitamente numeri da vno de' capi, per fino a quello, che ha l'anello, il quale habbiamo posto che sia il settimo huomo, e dirai che raddoppi quel numero, fa 14. sopra il quale digli che ponga 5. fa 19. e questo multipl. via 5. fa 95. e sopra questo ponga 10. fa 105. e sopra questo dirai che ponga il numero delle dita, numerandole con l'ordine sopradetto, che habbiamo detto esser il 9. dito, il qual 9. pongalo sopra 105. fa 114. e questo multipl. via 10. fa 1140. e sopra questo ponga il numero de' nodi del dito, che pongo per caso sia nel secondo, onde posto 2. sopra 1140. farà 1142. e di questo dirai, ne caui 350. resta 792. e perche le centinaia son 7. dirai che l'anello l'habbia il settimo huomo, e perche le decine sò 9. dirai che l'ha nel 9. dito, e per num. resta 2. dirai che l'ha nel secondo nodo.

Ancora se tu ponessi 40. ducati, o quattrini sopra vna tauola, e due huomini li togliessi ro a refuso, per saper quanti ne togliessi ciascuno.

Fà così, poni che vn di loro ne togliessi 12. e l'altro 28. volgiti a vn di loro, e dirai, che i denari, quali ha tolti, che li multiplichi via 2. che pongo per caso che ti venga detto a quello, che n'ha tolti 12. che tacitamente multiplicato nel cnor suo, terrà 24. & all'altro dirai, che quelli, che tolse li multiplichi via 40. cioè.

cioè sempre via il numero de' denari, che diuidono, che tacitamente multiplicato 28. via 40. fa 1120. & hora dirai, che manifestino l'vno all'altro il numero della lor multiplicatione, e che li sommino insieme, cioè 24. e 1120. fanno 1144. e tu intanto cautamente multipl. il numero de' denari diuisi per vn più, che in questa ti conuerrà multiplicare 40. via 41. fanno 1640. e dirai a loro, che il congiunto delle lor multiplicationi, cioè 1144. lo cauino di 1640. resta 496. il qual con arte inuestigato, lo partirai sempre per vn meno de' denari diuisi, cioè per 39. ne viē 12. & auanza 28. e per il 12. che ne viene dirai sempre, che gli habbia quello a chi tu facesti multiplicare via 2. e l'auanzo, ch'è 28. dirai che l'habbia quello, a chi tu facesti multiplicare via 40. ma nota, che questa regola non serue, quando vn di loro pigliasse 1. e l'altro il resto.

E se fussero 3. ouero 4. persone, che hauessero tolto vna quantità di denari, e tu volessi sapere quanti n'hauesse tolti ciascuno, ti puoi seruire di quella regola da ritrouare vn numero pensato, dicendo a ciascuno, che multiplichi i denari, che ha tolti via 3. & i prodotti li partino per 2. domandandoli se auanza rotti, e notare a chi auanza, & a chi non auanza, e farli gettar via i detti auanzi, dipoi far multiplicare via 3. quel numero, che ne venne a ciascuno quando partirono per 2. & i nouoi prodotti farli partir per 2. e notare a chi di loro auanza, e farli gettar via gli auanzi, e poi domandare a ciascuno separatamente quante volte 5. entra in quell'ultimo loro auuenimento, e per ogni 9. tieni a mente 4. al qual deui aggiungere quel numero, che douei tenere a mente per conto de' rotti, ouero auanzi, e con quest'ordine trouarai quanti denari togliessè ciascuno.

Per altro modo ancora potrai trouare quanti denari tolga ciascuno, come per effempio, se fussero 3. et gliessero 30. grossi.

Poni che il primo ne togliessè 7. digli che lo raddoppi fa 14. & il secondo poni che togliessè 9. digli che lo multiplichi via 29. ci. è per vn meno de' denari diuisi farà 261. & il terzo poni, che togliessè il resto, cioè 14. digli che lo multiplichi via 30. cioè per il numero de' denari diuisi; doue multiplicato 14. via 30. fa 420. hora dirai loro, che accozzino le dette tre multiplicationi insieme, cioè 14. 261. 420. fanno 695. e tu intanto multiplica 30. in se, cioè il numero de' denari diuisi fanno 900. e di questi dirai, che ne cauino il congiunto delle loro multiplicationi, cioè 695. che resta 205. il qual resto a te deu' esser manifestato da loro, dipoi parti questo resto, cioè 205. per 28. cioè per 2. meno de' denari diuisi, ne vien 7. & auanza 9. per il che dirai che 7. togliessè quello a chi facesti raddoppiare i suoi denari, e 9. tolse quello a chi facesti multiplicare via 29. & il resto, cioè 14. tolse il terzo, e così farai sempre.

Con la medesima regola si possono trouare 3. cose occulte, cioè se fussero 3. & vn di loro hauesse vn ducato, e l'altro vn giulio, e l'altro vn quattrino, e volendo sapere qual di loro ha il ducato, il giulio, & il quattrino terrai questo modo.

Mettili per ordine, e dirai a vn di loro, che cominci a cõtare da vn de' capi per fino a quello, che ha il ducato, che pongo sia il secondo, e quel numero digli che lo raddoppi, cioè 2. fa 4. al quale aggiunga 5. fa 9. e questo multiplichi via 5. fa 45. e sopra questo ponga 10. fa 55. dipoi digli che numeri nel medesimo modo per fino a quello che ha il giulio, che pongo sia il terzo, e questo numero 3. digli che lo ponga sopra la somma che haueua, cioè 55. fa 58. e questo multipl. via 10. fa 580. dipoi dirai che numeri nell'istesso modo per fin a quello, che ha il quattrino e che sarà il primo cioè 1. e questo ponga sopra 580. farà 581. e di questo dirai che caui 350. resta 231. e perche le centinaia son 2. dirai che il secondo ha il ducato,

e perche le decine son 3. dirai che il terzo ha il giulio, e perche il numero che resta è 1. dirai che il primo ha il quattrino. Con altri modi potresti ritrouare le dette cose, come da te istesso potrai facilmente inuestigare.

Vno si troua 90. grossi, e vuol comprare 90. uccelli di tre sorti, cioè sagiani a 5. grossi l'vno, e pernici a 3. grossi l'vna, e tordi a $2\frac{1}{2}$. d'vn grosso l'vno, si domanda quanti ne comprerà di ciascuna sorte. Fa così, poni che compri tanti tordi, quanti grossi si troua, perciòche bisogna cominciare dagli uccelli di minor prezzo; e perche si troua 90. grossi, noni che compri 90. tordi, che a vn terzo d'vn grosso l'vno, gli costatanno 30. grossi, i quali tratti di 90. restanno grossi 60. dipoi caua il prezzo del tordo dal prezzo del sagiano, e della pernice, cioè caua $\frac{1}{3}$. d'vn grosso di 5. grossi, resta $4\frac{2}{3}$. dipoi caua $\frac{1}{3}$. d'vn grosso di 3. grossi resta $2\frac{1}{3}$. hor bisogna far di 60. grossi due parti, che vna partita per $4\frac{2}{3}$. e l'altra per $2\frac{1}{3}$. a nessuna di dette parti auanzi rottila qual cosa volendo fare trouuaua (per fuggir l'intrigo de' rottili) recare le parti a rottili d'vna medesima specie, cioè ridurre ogni cosa a terzi, haurai 14. terzi, 8. terzi, e 180. terzi, e di questo 180. ne farai due parti, che vna partita per 8. e l'altra per 14. non auanzi cosa alcuna, e volendo trouar le dette parti, farai così, caua 8. di 180. resta 172. il qual se tu partirai per 14. trouarai che auanza 4. e noi non uoluamo che auanzasse cosa alcuna, adunque per la seconda parte il 172. non è buono; dipoi caua 8. di 172. resta 164. il qual partito per 14. auanza 10. & anco 164. dirai che non sia buono, dipoi caua 8. di 164. resta 156. il qual partito per 14. auanza 2. ne anco 156. dirai che sia buono, dipoi caua 8. di 156. resta 148. il qual partendolo per 14. ancora auanza, dipoi caua 8. di 148. resta 140. che partito per 14. ne vien 10. e non auanza cosa alcuna, e così dirai che vna parte sia 140. e l'altra 40. che partito la prima per 14. ne vien 10. e non auanza, e l'altra partita per 8. ne vien 5. e non auanza, e così dirai che comprasse 10. sagiani, 5. pernici, e 75. tordi, fanno pro-ua, e lo vedrai; ma nota, che se per caso tal diuisione non si potesse fare; che non auanzasse rottili, dicessi che tal proposta non si potrebbe soluere, perciòche verrebbe uccelli spezzati.

Vno si troua lire 50. e vuol comprare staia 50. di robba, cioè grano a lir. 2. lo staio, e vecce a lir. $1\frac{1}{2}$. lo staio, e panico a sol. 12. lo staio, si domanda quante staia torrà di ciascuna sorte. Fa così, comincia sempre dal minor prezzo, poni che compri staia 50. di panico, il quale a sol. 12. lo staio varrebbe lir. 50. le quali cauerei di lir. 50. restano lir. 20. e queste salua, dipoi caua sempre il minor prezzo, cioè sol. 12. degli altri prezzi, caua adunque sol. 12. di lir. 2. resta lir. 1. 8. dipoi caua sol. 12. di lir. 1. 10. resta sol. 18. Hora ti conuien far due tal parti di lir. 20. che saluasti, che vna di esse partita per sol. 28. e l'altra per sol. 18. non auanzi cosa alcuna, riduci le dette lir. 20. a sol. sono sol. 400. e di questi ne farai due parti, come habbiamo detto di sopra, opera trouarai che vna parte sarà 112. la qual partita per 28. ne vien 4. apunto, e tante staia di grano diremo che comprerà, l'altra parte trouarai che sarà 288. la qual partita per 18. ne vien 16. apunto, e tante staia di vecce diremo che comprerà. Resta hora a trouare il panico; somma insieme staia 16. di vecce, con staia 4. di grano; fanno staia 20. le quali tratte di 50. restano 30. e tante staia di panico comprerà. Fanne pro-ua, valutando staia 4. di grano a lir. 2. lo staio, montano lir. 8. e le staia 16. di vecce a lir. 1. 10. lo staio montano lir. 24. e le staia 30. di panico, a sol. 12. lo staio, montano lir. 36. che sommate insieme tutte 3. queste valute fanno lir. 50. & haurai 50. staia di robba.

Vno si troua sol. 60. e vuol comprar 60. uccelli di tre sorti, cioè 20. re, lodole e tordi, e troua che si dà 3. passere per vn soldo, e la lodola si vende 3. soldi, & il tordo 4. sol. si domanda quanti ne douerà comprare per sorte.

Fa

Fà così, poni che compri 61. passere, cioè vccelli della minor valuta, le quali costarebbono al suo prezzo sol. 20. $\frac{1}{2}$. li quali tratti di 60. restano sol. 39. $\frac{1}{2}$. fatto questo caua il costo della passera, dal costo della lodola, e del tordo, e perche la passera costa $\frac{1}{2}$. d'un soldo, perciò caua $\frac{1}{2}$. di sol. 3. e di soldi 4. resta soldi 27. e sol. 3. $\frac{1}{2}$. hora reca tutte queste parti a vna medesima natura, cioè riduci ogni cosa a terzi, haurai 8. terzi, 11. terzi, e 119. terzi, e di questi 119. ne farai due parti, che partito vna per 8. e l'altra per 11. non auanzi cos'alcuna. Offerui il mudo della sopradetta, trouarai che vna di dette parti sarà 55. e l'altra 64. che partito la prima per 11. ne vien 5. e tanti tordi comprò, e partito l'altra per 8. ne vien 8. e tante lodole comprò, & il resto per fino in 61. che v'è 48. comprò tante passere, adunque dirai, che comprasse 48. passere, 8. lodole, e 5. tordi, che in tutto sono 61. vccelli, e soldi 60. come facendone proua potrai vedere.

E dicendo, vno si troua 20. quattrini, e vuol comprar 20. vccelli, cioè tordi, lodole, e passere, delle passere se ne dà 2. al quattrino, e la lodola vale 2. quattrini, & il tordo vale 3. quattrini, si domanda quanti vccelli còprerà di ciascuna sorte, opera come nelle soprad. trouarai, che comprerà vn tordo, 5. lodole, e 14. passere.

Vno si troua 100. soldi, e vuol còprare 100. vccelli di 4. sorti, cioè passere, che se ne dà 2. al soldo, e lodole che se ne dà 7. al soldo, e storni che si vedono vn soldo l'vno, e tordi che si vendono 3. sol. l'vno, e spese 100. soldi, e comprò 100. vccelli, si domada quanti ne comprò di ciascuna sorte. Opera come nelle sopradette, cominciando da quelli vccelli di manco prezzo. Poni che compri 100. lodole, che in tutto costano sol. 14. $\frac{1}{2}$. quali caua di sol. 100. restano sol. 85. $\frac{1}{2}$. hora caua la valuta d'vna lodola, che è $\frac{1}{2}$. d'un soldo, della valuta d'vna passera che è $\frac{1}{2}$. soldo, resta 7. $\frac{1}{2}$. d'un soldo, dipoi caua la valuta della lodola, cioè $\frac{1}{2}$. di soldo della valuta dello storno, resta $\frac{1}{2}$. di soldo, dipoi caua la valuta della lodola, che è $\frac{1}{2}$. di soldo dalla valuta del tordo, cioè di 3. soldi, restano sol. 2. $\frac{1}{2}$.

Hora hai a tor via tutti questi rottii, recando ciascun rottio a numero di quella natura che è la maggior denominatione di essi rottii, e perche il maggior denominatore che sia fra tutti i detti rottii è 14. perciò reca a quattordicesimi tutti quei numeri sopradetti, cioè 85. $\frac{1}{2}$. che sono 1200. quattordicesimi, e per la passera hauerai 5. quattordicesimi, e per lo storno 12. quattordicesimi, e per il tordo 30. quattordicesimi, hora tu hai a diuidere 1200. in tre parti che la prima diuisa per l'altra per 12. e l'altra per 30. niente auanzi in dette partiuioni, opera nei soprad. modi, trouarai che còprerà 4. passere, 63. lodole, 5. storni, e 28. tordi, fanne proua.

Vn Gentiluomo diede vna quantità di denari ad vn suo Factore, e gli comessè che comprasse vna quantità di pernici, e che spendesse il $\frac{1}{2}$. & il $\frac{1}{2}$. meno 10. dei denari che gli hauea dati. Il Factore obbedì, e doppo che hebbe còpro le pernici trouò, che gli era rimaso lire 5. $\frac{1}{2}$. si domanda quante lire gli diede il Padrone.

Chiara cosa è, che se il Factore spendeu a interamente il $\frac{1}{2}$. & il $\frac{1}{2}$. de' denari che gli diede il Padrone, gli restaua lir. 10. meno, che non gli restò, ma perche gli conuenne spende lir. 10. meno delle soprad. parti, perciò restò lir. 10. piu di quelle che gli facebbono restate, si che bisogna cauar lir. 10. di lir. 5. $\frac{1}{2}$. restano lir. 41. $\frac{1}{2}$.

Hora ci conuen trouare vn numero, che traione il $\frac{1}{2}$. & il $\frac{1}{2}$. di 41. $\frac{1}{2}$. il qual lo troueremo in questo modo; poniamo caso che il Padrone gli hauesse dato 30. pigliane il $\frac{1}{2}$. che è 6. & il $\frac{1}{2}$. che è 5. e somma insieme 6. e 5. fanno 11. il qual cauerai di 30. resta 19. e poi volenamo che restasse 41. $\frac{1}{2}$. e perciò dirai cosi, se 19. ci resta da 30. che ci apponemo, da che numero ci resterà 41. $\frac{1}{2}$. multipli. 41. $\frac{1}{2}$. via 30. & il prodotto partirai per 19. ne verrà 65. e tante lire diremo, che il Padrone des: al suo Factore. Fanne proua.

Vno.

Vno si troua lire 800. delle quali vuol comprare due forte di panni, cioè saia, e rascia, e troua che la canna della saia vale lire 10. e la rascia vale lire $7\frac{1}{2}$. il braccio, e vuol per ogni 3. braccia di rascia, vna canna di saia, si domanda quante braccia di rascia, e quante canne di saia comprerà.

Fa così, poni che compri vna canna di saia, la qual costa lire 10. e poni ancora che compri 3. braccia di rascia, la qual costa lire $22\frac{1}{2}$. dipoi somma insieme lire $32\frac{1}{2}$. con lire 10. fanno lire $42\frac{1}{2}$.



Hora dirai così, se con lire $42\frac{1}{2}$. si cōpra vna canna di saia, e per ogni canna di saia si compra ancora braccia 3. di rascia, quante se ne comprerà con lire 800? moltiplica 800. via 1. fa 800. il qual parti per $42\frac{1}{2}$. ne viene $24\frac{1}{4}$. e tante canne di saia comprerà. Ma perche vuol per ogni canna di saia braccia 3. di rascia. multipl. $24\frac{1}{4}$. via 3. farà $73\frac{1}{4}$. e tante braccia di rascia dirai che comprerà.

Vno compra 12. braccia di tela per vna quantità di soldi il braccio, e riuenendola tutta lire 10. e troua che vi guadagna sol. 2. per braccio, si domanda quanto gli costò il braccio. E cosa manifesta, che guadagnando sol. 2. per braccio, in 12. braccia si guadagnerà soldi 24. i quali tratti di lire 10. restano lire 8. 16. e tanto li costarono 12. braccia, parti adunque lire 8. 16. per 12. ne viene soldi 14. den. 8. e tanto li costò il braccio. Ma volendola soluere per la regola del primo apponere fa così, poni che li costasse il braccio soldi 13. e lui lo riuende soldi 2. più, adunque verrebbe a riuenere il braccio soldi 15. di maniera che tutta la tela la venderebbe lire 9. e noi hauiamo detto che la riuende lire 10. e perciò diremo così, se lire 9. vengono da soldi 13. ch'io m'apposi, da che verranno 10? multipl. 10. via 15. fa 150. partilo per 9. ne viene soldi 16. den. 8. e tanto riuenend il braccio, ma perche s'è detto che lo riuende soldi 2. più che non lo compra, perciò caua soldi 2. di soldi 16. den. 8. restano sol. 14. den. 8. e tanto diremo, che li costasse il braccio.

La canna del panno val più che il braccio due. $5\frac{1}{2}$. si domanda quanto vale la canna, e quanto il braccio. Fa così, poni che il braccio vaglia due. $1\frac{1}{2}$. adunque la canna varrà due. 6. de' quali cauane la valuta d'un braccio, cioè due. $1\frac{1}{2}$. resta due. $4\frac{1}{2}$. e noi voluamo che restassero due. $5\frac{1}{2}$. per il che dirai così, se $4\frac{1}{2}$. mi resta da $1\frac{1}{2}$. ch'io m'apposi, da che mi resterà $5\frac{1}{2}$. opera, ti resterà due. $1\frac{1}{2}$. e tanto valse il braccio, e la canna valse due. $7\frac{1}{2}$. Fanne proua, caua $1\frac{1}{2}$. di $7\frac{1}{2}$. resta $6\frac{1}{2}$. per il che si vede che la canna vale due. $5\frac{1}{2}$. più che non vale il braccio.

Pigliala per quest' altro modo di conclusione, noi diciamo che la canna del panno vale due. $5\frac{1}{2}$. più che non vale il braccio di panno, adunque i detti due. $5\frac{1}{2}$. son la valuta d'vna canna meno vn braccio, cioè la valuta di 5. braccia; parti $5\frac{1}{2}$. per 3. ne viene $1\frac{1}{2}$. per la valuta d'un braccio.

E dicendo, vn Castellano è alla guardia d'vna Torre, la quale ha 4. facce, e se hauesse 24. soldati gli dispensarebbe in tal modo, che n'apparirebbe 9. per faccia, e se n'hauesse 28. n'apparirebbe similmente 9. per faccia, e se n'hauesse 20. pure apparirebbe 9. soldati per faccia, si domanda in che modo gli dispensarebbe, dirai che gli dispenserà nel modo che qui di sotto vedi.



Vno

VNo ha compro libb. 75. di lana per vna quantita di lire, e per parte di pagamento gli ha dato lire 9.6.8. e gli restò a dare il quarto della valuta del cento, si domanda quanto gli restò a dare, e quanto valse il cento. Argomentarai così, che restando debitore d' $\frac{1}{4}$. di quanto valse il cento, il detto debito fuisse vguale alla valuta d' $\frac{1}{4}$. di cento libbre, e perche $\frac{1}{4}$. di cento è 25. perciò diremo, che libbre 75. di lana meno 25. libbre, cioè libbre 50. valsero lir. 9. 16. 8. che varranno adunque libb. cento? opera varranno lir. 19. 12. 4. e tanto valse il cento, dipoi piglia il $\frac{1}{4}$. di lir. 19. 12. 4. ne viene lir. 4. 18. 4. e di tante lire gli restò debitore adunque le dette libb. 75. di lana valsero lir. 14. 15. fanno proua dicendo così, il cento della lana vale lir. 19. 12. 4. che varranno libbre 75? trouerai che varranno lir. 14. 15. delle quali pagandone lir. 9. 16. 8. resta debitore di lire 4. 18. 4.

Poteuasi ancora la sopradetta propositione risolvere per regola delle due false positioni, e porre che il cento valesse (per esempio) lire 60. che a tal prezzo le libb. 75. varrebbero lir. 45. delle quali traendo il $\frac{1}{4}$. di lir. 60. che sono lir. 15. resterebbono lir. 30. e noi voleuamo che rimanessero lir. 9. 16. 8. caua adunque lir. 9. 16. 8. di lir. 30. restano lir. 20. 3. 4. che per la prima positione conuerrebbe dir così, per 60. ch'io m'apposi, mi vien d'errore più 20. $\frac{1}{4}$. e poi far l'altra positione, e seguir l'ordine che intese si conuiene.

Hauendo fin qui proposto, e soluto molte propositioni per la regola semplice del Catayno, ò vogliamo dire per la regola del primo apponere, resta che al presente trattiamo della composta, detta comunemente regola delle due false positioni, per le quali si solue infinite questioni, e casi d'Arithmetica bellissimi, e piaceuolissimi, e questo vocabolo Catayn è voce Arabica secondo che narrano gli Scrittori antichi; la qual non vuol dir altro, che apponersi al falso; Perciò che apponendosi due volte a due numeri falsi, mediante le proportioni delle differenze si ritroua la verità di quella cosa che si cerca. Ma sappi, che per questa regola del Catayno tutte quelle propositioni, che portan con loro quadrature, ò vero radici irrationali non sono solubili; Quantunque Fra Luca dal Borgo dica che con difficoltà grande si soluerrebbero, la qual cosa è impossibile; perciò che, se la vera solutione della cosa deue esser per linea irrationale, e per questa regola non si può dare se non per linea rationale (atto che sempre il numero di quella positione che si fa è rationale) ne segue che per tal regola non si possono soluer simili proposte di quadrature, ò cube irrationali, ma prima che da noi si proponga alcun caso, è da notare, e mandar a memoria queste quattro regolette, appartenenti alla d. regola generale, quali in sostanza sono solamente 3. il senso delle quali è questo,

Prima regola.	Più, e più	S'abbatte.
Seconda regola.	Meno, e men.	S'abbatte.
Terza regola.	Più, e men.	S'aggiunge.
Quarta regola.	Meno, e più	S'aggiunge.

La prima regola non vuol dir altro, che questo cioè. Se per la prima positione ti venisse più della verità, e similmente per la seconda positione ti venisse più della verità, quel più che ti venisse per la prima, e seconda positione, si chiamano errori, & allora si deue cauare l'vn errore dall'altro, & il rimanente sarà partitore nell'operatione, e deusi multiplicare la prima positione via il secondo errore, e la seconda positione via il primo errore, e si come ambedue gl'errori (essendo venuti ciascun più della verità) si deuono trarre l'vn dall'altro, così le multiplicationi delle positioni via gli errori, nel modo, che di sopra s'è detto, si deuono trarre l'vna dall'altra, & il rimanente si deue partire per la differenza degli

degli errori, e l'auucimento farà la verità, come per la seguente proposta potrai meglio comprendere, la qual proporzione più facile, che a noi sia possibile.

Proposizione 1.

live

Il cento della lana vale sol. 50. domando quāto vale la libbra, chiara cosa è che la lib. vale sol. 10. ma per introdurti facilmente nella via dell'operatione della regola delle due false positioni, ci piace propor cosa facilissima, però farai così. Poni che la libbra vaglia vna cosa, cioè vna quantità di soldi, come a te pare, hor poni che la libbra vaglia sol. 16. adunque il cento varrebbe lir. 80. e noi habbiamo detto che vale lir. 50. talche per questa prima positione ci viene lir. 30. più della verità, e perciò scriuerai così, per 16. ch'io m'apposi mi vien 30. come di sotto vedi, e per la seconda positione poni che la libbra della lana vaglia sol. 12. a dique il cento varrebbe lir. 60. e noi voleuamo che valesse lir. 50. talche per questa seconda positione ci vien 10. più della verità, perliche dirai così, per 12. più 10. come di sotto vedi, e così habbiamo hauuto che in ciascuna positione c'è venuto più della verità, e perche la prima regola dice che più, e più s'abbatte, perciò habbatti il secondo errore del primo errore, e quando tu non potessi cauare il secondo errore del primo errore, in tal caso cauail primo del secondo, perche gli errori non saranno mai vguai, eccetto che vno del più, & vno del meno, i quali possion venire vguai, perche conuiene aggiungerli insieme.

Hor cauau 10. (che è il secondo errore) di 30. (che è il primo errore) resta 20. e questa è la differenza degli errori, il qual saluerai per partitore, dipoi multipl. in croce, cioè il primo errore ch'è 30. via la seconda positione che è 12. fa 360. fatto questo, multiplica il secondo errore che è 10. via la prima positione, che è 16. fa 160. il qual tratto di 360. resta 200. il qual parti per 20. che fù la differenza degli errori, ne vien 10. e tanti soldi valse la libbra, valendo il cento lir. 50. auuertendo, che quando tutti due gli errori ti verranno più, o vero tutti due ti verranno meno della verità, ti conuerrà trarre l'vn dell'altro, e similmente bisognerrà ancora trarre le multiplicationi degli errori via le positioni, l'vna dell'altra, & il rimanente partire per la differenza degli errori, e quel che ne verrà per tal partitione, farà la valuta della cosa.

	1 6 0.	3 6 0.	
Prima positione.	per 1 6.	più 3 0.	primo errore.
		×	
Seconda positione.	per 1 2.	più 1 0.	secondo errore.
		—	
		2 0.	
	3 6 0		
	1 6 0		
	—		
2 0)	3 6 0		
	1 0		
	—		
		Valse la libbra soldi 10.	

Proposizione

Proposizione 2.

F Acciamo hora venire gli errori minori della verità, e poniamo che la libbra valesse sol. 7. adunque il cento varrebbe lir. 35. e noi voleuamo lir. 50. talche per questa prima positione ne viene lir. 15. meno della verità, e perciò dirai per 7. men 15. e per la seconda positione poniamo che la libbra valga sic sol. 8. adunque il cento varrebbe lir. 40. e noi voleuamo lir. 50. talche per questa seconda positione ne vien lir. 10. men della verità, e perciò dirai per 8. men 10. come di sotto vedi, e così habbiamo, che il primo errore è 15. & il secondo è 10. e perche nella seconda regola dice che meno, e meno s'abbatte, perciò cauà il secondo errore del primo errore, cioè cauà 10. di 15. resta 5. e questo salua per partitore, nell' operatione, dipoi moltiplica in croce le positioni via gli errori, come nelle sopradette cioè multipl. 15. primo errore, via 8. seconda positione, fa 120. dipoi multipl. 10. secondo errore, via 7. prima positione fa 70. il qual tratto di 120. resta 50. e questo lo partirai per 5. che saluasti, cioè per la differenza degli errori, ne vien 10. e tanti soldi valse la libbra, si come venne nell'operar del più.

prima positione.	per	7. o.	1 2 o.	
		men.	1 5	primo errore.
			X	
seconda positione.	per	8. men	1 o.	secondo errore.
			—	
			5.	partitore.
			1 2 o.	
			7 o.	
			—	
			5 o.	
			1 o.	Valse la libbra soldi 10.

Proposizione 3.

Potruasi ancora soluere in altro modo, trouando la differenza degli errori, la qual'è 5. e la differenza delle positioni, ch'è 1. e poi dir così, per regola del 3. Se di 5. differenza degli errori, vien da 1. differenza delle positioni, da che verrà 15. error maggiore? multipl. 1. via 15. fa pur 15. il qual parti per 5. ne vien 3. che raggiunto a 7. prima positione fa 10. e soldi 10. valse la libbra. E' dicendosi ancora, se 5. vien da 1. da che verrà 10. secondo errore, trouarai, che verrà da 2. il quale aggiunto alla seconda positione, ch'è 8. farà 10. per la valura della libbra, auuertendo che in questo modo d'operare si deue sèpre aggiungere qualche viene per detta regola del 3. alla positione della quale ti sei finito in detta regola, quando gli errori sieno però minori della verità, ma quando gli errori fussero più della verità, all' hora si deue cauare qualche ne viene in d. operatione della positione, della quale ti sarai seruito, come nella prima proposta facesti, che gli errori s'irano più della verità, e la differenza di essi errori 20. e la differenza delle positioni fu 4. e perciò dirai così, se 20. vien da 4. da che verrà 10. minor errore?

ne multipl. 10. via 4. fa 40. partilo per 20. ne vien 2. il qual deu trarre di 12. seconda positione, che ci ha dato 10. minore errore, del quale ti sei feruito, e auadunque 2. di 12. resta 10. come voleuamo, e da te stesso trouarai, che torna il medesimo prouandolo con il maggiore errore.

Propositione 4.

Facciamo hora, che gli errori delle positioni, ne venga vn minore, e l'altro maggiore della verità, e per la prima positione, poniamo, che la libbra vaglia sol. 12. adunque il cento varrebbe lir. 60. e noi voleuamo lir. 50.

Laonde per questa prima positione ne viene più 10. e per la seconda positione poniamo che la libbra vaglia sol. 8. adunque il cento varrà lir. 40. e noi voleuamo lir. 50. Laonde per questa seconda positione ne vien 10. men della verità, e perciò dirai, per 8. men 10. fatto questo ricorri alla terza regola, la qual dice. Più, e men s'aggiunge, e perche in questa operatione c'è venuto vna volta più, & vna volta meno della verità, perciò aggiungi insieme il primo, e secondo errore, fanno 20. qual salua per partitore in questa operatione, dipoi multipl. la prima positione, ch'è 12. via il secondo errore fanno 20. qual salua per partitore in questa operatione, dipoi multiplica la prima positione, ch'è 12. via il secondo errore, ch'è 10. fa 120. dipoi multiplica la seconda positione, ch'è 8. via il primo errore, ch'è 10. fa 80. il quale aggiunto con 120. fa 200. e questo lo partirai per 20. che saluasti ne vien 10. e tanti soldi valse la libbra, e quando nella prima positione ti venisse meno, e nella seconda ti venisse più della verità il medesimo ordine doueresti obseruare, percioche più, e men s'aggiunge, e meno, e più anco s'aggiunge.

prima positione. per 12. più 10. primo errore.

seconda positione. per 8. men. 10. secondo errore.

120. 20. partitore
80.

20) 200.
10. Valse la libbra soldi 10.

Propositione 5.

Le 5. Vuoua, e 2. quattrini vagliono 10. quattrini men vn vuouo, si domanda quanto valse vn vuouo. Questa vuol dir così; Troua vn numero, che multiplicato via 5. & al produ to aggiuntoui 2. faccia tanto, quanto tratto il d. num. di 10. Hor poni, che vn'vuouo costi 2. quattrini, adunque 5. vuoua, e due quattrini varrebbero 12. quattrini, e noi dicemo che valeuano 10. quattrini men vn'vuouo, cioè 8. quattrini, adunque per questa prima positione ci vien d'errore più 4. e perciò diremo così, per 2. più 4. e per la seconda positione, porremo che vn'vuouo valesse 3. quattrini, adunque le 5. vuoua, e 2. quattrini, varrebbero 17. quattrini, e noi dicemmo, che valsero 10. quattrini men vn vuouo, cioè 7. quattrini; Laonde per questa seconda positione ci vien d'errore più 10. perche diremo così, per 3. più 10.

Hora

Hora per trouare la verità, tu hai due errori di più, e perche la prima regola dice, che più, e più s'abbatte, perciò cauà il primo errore del secondo, cioè 4. di 10. resta 6. qual salua per partitore nell operatione, dipoi multiplica la prima positione via il secondo errore, cioè 2. via 10. fa 20. dipoi multiplica la seconda positione via il primo errore, cioè 3. via 4. fa 12. che tratto di 20. resta 8. il qual partito per 6. che saluasti, ne vien $1\frac{1}{3}$. e così diremo, che vn vuouo ualeffe quattrini $1\frac{1}{3}$. fanne proua.

Prima positione.	per	2.	più	4.	primo errore.
Seconda positione.	per	3.	~~più~~	10.	secondo errore.
			—		
		20.			6. partitore.
		12.			

6)

8.
 $1\frac{1}{3}$. Vn vuouo ualeffe quattrini $1\frac{1}{3}$.

Hor soluila così, somma 5. vuoua con men vn vuouo fa 6. perciò che in questi casi il più, e meno s'aggiunge, e meno di meno si trae, e più di più si trae, dipoi cauà 2. quattrini di 10. quattrini, resta 8. il qual partirai per detto 6. ne viene $1\frac{1}{3}$. per la valuta d'un vuouo, e questo modo d'operare è molto più breue.

Propositione 6.

DVe hanno denari, & andando per viaggio trouano vna borsa cō denari, nella quale era tanti ducati, che giunti insieme con i denari del primo, farebbe 8. tanti de' denari del secondo, & il secondo, con i denari della borsa, hauerebbe 60. tanti del primo, si domanda quanti denari era nella borsa, e quanti n'hauera ciascun di loro. Fa così, multipl. 8. tanti, che hauerebbe il primo, via 60. tanti, che hauerebbe il secondo, fa 480. del qual cauà 1. per regola generale, resta 479. e tanti ducati diremo, che fusse nella borsa. Fatto questo, aggiungi 1. per regola generale a 8. tanti del primo fa 9. e tanti ducati hauera il primo, dipoi aggiungi 1. a 60. tanti del secondo, fa 61. e tanti ducati hauera il secondo, fanne proua.

Propositione 7.

TRe hanno denari, il primo n'ha vna quantità, il secondo n'ha due tanti più 6. & il terzo n'ha quanti il primo, e secondo giunti insieme più 8. e fra tutti tre hanno due. 100. si domanda quanti n'haua ciascuno. Fa così, poni che il primo habbia 12. il secondo haurà due tanti più 6. cioè 30. & il terzo haurà quanto il primo, e secondo più 8. cioè 50. che fra tutti tre hauerebbono 92. e noi habbiamo detto che hanno cento, adunque il nostro ponere sù falso, perciò che per questa prima positione ci vien d'errore 8. men della verità, e perciò diremo così per 12. men 8. hor per la seconda positione, poni che il primo habbia 14. il secondo haurà due tanti più 6. cioè 34. & il terzo haurà quanto il primo, e secondo più 8. cioè 56. che tutti tre hauerebbono 104. e noi habbiamo detto, che hanno 100. onde questa positione è stata falsa, essendosi d'errore più 4. Hora

Hor tu hai per la prima positione men 8. della verità, e per la seconda positione tu hai 4. più della verità, a talche tu sei nella regola del più, e del meno, e perche più, e meno s'aggiunge, perciò aggiungi insieme gli errori, cioè 4. e 8. fanno 12. e questo sarà partitore, dipoi multipl. in croce gli errori via la positione, & i lor prodotti sommati insieme, fanno 160. il qual partirai per 12. che saluasti, ne vien $13\frac{1}{3}$. e tanti denari haueua il primo, & il secondo n'haueua due tanti più 6. cioè $32\frac{2}{3}$. & il terzo n'haueua quanti il primo, e secondo più 8. cioè 54. che fra tutti tre vengono ad hauere cento apunto, come si propose.

per 12. men 8. primo errore.

per 14. più 4. secondo errore.

per 112. { 12. partitore.

48.

(12. 160. Il primo haueua $13\frac{1}{3}$.
133. Il secondo haueua $32\frac{2}{3}$.
Et il terzo haueua 54.

100.

Propositione 8.

Quattro hanno denari, & il primo n'ha vna quantità, il secondo n'ha due tati del primo, il terzo n'ha quanti il primo, e secondo men 10. & il quarto n'ha quanto li $\frac{1}{2}$. del secondo, e 6. più, e fra tutti quattro hanno duc. 200. si domanda quanti n'haueua ciascuno.

Fà così, poni che il primo hauesse duc. 20. adunque il secondo n'hauerebbe due tanti più 8. cioè 48. & il terzo n'hauerebbe quanto il primo, e secondo men 10. cioè 58. & il quarto n'hauerebbe quanto li $\frac{1}{2}$. di quelli del secondo, cioè li $\frac{1}{2}$. di 48. e 6. più, che farebbono 42. Hor somma insieme 20. per il primo, 48. per il secondo, 58. per il terzo, e 42. per il quarto, fanno 168. e noi voleuamo 200. adunque per questa prima positione ci vien d'errore 32. meno della verità, e perciò diremo per 20. meno 32. dipoi per la seconda positione, poni che il primo hauesse ducati 24. & il secondo n'hauerebbe due tanti più 8. cioè 56. & il terzo n'hauerebbe quanti il primo, e secondo men 10. cioè 70. & il quarto n'hauerebbe li $\frac{1}{2}$. del secondo più 6. cioè 48. che fra tutti quattro hauerebbono ducati 198. e noi voleuamo 200. laonde per questa seconda positione ci viene d'errore 2. meno della verità, e perciò diremo per 24. men 2. Fatto questo, tu vedi, che in tutte due le positioni c'è venuto meno della verità, e perche meno, e meno s'abbatte, perciò caua 2. di 32. resta 30. e questo salua per partitore, dipoi multiplica in croce le positioni via gli errori, e del maggior prodotto caua il minore, resterà 728. il qual partirai per 30. che saluasti, ne viene $24\frac{4}{5}$. e tanti ducati diremo ch'hauesse il primo, & il secondo n'haueua due tanti più 8. cioè $56\frac{4}{5}$. & il

terzo

terzo n'haucaua quanti il primo, e secondo men 10. cioè 70. $\frac{2}{3}$. & il quarto n'haucaua li $\frac{1}{4}$. del secondo più 6. cioè 48. $\frac{2}{3}$. che fra tutti quattro vengono hauere duc. 200. apunto.

$$\begin{array}{r}
 \text{per } 20. \text{ men } 32. \quad 768. \\
 \times \quad \quad \quad 40. \\
 \hline
 \text{per } 24. \text{ men } 2. \quad 728. \\
 \hline
 30. \text{ partitore. } 42. \frac{2}{3}.
 \end{array}$$

Propositione 9.

DVe hanno denari, & il primo dice al secondo, se tu mi dai il $\frac{1}{4}$. de' tuoi denari, io haurò duc. 60. & il secondo dice al primo, se tu mi dai 8. de' tuoi, io n'haurò tanti, quanti ne restarà ate, si domanda quanti n'haucaua ciascuno.

Faremo positione, che il primo n'hauesse 48. laonde chiedendo al secondo il $\frac{1}{4}$. de' suoi denari, dice, che hauerà duc. 60. adunque gli manca duc. 12. i quali vengono a essere il $\frac{1}{4}$. de' denari del secondo, per il che ne segue che il secondo hauesse ancor lui duc. 48. che con 8. che ne chiede al primo fanno 56. & al primo ne rimarrebbe 40. e perche noi vogliamo, che il secondo cō 8. duc. che chiede al primo habbia quanto resta al primo, e noi trouiamo che al primo resterebbe 40. & il secondo hauerebbe 56. che farebbono 16. duc. più di quello, che conuerrebbe, che hauesse, per il che noi vediamo che in questa positione ci vien più 16. e perciò diremo per 48. più 16. E per la seconda positione porremo, che il primo hauesse 50. e perche chiede al secondo il $\frac{1}{4}$. de' suoi, e dice, che con esso quarto hauerebbe 60. adunque gli viene a chieder 10. & il secondo viene ad hauer 40. che con 8. che domanda al primo fanno 48. & al primo resterebbe 42. & a questi douerebbono esser vguali i denari del secondo, cioè 48. ma perche son più 6. il qual errore lo dà questa seconda positione, perciò diremo per 50. più 6.

Hor per trouare la verità, tu hai per la prima regola, che più, e più s'abbatte, e perciò caua il secondo errore dal primo errore, cioè 6. di 16. resta 10. il qual farà partitore, dipoi multiplica in croce le positioni via gli errori, e del maggior prodotto caua il minore, restarà 512. il qual partirai per 10. che saluasti, ne verà 51. $\frac{2}{3}$. e tanti ducati haucaua il primo, che per fino in 60. vi manca 8 $\frac{2}{3}$. e questi vengono a esser il $\frac{1}{4}$. de' denari del secondo, adunque di necessità il secondo haucaua duc. 35 $\frac{1}{2}$. fanne proua.

$$\begin{array}{r}
 \text{Per } 48. \text{ più } 16. \quad 800. \\
 \times \quad \quad \quad 288. \\
 \hline
 \text{Per } 50. \text{ più } 6. \quad 10) \quad 512. \\
 \hline
 10. \quad \text{partitore} \quad 51. \frac{2}{3}.
 \end{array}$$

Propositione 10.

DVe hanno denari, & il primo dice al secondo, se tu mi dai 18. de' tuoi, io hauerò 10. più del tuo rimanente; & il secondo dice al primo se tu mi dai 12.

de' tuoi, io hauero 6. tanti men 6. del tuo rimanente, si domanda quanti denari haueua ciascuno.

Poniamo che il primo haueffe 30. che con 18. più, quali qual domanda al secondo faranno 48. e questi douerebbono esser 10. più del rimanente del secondo, adunque al secondo restarebbe 38. che ripigliandosi 18. che diede al primo fanno 56. & aggiungendoui 12. che ne domanda al primo fanno 68. & al primo resterà 18. e perche il secondo ha 68. e douerebbe hauere 6. tanti men 6. del primo, cioè 6. via 18. fa 108. men 6. resta 102. & esso non ha altro, che 68. adunque questa prima positione ci viene a dar d'errore 34. meno, e perciò dirai per 30. men 34. Dipoi per la seconda positione, poniamo, che il primo haueffe 20. che con 18. più quali domanda al secondo, fanno 38. e questi douerebbono esser 10. più del rimanente del secondo, per la qual cosa al secondo rimarrebbe 28. che ripigliandosi 18. i quali ha dati al primo faranno 46. e se à questi s'aggiunge 12. che ne domanda al primo faranno 58. & al primo resterà 8. laonde volendo hauere il secondo 6. tanti men 6. di quelli che resta al primo, douerebbe hauere 42. & esso ha 58. e perciò diremo che questa seconda positione ci dia d'errore più 16. e così diremo, per 20. più 16.

Hora noi hauiamo due errori, vno del meno, e l'altro del più, e perche meno, e più si deue aggiungere, perciò somma insieme gl'errori, cioè 16. e 34. fanno 50. e questo salua per partitore, dipoi moltiplica in croce le positioni via gl'errori, & i prodotti sommali insieme, fanno 1160. e questo lo partirai per 50. ne viene $23\frac{2}{5}$. e tanti denari haueua il primo, e per sapere quanti n'haueua il secondo, dirai 18. di quelli del secondo al primo, faranno $41\frac{4}{5}$. e questi saranno più 10. di quelli che restano al secondo, adunque al secondo restarebbe $31\frac{4}{5}$. che ripigliandosi 18. che ne diede al primo faranno $49\frac{4}{5}$. e tanti n'haueua il secondo.

Fanne proua, dando al secondo 12. di quelli del primo fanno $61\frac{4}{5}$. & al primo resterà $11\frac{4}{5}$. il qual moltiplicato via 6. e trattone 6. resterà $61\frac{4}{5}$. apunto, e così il secondo con 12. di quelli del primo hauerebbe 6. tanti, men 6. di quelli, che restassero al primo.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Per } 30. \text{ men } 34. & & \\
 \text{Per } 20. \text{ più } 16. & \times & \\
 \hline
 & 50. \text{ partitore.} &
 \end{array}
 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{errori.}$$

Propositione 2.

VN Maestro di scuola ha tanti scolari, che pagando lir. 6. l'anno per ciascuno gli mancherebbe a pagar la pigione della casa lir. 20. e pagando ciascuno lir. 8. gli auanzarebbe lir. 20. si domanda quanti scolari haueua. e quanto pagaua di pigione l'anno. Queste non vuol dir altro, se non così, Troua vn numero, che moltiplicato via 6. & al prodotto aggiuntoui 20. faccia tanto, quanto moltiplicato detto numero via 8. e trattone 20.

Poniamo, che haueffe 40. scolari, i quali a lir. 6. per ciascuno pagarebbono lir. 240. & a questo pagamento noi diffemo, che li mancaua lir. 20. a poter pagare la pigione, adunque pagaua lir. 260. ma voltiamoci hora al secondo pagameto, e vediamo se a lir. 8. per ciascuno auanza lir. 30. tu vedi, che 40. scolari a lir. 8. per ciascuno

di manierache tra quel che gli manca, & quel che voleua che gli auanzasse, gli vien meno lire 24. & perciò dirai. Per 8. men 24.

Fatto questo, tu hai, che per ambedue le positioni t'è venuto meno della verità, & perche meno, & meno s'abbatte, perciò cauà il secondo errore dal primo errore, cioè, cauà 24. di 38. resta 4. questo salua per partitore, dipoi moltiplica il primo errore via la seconda positione, & il secondo errore via la prima positione, & il minor prodotto caualo del maggiore, & il rimanente che sarà 200. lo partirai per 4. che saluasti, ne verrà 25. & tanti scolari dirai, che hauesse

Per 6. men. 3 8

Per 8. men. 3 4

4. partitore.

Ma per più breue modo la soluerai così, troua la differenza, ch'è tra li due pagamenti, cioè la differenza, ch'è da lir. 6. a lir. 8. la quale è lir. 2. & questa tal differenza, per regola generale soluila sempre per partitore nell'operatione; dipoi somma insieme le lire, che gli mancherà a pagare la pigione, con le lire che gli auanzarà, cioè somma lir. 20. con lir. 30. fanno lir. 50. auuertendo, che quando a vn pagamento gli manca denari, & all'altro gli auanza, sempre si deuè sommare quel che gli manca, con quel che gli auanza; perciò che la regola vuole, che più e meno s'aggiunga, & è contra, & se in ambedue i pagamenti gli mancasse denari, doueresti cauare il minor mancamento dal maggiore, perciò che meno, & meno s'abbatte; & così, se in tutti due i pagamenti gli auanzasse denari, doueresti cauare il minore auanzo dal maggiore, perciò che più, & più s'abbatte, & il rimanente si parte sempre per la differenza de' pagamenti, ouero de' prezzi, come in questa; che hauendo sommato lir. 20. che gli manca, con lir. 30. che gli auanza, fanno lir. 50. il qual partirai per 2. che fu la differenza de' pagamenti, ne vien 25. & tanti scolari diremo, che hauesse.

Proposizione 13.

VNo si troua vna quantità di denari, & vuol comprare vna quantità di staia di grano, & vā in mercato, troua che se paga lo staia lir. 4. gli manca lir. 80. & se lo paga lir. 3 $\frac{1}{2}$. gli manca lir. 20. si domanda quante lire haueua, & quante staia di grano volea comprare. Soluesi per le due false positioni, ma per più breuità, soluila per via di conclusioni, tratte dalla regola d'Algebra. Prima troua la differenza de' prezzi; cioè trai lir. 3 $\frac{1}{2}$. di lir. 4. resta lir. $\frac{1}{2}$. & questo sarà partitore, dipoi perche in ambedue i prezzi gli manca denari, & perche meno, & meno s'abbatte, perciò cauà lir. 20. che gli manca al minor prezzo di lir. 80. che gli manca al maggior prezzo, restano lir. 60. le quali partirai per $\frac{1}{2}$. che saluasti, ne viene 120. & tante staia di grano voleua comprare. Hor per sapere quanti denari haueua, tu vedi che staia 120. di grano a lir. 4. lo staio costarebbono lir. 480. & perche a questo prezzo gli mancherebbe lir. 80. perciò cauà lir. 80. di lir. 480. restano lir. 400. & tante lire haueua. Fanne proua per via del minor prezzo, troua la valuta di staia 120. di grano a lir. 3 $\frac{1}{2}$. lo staio, le quali varranno lir. 420. & perche a questo prezzo

prezzo gli mancarebbe lir. 20. perciò caua lire 20. di lire 420. restano lire 400. più, o meno che re stasse, starebbe male, & il medesimo ordine douere si tenere, se in ambedue i prezzi dello staio del grano gl'auanzasse denari, come per esempio.

Propositione 14.

VNo si troua vna quantità di denari, e vuol comprare vna quantità di braccia di tela, si troua che se paga il braccio sol. 18. gl'auanza sol. 60. e se la paga soldi 16. gl'auanza soldi 140. si domanda quante braccia ne voleua comprare, e quanti soldi haueua.

Fà così, caua sol. 16. di sol. 18. restano sol. 2. e questo salua per partitore, dipoi trahi sol. 60. di sol. 140. restano sol. 80. e questi parti per 2. che saluasti, ne viene 40. e tante braccia di tela voleua comprare; hor, per sapere quanti denari haueua, moltiplica sol. 18. via bracc. 40. fanno sol. 720. e perche a questo prezzo gli auanzarebbe sol. 60. aggiungi sol. 60. faranno sol. 780. e tãti soldi haueua, fanne proua con il secondo prezzo, multipl. sol. 16. via bracc. 40. fanno sol. 640. ai quali aggiungi sol. 140. che a questo prezzo gli auanzarebbe, faranno sol. 780. apunto.

Propositione 15.

TRe hanno a partire duc. 110. il primo ne deue hauere vna quantità, il secondo ne deue hauere 3. più del primo, & il terzo ne deue hauere 4. più del secondo, si domanda quanti ne toccherà per vno.

Fà così, poni che al primo ne toccherà 20. al secondo ne toccherà 23. & al terzo ne toccherà 27. che fra tutti tre gli toccherebbe duc. 70. e noi voleuamo diuidere duc. 110. adunque per questa prima positione ci vien 40. meno della verità, e perciò diremo così: Per 20. men 40. dipoi per la seconda positione, poni che al primo toccherà duc. 30. al secondo ne toccherà duc. 33. & al terzo duc. 37. che fra tutti tre gli toccherebbe duc. 100. e noi voleuamo duc. 110. adunque per questa seconda positione ci vien d'errore 10. meno della verità, e perciò diremo così. Per 30. men 10. fatto questo opera secondo i documenti di sopra dati, traendo il secondo dal primo errore, e moltiplicando poi in ciocc gli errori via le positioni, & il rimanente partirai per la differenza degli errori, trouarai che al primo toccherà duc. $33\frac{1}{7}$. al secondo duc. $36\frac{2}{7}$. & al terzo duc. $40\frac{4}{7}$. ecco sodisfatto alla proposta.

Per 20. men. 40.

×

Per 30. men. 10.

30. partitore.

Propositione 16.

VNo ha compro 3. fiaschi di Vino vermiglio, e 4. fiaschi di trebbiano, e 5. fiaschi di greco, tutti per sol. 220. & il fiasco del trebbiano gli costa 'el 8 più del fiasco del vermiglio, & il fiasco del Greco gli costa sol. 6. più del fiasco del

Bb 3

trebbiano

trebbiano si domanda quanto gli costa il fiasco di ciascuna sorte .

Fà così, poni, che il fiasco del vino vermiglio gli costi vna quantità di soldi, come a te piace, hor poni che gli costi soldi 8. a tal prezzo li tre fiaschi gli costeranno soldi 24. e se il fiasco del trebbiano gli costa soldi 8. più del vermiglio, cioè soldi 16. adunque li quattro fiaschi di trebbiano gli costeranno soldi 64. e se il fiasco del Greco gli costa soldi 8. più del fiasco del trebbiano, cioè soldi 22. ne seguirà, che a tal prezzo li 5. fiaschi di greco gli costeranno sol. 110. hor somma insieme sol. 24. del vino vermiglio, con sol. 64. del trebbiano, e con sol. 110. del greco, faranno sol. 198. e noi voleuamo sol. 220. laonde tu vedi, che ci viene sol. 22. meno della verità, e perciò dirai . Per 8. men 22. Hor per la seconda positione; poni che il fiasco del vino vermiglio gli costi sol. 9. adunque il fiasco del trebbiano gli costerà sol. 17. & il fiasco del greco sol. 23. che a tal prezzo li 3. fiaschi di vin vermiglio, e li 4. di trebbiano, e li 5. di greco, costeranno sol. 210. e noi voleuamo sol. 220. per il che tu vedi, che questa seconda positione ci dà d'errore men 10. della verità, e perciò dirai . Per 9. men 10. e volendo trouare quanto costa il fiasco di ciascuna sorte; opera nei modi dati nelle sopradette, e trouarai, che il fiasco del vin vermiglio gli costò sol. $9\frac{1}{2}$. & il fiasco del trebbiano sol. $17\frac{1}{2}$. & il fiasco del greco sol. $23\frac{1}{2}$. che tutto insieme costerà sol. 220. apunto .

Per 8. men 22.

Per 9. men 10.

12. partitore .

Propositione 17.

DVe hanno denari, & il primo dice al secondo, se tu mi dai 20. de' tuoi, e che io gli aggiunga con i miei, io haurò due tanti del tuo rimanente, & il secondo dice al primo, se tu mi dai 30. de' tuoi, io haurò 3. tanti di quelli, che restaranno a te; si domanda quanti denari haueua ciascuno.

Fà così, poni che il primo hauesse duc. 40. aggiungili 20. che ne domanda al secondo, fanno 60. e questo conuien che sia il doppio de' denari, che restano al secondo, adunque al secondo gli resterebbe duc. 30. hor se al secondo restasse duc. 30. rendili duc. 20. che diede al primo, faranno duc. 50. & a questi aggiugi duc. 30. che vorrebbe che il primo gli desse de' suoi, faranno duc. 80. e questi deuono esser tre tanti di quelli, che restano al primo, e se il primo hauesse duc. 40. (si come habbiamo posto) e ne desse 30. al secondo, gli resterebbe duc. 10. che tre tanti essi sarebbono ducati 30. e noi voleuamo, che fossero duc. 80. perciò che tre tanti di quel che restasse al primo, donerebbe esser vguale a quanto si trouasse il secondo; per il che tu vedi, che in questa positione ci vien 50. meno di quel che conuertirebbe, e perciò dirai . Per 40. men 50. Hor per la seconda positione, poni che il primo hauesse duc. 50. aggiungi duc. 20. che ne domanda al secondo, fanno duc. 70. e questo conuien che sia il doppio de' denari, che resta al secondo, per il che ne segue, che al secondo resti la metà di 70. cioè duc. 35. che ripigliandocene 20. che ne dà al primo, fanno duc. 55. & a questi aggiungi duc. 30. che vuol di quelli del primo, fanno duc. 85. e questi deuono esser tre tati di quelli che restano

stano al primo, e, perche il primo ponemmo che hauesse duc. 50. de' quali dando-
ne 30. al secondo gli restarebbe duc. 20. che triplati fanno 60. e noi voleuamo
che facessero 85. perche tu vedi che ci vien 25. meno di quel che vorrebbe, e
perciò dirai per 50. meno 25.

Fatto questo, considera, che tu hai per le due positioni due errori, i quali cia-
cun di essi è meno di quel che douerebbe, e perche meno, e meno s'abbatte, perciò
trai 25. di 50. resta 25. e questo sarà partitore, dipoi multiplica in croce gli er-
rori via le positioni, e del maggior prodotto cava il minore, & il rimanente parti-
tolo per 25. che salua sta, trouarai, che ne verrà 60. e tanti ducati haueua il primo,
dipoi per il secondo opera da te stesso, trouarai che haueua parimente duc. 60.

per 40. meno 50.

per 50. meno 25.

25. partitore.

Propositione 18.

DVe soldati voglion comprare vn cavallo, il qual vale duc. 60. e nessun di so-
ro ha tanti denari, che per se solo lo possa comprare, perche il primo dice
al secondo, se tu mi dai il terzo de' tuoi denari io compraro il cavallo, & il seco-
do dice al primo, dammi il $\frac{1}{2}$. de' tuoi, che lo compraro io, si domanda quati duc.
haueua ciascuno. Fa così. Poni che il primo habbia duc. 48. per la qual cosa tu
vedi che li manca duc. 12. a voler hauer duc. 60. da poter comprare il cavallo,
adunque di necessità il secondo douerebbe hauer duc. 36. acciò che dandene al
primo la terza parte, cioè 12. habbia poi 60. Hor se il secondo ha duc. 36. e do-
mandando al primo il $\frac{1}{2}$. de' suoi, cioè il $\frac{1}{2}$. di 48. ch'è 24. i quali aggiunti a
duc. 36. fanno duc. 60. e lui voluea, che fossero duc. 60. perche tu vedi che ci
vien d'errore 14. men di quel che voleuamo, e perciò dirai così. Per 48. men
14. Veltiamoci hora alla seconda positione, e poni che il primo hauesse duc.
50. per la qual cosa tu vedi che gli mancherebbe duc. 10. adunque 10. duc. fareb-
bono il $\frac{1}{2}$. de' denari del secondo, e tutti farebbono duc. 30. e se a questi aggiungi
il $\frac{1}{2}$. de' denari del primo, cioè il $\frac{1}{2}$. di 50. ch'è 25. faranno duc. 40. e noi voleua-
mo duc. 60. per la qual cosa, tu vedi che questa seconda positione ci dà d'errore
20. men della verità, e perciò dirai così. Per 50. men 20. fatto questo, cava il
minor errore dal maggiore, perciò che meno, e meno s'abbatte, resta 5. e que-
sto sarà partitore, dipoi multiplica in croce gli errori, via le positioni, e del mag-
gior prodotto cava il minore, & il rimanente partilo per 5. trouarai che ne ver-
rà 42. e tanti ducati haueua il primo, & il secondo haueua duc. 51.

Per 48. meno 14.

Per 50. meno 20.

5. partitore.

Proposizione 19.

VNo vuol far fabbricare vna Casa, e troua vn fabbricante, il qual si offerisce farla in 60. giorni, ma con patto, che il di che vi lauora habbia di salario sol. di 33. & il di che non vi lauora vuol perder sol. 40. Il fabbricante fece la Casa nel sopradetto tempo, e fecero conto de giorni, che vi haueua lauorato, e di quelli che non vi haueua lauorato, e trouò che restaua hauer dal Padrone sol. 50. si domanda quanti gidri vi lauorò il detto fabbricante, e quanti non vi lauorò. Questa proposta altro non vuol dire se non questo cioè. Fammi di 60. due tal parti che multiplicata la prima via 33. faccia 50. più che l'altra in multiplicata via 40. Hor pongasi che vna parte sia 34. e l'altra 26. e poniamo che vi lauorassi 34. giorni, multiplichisi 34. via sol. 33. (che doueua hauer il giorno) farà 1120. dipoi pongasi che non vi lauorasse 26. giorni, multiplichisi 26. via 40. soldi che doueua perdere il giorno farà 1040. che tratto di 1120. restano sol. 82. e noi voleuamo che restassero sol. 50. adunque resterebbe sol. 32. più del douere, e perciò dirai così, per 34. ch'io m'apposi, mi vien più 32. Hor facciamo l'altra positione, e pongasi che vi lauorasse 36. giorni, che a sol. 33. il giorno guadagnerebbe soldi 1188. e questi saluinsi, dipoi pongasi, che non vi lauorasse 24. giorni, che perdendo sol. 40. il giorno, perderebbe sol. 960. i quali tratti di sol. 1188. resterebbe creditore di sol. 228. e noi habbiamo detto, che restò creditore di sol. 50. caussi adunque sol. 50. di sol. 228. restano sol. 178. più del debitore, e perciò dicasi così. Per 36. ch'io m'apposi, mi vien più sol. 178. offeruisci la regola del più, e del più tronerasi, che vi lauorò giorni 33. $\frac{2}{3}$. e giorni 26. $\frac{1}{3}$. non vi lauorò. Il medesimo modo si conuerrebbe offeruare, quando diceste che il fabbricante restasse debitore di sol. 50. che la sostanza della domanda sarebbe questa cioè. Fammi di 60. due parti, che multiplicata la prima via 33. faccia 50. meno dell'altra multiplicata via 40. &c.

per 3 4 per 3 2

per 3 6 per 1 7 8

1 4 6. partitore.

Proposizione 20.

VNo vuol comprare vn cauallo, che vale duc. 100. & ha di due sorte monete, cioè grossi, che ne va 18. al ducato, e giuli che ne va 11. al ducato, e gli vuol dar tanti grossi, quanti giuli, cioè tante monete dell'vna, quante dell'altra sorte, si domanda, quante gliene douerà dare di ciascuna. Simil proposta non vuol dir altro, che questo, cioè. Troua vn numero, che partito per 11. & anco per 18. e gli auuenimenti giunti insieme faccino 100. apunto. Fa così, poni, che li dessi 550. giuli, sanne ducati, partendoli per 11. ne vien duc. 50. e douendoli dare ancora 550. grossi, sanne ducati, partendoli per 18. ne vien duc. 30. $\frac{5}{6}$. che giunti insieme con duc. 50. fanno duc. 80. $\frac{5}{6}$. e noi voleuamo duc. 100. perliche tu vedi che questa prima positione ci dà d'errore 19. $\frac{1}{6}$. ma della verità, e perciò dirai così,

per

per 550. men 19. $\frac{2}{3}$. Dipoi per la seconda positione, poni che gli desse 660. giuli, de quali ne farai ducati, partendo per 11. ne vien duc. 60. e perche gli deue dare ancora tanti grossi, percio partira 660. per 18. ne vien ducati 36. $\frac{2}{3}$. i quali giunti insieme con duc. 60. farino duc. 96. $\frac{2}{3}$. e noi voleuamo, che facessero duc. 100. apunto, diuaniache per questa seconda positione ci vien d'errore 3. $\frac{2}{3}$. men della verita, laonde dirai cosi, per 660. men 3. $\frac{2}{3}$. hora tu hai che ambedue le positioni ti danno gli errori minori della verita, e perche meno, e menq' abbatte, pero caua il secondo errore del primo errore, cioe caua 3. $\frac{2}{3}$. di 19. $\frac{2}{3}$. resta 16. $\frac{2}{3}$. e questo salua per partitore, dipoi multiplica il primo errore via la prima positione, & il prodotto cauane il prodotto del secondo errore via la prima positione, & il rimanente partilo per 16. $\frac{2}{3}$. che saluasti, trouarai, che ne verra 682. $\frac{2}{3}$. e tanti giuli, e tanti grossi, gli douera dare.

per 550. m. 19. $\frac{2}{3}$.

per 660. m. 3. $\frac{2}{3}$.

16. $\frac{2}{3}$.

partitore.

MA soluala per quest' altro modo piu accorto, e breue, poni che gli dia 18. grossi, i quali sono vn ducato, poni ancora che gli dia 18. giuli, i quali sono duc. 1. $\frac{2}{3}$. adunque gli darai 36. monete, cioe tra giuli, e grossi, i quali faranno duc. 2. $\frac{2}{3}$. dipoi per regola del tredici, cioe, duc. 2. $\frac{2}{3}$. sono 36. monete, cioe tra giuli, e grossi, quante monete simili faranno duc. 100. multiplica 100. via 36. fa 3600. e questo parti per 5. $\frac{2}{3}$. ne viene 365. $\frac{2}{3}$. e tante monete gli douera dare tra giuli, e grossi, diuidi 365. $\frac{2}{3}$. in due parti uguali, ne viene 68. $\frac{2}{3}$. e tanti giuli, e tanti grossi, gli douera dare.

Propositione. 21.

VNo vuol comprare vn cavallo, che vale duc. 100. & ogni ducato cambiando lo a grossi vale 12. grossi, e cambiando a giuli vale 10. giuli, e cambiando a carlini vale 12. carlini. Hora il venditore vuol di questa tre monete, cioe due tanti giuli che grossi, e due tanti carlini che giuli, si domanda quante monete hauera di ciascuna sorte. Fa cosi, poni che li desse 60. grossi, i quali a 15. grossi per ducato, sono 4. ducati, e douendoli dare due tanti giuli, che grossi, li necessita li doueua dare 120. giuli, i quali a 10. giuli per ducato, sono duc. 12. e perche conuien che gli dia due tanti carlini, che giuli, gli dara adunque 240. carlini, i quali a 12. carlini il ducato, sono duc. 20. Hora somma insieme duc. 4. con duc. 12. e con duc. 20. fanno duc. 36. e noi voleuamo, che facessero duc. 100. per il che tu vedi, che questa prima positione ci da d'errore duc. 64. men della verita, e peretò dirai. Per 60. men 64. Dipoi per la seconda positione, poni che li desse 90. grossi, i quali sono duc. 6. e dandoli 90. grossi, gli conuien dare 180. giuli, che sono duc. 18. e dandoli 180. giuli, li conuien dare 360. carlini, che sono duc. 30. hora somma insieme duc. 6. 18. e 30. fanno duc. 54. e noi voleuamo duc. 100. per la qual

qual cosa questa seconda positione ci dà d'errore $\text{duc. } 46.$ men della verità, e perciò dirai. Per $90.$ men $46.$ e perche meno, e meno s'abbatte, però caua il secondo errore ch'è $46.$ del primo errore ch'è $64.$ resta $18.$ e questo salua per partitore; dipoi moltiplica il primo errore via la seconda positione, & il secondo errore via la prima positione, & il minor prodotto caualo dal maggiore, trouarai, che resterà $3000.$ e questo parti per $18.$ che aluasti, ne viene $166\frac{2}{3}.$ e tanti grossi gli douerà dare, e douendoli dare due tanti giuli, li darà giuli $333\frac{1}{3}.$ e carlini $166\frac{2}{3}.$ Fanne proua.

Per $60.$ m. $64.$

Per $90.$ m. $46.$

$18.$ partitore.

Hora solua per quest'altro modo, poni che gli dia vn ducato di grossi, cioè $15.$ grossi, $30.$ giuli, e $60.$ carlini, che ridotti a ducati faranno in tutto $9.$ ducati, & in questi $9.$ ducati v'è dentro $15.$ grossi, però dirai così per regola del $3.$ se per ogni $9.$ ducati conuien ch'io gli dia $15.$ grossi, quanti conuerà che io gliene dia per $\text{duc. } 100.$ multipl. $100.$ via $15.$ fa $1500.$ il qual partirai per $9.$ ne vien $166\frac{2}{3}.$ e tanti grossi gli douerà dare, dipoi dirai, se per ogni $9.$ ducati conuien ch'io gli dia $30.$ giuli, quanti conuerà ch'io gliene dia per $100.$ ducati multiplica $100.$ via $30.$ fa $3000.$ il qual parti per $9.$ ne viene $333\frac{1}{3}.$ e tanti giuli gli darà.

Dipoi dirai, se per ogni $9.$ ducati conuien ch'io gli dia $60.$ carlini, quanti conuerà ch'io gliene dia per $100.$ ducati multiplica $100.$ via $60.$ fa $6000.$ il qual partirai per $9.$ ne viene $666\frac{2}{3}.$ e tanti carlini gli douerà dare.

Vno dà a scassare vn pezzo di Tetra per piantarui vna Vigna; ma con questo patto, che il di che vi laura guadagni sol. $20.$ & il di che non vi laura perda sol. $24.$ & in capo d'vn mese il detto laurante fini di scassare detto Terreno, e non restò debitore, nè creditore, si domanda quanti giorni vi laurò, e quanti non vi laurò. Questa propositione vuol dir così: Pammi di $30.$ due parti, che tanto facci la maggiore moltiplicata via $20.$ quanto la minore via $24.$ Poni che la maggior parte sia $18.$ e la minore sia $12.$ e poni che vi laurasse $18.$ giorni, nel qual tempo a sol. $20.$ il giorno, meriterebbe sol. $360.$ hora bisogna vedere in $12.$ giorni (poniamo che non vi lauri) quanto perderebbe a sol. $24.$ il giorno, multipl. $12.$ via $24.$ fa $288.$ e noi vorremmo che facesse $360.$ cioè tanto il dare, quanto l'hauer, e perciò diremo che in $12.$ giorni che non vi laura perda soldi $288.$ i quali tratti di sol. $360.$ restano sol. $72.$ e così dirai per $18.$ ch'io m'apposi, mi vien meno $72.$ Hor per la seconda positione, poni che vi laurasse $16.$ giorni, che a soldi $20.$ il giorno meritarebbe soldi $320.$ dipoi vedi quanto perderebbe in $14.$ giorni (che poniamo non vi lauri) a sol. $24.$ il giorno, nel qual tempo perderebbe soldi $336.$ e noi vorremmo che perdesse sol. $320.$ e perciò caua sol. $320.$ di sol. $336.$ resta sol. $16.$ e così dirai per $16.$ più $16.$ e perche più, e meno s'aggiunge, secondo le regole date, perciò somma insieme gli errori, cioè $72.$ e $16.$ fanno $88.$ e questo salua per partitore; dipoi multipl. in croce gli errori via le positioni, & i prodotti sommali insieme, fanno $1440.$ qual partirai per $88.$ ne vien $16\frac{2}{11}.$ e tanti giorni vi laurò, & il resto per fino in $30.$ giorni che v'è giorni $13\frac{4}{11}.$ non vi laurò. Fanne proua &c.

Per

Per 18. men. 72

Per 16. più 16.

$\frac{72}{16} = 4.5$ partitore.

HOr soluila per quest' altro modo, piglia la metà di quanto guadagna, e di quanto perde il giorno, cioè la metà di soldi 20. e di soldi 24. che è soldi 10. e sol. 12. dipoi somma insieme queste due metà, cioè 10. 12. fanno 22. e questo sarà partitore nell' operatione, dipoi multiplica i detti soldi 10. via tutto quel tempo nel qual finisse di lauorare, che sono giorni 30. fa 300. e questo parti per 22. ne vien 13. $\frac{4}{7}$. e tanti giorni non vi lauorò, dipoi multiplica sol. 12. via 30. giorni fa 360. e questo partirai per 22. ne verrà 16. $\frac{4}{7}$. e tanti giorni vi lauorò.

Proposizione 22.

VN Soldato vuol comprare vn Cauallo, e vuol che gli resti in borsa 30. duc. e fa il suo conto, che se spende la metà, & il terzo meno 10. de' ducati che egli ha, gli resta apunto 30. ducati, come voleua, si domanda quanti ducati haueua, e quanti ne voleua spendere nel Cauallo. Questa proposizione non vuol dir altro, se non così.

Troua vn numero, che trattone il $\frac{1}{2}$. & il terzo men 10. resti 30. apunto, fa così: poni che hauesse duc. 60. pigliane la metà che è 30. & il $\frac{1}{3}$. che è 20. somma insieme fanno 50. ma perche dice che vuole spendere duc. 10. men delle dette parti perciò cauua 10. di 50. resta 40. e tanti ducati (secondo la nostra positione) costerebbe il cauallo, trai 40. di 60. resta 20. e noi voleuamo che restasse duc. 30. adunque gli resta duc. 10. meno di quel che voleua, e perciò dirai, per 60. meno 10.

Hor per la seconda positione, poni che hauesse ducati 90. pigliane il $\frac{1}{2}$. & il $\frac{1}{3}$. che è 45. e 30. somma insieme fanno duc. 75. cauane 10. ducati (i quali intende volere spender meno delle dette parti) restano duc. 65. e tanto costerebbe il cauallo in questa seconda positione, adunque gli resterebbe duc. 25. che sarebbono ducati 5. meno di quel che voleua, e perciò dirai, per 90. meno 5.

E perche in ambedue le positioni c'è restato meno di quel che voleuamo, perciò cauua il secondo errore che è 5. del primo errore che è 10. resta 5. questo sarà partitore, dipoi multipl. in croce gli errori via le positioni, e del maggior prodotto cauane il minore, resterà 600. il qual partirai per 5. ne viene 120. e tanti ducati haueua, hor per veder quanto voleua spendere nel cauallo, piglia il $\frac{1}{2}$. & il $\frac{1}{3}$. di duc. 120. ne vien 60. e 40. somma insieme fanno duc. 100. cauane 10. restano duc. 90. e tanti ducati voleua spendere nel cauallo, e da 90. ducati per fino in 120. (che n'haueua) v'è ducati 30. di resto come voleua.

Hor soluila in quest' altro modo, troua vn numero, che habbia le sopradette parti, cioè il $\frac{1}{2}$. & il $\frac{1}{3}$. che pongo sia 12. prendine la metà che è 6. & il $\frac{1}{3}$. che è 4. somma insieme fanno 10. et tratto di 12. resta 2. dipoi cauua 10. duc. (che vuol spender meno delle dette parti) di duc. 30. che vuol che gli resti, restano duc. 20. hor per regola del tre dirai così, se 2. di resto vien da 12. ch'io m'appoi, da che verrà 20? multiplica 20. via 12. fa 240. il quale partirai per duc. ne verrà

120. e tanti ducati haueua, e se haueffe detto di volere spendere due. 10. più delle dette parti, in tal caso bisognaua aggiungere ducati 10. a ducati 30. che a quelli, che voleua che gli rimanesse, e nel resto bisognarebbe operare come di sopra.

Propositione 23.

IL Sig. Marc'Antonio Cecchi da Pescia, Cavalierè di Santo Stefano, essendo io vna mattina a desinar seco, ad vna Fonte d'vna sua Villa, mi fece questo quesito, dicendo Compare Forestano, se di questo Pero il qual mi fa ombra n'apparisse fuor della terra braccia 8. $\frac{2}{3}$. e sotto terra ne fusse il $\frac{1}{3}$. & il $\frac{1}{3}$. e braccia 4. più di tutta l'altezza, quanto sarebbe alto tutto questo pero? alla cui domanda io risposi, e dissi così, che in due modi si poteua ritrouar la dett'altezza; l'vno de' quali era operar per la regola delle false positioni, e l'altro per via di conclusioni, & egli soggiunse, che hauerebbe gran piacere intendere la soluzione di essa per le false positioni, a cui io dissi, pigliate la penna, e seruiete, e ponete che tutto il pero sia alto quella quantità di braccia che più vi piace; ma per fuggir il fastidioso operar de' torti, ponete vn numero che habbia le sopradette parti interamente, cioè il $\frac{2}{3}$. & il $\frac{1}{3}$. senza che auanzi cos'alcuna; laonde esso pose, che fusse alto braccia 30. del quale pigliandone il $\frac{2}{3}$. che è 6. & il $\frac{1}{3}$. che è 5. e iunti insieme fanno 11. e con 4. braccia più che si propone esserne sotto terra, fanno braccia 15. e tante braccia ne sarebbe sotto terra, secondo la nostra positione, adunque sopra terra ne sarebbe braccia 15. e noi diciamo esser uene solamente braccia 8. $\frac{2}{3}$. perche ci vien d'errore braccia 6. $\frac{1}{3}$. più della verità, e perciò bisogna dir così, per 30. più 6. $\frac{1}{3}$. e per la seconda positione, egli pose che fusse alto braccia 60. (perche non trouo numeri più bassi, che hauessero il $\frac{2}{3}$. & il $\frac{1}{3}$.) del qual 60. ne prese il $\frac{2}{3}$. che è 40. & il $\frac{1}{3}$. che è 20. e queste due parti giunte insieme con 4. braccia più, fanno braccia 26. e tante braccia ne sarebbe sotto terra (stante questa seconda positione) le quali tratte di 60. restano braccia 34. e noi voleuamo che restassero braccia 8. $\frac{2}{3}$. per la qual cosa ci vien d'errore 25. $\frac{1}{3}$. più di quel che voleuamo, e perciò diremo per 60. più 25. $\frac{1}{3}$. Fatto questo, perche noi hauiamo ambedue gl'errori più della verità, e perche più, e più s'abbate secondo questa regola) perciò bisogna che noi cauiamo il primo errore del secondo, resta 19. il qual saluiamo per partitore, di poi bisogna che multipliciamo in croce gli errori via le positioni, e del maggior prodotto cauare il minore, il che fatto, restò 390. il qual partito per 19. ne venne 20. e tante braccia concludemmo, che sarebbe alto tutto il pero.

$$\begin{array}{r}
 \text{per } 30. \text{ più } 6. \frac{1}{3} \\
 \times \\
 \text{per } 60. \text{ più } 25. \frac{1}{3} \\
 \hline
 19. \text{ partitore.}
 \end{array}$$

Hor volendola soluer per l'altro modo molto più breue. Fa così, poni che il sopradetto arbore fusse alto quella quantità di braccia che più ti piace, purchè habbia le sopradette parti integrali, cioè il $\frac{2}{3}$. & il $\frac{1}{3}$. la qual quantità poni che sia 30. del qual presone il $\frac{2}{3}$. & il $\frac{1}{3}$. ne viene 6. e 5. che giunti insieme fanno 11. il qual tratto di 30. resta 19. e tante braccia ne sarebbe sotto terra, se non facesse mention di 4. braccia

braccia più, le quali 4. bracc. l'aggiungerai con bracc. 8. che n'apparisce fuori, fanno bracc. 13. dipoi dirai così, se 10. vien da 20. ch'io m'apposi, da che verrà 12. multipli. 12. via 30 fa 360. il qual parti per 19. ne vien 20. e tante braccia farebbe alto tutto l'arbore.

Propositione 24.

VN soldato vuol comprare vn cavallo, e domanda al padrone quanti ducati ne vuole, & esso domanda al soldato quanti ducati si troua, & il soldato glieli manifestò. Laonde il padron del cavallo disse, se tu mi dessi li 7. e li 7. de' duc. che vale il cavallo, tu mi restassi debitore di due. 22. si domanda quanti duc. haueua il soldato, e quami ne valeua il cavallo. Sappi che tanti ducati valeua il cavallo, quanti si haueua il soldato. Hor per trouer quami n'haueua, fa così. Poni, che il cavallo valesse vna quantità di ducati, come a te piace, purché di tal quantità se ne possa prender interamente li 7. e li 7. senza auanzar cosa alcuna, hor poni, che il cavallo valesse duc. 20. prendine li 7. che sono 40. e di detto 60. prendine li 7. che sono 48. somma insieme 48. e 40. fanno 88. e questo bisognarebbe cauar d'80. vna perche non si può cauar, trahi 60. di 88. resta 28. e tanti ducati resterebbe debitore; e noi habbiamo detto, che restasse debitore di due. 22. che farebbe più del douere duc. 4. per il che dirai, per 60. più 4. Dipoi per la seconda positione, poni che il cavallo valesse duc. 30. prendine li 7. che son 20. e li 7. son 24. aggiungi queste due parti insieme fanno 44. e queste bisognarebbe cauar di 30. ma perche non si può, trahi 30. di 44. resta 14. debito, e noi voleuamo, che restasse debitore di due. 22. adunque resterebbe debitore di duc. 10. men che non si proposse, e così per questa seconda positione, dirai per 30. men 10. Hor segui le regole già date, sommando più 4. con men 10. fanno 14. il che salua per partito-re, dipoi multiplica in croce gli errori via le positioni, cioè 60. via 10. fa 600. e 4. via 30. fa 120. che sommato insieme 720. con 600. fanno 720. il qual partirai per 14. che saluasti, ne vien 51. e tanti ducati valeua il cavallo, e tanti n'haueua il soldato.

VN soldato haueua 60. ducati, e vuol comprare vn cavallo, e domanda al padrone quanti ducati ne vuole, & esso domanda al soldato quanti ducati si troua, & il soldato glieli manifestò. Laonde il padron del cavallo disse, se tu mi dessi li 7. e li 7. de' duc. che vale il cavallo, tu mi restassi debitore di due. 22. si domanda quanti duc. haueua il soldato, e quami ne valeua il cavallo. Sappi che tanti ducati valeua il cavallo, quanti si haueua il soldato. Hor per trouer quami n'haueua, fa così. Poni, che il cavallo valesse vna quantità di ducati, come a te piace, purché di tal quantità se ne possa prender interamente li 7. e li 7. senza auanzar cosa alcuna, hor poni, che il cavallo valesse duc. 20. prendine li 7. che sono 40. e di detto 60. prendine li 7. che sono 48. somma insieme 48. e 40. fanno 88. e questo bisognarebbe cauar d'80. vna perche non si può cauar, trahi 60. di 88. resta 28. e tanti ducati resterebbe debitore; e noi habbiamo detto, che restasse debitore di due. 22. che farebbe più del douere duc. 4. per il che dirai, per 60. più 4. Dipoi per la seconda positione, poni che il cavallo valesse duc. 30. prendine li 7. che son 20. e li 7. son 24. aggiungi queste due parti insieme fanno 44. e queste bisognarebbe cauar di 30. ma perche non si può, trahi 30. di 44. resta 14. debito, e noi voleuamo, che restasse debitore di due. 22. adunque resterebbe debitore di duc. 10. men che non si proposse, e così per questa seconda positione, dirai per 30. men 10. Hor segui le regole già date, sommando più 4. con men 10. fanno 14. il che salua per partito-re, dipoi multiplica in croce gli errori via le positioni, cioè 60. via 10. fa 600. e 4. via 30. fa 120. che sommato insieme 720. con 600. fanno 720. il qual partirai per 14. che saluasti, ne vien 51. e tanti ducati valeua il cavallo, e tanti n'haueua il soldato.

Soluila hora per quest'altro modo, poni che il cavallo valesse vn ducato, prendine 7. e ne vien 7. e li 7. vn ducato, che sommati insieme fanno 14. del quale caua l'vnità, cioè vn ducato resta 1. e poi dirai se 7. di debito vien vn ducato, ch'io m'apposi, da che verrà duc. 24. di debito multipli. an. via 1. fa 24. qual parti per 7. ne vien 3. e li 7. come sopra. E se la proposta dicesse, che il soldato pagando il 7. & il 7. de' denari che si mouasse per la valuta del cavallo, e che gli restasse in borsa duc. 8. faresti così. Somma 7. con 7. fanno 14. e li 7. dell'vnità, resta 7. parti 8. per 7. ne vien 48. e tanti duc. hauerebbe il soldato, de quali d'80. ne li 7. & il 7. per la valuta del cavallo, gli resterebbe duc. 2. auuto. Hora, che si come a voler che restasse debitore bisogna che quelle parti, che vuol dare de suoi denari, sommate insieme faccino più dell'vnità, e volendo che gli resti qualche cosa, conuien proporre che paghi parti tali, che giunte insieme faccino meno dell'vnità, altrimenti nō si soluerrebbero tali proposte.

Propo-

Per 6. men. 8. 1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Per 8. più. 2.

8. partitore.

Proposizione 27.

F Ammì di 30. due parti, che alla prima aggiunto 60. faccia triplo dell'altra parte aggiuntoli 20. Poni, che la prima parte sia 20. la seconda farà 10. la prima con 60. fa 80. e la seconda con 20. fa 30. ma douerebbe il numero 80. esser triplo del numero 30. secondo la proposta, il che non è, ma il numero 90. è triplo al numero 30. e perciò habbiamo 10. meno del douere, e così dirai, per 20. ch'io m'apposi men. 10. Poni di nuouo, che la prima parte sia 24. e la seconda farà 6. la prima con 60. fa 84. e la seconda con 20. fa 26. e douerebbe il numero 84. esser triplo al numero 26. il che non è, ma il numero 78. è triplo del numero 26. adunque habbiamo, che il numero 84. è 6. più del triplo di 26. per il che dirai così per 24. ch'io m'apposi, più 6. segui la regola, trouarai che la prima parte farà 22. $\frac{1}{2}$. e la seconda 7. $\frac{1}{2}$. fanno proua &c.

Per 20. meno 10.

Per 24. più. 6.

16. partitore.

Proposizione 28.

V No ha vna pezza di rascia, vna pezza di panno, & vna pezza di saia, la qual saia vale lir. 150. e se si aggiunge la valuta della saia, con la valuta della rascia, fa triplo della valuta della pezza del panno, e se si aggiunge la valuta della saia con la valuta del panno, fa vguale alla valuta della pezza della rascia, si domanda quanto vale la pezza della rascia, e la pezza del panno.

Fà così, poni che la pezza della rascia vaglia lir. 258. aggiungili 150. cioè la valuta della saia, farà lir. 408. e perche questi due pezzi insieme giunti deuono esser tripli della valuta della pezza del panno, per tanto la pezza del panno douerà costare lir. 136. alle quali aggiuntoui lir. 150. della saia farà lir. 286. ma douea fare lir. 258. apunte, acciò che queste due valute insieme giunte fussero vguale alla valuta della rascia, adunque c'è venuto 28. più del douere, e perciò dirai così per 258. più 28.

Hor per l'altra positione, poni che la rascia vaglia lire 270. aggiungili lire 150. della saia, faranno lire 420. e questo conuien che sia triplo alla valuta del panno, adunque la pezza del panno varrà lire 140. alle quali aggiungi lire 150. della saia, faranno lire 290. e doucuan fare lire 270. cioè vguale alla valuta della rascia, per il che, e' è venuto 20. più del douere; e perciò dirai così per 270. ch'io m'apposi, mi vien d'errore più 20. segui la regola del più e più, e trouarai che la pezza della rascia valse lire 300. e la pezza del panno valse lire 150. per

Per 258. più 28. 280

Per 270. più 20. 290

8. partitore.

Propositione 29.

VNo ha vna certa quantità di braccia di rascia, & vna quantità di braccia di panno, & vna pezza di faia, quale vale lir. 100. le quali lir. 100. se si aggiungono alla valuta delle dette braccia di rascia, fanno triplo alla valuta delle braccia del panno; ma aggiunto le dette lir. 100. alla valuta del panno, fa duplo alla valuta della rascia; si domanda quanto valeua la rascia, & quanto il panno.

Poni che la rascia vaglia lir. 50. aggiungili lir. 100. della faia, fanno lir. 150. e perche questo prezzo deu' esser triplo del prezzo del panno, adunque il panno varrà ancor lui lir. 50. alle quali aggiungi lir. 100. della faia, farà pur lir. 150. il qual numero non è doppio di lir. 50. della rascia, ma il suo duplo è cento, adunque c'è venuto lir. 50. più del douere, e perciò dirai così, per 50. più 50.

Poni di nuouo, che la rascia vaglia lir. 98. aggiungiuir lir. 100. della faia, farà 198. adunque il panno varrà lir. 66. attesoche 198. deu' esser triplo di 66. aggiungi poi lir. 100. alla valuta del panno, farà lir. 166. il qual numero non è doppio di 98. cioè della valuta della rascia, ma il numero 166. è duplo di quello, per la qual cosa c'è venuto 30. meno del douere, e perciò dirai così, per 98. ch'io m'apposi mi vien 30. meno; segui la regola, trouarai, che la rascia valeua lir. 80. & il panno lir. 60.

Per 258. più 28. 280

Per 98. meno 30. 68

80. partitore.

Propositione 30.

VNo ha comprato panno di due forti, cioè rascia, e perpignano, che in tutto fa la somma di br. 30. & il braccio del perpignano costò lir. 5. & il braccio della rascia costò lir. 8. & il costo di tutto il perpignano fu lir. 20. più del costo di tutta la rascia, si domanda quante braccia fu la rascia, e quante il perpignano. Questa Propositione non vuol dir altro, che così. Fammi di 30. due parti, che moltiplicata la prima via 5. faccia 20. più, che a moltiplicare l'altra via 8. Hor poni, che compri br. 18. di perpignano, e br. 12. di rascia, che a lir. 5. il braccio del perpignano varrà lir. 90. e la rascia varrà lir. 96. laonde per questa prima positione, non habbiamo, che la rascia vale lir. 6. più del perpignano, e noi voleuamo, che il perpignano valesse lir. 20. più della rascia, di maniera che dal più 20. al men 6. vi corre di differenza 26. & in questi simili casi, bisogna all'operantq esser molto attento, perciò che la differenza ch'è dal mobile al debito si considera

deta sommando ambedue le parti, perche il debito disfa il mobile, & è conuerso il mobile disfa il debito, come per essempio. Io voglio comprare vna mercantia e so mio conto, che pagando vna quantità di denari, m'auanzarà lir. 20. Vado, e compro detta mercantia, e trouo che costa più di quello, che nell'animo mi proposi, e costa tanto più, che mi manca lir. 6. a far l'intero pagamento. Laonde chiara cosa è, che quella tal mercantia costa lir. 26. più che io non pensaua, perche non solamente non m'auanza le lir. 20. ma me ne manca 6. adunque mi resta lir. 26. men di quello, ch'io pensaua, e perciò in questa nostra prima positione diranno essi, per 18. men 26. Hor per la seconda positione, poni che compri braccia 22. di perpignano, e braccia 8. di rascia, che a lir. 5. il braccio del perpignano varrà lir. 110. e la rascia varrà lir. 64. per la qual tu vedi, che il perpignano costerebbe lir. 242. più della rascia, e noi vorremmo che costasse lir. 20. più, adunque ci viene lir. 26. più del douere, e perciò dirai per 22. più 26.

Hor procedi seconda la regola del più, e del meno, sommando 26. più, con 26. meno, cioè gli errori, fanno 52. e questo salua per partitore nel resto dell'operatione, e trouarai, che compri braccia 20. di perpignano, e 10. braccia di rascia, fanno proua, trouarai che la rascia varrà lir. 80. & il perpignano lir. 100. che vale appunto lir. 20. più della rascia.

Se il debito è meno di 8. men 2. 6.

Se il debito è più di 8. più 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

Se il debito è di 8. Per 12. 2. più di 2. 6.

HOr soluiua per quest'altro modo, somma insieme le valute del braccio del perpignano, e della rascia, cioè 8. e 5. fanno 13. e poi moltiplica 8. via 30. fa 240. & a questo aggiungi lir. 20. che vuol che costi più tutto il perpignano, faranno lir. 260. e questo parti per 13. ne vien 20. come di sopra, per la quantità del braccio del perpignano. E se la proposta hauesse detto, che il costo della rascia fusse stato più lir. 20. del costo del perpignano, allora si doueua trarre lir. 20. di lir. 240. e farla costato lir. 220. il qual partito per 13. ne viene 16. $\frac{4}{13}$. e tanto braccia di perpignano comprarebbe, & il resto per fino in 30. che v'è 13. $\frac{4}{13}$. farebbono le braccia della rascia.

Propositione 31.

VN. soldato vuol comprare vn Archibuso, e domanda all'artefice padron di esso quanto vale, e l'artefice gli risponde valer tanto, che a moltiplicare i ducati dell'Archibuso in se medesimi, e di detta moltiplicatione trarne il moltiplicato in se medesimo de' denari, che si troua il soldato, restarebbe 50. appunto, e tra la valuta dell'Archibuso, & i denari che haueua il soldato, farebbono apito duc. 10. si domanda quanto valeua l'Archibuso, e quanti denari haueua il soldato.

Questa Propositione non vuol dir altro che così: Fannoi di 10. due parti, che il quadrato della minore, tratto dal quadrato della maggiore resti 50.

Hor poni, che l'Archibuso vallessi duc. 8. il soldato di necessità conueni che habbia duc. 2. a voler che fra anbedue faccino duc. 10. moltiplica 2. in se 4. dipoi a moltiplica 8. in se, fa 64. del qual cauane 4. resta 60. e noi voleuamo che

C c

re stasse

restasse 50. adunque ci vien più 10. di quel che voleuamo, e perciò dirai. Per 8. più 10. Poni hora che l' Archibuso valesse duc. 7. adunque il soldato haurà duc. 3. multipl. 3. in se fa 9. dipoi multipl. 7. in se fa 49. del qual trattone 9. resta 40. e noi voleuamo che restasse 50. per ilche ci vien 10. meno di quel che voleuamo, e perciò dirai, per 7. men 10. fatto questo opera secondo la regola del più, e meno, trouerai che ne verrà 7. $\frac{1}{2}$. e tanti ducati diremo che valesse l' Archibuso, & il soldato haueua ducati 2. $\frac{1}{2}$. fanne proua, &c.

Hor soluila in quest' altro modo, raddoppia 10. cioè 1. ducati che vale l' Archibuso, & i denari che si troua il soldato, fa 20. e questo salua per tuo partitore, dipoi multiplica i detti duc. 10. in se medesimi fanno 100. & a questa moltiplicazione aggiungi quel 50. che vuol che resti, fa 150. il qual parti per 20. che saluasti, ne vien 7. $\frac{1}{2}$. come di sopra; e volcado trouar prima, quanti ducati haueua il soldato, c'ha quel 50. del sopradetto 100. resta 50. partilo per 20. del sopradetto, ne viene 2. $\frac{1}{2}$. e tanti ducati haueua il soldato.

Proposizione 32.

VNo ha' compro libbre 4. di carne di porco, e libbre 6. di carne di castrato, e libb. 5. di vitella, e la libb. d. l. castrato gli costò 4. quattrini più, che la libb. del porco, e la libb. della vitella gli costò 5. quattrini più che la libb. del castrato, & intutto spese lire 3. si domanda quanto gli costò la libbra di ciascuna forte.

Perche i prezzi delle sopradette carni si superano l'vn l'altro di quattrini, perciò riduci a quattrini le lir. 3. faranno quattrini 180. Hor bisogna trouar 3. numeri, che multiplicato il primo via 4. il secondo via 6. & il terzo via 5. & i loro prodotti sommati insieme faccino 180. e per trouarli farai così.

Poni che la libb. del porco costi 12. quattrini, di necessità, la libb. del castrato costerà 4. quattrini più, cioè 16. quattrini, e la libb. della vitella a costerà quattrini 21. & a questi prezzi, le sopradette libbre varranno in tutto quattrini 249. e noi voleuamo che costassero quattrini 180. di maniera che ci viene più 69. quattrini di quel che doueua, e perciò dirai. Per 12. più 69. Poni hora che la libb. del porco gli costi 9. quattrini, adunque la libb. del castrato gli costerà 13. quattrini, e la libb. della vitella 18. quattrini, che a detti prezzi, tutte le sopradette libbre costerebbono 204. quattrini, e noi ne voleuamo 180. per ilche ci vien 24. quattrini più di quel che voleuamo. E perciò dirai. Per 9. più 24. Fatto questo, osserua la regola del più, e più, trouerai che la libb. del porco li costò quattrini 7. $\frac{2}{3}$. e la libb. del castrato, quattrini 11. $\frac{2}{3}$. e la libb. della vitella quattrini 16. $\frac{2}{3}$. che a detti prezzi tutte le sopradette libbre costeranno quattrini 180. come voleuamo.

Per 12. più 69.

Per 9. più 24.

4 5. partitore.

Proposizione 33.

DVe hanno denari, & il primo compra bracc. 15. di panno, & auanzali lir. 18. e l'altro ne compra bracc. 20. al medesimo prezzo, e resta debitor di lir. 30. domando

domando quante lire fu pagato il panno, e quante lire hauea ciafeuno. Questa propositione non vuol dir altro se non così. Troua vn numero, che tanto faccia multiplicato via 15. & al prodotto aggiuntoui 18. quanto multiplicato via 20. e trattone 30. opera per le false positioni come ti piace; ma solui la per quest' altro modo molto più breue, caua 15. braccia che ne vuol comprare il primo di 20. braccia che ne vuol comprare il secondo. Resta 5. per tuo partitore, dipoi somma insieme lir. 18. che auanza al primo con lir. 30. che manca al secondo, fanno lir. 48. perciò che la regola vuole che più, e meno s'aggiunga in questi casi; dipoi parti 48. per 5. ne vien 9. $\frac{7}{5}$. e tate lire diremo che fu pagato il braccio. Fane proua.

Propositione 34.

DVe vinaiuoli caricano vn Nauicello di Vino, & il primo ve ne mette 18. barili, & il secondo ve ne mette 30. barili, e giunti al fin del loro viaggio, ciaschun di loro dette al Padron del Nauicello vn Baril di Vino che lo vendesse, e si pagasse di tutto quello ch'haueua hauere di Nolo, e così fece, & a quello di 18. barili, gli rese lir. 10. & a quello di 30. barili gli rese lir. 6. domando quanto pagarono di nolo per barile, e quanto fu venduto il barile. Opera dicendo così. Troua vn numero che tanto faccia multiplicato via 18. giuntoui 10. quanto multiplicato via 30. giuntoui 6. opera per le false positioni come ti piace, ma solui la in questo modo molto più breue; caua 18. barili (che ne carica il primo) di 30. barili che ne carica il secondo; resta 12. per tuo partitore, dipoi caua lire 6. che rende al secondo di lir. 10. che rende al primo restano lir. 4. le quali partirai per 12. che si luastì ne viene $\frac{1}{3}$. & vn terzo di lira si pagò di nolo per barile; e se la proposta hauesse detto, che il Padrone del Nauicello hauesse reso al primo lir. 10. & il secondo hauesse hauuto a rifare al nauicellaio lir. 6. bisognaua sommare insieme lir. 10. con lir. 6. perciò che la regola del più, e meno vuol s'aggiunga. Hor per saper quante lire fu venduto il barile multipl. $\frac{1}{3}$. via 18. fa 6. aggiungi lir. 10. che rende al primo fanno lir. 16. et ante lire valse il barile. Opera per il secondo multipl. $\frac{1}{3}$. via 30. fa 10. aggiungi lir. 6. che gli rede, fano lir. 16. ergo, la proua torna.

Propositione 35.

VNo ha eompro $\frac{1}{2}$. d'vn braccio di velluto per lir. 6. e più $\frac{1}{2}$. di quel che valse il braccio, si domanda quanto si vendeua il braccio del detto velluto. Questa non vuol dir altro, se non così. Troua vn numero che li $\frac{1}{2}$. di detto num. sia quanto $\frac{1}{2}$. di detto num. più 6. poni che il braccio di detto velluto valse lir. 12. adunque li $\frac{1}{2}$. varranno lir. 9. ma lui dice che gli da $\frac{1}{2}$. di quel che vale vn braccio cioè $\frac{1}{2}$. di lir. 12. che è 4. e lir. 6. più, che in tutto li viene a dare lir. 10. adunque questa nostra prima positione ci da d'errore men' 1. di quel che voleuamo, perche li $\frac{1}{2}$. varrebbero lir. 9. e lui gli da lir. 10. e perciò dirai per 12. men' 1. Poni hora che il braccio valse lir. 15. adunque li $\frac{1}{2}$. varranno lir. 11. $\frac{1}{2}$. e lui gli dette lir. 6. più $\frac{1}{2}$. di quel che valse il braccio, cioè $\frac{1}{2}$. di 15. che è 5. che in tutto gli da lir. 11. perche questa seconda positione ci da d'errore più $\frac{1}{2}$. perciò che li $\frac{1}{2}$. vagliono lire 11. $\frac{1}{2}$. e lui gli da lire 11. e perciò dirai. Per 15. più $\frac{1}{2}$. fatto questo aggiungi il primo errore con il secondo, farà 1. $\frac{1}{2}$. qual farà tuo partitore; dipoi multiplica in croce gli errori via le positioni, & i prodotti sommal insieme

ne, fanno 18. il qual partito per $1\frac{1}{2}$. ne vien 14. $\frac{2}{3}$. e tante lire. valse il braccio del velluto, e li $\frac{1}{2}$. trouerai che varranno lir. 14. $\frac{2}{3}$. e perche tu veda, che dandosi lir. 6. e più $\frac{1}{2}$. di quel che valse il braccio, gli viene a dare vguale alla valuta de' $\frac{1}{2}$. perciò piglia il $\frac{1}{2}$. di lir. 14. $\frac{2}{3}$. ne viene lir. 4. $\frac{1}{3}$. per la valuta d' $\frac{1}{2}$. d'vn braccio, alle quali aggiungi lir. 6. faranno lir. 10. $\frac{2}{3}$. che è quanto ci occorreu dimostrar per proue di questa proposta.

per	1	2	men	1.
			$\times$	
per	1	5	Più	$\frac{1}{2}$.
			2	$\frac{1}{2}$. partitore.

Proposizione 36.

DVe hanno à partire duc. 120. fra loro vgualmente, che ne viene per ciascuno duc. 60. accade che nel partirli si corruciano insieme, & à refuso ogn' vn di loro piglia de' detti ducati più che può, e quindi a poco pacificati, e quieti, vn volendo alcuno di loro diuiare dalla ragione, s'accordarono in questo modo, che il primo metta giù la metà di quelli che tolse, e l'altro metta giù il $\frac{1}{2}$. di ciò che prese, e così fu fatto, e quel che fu posto giù fu diuiso in due parti vguali, e ciascuno prese la sua, & ogn' vn di loro si trouò hauer duc. 60. si com' è di ragione se li perueniu, si domanda quanti ducati tolse ciascuno di loro.

Questa proposizione non vuol dir altro senon così. Fammi di 120. due parti, che dalla maggiore trattone la sua metà, e della minore trattone il quarto, & aggiunte insieme queste due parti, cioè la metà dell'vna, & il $\frac{1}{4}$. dell'altra, e questa agguintione diuisa per metà, e queste metà giunte sopra i rimanenti de' detti tratti faccino 60. per ciascuna parte.

Poni che il primo togliessi duc. 72. adunque il secondo tolse duc. 48. per veder se la verità, ne faremo la proua in questo modo; fa che il primo metta giù la metà di 72. che è 36. e 36. gli resterà; & il secondo fa che metta giù il $\frac{1}{2}$. di 48. ch'è 24. e 24. gli resterà, hor somma insieme quel che metton giù, cioè 36. e 24. fanno 60. e questo bisogna diuidere in due parti vguali, che ciascuna farà 30. e perche al primo restò duc. 36. aggiungi duc. 24. che gli tocca di quel che fu posto giù, faranno duc. 60. e perche al secondo restò duc. 36. aggiungi duc. 24. che gli tocca di quel che fu posto giù, faranno duc. 60. come di ragione gli douea toccare, di maniera che non fa più bisogno far altre positioni, poiche per la prima habbiamo hauuto il desiderio nostro; e di ciò non ti ammirare, percioche spesso volte accade che per la prima positione si troua la verità di quel che si cerca.

Hor sia che per la prima positione, tu non haueffi trouato la verità, e poniamo che al primo togliessi duc. 68. adunque il secondo tolse duc. 52. e perche s'accordano che il primo metta giù la metà, dunque metterà la metà di 68. ch'è 34. e 34. gli resterà, e perche il secondo ponuiene che ponga giù il $\frac{1}{2}$. di 52. adunque metterà giù 26. e gli resterà 26. hor somma insieme 34. che mette giù il primo con 26. che mette giù il secondo, fanno 60. e questo bisogna diuidere per metà, che ne viene 30. il qual aggiungi a quel che restò al primo cioè a 34. farà 64. e noi voleuamo che facesse 60. perche tu veda che ci vien 2. $\frac{1}{2}$. men della verità, però di-
rai.

rai. Per 68. mē 2. $\frac{1}{2}$. Poni hor per la secōda positione, che il primo togliessē duc. 80. di necessitā, il secondo ne tolse 40. e perche il primo pose giu la metà di 80. cioè 40. e 40. gli resta, & il secondo pose giu il $\frac{1}{2}$. di 40. che è 20. e 30. gli resta & il secondo pose giu il $\frac{1}{4}$. di 40. che è 10. e 30. gli resta; però somma insieme quel che pongon giu, cioè 40. e 10. fa 50. li quali si diuidono per metà, che ne tocca 25. per vno, i quali aggiunti a duc. 40. che restò al primo fanno duc. 65. e noi voleuamo, che facesser duc. 60. laonde per questa seconda positione ci vien d'errore 5. più della verità, e perciò dirai, per 80. più 5. segui la regola del meno, e più, sommando più 5. con meno 2. $\frac{1}{2}$. fa 7. $\frac{1}{2}$. per tuo partitore, fatto questo, multipl. in croce gli errori via le positioni, & i prodotti sommati insieme, faranno 540. il quale partirai per 7. $\frac{1}{2}$. ne vien 72. e tanti ducati tolse il primo, & il resto fino in 120. che v'è 48. tolse il secondo.

Ma volendo con questa regola trouar quanto tolse il secondo, fa così. Tu ponesti nella prima positione, che il primo togliessē 68. & il secondo 52. poni adunque 68. e di sotto poni 52. e perche questa positione ci da d'errore 2. $\frac{1}{2}$. però poni 2. $\frac{1}{2}$. sotto al detto 52. come di sotto vedi.

Dipoi nella seconda positione, tu ponesti che il primo togliessē 80. sotto del quale poni 40. e he tolse il secondo, e sotto il detto 40. poni l'errore che ne segue, cioè più 5. fatto questo somma gli errori insieme, cioè men 2. $\frac{1}{2}$. con più 5. fanno 7. $\frac{1}{2}$. per tuo partitore, dipoi multipl. in croce gli errori via le positioni, cioè 2. $\frac{1}{2}$. via 80. fa 200. e 5. via 68. fa 340. il qual'aggiunto con 200. fa 540. e questo partito per 7. $\frac{1}{2}$. ne vien 72. per la quantità de' denari che tolse il primo: e volendo sapere i denari che tolse il secondo, multipl. 2. $\frac{1}{2}$. che è il primo errore, via 40. che ponemmo togliessē il secondo la seconda volta, fa 100. dipoi multipl. 5. che è il secondo errore via 52. che ponemmo togliessē il secondo la prima volta, fa 260. il qual aggiunto con 100. fa 360. e questo partito per 7. $\frac{1}{2}$. ne vien 48. per la quantità de' denari che tolse il secondo, e volendola meno intrigata, dirai così, per 52. men 2. $\frac{1}{2}$. e per 40. più 5. segui la regola, haurai, che il secondo tolse 48. come di sotto vedi.

Per 68. men 2. $\frac{1}{2}$.	Per 68.	Per 80	Per 52 men 2. $\frac{1}{2}$.
~~Per 80. più 5.~~	~~52~~	~~40~~	~~Per 40 più 5~~
partitore 7. $\frac{1}{2}$.	men	più	
	2. $\frac{1}{2}$	7. $\frac{1}{2}$ partitore.	

HOr solui la per quest'altro modo molto bello, e breue. Considera prima, che se quel che metton giu si diuide per metà, & ogn'vn di loro ne piglia la parte sua, e l'aggiunge con quelli che gli resta in mano, e si trouano tanti ducati l'vno, quanti l'altro, è di necessitā, che quando ogn'vno ha posto giu quella parte di che furon d'accordo, che a ciascuno resti in mano tanto all'vno, quanto all'altro, poiche se a cose vguali s'aggiuge parte vguale, le lor somme farāno vguali.

Hor poni, che ciascun di loro resti con ducati 12. doppo che hanno posto giu quelle parti di che furon d'accordo, e se al primo restassē 12. hauendo posto giu la metà di quanto prese, chiara cosa è che hauerebbe preso 24. e se al secōdo (poi che hauesse posto giu il $\frac{1}{4}$. di quel che prese) gli restassē parimēte 12. chiara cosa

è che li 12. ducati che gli restasse, farebbono li $\frac{1}{2}$. di tutti quelli che prese, a dunque tutt' i ducati che prese furon 16. e se il primo hauesse preso 24. & il secondo 16. fra tutti due hauerebbono preso 40. e noi habbiamo detto che presero 120. per ciò dirai così, se 40. fusse 120. che farebbe 24. e che 16? opera trouarai, che 24. farebbe 72. se tanti ducati prese il primo, e 16. farebbe 48. e tanti ducati diremo che pigliasse il secondo.

Proposizione 37.

DVe compagni caricano vn nauicello di vino, & il primo ve ne messe 25. barili, e l'altro 36. e quel di 25. pagò di nolo vn barile, e soldi 20. e quel di 36. dette al padrone del nauicello 2. barili di vino per il nolo che doueua, e lui gli rese indietro soldi 40. si domanda quanto valse il barile del vino, e quanto si pagò di nolo per barile.

Fa così, poni che il barile valesse soldi 80. adunque il primo pagandone vn barile, e soldi 20. più vien'a pagare in tutto soldi 100. i quali partirai per 25. ne vien 4. e tanti soldi verrebbe a pagare per barile il primo; ma voltiamoci hora al secondo compagno, il quale ve n'ha 36. barili che alla medesima ragione del primo, cioè a sol. 4. per barile, douerebbe pagare in tutto sol. 144. ma dice, che paga 2. barili men soldi 40. i quali a soldi 80. il barile vagliono soldi 160. cauaue sol. 40. che il barcarolo gli rende indietro, restano soldi 120. e lui douerebbe pagare soldi 144. adunque pagarebbe soldi 24. men di quel che doueua, e perciò dirai per 80. men 24. Dipoi per la seconda positione, poni che il barile valesse sol. 100. adunque il primo dando vn barile, e soldi 20. più, verrebbe a dare in tutto soldi 120. i quali partirai per 25. ne vien soldi 4. $\frac{2}{5}$. e tanto verrebbe a pagare di nolo per barile il primo.

Ma voltiamoci al secondo, il qual paga 2. barili, men soldi 40. che sono in tutto soldi 160. & a soldi 4. $\frac{2}{5}$. per barile alla ragione del primo, di 36. barili, douerebbe pagare soldi 172. $\frac{2}{5}$. e noi diciamo che paga soldi 160. adunque paga soldi 12. $\frac{2}{5}$. men di quel che doueua, e perciò dirai per 100. men 12. $\frac{2}{5}$. fatto questo, segui la regola del meno, e meno, trahi il secondo errore del primo, cioè 12. $\frac{2}{5}$. di 24. resta 11. $\frac{2}{5}$. per tuo partitore, dipoi multiplica in croce gli errori per le positioni, e del maggior prodotto cauaue il minore, restará 1376. che partito per 11. $\frac{2}{5}$. ne viene 122. $\frac{2}{5}$. e tanti soldi valse il barile, e per sapere quanto si pagò di nolo per barile, tu sai che il primo ne dà vn barile più soldi 20. che in tutto sono soldi 142. $\frac{2}{5}$. e questi partirai per 25. ne viene soldi 5. $\frac{2}{5}$. e tanto concluderemo, che pagasse di nolo per barile, fanno proua, con il secondo compagno, il qual carica 36. barili di vino, che pagando soldi 5. $\frac{2}{5}$. di nolo per barile, pagarebbe in tutto soldi 209. $\frac{2}{5}$. e lui dice che gli dà 2. barili di vino, i quali vagliono (a sol. 122. $\frac{2}{5}$. il barile) soldi 244. $\frac{2}{5}$. e perche il nauicellaio li rende indietro soldi 40. caua soldi 40. di soldi 244. $\frac{2}{5}$. restano soldi 209. $\frac{2}{5}$. che sono vguale al pagamento, che si fa di soldi 5. $\frac{2}{5}$. per barile, che è quanto ci occorreua dimostrare.

Per 80. meno 24.

Per 100. meno 12. $\frac{2}{5}$.

11. $\frac{2}{5}$. partitore.

Proposizio-

Proposizione 38.

Baccia 6. di Rascia, e braccia 8. di perpignano valsero lire 88. & a quel prezzo braccia 10. di Rascia, e braccia 16. di perpignano valsero lire 160. si domanda quanto valse il braccio di ciascuna sorte.

Questa proposizione non vuol dir altro se non così. Trova due numeri, che moltiplicato il primo via 6. & il secondo via 8. e questi due prodotti giunti insieme facciano 88. & ancora moltiplicato il primo via 10. & il secondo via 16. e queste moltiplicationi sommate insieme facciano 160. si domanda quali sono i numeri. Fa così; il numero, che si moltiplicherà via 6. poni che sia 2. cioè il braccio della rascia, poni che naglia lir. 2. le 6. braccia uarranno lir. 12. che tratte di lir. 88. restano lir. 76. per la valuta di braccia 8. di perpignano, adunque il braccio uarrebbe lir. $9\frac{1}{2}$. e questo è la verità, quanto alla prima positione; ma resta da vedere se si concorda con la seconda, troua hora la valuta di braccia 10. di rascia che a lire 2. il braccio varranno lir. 20. e brac. 16. di perpignano a lir. $9\frac{1}{2}$. il braccio varranno lir. 152. che giunte insieme queste due valute, cioè lir. 20. e lir. 152. fanno lir. 172. e noi proponemmo che la lor valuta fusse lir. 160. adunque questa prima positione ci dà d'errore 12. più di quel che doueua, e perciò dirai per 2. più 12. Hor per la seconda positione, poni che il braccio della rascia ualesse lire 3. adunque le 6. braccia varrebbero lir. 18. che tratte di lir. 88. restano lir. 70. per la valuta di bracc. 8. di perpignano, adunque il braccio varrebbe lir. $8\frac{1}{2}$. stante questo nostro operare, hor vediamo se concorda con la seconda.

Troua la valuta di bracc. 10. di rascia a lir. 3. il braccio, la qual varrà lir. 30. di poi valuta bracc. 16. di perpignano a lir. $8\frac{1}{2}$. il braccio, il qual varrà lir. 140. che giunte insieme queste due valute, cioè lir. 30. e lir. 140. fanno lir. 170. e noi proponemmo che la lor valuta fusse lir. 160. adunque questa seconda positione ci dà d'errore più 10. che non doueua, e però dirai per 3. più 10. segui la regola, caua più 10. da più 12. resta 2. per tuo partitore, di poi multipl. in croce gli errori via le positioni, e del maggior prodotto caua il minore, resta 16. che partito per 2. che saluasti, ne vien 8. e lir. 8. diremo che ualesse il braccio della rascia, che a tal prezzo le bracc. 6. varranno lir. 48. e da lir. 48. per fino in lir. 80. v'è lir. 40. quali faranno la valuta di braccia 8. di perpignano, parti lire 40. per 8. ne vien 5. e lire 5. ualse il braccio del perpignano; Per 2. Ma concordiamo hora con la seconda compra, tu vedi che bracc. 10. di rascia, a lir. 8. il braccio varranno lir. 80. e brac. 16. di perpignano a lir. $8\frac{1}{2}$. il braccio varranno lir. 80. che congiunte queste due valute insieme fanno lire 160. come voleuamo.



Hor soluila per quest'altro modo, parti bracc. 8. di perpignano per bracc. 6. di rascia, ne vien $1\frac{1}{2}$. il qual multipl. via bracc. 10. di rascia, che si propone per la seconda valuta, fa $13\frac{1}{2}$. e questo trahi di 16. resta $2\frac{1}{2}$. qual salua per partitore, di poi

poi parti lir.88. per le 6. bracc. di rascia, ne viene $14\frac{2}{3}$. e questo multipl. via 10. fa 146. $\frac{2}{3}$. il qual caua di lir. 160. resta $12\frac{2}{3}$. e questo parti per $2\frac{2}{3}$. che saluasti, ne vien 5. et ante lire ualse il braccio del perpignano, e per uedere quel che ualse il braccio della rascia, caua la ualuta di bracc.8. di perpignano, cioè lir.40. di lir. 88. restano lir.48. e questo parti per le bracc.6. di rascia, ne uien lir.8. per la ualuta della rascia. Sappi che in simili casi, ti potria esser proposta la cōclusion e in eō, trario, laonde ti aggiraresti in grandissimo bosco senza mai trouar la uia, si come dicessē bracc.8. di perpignano, e bracc.6. di rascia uagliano lir.88. & a quel prezzo bracc.16. di perpignano, e bracc.10. di rascia uagliano lire 160. si domanda quanto ualse il braccio da per se.

Fà così, parti sempre la seconda quantità di braccia, che si propone, per prima quantità; hor parti 6. ch'è la seconda quantità, per 8. ne vien $\frac{1}{2}$. e questo multipl. via 16. fa 12. il qual 12. caualo di 10. secondo l'ordine, che di sopra habbiamo dimoſtrato, ma quando non si può trarre, trahi il minore del maggiore, cioè 10. di 12. resta 2. per tuo partitore, e quādo ti accadesse in questo primo sottrarre, che i numeri fussero vguali, e che restasse nulla, habbi per certo, tal proposta non si poter soluere. Dipoi parti 88. per 8. ne vien 11. il qual multipl. vi a 16. fa 176. e questo donaresti trarre di 160. ma perche nō si può trarre, trahi 160. di 176. resta 16. il qual parti per 2. che saluasti ne vien 8. per la ualuta del braccio della rascia, & il perpignano ualse lir.5. come di sopra.

Proposizione 39.

LE 5. pere più 5. denari, vaglion tanto più di soldi vno, quanto le 16. pere men 30. denari. vaglion meno di soldi vno, si domanda quanto ualse vna pera. Questa proposizione non vuol dir altro se non così. Cinque pere vaglion tanto più di 7. denari, quanto le 16. pere vaglion men di 42. denari; & in altro modo può dir così. Troua vn numero, che multiplicato via 5. e della multiplicatione restane 7. & il rimanente saluato, e di nouo multiplicato il medesimo num. via 16. & il prodotto tratto di 42. il rimanente sia vguale al primo rimanente. Poni che il numero da multiplicarsi via 5. sia 2. multipl. 2. via 5. fa 10. cauaue 7. resta 3. e questo salua, dipoi multipl. il detto 2. via 16. fa 32. che tratto di 42. resta 10. e noi voleuamo che restasse 3. adunque resta 7. più di quel che voleuamo: però dirai per 2. più 7. Dipoi per la seconda positione, poni che il num. comune sia $2\frac{1}{2}$. multipl. $2\frac{1}{2}$. fa $12\frac{1}{2}$. cauaue 7. resta $5\frac{1}{2}$. e questo salua; dipoi multipl. il detto $2\frac{1}{2}$. via 16. fa 40. che tratto di 42. resta 2. e noi voleuamo che restasse $5\frac{1}{2}$. adunque il resta $3\frac{1}{2}$. men di quel che voleuamo, però dirai; per $2\frac{1}{2}$. men $3\frac{1}{2}$. segui la regola, sommando più 7. con men $3\frac{1}{2}$. fa $10\frac{1}{2}$. per tuo partitore, dipoi multipl. in croce gli errori via le positioni, & i prodotti somma insieme, fanno $24\frac{1}{2}$. il qual partito per $10\frac{1}{2}$. ne viene $2\frac{1}{2}$. et anti denari ualse vna pera.

Hor voltiamoci a soluere la ragione, secondo la prima proposta, e poni che vna pera ualesse 3. denari, adunque le 5. pere più 5. denari, varrebbero 20. denari, che vengono a esser 8. denari più d'un soldo; adunque secondo la nostra propositione, le 16. pere men 30. denari deuon valer 8. denari men d'un soldo, cioè 4. den.

Hora vediamo se è così la verità, multiplica 3. denari via 16. pere, fa 48. che restane 30. denari, resta 18. e noi voleuamo che restasse 4. adunque per questa nostra prima positione ci viene d'errore più 14. denari, e così per 3. più 14.

Dipoi

Dipoi per la seconda positione, poni, che vna pera valesse 2. denari, adunque le 5. pere, più 5. denari varrebbero 15. denari, che vengono a valere 3. denari più d'un soldo, e perciò le 16. pere, men 30. denari douerebbono valere 3. denari men d'un soldo, cioè 9. denari.

Hora vediamo se vagliono 9. denari, multiplica 2. denari via 16. pere, fa 32. cauaue 30. denari, resta 2. e tanti denari varrebbero le 16. pere men 30. denari, e noi voleuamo che valessero 9. denari, adunque per questa seconda positione, ci vien d'errore men 7. denari di quel che voleuamo, e perciò dirai per 2. meno 7. segui la regola del più, e meno, trouerai che vna pera valse denari $2\frac{1}{7}$.

Per 3. più 14.

Per 2. men 7.

2 1. partitore.

HOr soluiſi per queſt'altro modo; ſomma le 5. pere con le 16. pere, fanno 21. e queſto ſalua per partitore, dipoi caua più 5. denari di ſoldi 1. reſta 7. denari, dipoi ſomma 30. denari con vn ſoldo, fanno 42. denari, & a queſti aggiungi li 7. denari, che di ſopra ti reſtò, fanno denari 49. il qual parti per 21. che ſaluaſti, ne viene $2\frac{1}{3}$. per la valuta d'vna pera.

Propoſitione 40.

VNo ha venduto vna quantità di pere, in tal modo, che ſe n'haueſſe date men 3. al bolognino che non fece, hauerebbe toccato 12. bolognini più che non fece, e tante pere, quante diede al bolognino, tanti bolognini ſi trouò, doppo che hebbe vendute le dette pere, ſi domàda quante pere vendè, equanti bolognini toccò.

Queſta non vuol dir'altro, ſe non trouarmi vn numero, che la ſua radice multiplicata via 3. vien di detta radice, faccia 12. più della radice del detto numero.

Perche nel principio di queſto noſtro trattato delle due falſe positioni, ſi diſſe, che tutte quelle propoſitioni, che ſi portan con loro quadrature, ò vero radici irrationali, per tal regola non eſſer ſolubili, perciò non ci affaticheremo al preſente a dimoſtrar come queſta propoſta ſi poſſa per tal regola ſoluere, ancorche la conſeſione di detta propoſitione termini in numero rationale, ma la ſoluzione di eſſa la dimoſtreremo per via di conſeſione.

Ho, ſa coſi, multiplica ſempre quelle pere, che deſſe meno al bolognino, via quei bolognini, fa 36. il qual ſalua, dipoi caua quelle 3. pere, (che deſſe meno al bolognino) di 12. bolognini, che toccherebbe di più, reſta 9. e per 9. conuiene che tu porti 36. che ſaluaſti, ne vien 4. e tante pere dette al bolognino, e perche la propoſta dice, che tante pere, quante diede al bolognino, tanti bolognini toccò, adunque toccò 4. bolognini, e perciò le pere che vendè, diremo che fuſſero 16. hauendone date 4. al bolognino, ma perche dice che ſi haueſſe dato 3. pere meno al bolognino, che non fece, hauerebbe toccato 12. bolognini più che non fece, cioè ſe haueſſe dato vna pera al bolognino, hauerebbe toccato 16. bolognini, e lui toccò 4. bolognini, adunque ſe haueſſe dato vna pera al bolognino, hauerebbe toccato 16. bolognini, i quali ſarebbono apunto 12. bolognini più di quelli che toccò.

Proſe.

Proposizione 41.

DVe compagni andando per viaggio, giunsero a Liorno, e volendo andare a Genoua noleggiarono vna Barca per lire 12. dando libertà al Padrone di essa, che possa leuare altri passeggeri, ma con patto, che voglion la metà di tutto quel che guadagnerà, accadde, che lui leuò 3. altri passeggeri, con conditione che siano al bene, & al male che staranno i due primi, e così fuyon d'accordo, si domanda giunti che faranno in Genoua, quanto douerà pagare ciascuno di loro. Fa così, poni che ciascun di loro pagasse lire 2. adunque li due primi pagherebbono lir. 4. e gl'altri tre, pagherebbono lire 6. delle quali ne toccherebbe la metà cioè lir. 3. alli due primi, che sommate con li 4. che pagano, fanno lire 7. e noi vorremmo lir. 12. per il che tu vedi, che ci vien d'errore lir. 5. meno di quel che desiderauano, e perciò dirai per 2. men 5. Hor per la seconda positione, poni che ciascuno pagasse lir. 3. adunque li due primi pagherebbono lir. 6. e gl'altri 3. pagherebbono lir. 9. delle quali, ne toccherebbe lir. 4. $\frac{1}{2}$. a i primi due, che sommate con lir. 6. che pagano lor medesimi, fanno lire 10. $\frac{1}{2}$. e noi voleuamo lire 12. adunque ci viene lir. 1. $\frac{1}{2}$. men del douere, e perciò dirai, per 3. men 1. $\frac{1}{2}$. segui la regola trahendo il minor errore del maggiore, resta 3. $\frac{1}{2}$. per tuo partitore, dipoi multiplica in croce gli errori via le positioni, e del maggior prodotto cauane il minore, resta 12. il qual partito per 3. $\frac{1}{2}$. ne viene 3. $\frac{1}{2}$. e tante lire diremo che pagasse ciascuno, fanne proua.

per 2. men. 5.

×

per 3. men. 1. $\frac{1}{2}$.

3. $\frac{1}{2}$. per partitore.

Hor soluila per quest'altro modo, cioè per la regola del primo apponere. Poni che ciascun pagasse lir. 3. adunque li due primi pagherebbono lir. 6. e gl'altri tre pagherebbono lir. 9. delle quali dandone la metà, cioè lir. 4. $\frac{1}{2}$. alli due primi, faranno lir. 10. $\frac{1}{2}$. e noi vorremmo 12. laonde dirai così, se lir. 10. $\frac{1}{2}$. vengono da lir. 3. ch'io m'apposi, da che verranno lire 12? multiplica 12. via 3. fa 36. parti per 10. $\frac{1}{2}$. ne viene 3. $\frac{1}{2}$. e tante lire pagò ciascuno.

Proposizione 42.

DVe hanno fatto compagnia, e fra tutte due messero vna quantità di ducati, & il primo di essi, di detto capitale ne messe la metà più 3. & il secondo ne messe il $\frac{1}{2}$. più 4. & hanno guadagnato duc. 60. domando quanti ne toccherà per vno. Questa propositione non vuol dir altro se non così. Troua vn numero che prefone la metà più 3. & il $\frac{1}{2}$. più 4. e queste due parti giunte insieme, facciano il medesimo numero. Poni che sia tutti due mettersero duc. 36. adunque il primo mettendo del capitale la metà più 3. verrà a mettere 21. & il secondo mettendo il $\frac{1}{2}$. più 4. verrà a metter 16. che fra tutte due metterebbono 37. e noi voleuamo 36. Laonde per questa prima positione, ci viene più 1. della verità, e perciò dirai,

per

per 36. ch'io m'apposi, più 1. Hor per la seconda positione, poni che fra tutti due mettesse duc. 42. adunque il primo ne metterebbe la metà più 3. cioè 24. & il secondo ne metterebbe il $\frac{1}{2}$. più 4. cioè 18. che fra tutti due metterebbono 42. per la qual cosa non accade in questa proceder più oltre, poiche per questa seconda positione hauiano trouato il numero che cercauamo, e così concluderemo, che il primo mettesse duc. 24. & il secondo duc. 18. Fanne proua. E volendo sapere quanti ducati toccherà per vno, opererai come se fusse vna semplice compagnia, dicendo il primo mette 24. & il secondo mette 18. & hanno a partire ducati 60. domandasi quanti ne toccherà per vno, opera trouerai che al primo toccherà ducati 32. $\frac{2}{3}$. & al secondo ducati 25. $\frac{1}{3}$. fatta, &c.

Propositione 43.

TRe hanno denari, e mettonsi a giocare; il primo vince al secondo la metà de' suoi denari, & il secondo vince al terzo il $\frac{1}{2}$. de' suoi denari, & il terzo vince al primo il $\frac{1}{2}$. de' suoi denari, & alla fine del giuoco si trouò ducati 100. si domanda con quanti ducati ciascun di loro si messero a giocare.

Nota che le vincite che fanno s'intendono de' primi capitali. Poni che il primo hauesse duc. 60. de' quali ne viene a perdere il $\frac{1}{2}$. cioè 30. con il terzo compagno, che tratti di 60. restano 45. e da 45. per fino in 100. vi manca 55. adunque il primo vinse al secondo duc. 55. e questi 55. sono la metà de' denari del secondo, adunque il secondo huomo haueua duc. 100. de' quali trattone 55. che ne perde con il primo gli resta duc. 55. e da d. 55. che gli resta per fino in 100. che si troua poi alla fine del giuoco v'è 45. i quali vince al terzo huomo, e perche gli vince il $\frac{1}{2}$. de' suoi denari, adunque duc. 45. sono la terza parte de' denari del terzo huomo, per ilche ne segue che il terzo hauesse duc. 135. de' quali trattone duc. 45. che perde con il secondo, gli resta 90. a i quali aggiungi duc. 15. che vince al primo, fanno duc. 105. e noi voleuamo che il terzo compagno si trouasse ancor lui duc. 100. e stante questa positione si trouerebbe duc. 105. per ilche dirai, per 60. più 5.

Hor per la seconda positione, poni che il primo hauesse duc. 84. de' quali trattone il $\frac{1}{2}$. cioè 21. i quali perde con il terzo huomo, restano duc. 63. che per fino in 100. vi manca 37. e questi conuien che siano la metà de' denari del secondo, adunque di necessità il secondo haueua 74. che trattone 37. che perde con il primo, gli resta duc. 37. e da 37. per fino in 100. v'è 63. i quali viene a vincere al terzo huomo, adunque 63. conuien che sia la terza parte de' denari vel terzo compagno, e se 63. è la terza parte de' suoi denari, ne segue che i suoi tutti saranno duc. 189. de' quali perdendone 63. con il secondo, gli resta duc. 126. & a questi aggiungi duc. 21. che vince al primo, fanno ducati 147. e noi voleuamo, che facesse 100. adunque per questa nostra seconda positione, ci viene 47. più del nostro desiderio; e perciò dirai, per 84. più 47.

Segui la regola, trouerai che il primo hauea duc. 57. $\frac{1}{2}$. il secondo duc. 114. $\frac{2}{3}$. & il terzo duc. 128. $\frac{1}{3}$. fanne proua. Poteuasi proporre più intrigata, come la seguente.

Per 60. più. 5.

Per 84. più. 47.

42.

partitore.

Propositione

Proposizione 44.

TRe hanno denari, e mettonsi a giuoco, & il primo vince al secondo la metà de' suoi denari men' 8. & il secondo vince al terzo, il $\frac{1}{2}$. de' suoi denari più 5. & il terzo vince al primo il $\frac{1}{4}$. de' suoi denari men' 7. & alla fine del giuoco ciascuno si trouò hauere duc. 100. si domanda quanti ducati haueua ciascuno da se, quando si messe a giuoco, auuertendo sempre che le vincite che si fanno, s'intendono de' primi capitali. Hor poni che il primo haueffe duc. 60. de' quali ne perde con il terzo huomo il $\frac{1}{4}$. men' 7. cioè duc. 8. percioche il $\frac{1}{4}$. di 60. è 15. e men' 7. restano 8. per la perdita che fa con il terzo compagno, caua adunque 8. di 60. resta 52. che per fino in 100. vi manca 48. adunque il primo vinse al secondo duc. 48. douendosi trouare alla fin del giuoco duc. 100. e questi duc. 48. sono la metà men' 8. de' denari del secondo, adunque l'intera metà de' detti denari sarà 56. & tutti saranno 112. e tanti ducati haueua il secondo, de' quali ne perde con il primo la metà men' 8. cioè 48. che tratti di 112. restano duc. 64. e lui dice che vince al terzo huomo il $\frac{1}{2}$. de' suoi denari più 5. con la qual vincita haueua duc. 100. e perche da 64. per fino in 100. v'è 36. e però diremo che tanti ne vinca il secondo al terzo, i quali duc. 36. vengono a essere il $\frac{1}{2}$. più 5. de' denari del terzo compagno, adunque l'intera terza parte saranno duc. 31. e tutti i denari del terzo compagno saranno duc. 93. de' quali trattone 36. che ne perde con il secondo, restano duc. 57. e perche si disse che lui vinse al primo il $\frac{1}{4}$. de' suoi denari men' 7. cioè duc. 8. percio aggiungi duc. 8. con duc. 57. fanno duc. 65. e noi voleuamo che si trouasse ducati 100. di maniera che ci vien meno del nostro desiderio ducati 35. e percio diremo. Per 60. men' 35.

Hor per la seconda positione, poni che il primo haueffe ducati 84. de' quali ne perde il $\frac{1}{4}$. men' 7. cioè 14. con il terzo compagno, che tratti d' 84. restano duc. 70. che per fino in 100. v'è 30. e questi conuien che siano la metà men' 8. de' denari del secondo, adunque la metà sarà 38. e tutta la quantità sarà duc. 76. del quale caueua 30. che ne perde con il primo restano duc. 46. e da duc. 46. per fino in 100. v'è 54. e tanti ducati il secondo vince al terzo, la qual vincita viene a essere il $\frac{1}{2}$. più 5. de' denari del terzo compagno, adunque la terza parte saranno ducati 49. perleche diremo, che prima che perdesse coia alcuna haueua ducati 147. de' quali trattone duc. 54. che perde con il secondo, gli resta duc. 93. e tanti ducati rimane al terzo compagno, doppo la perdita, ma perche si disse che vinse al primo il $\frac{1}{4}$. men' 8. de' suoi denari, cioè duc. 14. però aggiungi 14. con 93. fa 107. e noi vorremo che si trouasse duc. 100. Laonde si troua duc. 7. più di quel che voleuamo, e percio diremo. Per 84. più 7. fatto questo, offerua la regola del più, e meno, e trouerai che il primo haueua duc. 80. il secondo duc. 82. & il terzo duc. 118. Fanne proua.

Per 60. men' 35.

Per 84. più 7.

42. partitore.

Proposizione 45.

Centinaia 6. di lino, e centinaia 4. di lana, vaglien ducati. 36. più vn centinaio di lino, & a quel medesimo prezzo, centinaia 9. di lino, e centinaia 7. di lana

Intien e queste due multiplicazioni fanno 600. e così multipli. il d. primo nura. via 2 $\frac{1}{2}$. ch'è la vendita della pecora, & il secondo via 4. ch'è la vendita della capra, & queste due multiplicazioni giunte insieme facino 20. cioè il capitale, e guadagno, si domanda quali sono i numeri. Per esser questa proposizione simile alla sopradetta, e perciò operando nel modo istesso, trouarai che comprò 64. pecore, e 140. capre; fanno proua, riuendendole al prezzo sopradetto, trouarai, che si guadagnerà lire. 120. come si propose.

Per 60. più 30.

Per 70. men 45.

75. partitore.

Proposizione 47.

VNo ha compro vna quantità di staia di grano, per vna quantità di lire, e fa suo conto, che se riuede lo staio lir. 4. guadagna lir. 60. e se lo riuede lir. 6. guadagna lir. 160. si domanda quante staia di grano comprò, e quante lire pagò lo staio. Fa così, poni che comprasse staia 60. di grano, che riuendendo poi lo staio lir. 4. montarebbe lir. 240. nella qual vendita dice che guadagna lir. 60. caua adunque lir. 60. di lir. 240. restano lir. 180. e questo conuien che sia il suo capitale, secondo la nostra posizione. Parti adunque lir. 180. per staia 60. ne vien lir. 3. e tanto gli verrebbe a costar lo staio; ma vediamo hora se concorda con la seconda parte, noi habbiamo che le staia 60. di grano a lir. 6. lo staio, le riunderà lir. 360. & a lui costano lir. 180. adunque vi guadagna lir. 180. e noi habbiamo detto che guadagna lir. 160. perche ci dà d'errore lir. 20. più della verità, e perciò dirai per 60. più 20. Hor per la seconda posizione, poni che comprasse staia 54. di grano, il quale se lo vendesse lir. 4. lo staio, montarebbe lir. 216. delle quali cauandone lir. 60. che dice, che guadagnarebbe, restano lir. 156. e tanto gli costerebbono. Vediamo hora a riunder lo staio lir. 6. quanto riunderà le dette staia 54. trouaremo che le riunderà lir. 324. & a lui habbiamo detto, che costerebbono lir. 156. secondo la nostra posizione, laonde verrebbe a guadagnare lir. 168. e noi habbiamo detto, che guadagnarebbe lir. 160. adunque questa posizione ci dà d'errore lir. 8. più della verità, e perciò dirai per 54. più 8. Segui la regola, trouarai che comprò staia 50. di grano, e pagò lo staio lir. 2 $\frac{2}{5}$. il qual riuendendo lo poi ai prezzi sopradetti, farebbe i sopradetti guadagni.

Per 60. più 20.

Per 54. più 8.

12. partitore.

Hor soluila per quest'altro modo, caua 60. di 160. resta 100. il qual parti per la differenza, ch'è da 4. a 6. cioè per 2. ne vien 50. e tante staia ne comprò, e trouarai che lo staia li costò lir. 2 $\frac{2}{5}$. come di sopra per il primo operare.

Proposizione 48.

VNo ha compro la libbra della seta vna quantità di lire, dipoi l'ha riuduta lir. 3. più, che non gli costò, e fa suo conto, che ha guadagnato a ragione di 16. per cento, si domanda quanto gli costò la libbra. Se considerai bene questa proposta, conoscerai, che tal parte faranno le lir. 3. di quella quantità di lire che

che compra la libbra, qual'è 16. di cento, per cagione che 16. è il guadagno da cento, e 3. è il guadagno di quel che costa la libbra, e perciò bisogna vedere 16. che parte sia di cento, trouarai che sarà $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$. fatto questo, troua vn numero, che 3. ne sia $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$. la qual cosa volendo trouare con facilità, multiplica il detto 3. via 25. fa 75. il qual parti per quel 4. ch'è sopra la riga, cioè per il numero denominante, ne viene 18 $\frac{1}{4}$. e così diremo che 3. sia $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$. di 18 $\frac{1}{4}$. e lir. 18 $\frac{1}{4}$. concluderemo che gli costasse la libbra, fanne proua, dicendo; se con lir. 18 $\frac{1}{4}$. io guadagno lir. 3. quanto guadagnerò con lir. 100? opera, verrò a guadagnare 16. apùto.

È con più breuità potèui dir così. Se 16. di guadagno vien da cento di capitale le lire 3. di guadagno da che capitale verranno? opera, trouarai, che verranno da capitale di lir. 18 $\frac{1}{4}$. come di sopra.

È volendola soluere per la regola del Caraino. Fa così, poni che comprasse la libbra lir. 25. troua hora il guadagno che farebbe a ragione di 16. per cento, dicendo, se 100. mi dà di guadagno 16, quanto mi darà 25? opera ti darà 4. adunque se la riuendesse lir. 4. più di lir. 25. guadagnarebbe 16. per cento, e di sopra si disse che l'haucaua venduta lir. 3. più che non gli costò, adunque per questa positione ci vien d'errore lir. 1. più della verità, e perciò dirai. Per 25. più 1.

Hor per la seconda positione, poni che la libbra gli costasse lir. 20. troua il guadagno che farebbe a ragione di 16. per cento, dicendo, se cento mi dà 16. di guadagno, che mi darà 20? opera, ti darà 3 $\frac{1}{2}$. e noi voleuamo 3. apùto, e perciò dirai per 20. più $\frac{1}{2}$. segui la regola, trouarai, che li costò la libbra lir. 18 $\frac{1}{4}$. come sopra.

Per 25. più 1.

Per 20. più $\frac{1}{2}$.

7. partitore.

Propositione 49.

DVe hanno denari, e trouano due borse con denari dentroui, & in vna di dette borse, v'era due. 10. più che nell'altra, e fra tutte due le borse, v'era due. 100. & il primo disse al secondo, se tu mi dai la prima borsa con 10. ducati de' tuoi, io haurò quattro tanti di quelli, che resteranno a te, senza la seconda borsa, & il secondo disse al primo, se io piglio la seconda borsa, e tu mi dia 20. ducati de' tuoi, io haurò 5. tanti di quelli che resteranno a te, senza quelli della prima borsa, si domanda quanti ducati hauea ciascuno, e quanti n'era per borsa.

Prima bisogna far di 100. due parti che l'vna sia 10. più dell'altra, che la prima farà 55. e l'altra 45. e così habbiamo trouato quanti ducati era per borsa.

Hora per saper quanti ducati haueua ciascuno da per se, senza i denari delle borse, farai positione, e poni che il primo hauesse due. 30. aggiungiui due. 55. della prima borsa, fa 85. & a questi aggiungi due. 10. che domanda di quelli del secodo, fanno due. 95. e questi vengono a essere 4. tanti di quelli che son restati al secodo, parti adunque 95. per 4. ne viene 23 $\frac{1}{4}$. e tanti ducati conuien che resti al secodo.

Vediamo hora di concordare il secodo, al qual diciamo esserli restati due. 23 $\frac{1}{4}$. aggiungili 10. che ne dà al primo, fanno 33 $\frac{1}{4}$. aggiungili 45. della secoda borsa, fanno 78 $\frac{1}{4}$. aggiungili 20 che ne domada al primo, fanno 98 $\frac{1}{4}$. e queste deu essere e 5. tanti che quelli che resta al primo, e se il primo che ponemmo n'hauesse 30.

ne

ne da al secondo 20. gli rosta 10. che 5. tanti di 10. son 50. e douea esser 98. $\frac{7}{2}$. adunque questa nostra prima positione ci dà 48 $\frac{1}{2}$. men di quel che voleuamo; e però dirai Per 30. men 48 $\frac{1}{2}$. Hor farai la seconda positione; e poni, che il primo hauesse duc. 35. aggiungili duc. 55. della prima borsa, e 10. di quelli del secondo, faranno in tutto duc. 100. i quali debbono esser vguale a 4. tanti di quelli che restano al secondo, parti adunque 100. per 4. ne vien 25. e tanti conueni che ne resti al secondo. Voltiamoci hora al secondo, che gli è restato 25. aggiugili 10. che ne domanda di quelli del primo, fanno in tutto duc. 100. e questi debbono esser vguale a 5. tanti di quelli, che son restati al primo; e perche il primo ponemmo che hauesse 35. dandone poi 20. al secondo, gli restarebbe 15. che 5. tanti di 15. farebbono 75. e noi voleuamo che fossero 100. apunto; però dirai Per 35. men 25. segui la regola del meno; e hieno; trouarai, che il primo haueua duc. 40. $\frac{1}{2}$. & al secondo duc. 36. $\frac{1}{2}$. Fanne proua. $\frac{1}{2}$. Per 30. men 48 $\frac{1}{2}$. Per 35. men 25.

DVe hanno denari, e trouano vna borsa con denari, & il primo dice al secondo, se tu mi dai la metà de' tuoi denari, e che io gli metta con i miei, io hauerò tanto quanto è nella borsa. Et il secondo dice al primo, se tu mi dai il terzo de' tuoi denari insieme con i miei, io hauerò tanti ducati, quanti sono nella borsa, si domanda quanti ducati haueua ciascuno, e quanti n'era nella borsa; hauendo sia tutti due insieme con i denari della borsa duc. 120. Poni che nella borsa fusse duc. 24. e così poni ancora che il primo hauesse vna quantità qual ti piace, hor poni, che hauesse 18. adunque il secondo huomo haueua 12. duc. che dandone la metà al primo, cioè 6. farà 24. vguale a quanto s'è posto che sia nella borsa, hora il secondo, chiede al primo il $\frac{2}{3}$ de' suoi denari, e dice che hauerà ancor lui 24. duc. piglia adunque il $\frac{2}{3}$ de' denari del primo, cioè di 18. ch'è 6. aggiungilo a 12. cioè a' denari del secondo; fa 18. e lui voleva 24. cioè vguale a quanto si pose che fusse nella borsa, per il che tu vedi che per questa prima positione, ci vien 6. meno della verità, però dirai Per 18. men 6. Hor per la seconda positione, maticini fermamente che nella borsa sia duc. 24. come nella prima positione s'è detto, dipoi poni che il primo hauesse duc. 15. il secondo per forza conuerà che habbia 18. accio che dandone la metà al primo possa hauere 24. com'è nella borsa, dipoi piglia il $\frac{2}{3}$ di 15. ch'è 5. e mettilo sopra 18. fa 23. per il secondo, e lui voleva che facesse 24. che è vn meno di quel che voleva, e perciò dirai Per 15. men 1.

Segui la regola, trouarai che il primo haueua duc. 14. $\frac{2}{3}$. & il secondo duc. 19. $\frac{1}{2}$. ma perche la nostra proposita dice, che fra i denari del primo, e secondo, e quelli della borsa erano duc. 120. & in questa nostra operatione farebbono duc. 57. $\frac{1}{2}$. però per regola del tre, dirai così, se la somma di 57. $\frac{1}{2}$. venne da duc. 24. che tanti ponemmo fossero nella borsa, da che verrà la somma di 120? multiplica 120. via 24. fa 2880. il qual parti per 57. $\frac{1}{2}$. ne vien 50. e tanti ducati dirai che fusse nella borsa, dipoi per la medesima regola del tre, trouarai quanti denari haueua ciascuno, dicendosi se 57. $\frac{1}{2}$. vien da 14. $\frac{2}{3}$. da che verrà 120? opera, verrà da 30. e tanti ducati haueua il primo, opera per il secondo, trouarai, che haueua duc. 40. Fanne proua.

Per	18.	men.	6.
Pot	15.	men.	1.

5. partitore.


Proposizione 51.

Tre hanno denari, & il primo dice a gli altri due, se voi mi date la metà de' vostri, e ch'io li metta con i miei, io hauerò duc. 20., dice il secondo a gli altri due, se voi mi date il $\frac{1}{2}$. de' vostri, io hauerò con li miei duc. 20., dice il terzo a gli altri due, a me basta che mi dia il $\frac{1}{2}$. de' vostri, & ancor'io hauerò con li miei duc. 20. si domanda quanti duc. hauea ciascuno. Ponì, che il primo habbia duc. 4. di necessità, tra'l secondo, e'l terzo haueranno duc. 32. de' quali dandone la metà al primo, cioè 16. faranno 20. hor per trouare separatamente quanto haueua il secondo, e'l terzo, somma insieme tutto quello che habbiano posto, che habbino fra tutti tre fa 36. e per trouare quelli del secondo dua così. Fatti di 36. due parti, che alla minore aggiuntoli il $\frac{1}{2}$. della maggiore, faccia 20. apunto, e questo conuien fare, perche la parte maggiore farà il congiunto de' denari del primo, e del terzo, de' quali bisogna darne il $\frac{1}{2}$. al secondo compagno, e per trouarai, che la minor parte farà 12. etanti duc. haurà il secondo, e la maggiore parte farà 24. cioè il congiunto de' denari del primo, e terzo, e perche poniamo che il primo hauesse duc. 4. adunque il terzo conuerrebbe che hauesse duc. 20. Hor fin qui habbiamo sodisfatto al primo, & al secondo, resta, che concordiamo il terzo, il quale (secondo la nostra positione) hauerrebbe da se solo duc. 20. e chiedendo il $\frac{1}{2}$. di quelli del primo, e del secondo, hauerrebbe duc. 4. più, cioè duc. 24. e noi voleuamo che hauesse duc. 20. apunto, e perciò ciui. per 4. ch'io m'apposi più 4. Dipoi per la seconda positione, poni che il primo habbia 8. adunque tra il secondo, e terzo, haueranno 24. acciò che dandone la metà al primo habbia poi duc. 20. Hor per trouare quelli del secondo, somma insieme quello che poniamo che habbino fra tutti tre, faranno 32. e dirai così. Fatti di 32. due parti, che alla minore aggiuntoli il $\frac{1}{2}$. della maggiore faccia 20. opera trouarai che la minore farà 14. e tanti duc. haurà il secondo, e la maggiore farà 18. cioè la quantità de' denari, che haueranno fra il primo, & il terzo, de' quali dandone il $\frac{1}{2}$. cioè 6. al secondo, haueà 20. e così habbiamo sodisfatto al primo, & al secondo. Resta hora di sodisfare al terzo, e perche in questa nostra seconda positione, trouiamo, che fra il primo, e terzo hanno duc. 12. de' quali ven'è 8. che ponemmo hauesse il primo, adunque per il terzo compagno restano 10. e perche il primo ha 8. & il secondo 14. che sommati insieme fanno 22. de' quali bisogna darne il $\frac{1}{2}$. al terzo compagno, però piglia il $\frac{1}{2}$. di 22. ch'è 11. aggiugli a 10. fanno 15. $\frac{1}{2}$. e noi voleuamo, che facesse 20. adunque ci vien $4\frac{1}{2}$. non di quel ch'era nostro desiderio, però dirai, per 1. non $4\frac{1}{2}$. per tuo partire. Dipoi moltiplica in croce gli errori per le positioni, & i prodotti sona insieme, fanno 10. che partito per $8\frac{1}{2}$. ne vien $5\frac{1}{2}$. e tanti denari dirai o che hauesse il primo, adunque tra il secondo, e terzo haueanno 28 $\frac{1}{2}$. de' quali dandone la metà al primo, cioè 14 $\frac{1}{2}$. hauerà 20. apunto, e fra tutti tre conuien che habbino 34 $\frac{1}{2}$. Poi bi-

D d

fogna

fogna fare di $34\frac{2}{7}$. due tal parti, che alla minore aggiunto il $\frac{1}{7}$. della maggiore faccia 20. e questo conuien fare per vn'altra positione, la qual sia detta positione speciale, ma per men briga, volendo trouare i denari del secondo, e del terzo, fa così poni per ordine, come di sotto vedi tutt' i numeri delle positioni, così generali, come speciali de' den. del primo, secondo, e terzo, e poco più sotto poni gli errori, che di esse positioni t'è venuto. Hor diccsi, che volendo trouare i den. del secondo (poiche quelli del primo, di sopra habbiamo detto d'hauerli trouati) conuien multipl. il primo errore, cioè 4. via la seconda positione del secondo, ch'è 14. fa 56. al poi multipl. il secondo errore, ch'è $4\frac{1}{2}$. via la prima positione del secondo, ch'è 12. fa 54. qual sommato con 56. fa 110. e questo parti per $8\frac{1}{2}$. ne vien $12\frac{2}{7}$. e tanti denari haueua il secondo. Dipoi per il terzo, multipl. il primo errore, cioè 4. via la sua seconda positione ch'è 10. fa 40. poi multipl. il secondo errore, cioè $4\frac{1}{2}$. via la sua prima positione, ch'è 20. fa 90. che sommato con 40. fa 130. qual partito per $8\frac{1}{2}$. ne vien $15\frac{1}{7}$. e tanti duc. hauea il terzo. Fanc proua &c.




Propositione 52.

TRe hanno denari, & il primo dice a gl'altri due, se voi mi date il $\frac{1}{2}$. de' vostri denari, io hauerò duc. 48. & il secondo dice a gl'altri due, se voi mi date il $\frac{1}{3}$. de' vostri, insieme con li miei hauerò duc. 60. Dice il terzo a gl'altri due; se voi mi date li $\frac{2}{3}$. de' vostri hauerò duc. 70. si domanda quanti n'hauea ciascuno. Questa propositione la pone Gio: Sfortunati, ch'è la 22. fra le regole del Cataino, & è simile alla sopradetta, ma perche nella sua dichiarazione, e nelle dimostrazioni ancora nello stampare è stato messo vn numero per vn'altro, perciò a maggiore intelligenza, con le positioni piu accorte, vogliamo dimostrarne la vera solutione; e prima faremo positione, che il primo hauesse duc. 28. qual dice che con il $\frac{1}{2}$. de' denari del secondo, e del terzo hauerà 48. adunque gli m'ha duc. 20. quali vengono a essere uguali alla quinta parte dei denari del secondo, e del terzo; per il che ne segue, che fra ambedue habbino duc. 100. Inteso questo è necessario diuidere 100. in due tal parti, che a vna, aggiuntoli i den. del primo, cioè 28. e della somma presone il $\frac{1}{2}$. il qual posto sopra l'altra parte faccia 60. cioè la quantità, che si trouarebbe il secondo, con la parte che chiede a gl'altri due. Laonde a noi è terza far noua positione, la qual sia detta positione speciale, e la prima si dice positione generale. Hor poni per la speciale, che di questi duc. 100. il secondo n'hauesse 40. adunque il terzo n'habbe 60. che aggiunti con 28. del primo fanno 88. e dandone il $\frac{1}{2}$. cioè 22. al secondo, haurà 62. che viene haure 2. più del douere, e però dirai, per 40. più. E per la seconda positione speciale, poni che de' detti 100. ducati, il secondo n'hauesse 30. adunque il terzo n'habbe 70. che cō 28. del primo fa 98. del quale presone il $\frac{1}{2}$. ch'è 24 $\frac{1}{2}$. e posto sopra 30. del

del secondo fa $54\frac{1}{2}$. e lui voleua che facesse 60. perche li vien meno $5\frac{1}{2}$. del douere, e perciò dirai. Per 30. men $5\frac{1}{2}$. Hor per queste due positioni speciali, offerua la regola, e trouarai, che il secondo de' detti due. 100. n' hebbe $37\frac{1}{2}$. Se il terzo n' hebbe $62\frac{1}{2}$. laonde a questi due. $62\frac{1}{2}$. del compagno, aggiuntoui li due. 28. del primo fanno due. $90\frac{1}{2}$. e tanti diremo che habbino sia il primo, & il terzo de' quali dandone il $\frac{1}{2}$. cioè $22\frac{1}{2}$. al secondo, hauià due. 60. come voleua, e fin qui habbiano sodisfatto al primo, & al secondo, resta hora a trouare la sodisfatione del terzo, e perche fra'l primo, & terzo s'è detto, che hanno due. $90\frac{1}{2}$. & il primo si pose, che hauesse 28. adunque il terzo haueua il resto, cioè $62\frac{1}{2}$. al quale chiede al primo, & al secondo li $\frac{1}{2}$. de' lor denari, & il primo haueua 28. & il secondo $37\frac{1}{2}$. fra ambidue haueuanno due. $65\frac{1}{2}$. de' quali dandone $\frac{1}{2}$. cioè $12\frac{1}{2}$. al terzo compagno, haueua in tutto due. $81\frac{1}{2}$. e lui voleua solan. etc. due. 70. adunque per questa nostra prima positione generale, ci viene $11\frac{1}{2}$. piu del douere, e dirai, Per 28. e di sotto metterai i den. del secondo, cioè $37\frac{1}{2}$. e li sotto metterai denari del terzo, cioè $62\frac{1}{2}$. e poco più di sotto scriuerai piu $11\frac{1}{2}$. come alla fine di questa potrai vedere. Hora faremo la seconda positione generale, quale mediante la prima, haueuemo l'intento nostro. Pon che il primo hauesse due. 24. il qual dice, che se hauesse il $\frac{1}{2}$. de' den. del secondo, e del terzo, hauerebbe poi due. 48. laonde tu vedi, che gli manca due. 24. adunque li due. 24. che gli manca vengono a s'ire la quinta parte de' denari del secondo, e del terzo, perche fra ambidue hauerebbero due. 120. e questi 120. bisogna diuiderli in due tal parti, che a vna di esse parti aggiuntoui due. 24. (che ponemmo, che hauesse il primo) della somma persone il $\frac{1}{2}$. & aggiunto all'altra parte, faccia 60. e volendo trouar questo bisogna fare vn'altra positione speciale; hor poni che de' detti due. 120. il secondo n' hauesse 40. di necessità il terzo n' hauerebbe 80. che con 24. del primo fanno due. 104. de' quali dandone il $\frac{1}{2}$. ch'è 26. al secondo, fanno 66. lui voleua che facesse 60. e perciò dirai. Per 40. piu 6. Dipoi per la seconda positione speciale, poni che de' detti due. 120. il secondo n' hauesse 48. di necessità il terzo n' hauerebbe 72. che aggiuntoui due. 24. del primo fanno due. 96. e tanti due. hanno fra il primo, & il terzo, de' quali dandone il $\frac{1}{2}$. cioè 24. al secondo, e sommati con 48. che ponemmo che n' hauesse, fanno 72. e lui voleua che facesse 60. di modo che ci viene 12. piu del douere, e però dirai, Per 48. piu 12. segui la regola, trouarai, che de' detti due. 120. il secondo n' haueua 32. & il terzo il resto, cioè 88. che aggiuntoui due. 24. del primo fanno due. 112. tra il primo, & il terzo, de' quali dandone il $\frac{1}{2}$. cioè 28. al secondo fanno 60. come voleuamo, e così con queste 2. positioni speciali habbiamo accordato il secondo. Resta hora che accordiamo il terzo, il quale habbiamo detto, che ha due. 88. e chiede al primo, & al secondo li $\frac{1}{2}$. de' lor denari, con i quali dice, che haueua poi due. 70. somma adunque due. 24. del primo, con due. 32. del secondo, fanno due. 56. pigliane $\frac{1}{2}$. ne vien 16. che aggiunti a 88. del terzo, fanno 104. e lui voleua che facesse 70. laonde ne viene 32. piu di quel che voleua, e perciò dirai per questa seconda positione generale. Per 24. e di sotto poni 32. per il secondo, e sotto a questo poni 88. per il terzo, & vn poco più di sotto scriuerai piu 34. come di sotto vedi.

Hora tu hai, che per la prima positione generale t'è venuto piu $11\frac{1}{2}$. e per la seconda piu tremasquattro, e perche è piu più s'abbatte, però caua $11\frac{1}{2}$. di 34. resta $22\frac{1}{2}$. per tuo partitore; dipoi volendo trouare quanti denari haueua il primo, multiplica $11\frac{1}{2}$. che è il primo errore, via 24. che è la seconda positione, fa 272. dipoi multiplica 34. che è il secondo errore, via 28. che è la

prima posizione, fa 952. del quale trattone 272. resta 680. il qual parti per $22\frac{2}{7}$. ne viene 30. apunto, e tanti duc. diremo che hauesse il primo, hor per il secondo, multipl. $11\frac{1}{7}$. via 32. fa $362\frac{2}{7}$. dipoi multiplica 34. via $37\frac{5}{7}$. fa $1269\frac{2}{7}$. del qual trattone $362\frac{2}{7}$. resta 906 $\frac{2}{7}$. il qual parti per $22\frac{2}{7}$. ne vien 40. p. Per 28 apunto, e tanti duc. haueua il secondo. Hora per il terzo multipl. $11\frac{1}{7}$. via 88. fa $997\frac{1}{7}$. dipoi multipl. 34. via $62\frac{2}{7}$. fa 2130. $\frac{2}{7}$. del qual trattone $997\frac{1}{7}$. resta 1133 $\frac{2}{7}$. il qual parti per $22\frac{2}{7}$. ne vien 50. apunto, e tanti duc. haueua il terzo; In tutte le sopradette multiplicationi ti reggerai secôdo le dimostrazioni, che qui di sotto puoi vedere.



Propositione 53.

VNo s'accomoda a padrone per tre mesi, con questi patti, che il primo mese vuol di salario vna quantità di lire, & il secondo mese vuole lire 2. più del primo, & il terzo vuole lire 2. più del secondo, & alla fine de' detti 3. mesi vuole ancora lire 10. in giunta.

Accade, che costui non serue se non 6. giorni, e vuol esser pagato del seruizio, & il padrone gli diede la metà del salario del primo mese, & il $\frac{1}{7}$. del salario del secondo, & il $\frac{1}{7}$. del salario del terzo, si domanda, quante lire li toccaua in tutto, e quante lire li toccaua il primo mese.

Questa Propositione la trouarai nell'Opera di Fra Luca nella nona distinctione, Tratt. 10. dell'extraordinarij, doue tratta de' salari de' seruitori, Propositione 5. Questa medesima Propositione la deferiue ancora Gio: Sfortunati nella sua opera, tra le regole del Catano Propositione 16. adducendo hauerla messa aneora Fra Luca, e che doue il detto Fra Luca disse hauer seruito 6. giorni, volse dire 18. giorni, e che fù errore dell'impressore, ouero inauuertenza di F. Luca, che habbia posto 6. in cambio di 18. come molte volte accade, che si pone vn numero per vn'altro; E noi diciamo, che non puol esser stato errore dell'impressore, nè inauuertenza dell'Autore, ma proprio volere, & opnion di Fra Luca, poiche in ambedue le positioni, che egli fa, il suo fondamento lo fa sempre sopra 6. giorni, e più volte replica, e dice che 6. giorni sono $\frac{1}{7}$. d'vn mese, e non dice, che siano $\frac{1}{7}$. di tre mesi, perche se si dice, che 6. giorni fussero $\frac{1}{7}$. di tre mesi, chiaramente apparirebbe l'inauuertenza, perche ogn'vn sa che 6. giorni non sono $\frac{1}{7}$. di tre mesi, ma 18. giorni sono $\frac{1}{7}$. apunto, e perciò lo Stampatore, lo stampò in quel modo, che lo trouò scritto.

Ma a confirmatione del d. Sfortunati, si dice fermamete che deue dir 18. giorni, e non 6. perche se poniamo che il primo mese hauesse di salario lire 16. il secondo lire 18. & il terzo 20. & alla fine de' detti tre mesi lire 10. più, hauerebbe in tutto lire 64.

Laonde

Ma a confirmatione del d. Sfortunati, si dice, che deue dir 18. giorni, e non 4. perche se poniamo che il primo mese hauesse di salario lir. 16. il secondo lir. 18. & il terzo 20. & alla fine di detti tre mesi 64. piu, hauerebbe in tutto lir. 64.

Laonde per 6. giorni, se ben seno $\frac{1}{4}$. d'un mese, non deue per tal conto hauere il $\frac{1}{4}$. di 64. come vuol Fra Luca, poiche lir. 64. sono il salario di 3. mesi, e li 6. giorni sono $\frac{1}{2}$. d'un mese, e non di 3. mesi, come si richiede, e però bisogna dire, che scruiſſe 18. giorni, li quali seno $\frac{1}{4}$. di detti 3. mesi, e perciò piglia $\frac{1}{4}$. di 64. ch'è 12. $\frac{1}{2}$. e tante lire douerebbe hauere, secondo la nostra positione, ma noi trouiamo, che se hauesse di salario il primo mese lir. 16. il secondo lir. 18. & il terzo lir. 20. come sopra s'è detto, del qual salario, dandoli la metà del primo mese, ch'è lir. 8. il $\frac{1}{2}$. del secondo, che è lir. 9. & il $\frac{1}{4}$. del terzo, ch'è lir. 5. gli si darebbe lir. 19. che sarebbono piu del douere lir. 6. $\frac{1}{4}$. e però dirai per 16. piu 6. $\frac{1}{4}$. Hor per la seconda positione, poni che il primo mese hauesse di salario lir. 4. il 2. lir. 6. & il 3. lir. 8. f. n. n. a. in. e ne fanno lir. 18. e con lir. 10. piu che deue hauere in giunta fanno lir. 28. delle quali presone la quinta parte, ne vien 5. $\frac{1}{4}$. e tanti gli toccache in 18. giorni; e di sopra si disse che gli diede la metà del salario del primo mese, che sono lir. 2. & il $\frac{1}{4}$. del salario del secondo mese, che sono lir. 2. & il $\frac{1}{4}$. del terzo mese, che sono lir. 2. che in tutto sen lir. 6. e noi voleuamo che iusticio lir. 4. $\frac{1}{4}$. adunque gli habbe $\frac{1}{4}$. d'una lira piu del douere, e così dirai per 4. piu $\frac{1}{4}$. scgui la regola, trouarai, che il primo mese douea hauere lir. 33. $\frac{1}{4}$. & il secondo mese lir. 33. $\frac{1}{4}$. & il terzo mese lir. 33. $\frac{1}{4}$. fanno proua, e lo vedrai.

Per 16. men 6. $\frac{1}{4}$.

Per 4. piu $\frac{1}{4}$.

5. $\frac{1}{4}$. partitore.

Propositione 54.

VNo manda vn suo Fattore alla Fiera, e gli diede duc. 100. e gli disse, che dovesse di 4. sorti animali, cioè pecore, capre, porci, & asini, e vuol, che le pecore le paghi $\frac{1}{2}$. duc. l'vna, e le capre $\frac{1}{4}$. di duc. l'vna, & i porci vn duc. l'vno, e gli asini 3. duc. l'vno, e vuol che spenda tutt'i duc. 100. e che compri 100. capi di bestie tra tutte 4. le sorti, si domanda quanti capi ne comprará per sorte.

Questa propositione la mette Fra Luca, e la risolve per le false positioni, e dice che tutte l'altre simili per tal regola del Catino si possono soluere, e Giouanni Sfortunati Banese, dice che per tal regole non si possono soluere, e se pur alcuna se ne soluere, che è vna ventura, e non arte.


E noi diciamo che per tal regola si possono soluere, ma che il più delle volte le solutioni di esse nõ verranno che compri capi di bestie intere, ma verranno con numero rotto, come per esemplo pecore 20. $\frac{1}{4}$. e simili, la qual cosa non puol'essere, ma volendo trouare che compri capi interi, bisogna farsi lume come il Cieco; & alcune proposte trouarai, che con differenti positioni ti daranno differenti quantità di capi di bestie, come in questa, che se per la prima positione, noi poniamo come Fr. Luca, che compri 28. pecore, 6. capre, 52. porci, e 14. asini, faranno in tutto capi 100. che à i sopradetti prezzi, le pecore montano ducati 14. le capre duc. 2. i porci duc. 52. e gli asini duc. 42. che stà tutti montano ducati 110. e noi voleuamo 100. che sono ducati 10. più del douere.

Per la seconda positione, gli si pone, che compriasse 20. pecore, 24. capre, 40. porci,

D d 3

cl.

ci, e 16. asini, che in tutto son capi 100. & ai sopradetti prezzi mótano duc. 105. e noi volcuamo 100. che son duc. 6. più del douere; segui la regola, trouarai che comprò 8. pecore, 51. capre, 22. porci, e 19. asini, che in tutto son capi 100. e mótano duc. 100. & operando con altre diuerse positioni (quali non descriuo per breuità) ti può venire, che cōprasse 16. pecore, 39. capre, 23. porci, e 17. asini che son capi 100. e mótano duc. 100. e con altre differēti, può venire, che comprasse 4. pecore, 69. capre, 3. porci, e 24. asini, che mótano, come sopra duc. 100. e simili &c.



Propositione 55.


Troua 3. numeri delli quali al primo aggiuntoui 73. sia doppio dagl'altri due, & al secondo aggiuntoui 73. sia triplo a gl'altri due, e similmente al terzo aggiuntoui 73. sia quadruplo degl'altri due, si domanda quali sono i numeri.

Poni, che il primo numero sia 1. ouero qual si uoglia altro numero di pari, accioche aggiunti cui 73. faccia numero pari, per poter prenderne la metà senza che auanzi resto, perciocche il primo numero con 73. più, deue fare il doppio degli altri due, aggiungi 1. con 73. fa 74. il qual numero secondo la nostra proposta deu' esser doppio degl'altri due: per ilche è necessario che gl'altri due insieme fano 73. e perche il secondo numero con 73. deue fare vn numero triplo del primo, e del terzo insieme, conuerà diuidere 37. in due tal parti, che la prima con 73. faccia vn numero triplo al numero che dalla seconda parte, e dall' 1. (cioè dal primo num.) si cōpone, per ilche è necessario far vn'altra positione speciale.

Poni adunque la prima parte di 37. esser 2. e la seconda 35. La prima parte 2. aggiunta con 73. fa 75. e seconda parte 35. aggiunta con 1. fa 36. e del qual numero non è triplo il numero 75. ma il num. 108. adunque ci vien men del douere 33. e perciò dirai per 2. men 33. Poni di nuouo, che la prima parte di 37. sia 5. e la seconda 32. la prima con 73. fa 78. e la seconda con 1. fa 33. del qual numero non è triplo il numero 78. ma il num. 99. adunque ci ueniamente ci vien 21. meno della verità, e però dirai per 5. men 21. segui la regola, trouarai, che la prima parte di 37. sarà $10\frac{1}{4}$. e la seconda sarà $26\frac{3}{4}$. adunque se il primo numero della restita positione generale è 1. il secondo sarà $10\frac{1}{4}$. & il terzo $26\frac{3}{4}$. perche in questo numero, il primo num. 73. fa il doppio degl'altri due, & il secondo con 73. fa $83\frac{3}{4}$. che è triplo a gl'altri due, se adunque il terzo num. con 73. farà 4. tanti degl'altri due, sarà soddisfatto alla proposta; ma il terzo numero ch'è $26\frac{3}{4}$. con 73. fa $99\frac{3}{4}$. il qual non è quadruplo al cōgiunto del primo, e secondo, cioè $11\frac{3}{4}$. ma il num. 45. è quadruplo del num. $11\frac{3}{4}$. adunque habbiamo traspassato di $54\frac{1}{4}$. la verità, e perciò conuerà dir così per la prima positione generale. Per 1. ch'io m'apposi, mi dà d'errore più $54\frac{1}{4}$.

Hor

Hor per la seconda posizione generale, poni che il primo delli 3 da inuestigari fa 3. che con 73. fa 76. il qual numero deu' esser doppio degl'altri due, adunque gl'altri due faranno 38. e perche il secondo con 73. deu' esser triplo del primo, che e 3. e del terzo insieme, per tanto conuerà fare vn'altra posizione speciale, e diuidere 38. in due parti, delle quali la prima con 73. faccia vn numero triplo, del numero che si farà dalla seconda parte, e dal 3. cioè dal primo numero, e dalla seconda parte di 38. Poni adunque la prima parte di 38. esser 2. e la seconda 36. la prima con 73. farà 75. la seconda è con 3. farà 39. del quale il numero 75. non è triplo, ma il num. 117. adunque c'è venuto men 42. della verità, e però dirai per 2. men 42. Poni di nouo la prima parte esser 5. la seconda farà 33. la prima cō 73. farà 78. e la seconda con 3. della position generale farà 36. del qual numero non è triplo il num. 78. ma il num. 108. perche c'è venuto 30. men della verità, e perciò dirai per 5. men 30. Segui la regola, trouarai che la prima parte di 38. farà $12\frac{1}{2}$. e la seconda $25\frac{1}{2}$. adunque se il numero primo della position generale è 3. il secondo farà $12\frac{1}{2}$. & il terzo $25\frac{1}{2}$. percioche così il primo con 73. fa il doppio degli altri due, & il secondo con 73. fa tre tanti degli altri due, & se adunque al terzo cō 73. farà quadruplo degl'altri due. farà soluta la proposta, ma il terzo numero cioè $25\frac{1}{2}$. con 73. fa il num. 98 $\frac{1}{2}$. il qual non è quadruplo del num. $15\frac{1}{2}$. che è composto dal primo 3. e dal secondo $12\frac{1}{2}$. ma il num. 62. farà quadruplo ai detti due numeri, adunque per questa position generale, c'è venuto $36\frac{1}{2}$. più della verità, perche dirai così, per 3. ch'io m'appoti. più $36\frac{1}{2}$. Fatto questo, osserua la regola, multiplicando in croce gl'errori, via le positioni, trouarai, che il primo numero farà 7. il secondo 17. & il terzo 23. perche il primo con 73. fa 80. il qual numero è doppio de gl'altri due; & il secondo con 73. fa 90. che è triplo degl'altri due; & il terzo con 73. fa 96. il qual numero è quadruplo degl'altri due.



Propositione 56.


DVe douean partire vualmente fra di loro 60. duc. ma essendo nato di parere fra essi, ciascuno ne tolse quanti potè; ma essendo pacificati, il primo pose giù il $\frac{1}{2}$. di quelli che prese, & il secondo pose giù il $\frac{1}{2}$. de' suoi, & auuenne allora, che il primo prese quelli che pose giù il primo, e ciascun si trouò hauere 30. duc. si domanda quanti ne tolse ciascun di loro la prima volta.

Dd 4

Poni

Poni, che il primo pigliasse 36.duc. il secondo bisognò che pigliasse 24.duc. se il primo posarà giù il $\frac{1}{2}$. cioè 9. gli resterà in mano 27.duc. ai quali se aggiungeremo il $\frac{1}{2}$. del secondo, cioè 8. faranno 35. per li denari del primo, ma egli douea hauer solo 30. dūque è venuto 5. più del douere, e però dirai per 36. più 5.


Poni hora che il primo togliess 12. & il secondo il resto, cioè 48. se il primo potrà giù il $\frac{1}{2}$. cioè 3. gli resterà in mano 9.duc. alli quali, se aggiungeremo il $\frac{1}{2}$. di quelli del secondo, cioè 16. faranno 25.duc. per il primo, ma egli douea haueere solamente 30.duc. adūque c'è venuto 5. meno del douere, e perciò dirai, per 12. men 5. opera hora secondo la regola; trouarai che il primo prese 24.duc. & il secondo 36. fanno proua.



Proposizione 57.

FAmmi di 1000. due tal parti, che la maggior ecceda la minore in 49. Poni che la maggior parte sia 600. la minore sarà 400. la qual eccede la seconda in 200. e noi voleuamo che l'eccesso fusse 49. per il che c'è venuto 151. più del douere, perciò dirai per 600. più 151.

Poni di nuouo la maggior parte esser 550. di necessità la minore sarà 450. che la prima eccede la seconda in 100. e noi voleuamo che l'eccesso fusse 49. adūque vn'altra volta c'è venuto più del douere 51. per il che dirai così. Per 450. più 51. segui la regola, trouarai che la maggior parte sarà 524 $\frac{1}{2}$. e la minore 475 $\frac{1}{2}$.



ANcorche da altri Scrittori sia stato posto quel bell'artificio d'Archimede Siracusano, col quale (si come riferisce Pollione nel nono libro, al terzo capitolo) ritrouò il furto d'un Orefice in vna corona d'oro, senza disfar la corona, nientedimeno, ancor noi lo descriveremo, per far al mondo maggior copia d'vna così sottile speculatione.

Hauendo adunque Hierone Rè deliberato d'offerir per voto a' suoi Dei vna corona di puro Oro, l'artefice tolto vna parte dell'Oro, vi mescolò altrettanto Argento: onde sdegnato Hierone, nè sapendo ritrouar quanto vi mancasse, pregò Archimede, che pigliasse cura di pensarui sopra.

Egli hauendo hauuta tal commissione, entrò à caso nel bagno, & iui descendendo nel vaso, considerò che tant'acqua uscìua del vaso, quanta parte del suo corpo in quella v'entrava. Onde hauendo di quà ritrouata la ragione della resolutione del quesito fattoli, non si fermò punto, ma spinto dall'allegrezza saltò subito

subbito fuer' nel vaso, & andando ignudo verso casa, gridaua ad alta voce inueni inueni, & a hora dalla battimento di tal inuentione, si dice che fece due masse vna di puro oro, e altrà d'argento, ciascuna d'vqual peso, che era la corona; dopo di che prese vn vaso grande, e l'empì d'acqua infino al colmo, & in quello pose la massa d'argento, e tutta l'acqua, che versò fuor del vaso, la raccolse, misurò e pesò, dipoi leuò la massa dall'argento, e tornò a riempire il d. vaso infino al colmo com'era prima, e così da quello ritorno di quãto vna certa misura, ouero peso d'acqua a vn certo peso d'argento rispondeste. E come hebbe sperimentato questo, pose similmente la massa d'oro nel d. vaso pieno, e quella cauata, con la medesima ragione adoprando la misura stessa, ritrovò che dell'acqua nò n'era uscita tãta, uia mào, quãto men grande di corpo del medesimo peso era la massa dell'oro, che quella dell'argento. Dipoi ripieno il vaso, e nella medesim'acqua posta la corona, ritrovò la corona hauer buttato fuor del vaso più acqua che la massa d'oro del medesimo peso, e così discorrendo da quello, che più acqua haueua buttato la corona che la massa d'oro, trouò il mescolamẽto dell'argento nell'oro.

Fin qui dice Vetruiuo. Hora dimostraremo in che modo per la regola delle false positioni si ritroui il d. mescolamento d'argento nell'oro, seruendoci dell' artificio d'Archimede. Pongasi per effempio, che la corona fusse 100. libbre, e quella posta nel vaso buttasse fuora 65. libb. d'acqua; ma posta nel medesimo vaso la massa d'oro schietto di 100. libb. buttasse fuori 60. libb. d'acqua, e posta nel medesimo vaso la massa d'argento schietto buttasse fuori 90. libb. d'acqua, poni hora che l'orefice habbia rubbato 40. libb. d'oro, e che habbia rimesso tant'altre libb. argento, si che nella corona fusse 60. libb. d'oro, e 40. libb. d'argento, vedi hora se la corona così mischiata butta 65. libb. d'acqua, il che così suprai dicendo, se libb. 100. d'oro, buttano fuor del vaso libb. 60. d'acqua, quant'acqua buttaranno libb. 60. d'oro? e se libb. 100. d'argento buttano libb. 90. d'acqua, quant'acqua buttaranno libb. 40. d'argento, e ritrouarai nell'vna, e nell'altra operatione libb. 60. d'acqua, si che diremo che la corona butti libb. 72. d'acqua, e doueua buttar solamente libb. 65. secon to la nostra positione, per il che ci vien più del douere 7. libb. e perciò dirai così; Per 40. ch'io m'apposi più 7. Hor poni, che l'orefice habbia rubbato libb. 30. d'oro, adunque nella corona farà libb. 70. d'oro, e 30. d'argento.

Laonde dirai così; se libb. 100. d'argento schietto, buttano libb. 60. d'acqua, quãt'acqua buttaranno libb. 70. d'oro? E se 100. libb. d'argento buttano libb. 90. d'acqua, quant'acqua buttaranno libb. 30. d'arg. ritrouarai nella prima operatione libb. 42. e nella seconda libb. 25. che insieme fanno libbre 69. d'acqua, ma doueuaano esser solo libb. 65. per il che c'è venuto libb. 4. più del douere, e però dirai. Per 30. più 4.

Opera secon da la regola, trouerai, che l'orefice hauea tolto libb. 16. $\frac{2}{3}$. d'oro, e perciò in quella corona ritrouarsi libb. 83. $\frac{1}{3}$. d'oro, e libb. 16. $\frac{2}{3}$. d'argento.

Fanne proua dicendo, se libb. 100. d'oro buttano libb. 60. d'acqua, quant'acqua buttaranno libb. 83. $\frac{1}{3}$. d'oro, e se libb. 100. d'argento buttano libb. 90. d'acqua, quant'acqua buttaranno libb. 16. $\frac{2}{3}$. d'argento? ritrouerai nella prima operatione 50. libb. d'acqua, e nell'altra libb. 15. le quali tutte insieme fanno libb. 65. cioè, tanto quanto habbiamo posto che la corona ne buttava fuori.

Per 40. più. 7.

Per 30. più. 4.

3. partitore.

Fine del Quinto Libro.

L I B R O S E S T O.



POICHE (con l'aiuto di Dio) habbiamo trattato a sufficienza della Pratica d'Aritmetica, con molti casi diletteuoli. Resta al presente, che dimostriamo, e dichiariamo tutte quelle cose, che alla Pratica di Geometria più bisognueuoli sono. Ma prima è necessario dichiarare, & intendere cinque cose principali, a chi vuol esser perfettamente esperto in simil pratica, acciò che non gl'interuenga poi, come interuiene a molti ignoranti contadini, i quali purché sappino quante braccia, o piedi sia vna canna, ouero pertica, voglion far l'Arcifanlano: ma quando si trouan poi al parragone di qualche persona intendente, serueno solamente per ombra, & a portar le canne, e come si suol dir per proverbio, a tenere il lume, perche molti di loro sono, che non portano lo squadra, il qual niète, o poco fanno adoperare: Ma che diremo di quelli, che misurano senza squadra, o altro strumento, ma solo con l'occhio, e perciò nascono molte liti, e differenze nelle misure, e si come non si fanno coscienza d'vsurpare i premi, che di ragione peruerrebbero ai ben pratici, e virtuosi Agrimenfiori, cosiancora non si fanno coscienza di rubbare a vno, e dare a vn'altro, e far maggior misura a chi gli dà maggior mancia, la qual cosa sappiamo esser così la verità, perche hauendo noi misurate alcune selue di certi pover huomini, e trouandole meno di quello, che essi si pensauano, le quali hauuano prima fatte misurare a vn'ignorante, anzi malizioso contadino, disse vn di loro, e pur gli diedi lir. 8. di mancia, perche mi facesse buona misura, & vn'altro soggiunse, & io gli diedi di nascoso lir. 6. per il che se bene il d. misuratore era stato chiamato da vn Dottore, che gli misurasse vna buona partita di selue, contigue a quelle de' sopradetti contadini, non perciò hebber riguardo, nè alle mance riceuute, nè a consiuar per equità la parte di quei pouerelli; anzi disse loro palesemente, ch'essi n'hauuano più che non doueano hauere, e tolse loro, e diedelo nella parte del Dottore, si come conuenne poi renderlo indietro, quando da noi furon misurati i detti luoghi, con l'interuento di d. misuratore, di maniera che si fece conto, che il detto misuratore in quel giorno guadagnò, anzi rubbò sei tuedi sia mance secrete, e quel che gli diede il Dottore, laonde vn'huomo da bene non hauiua preso denari secretamente, ma palesemente hauerebbe detto, io deuo hauer tanto delle mie fatiche, a talche con queste strade indirette, guadagna più vn'ignorante, e tristo, che vn'esperto, & huomo da bene, aggiungendo ancora, che portano le canne hor lunghe, & hor corte, e quando poi gli sono paragonate, dicono, che non se sono accorti, si come disse il sopradetto Contadino misuratore, quando nel misurare cert'altre selue fù da noi trouato in frodo, il quale haueua le canne più corte del douere, e perciò l'arte del misurare è guasta.

Hor tornando al proposito nostro, noi habbiamo poco prima detto, che cinque cose conuien che sappia vn' Agrimenfore, le quali son queste, cioè, Punto, linea, angolo, superficie, e corpo.

Disposizione

Diffinition del Punto.

SE noi voleſſimo hauer riguardo a quello, che altri hanno hauuto, i quali non ſi ſono mai contentati di coſe ch'habbin fatto, nè hanno voluto dire, o ſcriuere quel ch'altri hanno detto, o ſcritto, o nel medefimo modo, onde per tal cagione hanno condotto pochiffime opere a perfectione, adducendo che la lor inano non poteua giungere all'intelletto; noi non haucremmo giamai poſto penna in carta, per mandar fuori queſte poche vigilie: perciòche di quanto habbiamo fin qui ſcritto, nulla è ſecondo il deſiderio noſtro; ma per diſpenſar quel picciol talento, che alla bontà di Dio è piaciuto donarci, habbiamo conſiderato, che ſe con queſte noſtre fatiche non giouaremo ai pellegrini ingegni a ſaper coſe alte, e toccare il fondo d'ogni coſa, giouaremo almeno a quelli, che fanno nulla, o poco, che queſta è ſtata la noſtra prima intentione.

Hauendo dunque a diffinire il punto, e moſtrare in qual modo ſ'intenda come prime terminie, e fondamento della Geometria, non vogliamo darne altre diffinitioni, che quelle, che hāno dato gl'inſcriſſi famoſiſſimi Autori, e prima.

I Geometri hanno detto eſſer punto quello, che per la breuita ſua incompreſibile non ſi può diuidere in parte, ma ſolamente ſi dice eſſer vn ſegno. Macrobio nel primo libro ſopra il ſonno di Scipione, ſcritto da Cicerone.

Il punto è quello, che non ha parti alcune, e perciò non cade ſotto niun ſenſo. Calcidio ſopra il Timeo di Platone.

Il punto è al tutto indiuiſibile, & ha vna forza infinita naſcoſa, con la quale produce tutti gl'interualli. Proclo ſopra Euclide lib. 2. cap. 11.

Il punto ſolamente nella Geometria, e l'vnici nell'Aritmetica non è capace di partimento. Proclo ſopra Euclide lib. 2. cap. 11.

Il punto aggiunto al punto non accreſce la grandezza. Marſilio Ficino ſopra la Teologia di Platone lib. 8. cap. 4.

Il punto non può ſtar da per ſe ſteſſo; ma è aſſiſſo di maniera alla miſura del corpo, che è ſempre termine di eſſa. Marſilio Ficino lib. 8. cap. 4.

Il punto è per tutto nella linea. Marſilio Ficino ſopra il Conuito di Platone, Orat. 2. cap. 3.

Il punto principio del continuo, non è continuo. Marſilio Ficino ſopra Plotino lib. 2. cap. primo.

Et il Principe de' Matematici Euclide con breui parole lo diffinifce, coſi dicendo. Punto è di cui parte non è.

Parando al ſenſo noſtro, che la diffinitione del punto deſcritta da miſſer Niccolò di Nale, nel dialogo ſopra la ſcena del mondo, ſia facile ad intenderſi, e dilectare a leggersi, noi la deſcriuere mo a punto in quel modo, ch'egli leggiadramente l'ha deſcritta, la quale è queſta.

Niccolò, e Marino.

Niccolò. Ditemi la diffinition del punto. Mar. Punto è vna coſa tãto picciola, che non ha parte, talche nõ ſi può partire, nè diuidere. N. hora mi pare, che

che contradichiate a quello, che poco auanti hauete detto. M. mostratemi doue io mi contradico. N. voi dite, che ogni cosa per se denota quantità continua, la qual è diuisibile, non solamente in due, o tre parti, ma in infinito. M. certo che questa par chiara contraditione, ma così la diffinisce Euclide Principe de Mathematici. N. Del pouero Euclide, quanti falsi accusatori se gli sono leuati contro à tempi nostri, ma non è marauiglia, perche essendo stato bandito per tanti anni, e secoli, hora par che sia stato rimesso alle mani di pochissimi, e per tanto la lingua assente ha cagionato, che non è conosciuto ne inteso. M. Che volete voi dire? N. Dire, che voi, e molti altri non solamente à bocca, ma etiamdio in opete mandate in luce, l'accusano di cose, che egli mai ha sognate. E doue haurete voi trouato, che Euclide habbia detto, che punto è vna cosa? dice bene, che punto è di cui parte non è; ma non dice punto è vna cosa. M. Che importa se ha detto, o no detto è vna cosa? basta che habbia detto che punto è; perche se è, dunque è essentia. & essendo essentia sarebbe diuisibile; per ilche ne io sono del tutto capace di questa definitione, percioche essendo essentia deue esser diuisibile, e pur questa verità contradice a quella mia falsa opinione, che poco inanzi haueua. N. Al contrario, questa fal' à opinione contradice à quella vera che prima diceu. M. Di gratia cauatemi di questi dubbij. N. E che dubbio è questo? non sapete che punto è de' primi termini nella Geometria, e che li primi termini si conuenie hauerli per vera verità, e dignità, attesoche sono i semplici suppositi: ma la sciano star questo, e torniamo al nostro dubbio, & all'apparente contraditione, la qual prouiene, perche voi non fate differentia fra l'essentia, che denota il genere generalissimo, e la quantità continua, delle quali due cose la prima può esser diuisibile, & indiuisibile, ma la seconda bisogna che sia diuisibile in infinito. M. Vorrei qualche esemplo di questo. N. A daruelo; ditemi l'anima dell'huomo che è in tutto il corpo può diuidersi, o no? M. Mysteriò. N. E la voce d'un Predicatore, o il suono d'vna campana, che empie tutta la Chiesa, può diuidersi, o no? M. Mysteriò. E che diremo di Dio, il quale è tanto grande: che è, & infinito, & immenso, puossi diuidere, o no? M. Certo che no. N. E tutte queste allegate sono essentie. M. Si bene. N. Ma perche non credete voi, che il punto essendo minor dell'anima, della voce, e di Dio sia indiuisibile nelle parti, e che in se non habbia parte? e tanto più, come dissi, che cgli è primo, e semplice supposito, di maniera che si deue tener in quel modo, che nell'alfabeto le lettere, doue ciascuna ha il suo nome impositole, e così bisogna chiamarle. M. Vorrei vna cosa da voi se è possibile, che mi facesse vedere questo punto. N. Hauete a sapere, che il punto tal volta si può vedere con l'occhio, e tal volta con la mente. M. Che vuol dire che non si può veder sempre con l'occhio? N. Direuuelo, quando il punto è nella linea, o vero nella superficie, come a dire nella bianchezza d'vna carta, o ver d'un dado, all'hora si può vedere, e con l'occhio, e con la mente, ma quando il punto fusse dentro à qualche corpo, all'hora conuen vederlo con l'occhio della mente, o vogliamo dire dell'intelletto, me a dir quando fusse dentro in vn dado, o in vn pomo, doue con gl'occhi del corpo non si può penetrare, se già non s'hauessero quelli di Linceo, l'acutezza de' quali era tale, che nè le mura ancor impediuaano, che non scorgesse le cose; se crediamo alle fauole de' Poeti. M. Stà bene, ma fattemelo vedere, o all'vno, a o tutte due i modi? N. Son contento; ma ditemi prima, se vno che vede il tutto, vede ancora il suo mezzo, o con l'occhio, o con l'intelletto. M. Senza dubbio, chi vede il tutto, vede ancora il suo mezzo. N. dico adunque, che il mezzo,

il quale è equidistante dagli estremi opposti, quello è il vero punto. *M.* hora son'io in maggior dubbio che mai, perciò che essendo linea, superficie, e corpo quantità continue, per conseguente sono diuisibili in infinito, onde essendo il punto in vna di quelle, seguirebbe che il punto ancora fusse diuisibile. *N.* questa conclusione è falsissima, perchè essendo il punto (come habbiamo detto) il mezzo fra gli estremi opposti, quando fusse diuisibile, poniamo caso in due parti, seguirebbe, che d'un punto si facessero due punti, adunque farebbono due mezzi fra li medesimi estremi, il che è impossibile. *M.* hora di tutto son'io in chiaro, che il punto non ha, nè può hauer parte, ma se non vi rincresce, chiaritemi ancora vn altro dubbio, quando si ponessero insieme due, o tre punti, che cosa farebbono? *N.* farebbono di nuouo vn punto. *M.* adunque due, o tre non sono più d'vno? *N.* sibene, son più del numero, quando son distinti, cioè discreti, ma posti insieme, tanto fa vn punto, quanto uille. *M.* che cosa fantastica, & onde prouie questo? *N.* prouiene, perchè i punti non hauendo parte, posti insieme conuen- che vn punto tutto tocchi l'altro punto tutto, e però non cresce. *M.* di questo ancor son chiaro. *N.* mi piace, impertoche, essendo il punto sì picciolo, che non ha parte, a dire il vero mi vergognauo, che fussi io tanto lunghi a parlar di lui.

Definizione della Linea.

LA linea è vna lunghezza, la quale non ha nè larghezza, nè grossezza, ouero profondità, la qual è causata dal transito del punto, quasi vna via imaginata; Perciò che, come fu detto, il punto non hauendo parte alcuna, ne segue, che non habbia nè lunghezza, nè larghezza, nè grossezza; laonde il punto facendo il suo transito, disegnarebbe solo la lunghezza, senza larghezza, o grossezza, la qual si chiama linea, l'estremità della quale sono due punti, come per essempio farebbe la linea A. B.

A. ————— B.

MA s'auerti, che ancor che noi ponghiamo l'essempio della linea in carta, nondimeno non crediate, che sieno vere linee, perciò che quell'istessa che ti vede in carta, ha alquanto di larghezza, ma l'habbiamo posta, per dimostrar meglio l'essempio, accioche vedendo quella possiate imaginare, che pinger non si possono così sottili, come hanno da essere, sì come per maggior intelligenza, noi habbiamo la sopradetta linea negra A. B. la larghezza della quale termina con la larghezza bianca, diceti, che fra il detto negro, e bianco è vn termine comune, che non può hauere nè larghezza, nè grossezza alcuna, se non sola lunghezza, perchè il termine del negro, è l'istesso termine del bianco, nè sono due termini, e però non hanno, nè larghezza, nè grossezza, perchè la negrezza, e bianchezza non sono corpi, ma sono gli accidenti del termine del corpo.

Le linee adunque possono essere di due forti, cioè rette, e curue; la linea retta è quella, che dirittamente giace fra due punti.

La linea curua, ouero torta, è quella, che da vn punto ad vn'altro tortuosamente procede, sicchè fra quei medesimi punti si potria distendere vna linea più breue, come per gl'infrascritti essempi puoi vedere.

punto



Punto.

Linea retta.

Linea Curua.


L El linee parallele son quelle, che prottratte in infinito nel medesimo piano mai si congiungono, come son queste.

Linee parallele.

M A se da vna parte fussero più appresso l'vna all'altra parte, certo è che prottratte in infinito, da quella parte si congiungerebbono, doue più si accostano intieme, come farebbono queste, le quali non si posson chiamar parallele, come l'altre già descritte.

Che cosa sia angolo.

S Egue, che dimostriamo, che cosa sia angolo, e per angolo s'intende il toccamento di due linee trasuersali, e non per il diritto, gl'angoli adunque si possono formare di linee rette, e di linee curue; e di curue, e rette insieme, secondo che, o curue, o rette sono le linee, e quando l'angolo sia formato d'vna linea retta, e d'vna curua, si dice angolo misto, e quando sia formato di due linee curue, si dice angolo curuilinea, e quando saranno due cerchi, che s'interfichino in croce, come per esempio, volendo diuider la superficie d'vna palla in quattro parti vguali, conuien per forza disegnarli intorno due cerchi, che rettamente in croce s'interfichino, e tale interseztione facendo gl'angoli vguali tutti saranno angoli retti Sferali, per esser causati dall'interseztione de' cerchi, e non di linee rette, come puoi vedere il disegno.




N Ora, che gl'angoli formati di linee rette sono di tre specie. Il primo si chiama angolo retto, & è quello ch'è simile ad vna squadra, e quando vn'a linea retta caderà perpendicolarmente sopra vn'altra linea retta, in modo che doue la tocca generi due angoli vguali, quelle linee si dice esser l'vna all'altra perpendicolare, e quei due angoli si dice esser retti, e la linea cadente si chiama cattedo, ouero perpendicolare, e tutti gl'angoli retti sono fra loro vguali.

La

La seconda specie si chiama angolo ottuso, & è quello ch'è maggior del retto, cioè più aperto della squadra, e gli angoli ottusi posson esser più ottusi, e men'ottusi, perche ne segue, che non tutti gl'angoli ottusi sono fra loro vuali.



La terza specie si chiama angolo acuto, & è quello ch'è minor del retto, cioè più stretto della squadra, e perche gl'angoli acuti posson esser più, e meno acuti, perciò si dice, che non tutti gl'angoli acuti sono fra loro vuali, e per maggiore intelligenza habbiamo posto, e figurate le dimostrazioni di tutte tre le specie.



Che cosa sia Superficie.

LA superficie è vn spatio, che ha lunghezza, e larghezza senz'alcuna grossezza, della quale i termini sono vna linea, ouero più linee. Da vna linea sola son chiuse le superficie circolari, & ouali, da due linee son chiuse le superficie semicircolari, e curuilinee, ma la figura superficiale rettilinea, della quale habbiamo più bisogno, non si può racchiudere da meno di 3. linee rette, quali si chiamano poi figure triangolari, ouero trilaterè, e quelle superficie, che son racchiuse da 4. linee rette, con angoli retti, si chiamano figure quadrangolari, o quadrilaterè; & alcune volte le superficie son racchiuse da linee rette, e curue mescolate, attecche le superficie variano in molti modi.

Ciascuna superficie si può misurare, ouero partire in due modi, cioè in lunghezza, & in larghezza, perche ogni cosa si può partire nel suo simile; cioè linea in linee; superficie, nelle superficie, e corpo nei corpi, e similmente con quelli si deue misurare, cioè linea con linea, superficie con superficie, e corpo con corpo, e qualunque altra cosa, che si misura con l'altra, conuien che sia della medesima natura, come nel 10. dichiara Euclide. Ci resta a dire, che le superficie non son tutte simili, percióche, alcune son piane, come triangolari, quadrangolari, e circolari; e molte altre; ma alcune poi sono sferiche, ouali, lenticolari, & altre simili, delle quali alcune sono conuesse, & alcune concave, come appare nella scorza del pomo arancio, che ha due superficie. La prima conuessa, cioè la superiore, ch'è gialla, e la seconda, l'inferiore, è concava, e bianca.



Contengono le figure trilateri, ò vero triangolari sotto tre lati, e le figure quadrilateri sotto quattro lati, e le figure pentagonali sotto cinque lati, & angoli, e le figure esagonali sotto sei lati, e le figure decagonali, ò vero settagonali, sotto 7. lati, e le figure ottagonali sotto 8. lati, e le figure multilateri sono quelle che si contengono sotto molti lati.

Sono li triangoli alcune volte di tre lati, con angoli acuti, e chiamansi triangoli equilateri, & alle volte sono sol di due lati vgnali, e chiamansi triangoli equicruri, iquali hanno la base differente da ciascuno di due lati vgnali; alcuni altri si chiamano anbligoni, e questi hanno vn'angolo ottuso, con due lati vgnali, e la base è molto maggiore degl'altri due lati, e quei triangoli che hanno tutti tre i lati differenti, si chiamano diuersilateri, ma quelli che hanno vn'angolo retto, si chiamano rettangoli, ò vero ortogoni, e li triangoli ortogoni, possono essere di due lati vgnali, cioè il catetto, e la base, & anco possono essere di tutte tre i lati differenti, ma di tre lati vgnali già mai si troueranno.




Ortogenio.




Equilatero.



Equicruri.



Ambligonio.



Diuersilatero.

La quinta, & vltima cosa da sapere, è corpo, il quale ha lunghezza, larghezza, & altezza, ò vero grossezza, i termini de'quali sono le superficie, & i corpi sono d'infinita specie.

Perciò che variano secondo la varietà delle superficie, come poco più oltre procedendo intenderai.

Il circolo è vna figura piana, contenuta da vna linea sola; la qual linea si chiama circonferenza: in mezzo della qual superficie, si descrive il punto, e chiamasi centro, e tutte le linee rette che partono dal centro, e vanno a trouare la circonferenza, sono fra loro vgnali.



Il diametro del Circolo, è vna linea retta, la qual passa sopra il Centro, e con le sue estremità arriva alla circonferenza, diuidendo il Circolo in due parti vgnali.

Il semicircolo, cioè mezzo Circolo, è vna figura contenuta nel diametro del Circolo, e dalla metà della circonferenza di quello.

La corda in vn Circolo, si domanda quella linea che diuide il Circolo in due parti, e non passa per il centro, onde ne segue, che quelle due parti non sieno vgnali, ma quella sia maggiore doue rimane il centro, e quella è minore, che senza ne resta.

L'Arco

L'Arco si domanda quella parte del giro del Circolo, che è segata dalla corda, come di sotto vedi. Tutta quella parte A. B. C. si chiama Arco, perchè è segata dalla corda. A. C. e l'altra parte ancora, se ben è maggiore, la quale è A. D. C. parimente è Arco, per esser segata dalla detta corda.





Delle figure quadrangolari, alcune sono quadrate, cioè di lati vguali, e di angoli retti, & alcune sono d'angoli retti, ma non di lati vguali, e sono più lunghe che larghe, e chiamansi quadrilateri, e tetragone, & alcune sono rombe, o romboide, il rombo è quello, che ha li quattro lati vguali, & in se non contiene angoli retti. Il Romboide è quello, che ha i lati, e gli angoli opposti vguali, ma non è equilatero, nè rettangolo.

Quadro.

Quadrilatero.

Rombo.

Romboide.



Volendo noi dar principio a dimostrare il modo pratico di misurar le superficie, per cosa congrua di prima ammaestrar il lettore con alcuni auuertimenti, perciò che non in tutte le Città, e Luoghi s'usa misurare con vna medesima misura, e prima diremo del modo, e costume della Città di Fiorenza.

Per il Contado di Fiorenza, si vende il terreno a staiora, & vno staioro si diuide in 12. parti, & vna di quelle parti si dice panoro, & vn panoro si diuide in 12. parti, & vna di quelle parti si chiama pugnoro, & vn pugnoro, si diuide in 12. parti, & vna di quelle parti si chiama braccio quadro, di maniere che vno staioro



E c

loro è bracc. 1728. quadre da terra, & vn braccio quadro s'intende vno spazzo, ouer superficie di terra; cioè vn quadrato ad angoli retti, che sia per ogni lato vn braccio, come questo.

Laonde diciamo, che vno staioro è 1728. di quelle braccia quadre; e se si misurasse per linea retta vna lunghezza di terra di bracc. 1728. la qual lunghezza fusse da capo, e da piedi larga vn braccio, cioè, come due linee parallele, le quali fussero lunghe braccia 1728. e larghe, cioè lontane l'vna dall'altra da ciascuna testa ad angoli retti vn braccio, di celi che quel terreno che intraprendessero le dd. linee, farebbe vno staioro apunto.

Debbono gli Agitimenfori hauer notitia della lunghezza del braccio, o canna o pertica, o piede, o tauola da misurar le terre di quel Comune, o Contado, doue vorranno misurare, auuertendo, che quasi in tutti luoghi, è differente il braccio, o canna da misurar le terre a quella da misurar il panno. Hor se s'hauesse a misurare nel Contado di Fiorça vn campo di terra quadro ad angoli retti, e che per ciascuna faccia fassè braccia 124. si domanda quante braccia quadre farà. Sappi, che l'area, ouero superficie di tutti li quadrati si hauerà dalla moltiplicazione d'vno dei lati in se medesimo, ond: multipl. 124. via 124. fa 15376. bracc. quadre; e tante bracc. farà la superficie, delle quali volendone fare staiora, parti 15376. per 12. ne viene 1281. & auanza 4. il qual auanzo salua da parte, che son braccia, & 1281. sono pugnora, delle quali volendone far panora, parti per 12. ne viene panora 106. & auanza 9. pugnora, dipoi parti 106. panora per 12. ne viene staiora 8. & auanza 10. panora, e così diremo, che il detto campo farebbe 8. staiora, 10. panora, 9. pugnora, e 4. braccia. Se il detto campo fusse stato per ogni lato canne 124. la sua superficie farebbe canne 15376. quadre; e se quel suoogli terreno farà misurato a piedi, la superficie sarà piedi quadri; e se si misurará a tauole, l'area sarà tauole quadre, e se si misurará a Cateni, come si fa in quel di Roma, la superficie sarà catene quadre; delle quali se ne fa Rubbij, o staiora, o coltre, o quarzo, o tauole, o stallo, o ciatare secondo la diuersità de' paesi, doue non si ritroua.


Per lo Stato di Siena si vendono le terre a stiaia, e misuranli a tauole, & ogni cento tauole quadre fanno vno staiio, e per la tauola s'intende vna canna lunga braccia 6. di manierache vna canna, ouero tauola quadra è braccia 36. & vn capo quadro che fusse per ogni faccia braccia 24. et tu volissi sapere, quante canne, ouero tauole quadre fusse, moltiplica 24. in se, fa 576. braccia quadre, e volendone far tauole, ouero canne quadre, parti 576. per 36. ne vien 16. e tante tauole quadre farebbe il detto campo, auuertendo di non partire le braccia 576. quadre, per 6. o per 5. o per 4. secondo la lunghezza della canna, come fanno molti poco intelligenti, i quali pensano, che per esser lunga la canna braccia 6. ogni 6. braccia faccia vna canna quadra, senza hauer riguardo, o consideratione, che altro è linea, & altro è superficie, perche se vna canna sarà lunga 4. braccia, e volend noi misurare vna canna di terreno, s'intende vn quadretto, che per ciascuna lato sia 4. braccia, la superficie del quale sarà braccia 16. quadre, come per la presente figura puoi vedete.



In Pisa, e per il suo contorno si misura il terreno a stajora, & vno stajoro è 66. pertiche, ouero canne di quella misura, & ogni canna è lunga 5. braccia, e se vn campo quadro fusse per ogni lato per truché 30. volendo sapere quante stajora sia, moltiplica 30. in se medesimo, cioè 30. via 30. fa 900. il qual parti per 66. ne viene stajora 13. & auanzano pertiche 42.

A Pescia, per tutta Valdinieuoale, si vende, si compra, si misura il terreno a coltre, qualtrici, scale, e pertiche: misurasi con vna canna, ouer pertica lunga braccia cinque da terra, auuertendo, che Pescia, Montecarlo, Buggiano, Massa, Montecatini, Vzzano, e Montevetturini, tutti questi Castelli, ouer Comuni hanno le misure, cioè le canne, ouero pertiche differenti, e chi l'ha più lunghe, e chi più corte, di manierache nasce alle volte qualche confusione, quando inauuertentemente, e quando maluolosamente, perche da qualche malizioso misuratore vien misurato con le canne più lunghe, o corte, secondo che la poca coscienza gli detta, e per seruire a chi lo chiama, e perciò quando alcuno vuol far misurare, e trattar qual suo voglia cosa, la faccia sempre misurare, e trattare da huomini dabbene, & intendenti.

Sappi, che a Pescia, e per tutto il suo Vicariato, 4. pertiche, ouer canne, fanno vna scala quadra, cioè vn quadrato di terra, che sia lungo 2. canne, e largo 2. canne, dicci che la detta superficie sarà vna scala, e 30. di quelle scale fanno vn quartiere, e 4. di quei quartieri fanno vna coltra, e se vn campo quadro fusse pertiche 25. e tu volessi sapere quante coltra sia, moltiplica 25. in se medesimo, fa pertiche 625. e queste parti per 4. ne viene scale 156. & auanza vna pertica, e partendo 156. per 30. ne viene quartieri 5. & auanzano 6. scale, e partendo 5. quartieri per 4. ne viene vna coltra, & auanza vn quartiere, e concluderemo, che il detto campo ha vna coltra, vn quartieri, 6. scale, & vna pertica.






E se il sopradetto quadro fusse per ogni lato braccia 25. da panno, la sua superficie farebbe braccia 625. le quali volendo ridurre a scale secondo la lunghezza del braccio da terra, sappi che ogni 56. braccia da panno fanno vna scala, cioè 100. braccia da terra, per 6. partendo 625. per 96. ne viene scale 6. e braccia 49. n. a se il detto quadro fusse 25. per ogni faccia braccia 25. da terra, la sua superficie farebbe 625. braccia quadre, delle quali ogni 25. fanno vna pertica, ouero ogni 100. braccia fanno vna scala, di manierache farebbe 25. pertiche quadre, cioè braccia 6. pertiche 1.

E se bisognasse di tal quadrangolo A.B.C.D. trouare la linea schianciaua, ouero diagonale, ouero diametrale, che tutte sono vna cosa medesima; cioè se volessimo trouare la quantità della linea, che si parte da vn'angolo, e va a trauerarlo di detto quadro a trouare l'altro angolo a lui opposto, come per effempio si la linea A.D. ouero B.C. si così, raddoppia la superficie di tal quadrato; la qual superficie è 625. che raddoppiaa fa braccia 250. e di questo piglia la radice quadra, ch'è $35\frac{1}{2}$. e tanto farà ciascuno di detti diametri, ma quando non fussè vn quadrangolo di lati vguali, e di angoli retti, tal regola non seruirebbe, ma si dourebbe fare come nel tetragono seguente.




Et essendo vn campo, cioè vn quadrilatero, ouero tetragono A.B.C.D. d'angoli retti, che la sua lunghezza sia pertiche 30. e la larghezza sia pertiche 16. e volendo sapere quante pertiche quadre sia il detto campo, conuien multiplicare la lunghezza via la larghezza, cioè 30. via 16. che fa 480. e tante pertiche quadre farà, delle quali ne farai staio ora, o coltre, secondo l'vso del paese, e volendo sapere quanto sia il diametro di detto tetragono; multiplica la lunghezza, cioè 30. in se stesso fa 900. dipoi multiplica la larghezza, cioè 16. in se stesso, fa 256. e queste due potenze aggiungi e insieme, fanno 1156. e di questo prendine la radice quadra, ch'è 34. e tanto diremo che sia il diametro A.D. ouero B.C.

E volendo misurare vn campo che sia come triangolo ortogonio A.B.C. che il lato A.B. sia 16. e la base B.C. si 30. Questo se ben guardi, è la metà del sopranominato tetragono, laonde, se 16 multiplicarai 16. via 30. farà 480. come il sopradetto tetragono, del quale essendo il detto triangolo la metà, piglia il mezzo di 480. ch'è 240. e tante pertiche farà il detto triangolo. Poteuasi ancora multiplicare la metà del lato A.B. via tutto B.C. ouero la metà di B.C. via tutto A.B. il qual modo è più vsato dai misuratori, e tutto torna al medesimo.




Fra tutte le superficie, che ci possono occorrere da misurarsi, si attribuisce il primo luogo al triangolo, atteso che non si può chiuder superficie alcuna da mào linee rette, che da tre, e perche dei triangoli ne son di più forte, come poco inãzi s'è

s'è detto, tratteremo parimente de' triangoli rettangoli; e poi succedentemente, degli'altri; sia adunque il triangolo ortogonico A.B.C. di due lati vguali, misurisi vno de' suoi lati vguali, e multiplichisi per se stesso, e la metà di tal prodotto sarà il numero delle braccia della superficie di d. triangolo, ouero multiplichisi vno de' lati vguali via la metà dell'altro a lui vguale, e ne verrà il medesimo, ma per maggiore intelligenza dicasi, che i lati A.B. e B.C. siano vguali, e nel punto B. sia l'angolo retto, e sia ciascun di questi due lati bracc. 6. multipl. 6. in se, fa 36. il qual diuidasi per metà ne vien 18. per la superficie di d. triangolo, ouero diuidasi A.B. in due parti, l'vna delle quali farà 3. e multiplichisi poi questa parte via tutto B.C. che è 6. farà 18. talche nell'vno, e nell'altro modo haueremo che il detto triangolo sarà bracc. 18. apunto.




1 Egli è triangolo ortogonio A.B.C. che i lati A.B. e B.C. sono vguali, & il lato opposto all'angolo retto, cioè il lato A.C. sia noto, e sia bracc. $7\frac{1}{4}$. si domanda quanto sarà ciascuno degli altri due lati. Fa così, multiplica $7\frac{1}{4}$ in se stesso fa $50\frac{1}{4}$. del qual pigliane la metà, ch'è 25. $\frac{1}{8}$. e di questo pigliane la radice quadra, e tanto sarà ciascuno de' due lati vguali, ma per più breuità, e tua maggior intelligenza, diremo, che a multipl. $7\frac{1}{4}$ in se stesso, faccia 50. apunto, lasciando stare i rotti, dipoi prendasi la metà di 50. ch'è 25. e la radice quadra di 25. la qual è 5. sarà ciascuno de' due lati vguali di d. triangolo.




2 E volendo formare vn triangolo rettangolo di lati proportionali. del quale ci sia noto vn lato solo, di quelli che concorrono a far l'angolo retto, considerisi prima se il lato propostoci, è numerato da braccia, o pertiche, che siano in numero pari, o dispari, come per essemplio, dicendo prima del numero pari, & il propostoci lato sia A.B. e sia bracc. 6. diuidasi il 6. in due parti vguali, ne vien 3. il qual multiplichisi in se stesso, fa 9. dal quale si tragga vno per regola generale resta 8. e braccia 8. sarà il lato B.C. proportionale all'A.B. che concorre con esso a fare l'angolo retto.

E se aggiungerai a quest'8. vn 2. farà 10. e tanto sarà il lato A.C. proportionale a gli altri due lati, e sapendo quanto sia il lato A.B. & A.C. e volessimo sapere quante braccia fusse B.C. multiplichisi A.B. ch'è 6. in se, fa 36. dipoi multiplichisi A.C. in se, ch'è 10. fa 100. del qual traggasi 36. resta 64. la radice quadra del quale ch'è 8. faranno le braccia del lato B.C. e se per il lato B. C. ch'è 8. & il lato A. C. ch'è 10. volessimo trouare il lato A.B. multiplichisi 8. in se, fa 64. dipoi multiplichisi 10. in se, fa 100. del qual traggasi 64. resta 36. la radice quadra del quale è 6. e tante braccia sarà il lato A.B.




3 Ma volendo formare vn triangolo rettangolo di lati disuguali proportionali del quale ci sia noto vn lato solo, di quelli che concorrono a fare l'angolo retto, e sia il detto lato di braccia in numero dispari, come per essemplio, sia il triangolo
E c 3 A.B.C.

A.B.C. & il lato A.B. sia 7. braccia, multiplichisi 7. in se fa 49. del qual traggasi 1. resta 48. dicefi che la metà di 48. ch'è 24. farà il numero delle bracc. del lato A.B. C. proportionale all' A. B. che seco còcorre a fare l'angolo retto, e se a questo 24. si aggiungerà 1. farà 25. e tanto diremo, che sia il lato A.C. proportionale a gli altri due lati; E mediante il modo dichiarato nel triangolo sopra detto potrai sempre con due lati trouare il terzo lato di qualsiuoglia triangolo rettangolo.



D Ogni triangolo equilatero volendo trouare con facilità la superficie farai in questo modo, come per esempio, sia il triangolo equilatero A.B.C. e ciascun lato sia bracc. 6. dicefi che volendo trouare la superficie di d. triangolo, si multiplichi vno di detti lati in se stesso, cioè 6. via 6. fa 36. del quale per regola generale ne piglierai $\frac{3}{4}$. cioè multiplica 12. via 36. fa 338. e questo parti per 30. ne vien $15\frac{1}{2}$. e tanto diremo che sia la superficie di d. Triangolo.

E volendo trouare la medesima superficie per vn'altro modo; Fa così, somma insieme tutti tre i lati fanno 18. del qual prendi la metà, ch'è 9. e di questo 9. caua tutti tre i lati di d. triangolo a vn per volta, restarà per il primo lato 3. per il secondo 3. e per il terzo 3. Hor multiplica questi tre residui l'vno via l'altro fanno 27. e questo multiplica via la detta metà, cioè via 9. fa 243. e la propinqua radice quadra di 243. che è $15\frac{1}{2}$. farà la superficie di detto triangolo, e questo è il vero modo di trouare la superficie d'ogni triangolo di diuersi lati, o come si voglia; ma è ben vero, che nei triangoli equilateri a prenderne li $\frac{3}{4}$. come di sopra s'è detto è molto più breue operare, e facile, ma non è così giusto, perche sempre ci sarà qualche poco di differenza, o errore notabile &c.



P Ottenasi ancora per altra via ritrouare la superficie di detto triangolo, di lati vguali, trouando prima la perpendicolare, cioè la linea del piombo, che cacci da qual'angolo si voglia sopra il mezzo del lato apposto al detto angolo, & il detto lato lo dimanderemo base di detto triangolo, la qual perpendicolare si ritroua così. Seruaci per esempio, che il detto triangolo A.B.C. sia medesimamente braccia 6. per ogni lato, multiplica vno di questi lati via 12. per regola generale, fa 78. il qual parti per 15. ne vien $5\frac{1}{2}$. e tante braccia farà la perpendicolare, e perche noi habbiamo, che dalla multiplicatione della metà della base via tutto il catetto d'ogni triangolo, ne risulta la superficie, multipl. adunque la metà di 6. ch'è 3. via tutto il catetto, ch'è $5\frac{1}{2}$. fa $15\frac{1}{2}$. per la superficie di d. triangolo. E se vorremo mediante il catetto saper quante braccia siano i lati, multiplichisi il d. catetto, cioè $5\frac{1}{2}$. via 15. fa 78. il qual parti per 12. ne vien 6. e tanto sarà la quantità delle braccia di qualsiuoglia lato, di maniera che dalla superficie si troua i lati, e da essi lati la superficie, e così da essi lati il catetto, e dal catetto i lati, e la superficie.





Perche

Perche nel trouare il catetto del sopradetto triangolo, ci siamo seruiti d'vna regola breue, e facile, ma non così giusta come si richiede, perciò a noi par cosa ragionevole di dimostrarre il vero, e general modo da trouare i catetti d'ogni triangolo equilatero, seruaci adunque per esempio il medesimo triangolo A.B.C. che ogni suo lato sia 6. braccia, del quale volèdo trouare il catetto diremo così. Chiamerò cosa è che il catetto diuide la superficie di d. triangolo in due triangoli vguali, & ortogoni, che la base di cia scuno sarà 3. percioche il catetto, cadendo sopra il punto D. diuide la base B.C. in due parti vguali, e perche tutto B.C. è 6. adunque B.D. sarà 3. e così D.C. sarà 3. Inteso questo dirai così. Egli è il triangolo ortogonico, che per il maggior lato A.C. è braccia 6. e per la base D.C. è braccia 3. si domāda quant'è la perpendicolare A.D. Farai in questo modo, quadra A.C. fa 36. dipoi quadra D.C. fa 9. hor caua 9. di 36. resta 27. e la radice quadra di 27. farà il catetto di detto triangolo, ma perche 27. è numero sordo, e nō se ne puol pigliare la radice discreta, e di sopra dissemo che il catetto era braccia $5\frac{1}{2}$. la qual cosa non è vera, perche multiplicando $5\frac{1}{2}$. in se medesimo fa $27\frac{1}{4}$. e douerebbe fare 27. appunto. Laonde perche tal differenza non è cosa di momento, però si può dire che il detto catetto sia braccia $5\frac{1}{2}$. ma veramēte il suo catetto è radice 27. che è quanto voleuamo dimostrare. E volendo dimostrarre quanto sia la superficie di detto triangolo equilatero; multiplica A.D. cioè radice 27. via D.C. cioè 3. il che far non possiamo, se prima il detto 3. non si teca à radice, e ca adunque 3. à radice, sarà 9. e così puoi multiplicare Radice 9. via Radice 27. fa Radice 243. per la superficie giusta del triangolo equilatero. Sappi che quando noi diciamo, quadra A.C. se A.C. sarà 6. braccia, noi vogliamo dire n. multiplica 6. che tanto vuol dire quadra 6. quāto multiplica 6. in se medesimo; che l'vno, e l'altro fa 36. si dice quadrato, & il 6. si dice esser la radice quadra di 36. Et ancora, tanto vuol dire la potenza di 6. quanto il quadrato di 6. percioche la potenza di 6. è 36. & il quadrato di 6. parimente è 36. e perciò andanda à memoria queste cose, che nell'operationi di queste pratiche ti gioueranno assai.

Egli è il triangolo equicurio A.B.C. che A.B. & A.C. sono fra loro vguali, e ciascuno di detti due lati è braccia dieci, e la base B.C. è braccia 12. si domanda la perpendicolare, e la superficie di detto triangolo.


Questa è simile alla sopradetta, e perche A.B. & A.C. sono vguali, ne segue che il catetto diuida la superficie; e la base B.C. in due parti vguale, e formi due triangoli ortogoni, & vguali infra di loro; che vno de quali sarà il triangolo A.D.C. e l'altro A.D.B. e la base di ciascuno sarà braccia 6.

Hor volendo trouare il catetto, quadra D.C. fa 36. dipoi quadra A.C. fa 100. del qual caua 36. resta 64. e la radice quadra di 64. che è 8. diremo che sia il catetto A.D. e volendo sapere quanto sia la superficie, multiplica tutto A.D. che è 8. via la metà di tutta la base B.C. che la metà è 6. farà 48. per la superficie di tutto il triangolo equicurio.



Volendo adunque il buon pratico Agrimensore misurare il triangolo d'ueri-
lati A.B.C. prima procurerà d'hauer 3. o 4. cannuce diritte, & alte 4. o 5. bracc.
in circa, & a ciascuna metterà vn pezzo di carta bianca in cima, per poterle me-
glio vedere di lontano, le quali poi si domandano banderuole, ouer segni di ve-
duta, & vna di dette canne la planterà sopra l'angolo A. l'altra su l'angolo B. e l'
altra su l'angolo C. in tal modo, che stando il misuratore su l'angolo A. e risguar-
dando la canna B. e la canna C. non auanzi fuor della linea visuale, da vna cana
all'altra alcuna parte di d. campo; nè meno si comprenda d'entro a dd. linee visuali
alcun'altra parte di terreni, o strade, o fossati, o letti di fiumi, se già i dd. confini
non fussero talmente tortuosi, che andassero serpendo, perliche in tal caso il giu-
ditioso, e pratico misuratore anderà con detta linea visuale dando, e togliendo,
secondo che giudicherà ragioneuole, e questo dare, e torre non s'vfa se non nelle
tortuosità, e svolte picciole, perciòche nelle svolte grandi, l'occhio, & il giudi-
zio puole ingannare, e dar più, o men terreno, che non ci ricue.


Hor hauendo aggiustati i confini di d. triangolo con le d. canne, ouer segni di
veduta, misurerà la base B.C. ch'è pertiche 28. dipoi piglierà lo squadro, e lo pia-
terà su la base B.C. in tal lungo, portandolo tanto inanzi, & indietro, che guar-
dando per le fessure dello squadro vedrà la cannuccia B. e la cannuccia C. e sen-
za muouerlo vedrà ancora la cannuccia A. voltandosi d. misuratore hora da vna
banda, hora dall'altra dello squadro; e di doue vedrà questi tre punti, iui cade-
rà il catetto di d. triangolo; perliche subito misurerà dal piede dello squadro, che
poniamo sia il puto D. per fino al punto A. e trouerà che vi sono pertiche 24. cioè
il catetto A.D. del qual piglierà la metà, ch'è 12.
e questo lo moltiplicherà via la base B.C. ch'è 28.
farà 336. e tato farà la superficie, e questo è il giu-
sto, e vero modo di misurare. Nò ti marauigliare
se habbiamo piantato lo squadro sopra la linea, o
vero base B. C. perche si può piantare sopra qual
linea ci piace; ma è più sicuro a piatarlo sopra vna
linea più lunga, che sopra vna più corta, perche
piantandolo sopra la linea più corta, potrebbe esser
che il catetto cadesse fuor del triangolo, come
per la seguente proposta potrai vedere.



9. Acciò che si possa conoscere, che piantando lo squadro sopra la linea più cor-
ta d'vn triangolo puol'accadere che il catetto caschi fuor di d. triangolo, ci ser-
ua per esempio il triangolo M.N.O. che l'angolo N. sia ottuso, diccsi che pian-
tando lo squadro sopra la base N.O. in qual parte ti piace è impossibile per le fes-
sure dello squadro, oter vedere tutti tre gli angoli M.N.O. perche se tu plantarai
lo squadro su l'angolo N. e lo drizzerai verso l'angolo O. e senza muouer poi lo
squadro ti voltarai a guardar per l'altra fessura dello squadro verso l'angolo M.
diccsi che mai lo potrai vedere, e volendo vedere l'angolo M. vi sarà forza tirar-
ti tanto indietro a dirittura della linea N.O. che tu possa vedere i punti N.O. in
retta linea, con vna veduta sola, e poi voltandoti dall'altra banda senza muouer
lo squadro, si veda l'angolo M. che poniamo casoti còuenisse plantar lo squadro
in punto P. adunque chiaramente si vede che il catetto caderebbe fuor del trian-
golo, e perciò volendo trouare il catetto dentro di qualsinaglia triangolo, habbi
sempre auertenza di plantar lo squadro sopra vno de' lati più lunghi, e portarlo
tanto

E c 4

tanto inanzi, & indietro, che si vedino tutti tre gl'angoli, o cannuoce erette in essi, come se in questo tu hauesli piantato lo squadra sopra il lato M.O. in punto R. doue di d. luogo si può vedere per le fessure dello squadra tutti tre gli angoli M.O.N. di manierache la linea N.R. sarà il catetto, e trouarai che hauerai il catetto con lo squadra, potrai misurare quel terreno secondo l'ordine dato, cioè misurar la base M.O. & il catetto N.R. dipoi multiplicar la metà della base via tutto il catetto, ouero la metà del catetto via tutta la base, & il prodotto sarà la superficie di d. triangolo.



10 Poterai trouare la superficie di d. triangolo senza l'ineuigation del catetto N.R. in questo modo, cioè, misurare tutti tre i lati, de'quali pongasi, che M. N. sia 17. e N.O. sia 10. & O.M. sia 21. diccsi che in tre modi si può trouare la superficie di questo triangolo.


Il primo modo è sommare tutte tre le faccie, e della somma prender la metà, e di detta metà trarne tutte tre le faccie a vna per volta, & i residui multiplicare l'vno via l'altro, come per la 7. si dimostrò, & in questo modo trouarai, che la superficie sarà 84.

Il secondo modo è questo cioè, che per forza de' numeri, dei lati di d. triangolo si troui il catetto secondo l'8. propositione, trouarai, che il catetto N.R. sarà 8. & essendo la base M.O. 21. ne segue, che tutta la superficie sia 84.

Ma quando vno non sapesse trouare la superficie in alcuno de' sopradetti modi e che dentro a quel triangolo non si potesse andare per l'impedimento, e densità di qualche bosco, o per esser luogo paludoso, e che pur bisognasse trouare la superficie di d. triangolo, sarebbe forzato il buon pratico misuratore a fare in questo modo, cioè, pigliare lo squadra, & andare sul punto, ouero angolo N. e tirarli tanto dirittamente indietro, che per la fessura dello squadra con vna sola veduta potesse vedere l'angolo N. e l'angolo O. e dipoi voltandosi dall'altra banda, senza muouer lo squadra, potesse per l'altra fessura vedere l'angolo M. laonde diccsi che a voler vedere questi tre angoli M.N.O. con vna sola positione di squadra, bisognerebbe che si discostasse dall'angolo N. per fino al punto P. doue poniamo caso, che sia pertiche $2\frac{1}{2}$. e dal punto P. per fino all'angolo M. farà il catetto del triangolo ortogonio M.P.O. che M.P. sarebbe pertiche $16\frac{2}{3}$ e la base P.O. sarebbe pertiche $12\frac{1}{2}$. adunque tutta la superficie sarebbe pertiche 105. della quale bisognerebbe cauare la superficie del triangolo ortogonio M.P.N. il quale hauendo per catetto M.P. ch'è pertiche $16\frac{2}{3}$ e la base P.N. è pertiche $2\frac{1}{2}$. la sua superficie sarà pertiche 21. le quali tratte da pertiche 105. restano pertiche 84. per la superficie del triangolo diuersilati M.N.O. fanno prova in quel modo che ti piace, e trouarai esser così la verità.

12 Il Romboide è vna figura parallelograma, non rettangola, che ha solamente i lati, e gl'angoli opposti vguali, e volendo misurare dette figure romboide, bisogna tirare vn diametro il piu lungo che possibil sia per mezzo di dette figure, il qual diuida il romboide, in due parti vguali, cioè in due triangoli, come per essempio, se volessimo misurare il romboide A.B.C.D. che per ciascuno de' lati A.B. e D.C. sia 37. i quali lati sono opposti, e sono equidistanti, e gl'altri due lati A.D. e B.C. sono similmente vguali, & equidistanti, e ciascuno di essi è 15. & il diametro A.C. sia 44. il qual diametro diuida il detto Romboide in due triangoli vguali; cioè il triangolo A.B.C. & A.D.C. che ciascun di essi è ambligonio, prima bisogna trouare il catetto d'vno di detti triangoli, come il catetto D.F. o vero il catetto B.G. perciò che essendo i triangoli vguali, i catetti ancora faranno parimente vguali, ma prima bisogna trouare sopra che punto cadono del diametro A.C. i catetti di detti triangoli, in questo modo, cioè, trai la potenza di A.B. che è 1369. delle potentie A.D. & A.C. insieme giunte, che vna è 1936. e l'altra è 225. che giunte insieme fanno 2161. e di questo cauane 1369. resta 792. il qual residuo parti per il doppio del diametro A.C. cioè per 88. ne vien 9. per la quantità A.F. ouero C.G. doue caderanno i catetti, imperòche sono fra loro vguali, adunque F.C. ouero A.G. farà 35.

Hauendo trouato, che i catetti caderanno vno sul punto F. e l'altro sul punto G. ci resta a trouare la quantità di essi catetti F.D. e G.B. in questo modo cioè, tu hai il triangolo ortogonio A.F.D. che per la schianciana A.D. è 15. e per la base A.F. è 9. e volendo trouare il catetto F.D. dicesti, che se della potentia A.D. ch'è 225. che ne trarrà la potentia di A.F. ch'è 81. resterà 144. e la radice quadra di 144. ch'è 12. diremo che sia il catetto F.D. e similmente il catetto B.G. e volendo la superficie di tutto il romboide, multiplica tutto il diametro A.C. ch'è 44. via tutto il catetto F.D. ouero G.B. che l'vno, e l'altro è 12. farà 528. e tanto sarà la superficie del d. romboide.




Il buon pratico Agrimenfore non deve cercare i catetti di detti triangoli per forza di numeri, ma solo con lo squadra, in questo modo cioè. Misurisi prima il diametro A.C. ch'è 44. dipoi piantisi lo squadra col d. diametro, e portisi tanto innanzi, & indietro, che si trouino i catetti nel modo, che più volte s'è detto, che vna volta si pianterà sul punto F. e trouerassi il catetto F.D. e l'altra volta si pianterà sul punto G. e trouerassi il catetto G.B. che ciascuno sarà 12. e volendo sapere, quanto sia la superficie d'ambidue i triangoli A.B.C. e C.D.A. multiplienlisi la metà delle bafe A.C. via tutto il catetto F.D. ouero G.B. che l'vno, e l'altro farà 264. per la superficie d'vn triangolo solo, raddoppio 264. farà 528. per tutta la superficie del romboide.

13 Potuasi ancora operare in quest'altro modo, cioè, piantar lo squadra su l'angolo D. e dirizzarlo verso l'angolo C. dipoi voltarsi senza muouer lo squadra, e guardar per l'altra fessura, la qual poniamo caso, che riguardi il punto N. & iui ergerre vna cannoccia, ouero mazza, dipoi piantar lo squadra su l'angolo B. e dirizzarlo verso l'angolo A. dipoi voltarsi senza muouer lo squadra, e guardar per l'altra fessura, la qual poniamo, che mirasse in punto Q. doue parimente do-

uerch-


douerebbersi piantare vna cānuccia, di manierache in ciascuna

testa di d. romboide farebbe vn triangolo ortogonio, cioè il triangolo A. N. D. e C. O. B. e nel mezzo di essi restarebbe il quadrilatero rettangolo N. B. O. D. fatto questo douerebbersi misurare la base, & i catetti de' triangoli & i lati del quadrilatero, e farne il cōto, com'altre volte s'è detto.



14 Egli è il quadrangolo A. B. C. D. non continente in se alcun'angolo retto, di due lati equidistanti, e non vguali, e di due altri lati vguali, ma non equidistanti, che per il lato A. B. è 10. e per il lato opposto C. D. è 28. e gli altri due lati A. C. e B. D. ciascuno è 15. e si domanda la superficie.

In questa bisogna prima trovare la linea del piombo, cioè i catetti, perciò che se tiraremo la perpendicolare A. E. e B. F. sopra la base C. D. diuideremo questa figura in tre parti, delle quali vna sarà il quadrato rettangolo A. B. E. F. il quale haurà due triangoli ortogoni vguali, cioè A. C. E. e B. F. D. e perche A. B. è 10. diremo che E. F. sia parimente 10. adunque C. E. & F. D. saranno fra tutte due 18. cioè l'auanzo fino in 28. e perche C. E. & F. D. sono fra loro vguali, ne segue che essendo 18. fra tutti due, sia ciascun di loro 9. Saputo questo, e volendo trovare il catetto A. E. ouero B. F. facciasi così, della potentia A. C. ch'è 225. traggasi la potentia di C. E. ch'è 81. resta 144. e la radice quadra di 144. ch'è 12. diuino che sia il catetto di ciascun triangolo, adunque la superficie di ciascuno di detti triangoli sarà 54. e fra ambedue sarà 108. e la superficie del quadrato sarà 120. la quale aggiunta con 108. sarà 228. per tutta la superficie del quadrangolo: ma volendo poi ritrouare tutta la superficie in vna volta sola, troua prima la linea del piombo nel modo sopradetto, la qual'è 12. di poi somma tutta la base C. D. ch'è 28. con la testa A. D. ch'è 10: farà 38. del qual prendi la metà ch'è 19. e questo multiplica via la linea a piombo, ch'è 12. farà 228. per tutta la superficie, come di sopra.




Ma il pratico Agrimensore non deue procurare l'investigatione de' catetti per forza di numeri, se già non fusse necessitato, come molte volte accade, & accaderebbe in questo, se fusse luogo paludoso, o ver boscato, il qual solamente si potesse circondare; dicessi che bisognarebbe co' lo squadro trouare sopra che punto della linea C. D. cadono i catetti, il che facendo, si trouerebbe che vno cade nel be in punto E. e l'altro in punto F. Fatto questo bisognarebbe per forza di numeri trouare la quantità del A. E. e B. F. e di poi trouare la superficie nel modo sopradetto.

Il sopradetto quadrangolo A. B. C. D. non essendo luogo paludoso, ne boscato, e che per dentro si potesse andare, si potrebbe ancora misurare in questo modo.

Prima tirate la linea B. C. o vero A. D. e sarebbe diuiso il detto quadrangolo in due triangoli di diversi lati, e non vguali, cioè B. A. C. e B. C. D. di poi piantar lo squadro sopra la linea B. C. e portarlo tanto inanzi, & indietro, che si trouasse


il catetto A.E. fatto questo conuerrà misurar la base B.C. & il catetto A.E. dipoi piantar lo squadra sopra la linea C.D. e nel medesimo modo trouare il catetto B.F. dipoi misurare il catetto, e similmente la base C.D. e misurare che sono le base, & i catetti d'ambiduei triangoli, bisogna trouar la superficie di ciascuno nel modo che più volte s'è detto, e tornerà la medesima superficie, come nell' operare, che di sopra s'è fatto.




16 Egli è il quadrangolo A.B.C.D. di due lati equidistanti, e non vguali e di due altri lati non equidistanti, né vguali, né continenti in se alcun'angolo retto, che la testa A.B. è 20. e per l'opposita C.D. è 48. e per il lato A.C. è 26. e per l'altro opposto è 30. si domanda la superficie di detta figura.

Prima bisogna trouare i catetti A.E. e B.F. li quali faranno fra loro vguali, & equidistanti per esser la linea A.B. parallela alla C.D. e per tanto E.F. sarà vguale alla testa A.B. la qual'è 20. adunque E.F. parimente 20. Laonde ne segue che la base d'ambiduei triangoli ortogoni, che sono continenti a due lati del quadrato faranno 28. perciò che tutto C.D. è 48. e così habbiamo diuiso la d. figura in tre parti, cioè il quadrato A.B.E.F. il quale ha due lati noti, e due ignoti, e li due lati ignoti di d. quadrato sono fra loro vguali, e parimente vguali ai catetti de' due triangoli ortogoni, e perche i dd. catetti sono fra loro vguali, se congiungeremo insieme il catetto A.E. con il catetto B.F. in tal modo che la base C.E. d'un triangolo s'unisca, e sia vna con la base F.D. dell'altro triangolo, noi comporremo vn triangolo di diuersi lati, e noti, perche la base C.E. e F.D. faranno vna base sola, che sarà 28. & il lato A.C. sarà 26. & il lato B.D. sarà 30. del qual triangolo bisogna trouare il catetto, come per la 7. ma prima conuien trouare sopra che punto cade, come per la medema.


Trouarai, che F.D. sarà 18. e C.E. sarà 10. e per la medesima trouarai che il catetto A.E. e B.F. ciascuno sarà 24. e così tanto sarà ciascuno de' due lati ignoti del quadro A.B.E.F. e volendo trouare l'area superficiale, offrua il modo delle sopradette, trouarai, che la superficie sarà 816. i tutto



17 Poteuasi ancora la d. figura A. B. C. D. diuidere in due triangoli: perciò che, tirando la corda A.D. si formerà il triangolo A.B.D. & A.C.D. piantisi dipoi lo squadra tanto inanzi, & indietro sopra la linea A.D. che si troui il catetto B.F. e misurisi la corda, & il catetto: dipoi piantisi lo squadra sopra la base C.D. e portisi tanto inanzi, & indietro che si troui il catetto A.E. e misurisi la d. base, & il catetto, dipoi trouisi la superficie ne i modi più volte dati, moltiplicando la metà della base: via tutto il catetto di ciascun triangolo, o vero, versauice.



18. Hauendofi à misurare vn campo di quattro lati, come la figura M. N. O. P. nella quale sono due angoli retti, cioè, l'angolo M. e O. e la testa M. N. è 20. & è parallela alla base O. P. la qual'è 50. e il lato M. O. che contiene li due angoli retti è 12. si domanda la superficie di detto campo. Fa così, somma 50. della base, e on 20. della testa, fa 70. del qual prendi la metà che è 35. e questo moltiplica via la linea del piombo che è 12. fa 300. per la superficie del proposto campo: Ma molti che hanno poca esperienza del modo di misurare, farebbono così, diuiderebbono il detto campo in due parti, cioè nel quadrangolo M. N. O. Q. e nel triangolo ortogonio N. Q. P. e piantarebbono lo squadra in punto Q. e misurarebbono la linea Q. N. la qual farebbe pur 12. comune al quadrangolo, & al triangolo, & O. Q. farebbe 20. e per la base Q. P. del triangolo restarebbe 30. che tra la superficie del quadrilatero, e del triangolo farebbe parimente 300. di maniera che in questo secondo modo ne peruerrebbe più briga che sapere &c.



Perche niuno, ò rari sono i cāpi che sieno quadri perfetti, ò quadrilateri, rettangoli, ne meno che habbino pur vn sol'angolo retto, de' quali pochissim' si troua, ma si trouano bene di molte variate forme di campi, di più di quattro faccie, però dimostraremo il modo che dal pratico Agrimensore si deue offeruare nel misurar qualsivoglia forma di campo, per cosa conueniente di prima ammaestrarlo con questi auuertimenti.

Primo Auuertimento!

D Ouendofi misurare vn campo, che da vn lato, ò più lati confinasse con vna strada pubblica, e che tra la via, & il campo si ritrouasse vna fossa debbesi misurare tutta la fossa insieme con il campo, cioè tanto quanto è larga la fossa in fondo, senza misurare la sponda, ò vero argine della strada, che confina con detta fossa, & essendo poggio doue non sia fossa; si misura per sino su la strada, lasciando solo la larghezza della strada, &c.

Secondo

Secondo auuertimento:

DOuendosi misurare vn campo, che da vn lato, ò più lati confinasse con vna via vicinale, ancorche infra'l detto campo, e la via, si ritrouasse vna fossa, deuesi misurare fino a mezzo della detta via, e così si douerebbe fare essendo in poggio.

Terzo auuertimento.

DOuendosi misurare vn campo, che da vn lato, ò più lati confinasse con vn altro campo, ò con più campi d'altri padroni, e che infra'l campo che si vuol misurare, e gli altri si ritrouasse vna fossa, ò vn solco in mezzo, si deue misurare detta fossa, ò solco per metà, se già qualcuno non giustificasse hauer fatto la detta fossa, ò solco sul suo campo proprio, si come fanno molti balorai; la qual fossa, ò solco in spatio di tempo gli è messa in compromesso.

Quarto auuertimento.

DOuendosi misurare vn campo il qual confinasse con vn riuo, cioè vn fossatello, ancorche conducessi acqua; tanto nel piano, come nel poggio, si deue misurare il detto riuo per metà, & essendo torrente, ò fiume grosso, si deue misurare per fino al pian dell'acqua, cioè tutto l'argine, e lassare tutto il letto del fiume, ò torrenti, senza misurare, e se quel tal campo da misurarli fusse confinato da vn fiume, e che da quella parte facesse molte svolte, e tortuosità, purchè non sieno di molta grandezza, come poco più innanzi procedendo potrai vedere nell' piante da noi disegnate, diceasi, che in tal caso si deue tirare vna linea dritta lungo il fiume, di maniera che di dette tortuosità, tanto ne venga a torre, come a dare al detto campo; e quel che si dice d'vn fiume, si dice ancora delle strade, e fosse, che procedessero con simili tortuosità.

Quinto auuertimento.

DOuendosi misurare vn campo, il qual confinasse con vn fosso di comune, il quale per essere più largo delle fosse ordinarie, diceasi, che si deue misurare di detto fosso, tanto quanto farebbe larga vna fossa ordinaria, e non più, come quelle che sono tra vn vicino, e l'altro.

Sesto auuertimento.


DOuendosi misurare vna possessione in poggio, e che alla sommità di detta possessione contigua a i Lioni de Vicini, non vi sia fossa, come in nessuna, o in pochissime si troua, ma che solo vi sia vn greppo, ò verciglione, diceasi, che tal greppo, è della parte di sopra, & il padrone che doua sotto, non puole

aggiare, raschiare, nè toccar d.greppo, e perciò non si deue misurare per la parte di sotto, offeruifi poi secondo l'vltima de' paesi.

19 Hauendo fin quitrattato del modo, come si misurino i triàngoli separatamēte di qualsiuoglia sorte, e delle considerationi che deue hauere l'Agrimēfore intorno ai fiumi, fossati, strade, & altri confini, che posson circondare quei campi, che s'hanno a mirare; Tratteremo al presente, come si deuono misurare i campi che haouessero 4. facce non vguali, e non continenti angoli retti, & anco di quei che haouessero più di 4. facce. E prima. Tutti quei campi, che haneranno 4. o 5. e più facce, dicessi, che potend' cauare vn quadrato, o vn quadrilatero, o più quadrilateri, hor piccoli, hor grandi, purché habbino gli retti, si posson formare e misurare, dipoi quei triàngoli, o gombi, che auanzano fuori di dd. quadrilateri misurarli con diligenza, riducendoli a più perfettione triangolare, che possibi l sia. E quando quei quadrilateri non fossero così perfettamente ad angoli retti, e che qualche poco fusse più lungo vn lato, che vn'altro, in tal caso si posson misurare in croce, ouero tutte 4. le facce, caminando con le canne, o pertiche più rettamente, che si può, perciò che in molti luoghi non si puol'adoperar lo squadra, se non con gran perdimento di tempo, massimamente nei poggi, rispetto alle valli, e poggetti, che impediscono, nulladimeno il pratico misuratore, qualche non può fare con vna misura d'vn quadrato, o d'vn triàngolo, lo fa con 3. o 4. misure, e piu se fa di bisogno; e perciò in simil luoghi bisogna giuocar di pratica. E misurate che sono tutt' 2 4. le facce del quadrilatero, se vna faccia fusse lunga pertiche 20. e l'altra opposta fusse 22. queste due lunghezze bisognarebbe raggualiarle, sommando 20. con 22. fanno 42. e di questo se ne prede la metà, ch'è 21. e tanto diremo, che fusse lungo raggualiatamente il d. quadrilatero; e così se fusse largo da vn lato pertiche 12. e dall'altro lato opposto pertiche 13. si sommarebbe 12. con 13. fanno 25. e di questo se ne prende la metà, ch'è 12½. e tanto si direbbe, che raggualiatamente fusse largo d. quadrilatero, dipoi volendo sapere la sua quadratura, si multipl. 21. via 12½. che fa 262½. e tanto si direbbe, che fusse la superficie, secondo il modo praticale, che poco suaria dal giusto.


Ma il vero modo di misurare i campi è questo cioè, di ridurli tutti in triàngoli, e siano di quante faccie si vogliono, tirando la corda da vn'angolo all'altro, e poi con la squadra treuare il catetto, come per esempio sia il campo A.B.C.D. il qual non contiene in se alcun angolo retto, volendo trouare la quadratura fa così, tira vna linea retta da quell'angoli, che sono l'vno dell'altro piu lontan, la qual linea non solamēte viene ad esser guida della base di tutti i triàngoli, ma per quella si trouan meglio i catetti: che in questa propositione la d. linea vien ad esser A.C. la qual diuide il d. campo in due triàngoli, de' quali vno farà il triàngolo A.B.C. e l'altro A.D.C. de' quali bisogna hora trouare i catetti con lo squadra nel modo che s'è detto, e trouerai che vno ca. terà nel punto E. il qual poniamo che sia pertiche 18. e l'altro caderà in punto F. e poniamo che sia pertiche 30. e la base A.C. che è comune ad ambedue i triàngoli, poniamo che sia pertiche 60. laonde volendo la quadratura di d. cāpo, somma ambedue i catetti insieme, cioè 18. e 30. fanno 48. del qual piglia la metà, che è 24. e questo multiplica via la base A.C. che è 60. farà pertiche 1440. per la quadratura, o superficie di d. campo. Potreuasi ancora pigliar la metà della base, cioè di 60. la qual'è 30. questo multiplicare via il congiunto d' ambedue i catetti che è 48. farà pure 1440. & ancora si puol' trouare la superficie di ciascun triàngolo da per se, e poi sommarle insieme, e farāno la medesima superficie.

E perche



20 Eperche auuicne
 fpeffe volte, che mi-
 furando vn campo si
 vien ad interchiude-
 re, e mifurar qualche
 particella d'vn altro
 C câpo di qualche vici-
 no, rifpetto le tenuo-
 fia de' cõfini, il che
 fi fa per tai manco fi-
 gure in d. campo, co-
 me per effenpro, fia
 vn campo finile a
 quello segnato A. B.
 C. D. di quattro lati
 diuerfi, e non c. ten-
 nente in fe alcun an-
 golo retto, qual vo-
 lèdo fecõdo le rego-

le noftre mifurare, tirifi la linea diagonale C.B. qual diuiderà il câpo in due tri-
 angoli, e d'ambidue i triangoli la d. linea C.B. viene ad effer bafe, la qual poniamo
 che fia lunga pertiche 50. e fopra la d. linea fi tiri con lo fquadro il catetto A.E.
 il qual poniamo, fia pertiche 24. e fimilmente fi tiri il catetto D.F. qual poniamo
 fia pertiche 28. e ciò fatto, fomma inſieme i catetti fanno 52. prendine la metà
 ch'è 26. e queſto moltiplica via tutta la bafe, ch'è 50. fa 1300. per la quadratura
 di d. câpo, ma perche vi s'in-
 terchiude quella particella
 di terra, qual poniamo che
 fia d'vn'altro câpo, ouer vna
 fuolta di ſtrada, com'è il tri-
 angolo G.I.H. mifurifi la bafe
 G.H. qual poniamo che fia
 pertiche 16. dipoi mifurifi il
 catetto I. K. qual poniamo,
 che fia pertiche 5. multipl. il
 catetto via la metà della ba-
 ſe farà 40. pertiche, quali trai
 di 1300. che ſono la quadra-
 tura di tutto il corpo del câ-
 po, reſtaràno pertiche 1260.
 delle quali ne farai ſtaiora,
 o coltre ſecõdo l'vſanza del
 paefe, doue ti trouarai a miſu-
 rare, e faranno 2. coltre, 2.
 quartieri, e 15. ſcale al netto,
 ſcãza quella parte del vicino.



Ff 2

21 Egli

21 Egli è vn campo di cinque lati differenti, segnato A. B. C. D. E. come qui di sotto vedi, del quale vogliamo sapere la superficie.

Prima pianta vna cannuccia (con vn foglio bianco in cima da potersi veder di lontano) sopra tal'angolo di detto campo, che tirando le corde, o linee visuali dal detto angolo, a gli altri angoli opposti, si venga a disegnare in detto campo quella quantità di triangoli che si può, come per esempio in questo; pianta vna cannuccia sopra l'angolo A. e tira la corda A. C. la qual poniamo, che sia pertiche 40. o seruaci per base comune de due triangoli A. B. C. & A. D. C.


Lionde se pianterai vna canna su l'angolo B. & vn'altra su l'angolo C. & vn'altra su l'angolo D. potrai co lo squadra caminar tanto inanzi, & indietro; su per la linea A. C. che si troui il catetto B. F. il qual si presuppone, che sia pertiche 18. & il catetto D. G. pertiche 24. fatto questo, toglì via le canne B. e C. e piantane vna su l'angolo E. & hauerai figurato il triangolo A. E. D. del quale con lo squadra trouerai il catetto E. H. il qual diciamo esser pertiche 16.

E così hauerai fatto tutte le misure del detto campo, del qual volendo saper la superficie, somma insieme il catetto del triangolo A. B. C. che è 18. con il catetto del triangolo A. D. C. ch'è 24. faranno 42. del qual prendi la metà, che è 21. e questo moltiplica via la base comune A. C. che è 40. farà pertiche 840. per la quadratura di questi due primi triangoli; dipoi troua la quadratura del triangolo A. E. D. che la sua base è 38. prendine la metà, ch'è 19.

E questo moltiplica via il catetto E. H. ch'è 16. farà pertiche 304. per la quadratura di d. triangolo, la quale aggiunta con 840. farà in tutto pertiche 1144. e tante canne farà la superficie di d. campo.

22 Parrà forse a qualcuno che sia cosa superflua il portar con seco, tre, o quattro cannuccie quando si vada a misurare, piantarle sopra quegli angoli di quei campi, che si vogliono misurare; ma chi discorrerà ben con sano giuditio, conoscerà che non solo son bisognuoli in tali operationi, ma necessarie, poiche non si può misurare giustamente senz'esse, o altri segni, che seruino per segni di veduta, perciòche quando tu pianterai vna cannuccia sopra vn'angolo di detto campo, tu hauerai sempre riguardo, e consideratione, che le due linee, cioè fossi, o confini, che formano tal'angolo, venghino giustamente, e dirittamente dando, e togliendo, o delle fosse, o del campo ad arbitrio del sano giuditio del misuratore, di maniera tale, che il campo resti sempre ricoupenfato.


E quiui doue la dirittura di dette fosse, o confini si riscontraranno, e faranno angolo, quiui pianterai vna cannuccia, acciòche essendo poi nel mezzo del campo, o in qualch'altra parte, con lo squadra si possino chiaramente vedere i detti angoli, come per essempio, se fussimo su per la corda A. C. e volessimo trouare il catetto B. F. se prima non haueffimo piantato vn segno su l'angolo B. e che a caso volessimo misurare alla dirittura di tal'angolo, non ha dubbio alcuno, che tal catetto si potrebbe facilmente proderre più lungo del douere, e perciò noi diciamo esser di necessria hauer almeno 3. canne per piantarle, e formare il triangolo; e quando d'vna di dette canneti sei seruito, cioè di quella dell'angolo del catetto B. F. misuraro che farà il detto catetto, leuala via, e piantala sopra vn'altro angolo, del qual s'habbia a trouare nouamente il catetto, e così farai intorno, intorno al detto campo, fin tanto che sia finito di misurare.



23 Hauendo inteso il modo, col quale si deue procedere nel misurare i cāpi d'4. o 5. lari, ti fara facilissimo intēdere il modo, che si deue tenere a misurare ogni sorte di campire siano di quante faccie si vogliono. Ma perche spesse volte si troua dei campi, che da qualche parte hanno cer e rotondità. le quali a chi non fusse ben pratico, darebbono da pensare a ritrouare il modo da misurare detti cāpi, e rotondità, & ancora molte volte può accadere, che qualche lato di detti cāpi, per causa di lelli, o funa, e strade andasse sciupando, e molto tortuoso, per tãto il giudizioso Agrimensore, cessi per l'vna, come per l'altra cagione deue pensatamente misurare, e tener quest'ordine, cioè. Se volessimo misurare vn campo, che la sua pianta stesse ce ne l'initrascritta. Prima si deue eleggere vn'angolo, del quale si possino tirar le base di tutta quelle minor quantità di triangoli, che dentro a d. campo si possino figurare, il qual'angolo diremo che sia l'angolo A. e lo chiamiamo angolo con.une, circōdando intorno tutto il d. cāpo, poniamo che formi tutti questi angoli, A.B.C.D.E.F.G.H.I. come nella seguente figura vedi.

Così uisti, che hauerai tutti gli angoli, tirarai la corda, ouero linea A.C. e A.D. e A.E. e A.F. e A.G. e A.H. e così hauerai tirato sei base, e figurato sette triangoli, de' quali misurerai la base, e subito che hauerai misurato la base d'vn triangolo, procurarai con lo squadro di trouare, e misurare il catetto, seruendoti delle 3. cannuce a ciaschedun triangolo, e così farai fin tanto che tu gli habbi misurati tutti, auuertendo che la linea A.G. sarà base comune di due triangoli, cioè del triangolo A.F.G. e del triangolo A.H.G. e misurato che hauerai le base, & i catetti di ciascun triangolo, ti sarà facile, per via delle regole già date) a trouar la lor quadratura, che per non esser tanto la d. figura. noi non ci habbiamo posto la quantità delle pertiche. Quanto poi alle tortuosità, e fuochi che nei cāpi possono accadere, dice si, che essendo le solite di non troppa grandezza, e ne nella pianta si vede, si deue tirare diritta la corda, & in tal modo. che tanto si venga a torre, come a dare al d. campo. E quando dal punto A. cioè dall'angolo comune, che per tale hauerai detto, non si potesse tirar le corde a tutti gli angoli di d. campo, o s'io, per causa di qualche valle, o poggetto. che impedissero la vista di tali angoli, o perche fosse le corde, o linee passatecbbono furri di d. cāpo, bisognerà in tal caso diuidere il d. campo, o luogo in due parti, & in tre, &

& in quattro, secondo la grandezza di esso, & il bisogno, & in ogni parte eleggere vn'angolo comune. Noi diciamo angolo comune, perciôche da quello si tireranno tutte le bafe de' triangoli, che si formaranno in ciascuna parte, così facendo, ti renderai facile a misurare ogni luogo per difficile che sia, ma hauendo a misurare nei monti, e poggi alcune pendici, bisogna esser molto pratico, & alcune volte bisogna disegnare, e misurare quei luoghi a triangoli, & alcune volte parte disegnarli a quadrilateri, e parte a triangoli, & alcune volte bisogna misurare a vista, rispetto i pericolosi, e scoscese balze, e grotte, che si trouano, doue vanno le capre a pena scalze. Ma sopra tutto, hauendo a misurare le pendici, mandarai sempre la canna liuellata, e piana, piombandola poni con vn fassetto, o con vn'altra canna, perciôche i monti con tal piombatione si riducono in piano, e deuesi piombare a ciascheduna canna; ancorche in alcuni luoghi non vñano piombare, ma spianano la canna in terra, secondo che giace il terreno, il qual vso è non solo biasimeuole, ma dannoso a chi compra; e perciò concludentemēte diciamo, che si deue misurare a pertica, o tauola piombata, e non altrimenti, perche così è il comun vso, oltre al douere.




24. Se ben noi habbiamo eletto l'angolo A. per angolo comune, poteuamo ancora eleggere l'angolo I. dal quale si possono tirare le bafe a ciascuno degli altri angoli: ma se haueffimo eletto per angolo comune l'angolo B. o G. o qualsiuoglia altro, non poteuamo da vno di quelli tirar le corde a ciascuno degli altri angoli, come per esempio, se haueffimo eletto l'angolo B. noi non poteuamo tirar la corda B.F. perche sarebbe passata fuori del campo, e ò haueffimo eletto l'angolo G. non poteuamo tirar la corda G.D. la qual parimente passerebbe fuor del campo, e perciò in tal'elezione d'angoli, bisogna stare auuertito.

Ma perche più manifestamente apparisca, quanto poco prima habbiamo promesso voler dimostrare, cioè, che quando vn campo, o sia in piano, o sia in colla, da vno de' suoi angoli non si possion tirar le corde, o bafe a ciascuno degli altri angoli, per qualsiuoglia impedimento, bisogna diuidere il d.campo in due parti,

ti, o in quelle che più sono necessarie, e perciò si pone la presente figura A.B.C. D.E.F.G.H.I.K. della quale eleggasi per angolo comune qual'angolo ci piace, trouaremo che non si può trarre tutte le corde a ciascuno degl'altri angoli, che qualcuna non passi fuori del d.campo, e perciò dicesi esser di bisogno diuidere in due parti il d.campo, la qual diuisione, poniamo che sia la linea I.C. e così ha- ueremo la pianta della prima parte essere A.B.C.I.K. e la seconda C.D.E.F.G.H.I.

Inteso questo, se della prima parte eleggeremo per angolo comune l'angolo A. potremo tirare la base A.C. & A.I. e sarà diuisa la prima parte in tre triangoli, de' quali misurarai la base, & i catetti.


Fatto questo, se della seconda parte eleggeremo per angolo comune l'angolo D. potremo tirare la base D.F. e D.G. e D.H. & haueremo diuiso la seconda parte in cinque triangoli de' quali parimente misurarai la base, & i catetti, secondo le regole già date, se volèdo sapere la quadratura di d.campo, opera, come più volte s'è detto. E se della seconda parte hauesimo eletto per angolo co- mune l'angolo E. ouero F. ne sarebbe seguito differenti triangoli, ma ne risultaua la medesima quadratura.



G


25. Accade molte volte, che d'un capo, e sia di qualsiuoglia grandezza, bisogna misurarne solamente vna parte, come per esempio. Vno ha vn campo come il quadrilatero A.B.C.D. ch'è lungo pertiche 40. & è largo pertiche 10. del quale ne vuol vender quattro quartieri, e vuol consegnare questa parte lungo la linea C.D. si domanda quante pertiche bisognerà misurare per la larghezza, a uolere che sia quattro quartieri apunto. Nel principio di questo nostro trattato di Geometria, si disse, che vn quartiere era 30. scale, & vna scala era 4. pertiche, e perche il campo è lungo pertiche 40. perciò di 4. quartieri bisogna farne pertiche, i quali sono pertiche 480. adunque noi douiamo in d.campo misurare pertiche 480. quadre; laonde, se partiremo 480. per la larghezza del capo, cioè per 40. pertiche

ne verrà 12. e 12. perche diremo che bisognerà misurare per la larghezza, cominciando dall'angolo D. e misurando per fino al punto E. dall'angolo C. per fino al punto F. e così di d. campo n'haueremo misurato 4. quartieri, ci è il quadrilatero F.E.C.D. ch'è lungo perche 40. e largo 12. e la superficie è perche 480. che sono quattro quartieri apunto.




26 E se vn quadrilatero, del quale ne volessimo misurare vna parte, e lo misurassimo a braccia, e non a perche, o canne, o tauole, come per esempio, se fusse il quadrilatero A.B.C.D. lugo bracc. 120. e largo bracc. 72. del quale bisognasse misurarne vn quartieri per la sua larghezza, cominciando dalla linea B.D. si domanda quanto bisognerà misurare dalla lunghezza di d. quadrilatero. Perche il d. quadrilatero è misurato a braccia, perciò d'vn quartieri (che ne vogliamo misurare) bisogna farne braccia, e perche altre volte habbiamo detto, che vn quartieri è 30. scale, & vna scala è bracc. 96. da panno, ouero bracc. 100. da terra; e perciò se il campo fusse misurato con il braccio da misurare il panno, doueresti fare il conto a ragione di bracc. 96. la scala, e se il d. campo fusse misurato con il braccio da terra, per esser minore di quel del panno, bisognarebbe fare il conto a ragione di bracc. 100. la scala; hor poniamo, che il detto campo sia misurato col braccio da terra; riduci vn quartieri a braccia, ma prima riducilo a scale: il quale è 30. scale, le quali multipl. via 100. faranno bracc. 3000. adunque di d. campo ne douiamo misurare bracc. 3000. quadre; e perche s'è detto che le vuol consegnare per larghezza equidistante alla linea B.D. la quale è bracc. 72. perciò parti 3000. per 72. ne viene $41\frac{2}{3}$. e tante braccia diremo che bisogna misurare dalla lunghezza, cominciando dall'angolo B. e misurando fino al punto G. e dall'angolo D. fino al punto H. &

haueremo il quadrilatero G.B.H.D. il qual farà lugo bracc. $41\frac{2}{3}$. e largo bracc. 72. che la sua superficie farà vn quartieri apunto. Fanne preua, multipllica bracc. $41\frac{2}{3}$. via bracc. 72. fanno bracc. 3000. quadre, le quali parti per 100. ne viene scale 30. che sono vn quartieri apunto.



27 Ma perche non sempre i campi, o altri luoghi, de' quali accade spesse volte sfaccarne, e misurarne qualche parte, sono in forma quadrangolare; ma i piu sono situati di diuersi, e sfrauaganti faccie; perciò bisogna al pratico Agrimensore star molto vigilante: e per essempio proporremo vn caso siuo, come nella seguente figura vedi A.B.C.D.E.F.G.H. del quale ne vogliamo misurare due quarti, cioè 240. pertiche quadre dalla parte di leuante, doue è segnato A.E.C.D.E.F. & andare verso Ponente, di maniera tale che la terminatione di 240. pertiche quadre sia equidistante alla linea H.G. di ponente; si domanda il modo di misurar d. parte, essendo li tre angoli A.H. e G. retti. Prima pianta lo squadro sopra l'angolo A. in tal modo, che risguardi rettamente l'angolo H. dipoi senza mouer lo squadro, guarda per l'altra fessura verso il punto B. e poniamo ancora, che co la medesima veduta si veda il punto F. per ilche ne seguirà, che essendo l'angolo A. retto; la linea A.F. sia parallela alla linea H.G. & essendo così, ci vien figurato il quadrilatero A.F.G.H. e fuori di d. quadrilatero ci resta la figura, ouer parte di d. campo B.C.D.E.F. la qual parte bisogna misurare, e vedete quante pertiche quadre sia, tirando le corde, ouero base B.D. e B.E. e B.F. e così hauerai figurato tre triangoli, de quali misurerai la base, e con lo squadro trovarai i catetti, e li misurerai, come altre volte s'è detto; che per non generar confusione noi non ci poniamo i numeri delle pertiche, o tauole. Hor poniamo, che tutti tre i triangoli siano pertiche 180. quadre, e noi haueremo di bisogno, che fussi o pertiche 240. adunque ci manca pertiche 60. quali pigliaremo dal quadrilatero in questo modo cioè; misurisi la linea A. F. la qual poniamo che sia pertiche 20. partasi pertiche 60. che ci mancano alla misura, che desideriamo fare per la lunghezza del quadrilatero, cioè per 20. ne vien pertiche 3. e tante pertiche misurerai dall'angolo A. verso l'angolo H. e così dall'angolo F. verso l'angolo G. & in questo modo haueremo misurato due quarti di terra dentro al d. campo dalla parte di leuante, come si propose. E quando i sopradetti tre triangoli fussi stati più di 240. pertiche quadre, che douemo misurare, allora bisogna uoi giocar di pratica, e misurare tante volte inanzi, & indietro, facendo sempre il conto di quel che s'è misurato, che tornassi pertiche 240. a punto, perche in simili casi non c'è regola ferma, eccetto che fare il conto di qualche si misura di mano in mano.



28 Molte cose ci restarebbe da dire, quanto alla pratica del misurar le terre, ma solo vogliamo dire, e dimostrare, come più importante, ancor questo, cioè. I pratici Agrimensori (diciamo di quelli, che vanno giornalmente a misurare) bisogna, che s'accomodino a diuersare le piante, hora a triangoli, & hora a quadrilateri, secondo i luoghi, e sui, ancorche non si possin formare i quadrilateri in detti luoghi, che siano tanti lunghi da vn lato, quanto dall'altro, e similmente le larghezze loro, senza gran perdimento di tempo; perciò che lo squadro non è diuiso così p' sferamente in croce, che nelle lunghezze, e larghezze dei campi non ci dia qualche variatione da vn lato all'altro opposto, e perciò v'ano di segnare

gnate di i campi tutti quei quadrilateri che più conuenienti gli pare; disegnandoli ancora intorno tutti quei triangoli, che à giuditio loro si richiedono. E disegnato che hanno quei quadrilateri che possono, misurano tutte quattro le faccie dipoi, se vn lato è più lungo dell'altro (che questo accade quasi sempre, gli raggugliano in questo modo cioè.


Se vn lato fusse lungo canne 20. e l'altro opposto fusse canne 22. sommerebbono 20. con 22. fa 42. e di questo piglierebbono la metà, che è 21. e tanto sarebbe il ragguglio de due lati, e qualche si dice della lunghezza, si dice ancora della larghezza, cioè, che se da vn lato fusse largo canne 16. e dall'altro opposto fusse canne 18. si sommerrebbero 16. con 18. fa 34. e di questo prenderebbono la metà che è 17. e questo sarebbe il ragguglio delle due larghezze.

Hor per trouar la quadratura, multiplicherebbono 21. via 17. che fa 357. e tante canne quadre direbbono che fusse il detto quadrilatero, e così farebbono di tutti quei quadrilateri che in vn campo disegnassero, dipoi misurarebbono quei triangoli che intorno à detto campo fussero, secondo l'ordine da noi più volte dato de i quali trouerebbono la quadratura, e la sommarebbono con la quadratura de i quadrilateri; e perche meglio tu comprenda come vñano diuisare i campi inolti misuratori, ritguarda la presente pianta, nella quale non si descrue i numeri per non generar confusione.


Ma noi sentiamo alcuni che ci suonano le banche dietro, e dicono gridando, che tal modo non è giusto, à i quali riuolandoci si dice, che è la verità, e che il più giusto modo d'operare è il misurare a triangoli, si come poco indietro s'è dimostrato, ma pare à molti di maggior fatica, perliche misurando nel modo sopradetto, non ci darà errore notabile, sempre che ci seruiremo dello squadro, formando gli angoli più retti che possibil sia, e perciò diciamo che non facciano tanto strepito, perche l'intendiamo ancor noi.

Ci resta à dire ancora, che con la penna, e con le scisse, e squadre su per le carte si fanno di bei tiri, e disegni, cioè quadrilateri, rettangoli, e quadri perfetti; ma chi verrà à misurare nei campi, e nelle montagne, doue sono selue, e boschi folti, e luoghi ripidissimi, vedrà che i disegni delle scisse gli conuerà lasciar da parte, e seruirsi del giuditio, e della pratica, e molte volte gli conuerà andar carponi, doue poi è lecito il gettar via le scisse, gli squadri, & i ghiribizzi, se già non vorrà misurare vna canna di terreno il giorno.


Noi habbiamo voluto dir questo per dimostrare che non può star sempre su l'osservanza delle regole; ma quanto più si osseruano i modi da noi dati, tanto più giustamente verranno i luoghi misurati; e perche più chiaro apparisca, che non si misura tanto giustamente, che non si possa misurar più giusto, fa così. Misura vn campo nei modi sopradetti; dipoi ascondi i numeri delle misure fatte, e torna all'hora all'hora à rimisurare il detto campo, tenendo il medesim'ordine, che prima tenesti, trouarai che la seconda misura non si scontrerà con la prima per l'apunto, e chi dice il contrario s'inganna, e non è pratico in simil cose.




29 Ancorche per le passate regole si sia dimostrato il modo del pratico misurare, nulladimeno accade molte volte, che il pratico Agrimenfore vien domandato di vari casi, di misure di campi, o altre superficie, alle quali domand e cōuiuen sodisfare, e perciò al presente dimostreremo il modo di soluer molte propositioni di misurare superficiali. le quali son fuori del pratico operare; e prima. Sia il triangolo equilatero A.B.C. che il catetto è 6. si domanda quanto è per ciascun lato, e quanto è la superficie del triangolo. Fà così, multiplica il catetto, cioè 6. in se medesimo, fà 36. del qual piglia il terzo, ch'è 12. & aggiungilo al detto 36. fà 48. e Radice 48. diremo che sia ciascun suo lato. Hor volendo sapere quanto farà la superficie, piglia la metà del catetto, cioè la metà di 6. ch'è 3. recà questo 3. a radice, fà 9. multiplica radice 9. via radice 48. fà 432. e radice 432. farà la superficie di detto triangolo.



30 E dicendo egli è vn triangolo equilatero, che la sua superficie è bracc. 100. si domanda quante bracc farà per lato. Fà così raddoppia la superficie, cioè 100. fà 200. dipoi piglia il $\frac{1}{2}$. & il $\frac{1}{2}$. di detto 100. che fra ambedue le dette parti sono poco meno di 31. aggiungi detto 21. à 200. fa 231. e di questo piglia la radice quadra, ch'è $15\frac{1}{2}$. per numero, e tanto farà per lato il detto triangolo. Ancora, se moltiplicarai la superficie in se, cioè 100. via 100. fà 10000. e questo lo moltiplicarai via $5\frac{1}{2}$. per regola generale, farà 53333 $\frac{1}{2}$. e di questo ne prenderai la radice, e di tal radice ne cauarai vn'altra radice, e ti verrà il medesimo.



31 E dicendo, egli è vn campo simile al triangolo A.B.C. di diuersi lati, il quale è di due fratelli, e su la base B.C. v'è vn pozzo, e voglion diuidere il detto campo in due parti vguale, & in tal modo che ciascuno partecipi del pozzo, si domanda in che modo si douerà diuidere il detto campo. Poniamo che il pozzo sia in qual parte ci piace della base B.C. hor sia che si ritroui in punto G. tirisi la linea A.G. dipoi diuidi la detta base B.C. per metà, la qual metà poniamo che sia il punto D. e dal detto punto D. tirisi vna linea parallela alla A.G. la qual sarà D.E. e dal punto E. tirisi vna linea fine al punto C. cioè, per fino à deue è il pozzo, la qual linea diuiderà il detto campo in due parti vguale




32 E dicendo, egli è vn triangolo equilatero, che per ciascun lato è brace. 10. si domanda quanto è dal centro di detto triangolo, per fino a ciascun'angolo. Fà così, moltiplica 10. in se fa 100. e di questo piglia il $\frac{1}{3}$. che è 33. $\frac{1}{3}$. e radice 33. $\frac{1}{3}$. sarà dal centro a ciascun'angolo.

Ancora per vn altro modo si può soluer detta dimanda, ritrouando prima il cateto di detto triangolo, il qual secondo le regole date è Radice 75. del qual bisogna pigliar $\frac{1}{3}$. ma prima riduci $\frac{1}{3}$. à radice, sono $\frac{1}{3}$. piglia $\frac{1}{3}$. di 75. ne vien 33. $\frac{1}{3}$. come nel primo operare.


33 E dicendo, egli è vn triangolo equicrusio, del quale si desidera fare due parti vguale, si domanda il modo.

Fà così, diuidi qual lato ti piace in due parti vguale, e da quel punto tira vna linea all'angolo opposto, & hauera diuiso vgualemente il triangolo in due parti.




Come si possa diuidere vna linea con prestezza in quante parti ci piace.

34 Descriuasi vn quadrato rettangolo di grandezza a beneplacito nostro, come il quadrato A.B.C.D. il qual si diuida in 20. o più parti vguali, come in disegno vedi, dipoi volendo diuidere vna linea in 15. parti vguali, fa così, piglia con le fesse la lunghezza della linea, che vuoi diuidere, e doppo riporta quell'apertura delle fesse sopra la detta figura quadrilatera, fissando vn piè delle fesse in punto A. e l'altro sopra la linea 15. e così tirando lá linea da vn punto all'altre, resta vguilmente diuisa in 15. parti.



Il modo di formare vn triangolo vguale al quadrato.


35 Giovan Francesco Peuerone dice così. Quando d'vna superficie quadra ne vorrai formare vna triangolare vguale a quella, fa così, come per essemplio sia il quadrato L.M.N.O. partirai adunque il lato L.M. in due parti vguali in P. così tre di quelle aperture di fesse ti daranno la lunghezza d'vno de' lati del triangolo equilatero.



Che la sopradetta propositione sia mal soluta, e falso il modo di tal'operare, eccoti l'effempio, Poniamo che il d-quadrato L.M.N.O. sia per ogni lato 10 adunque il triangolo equilatero (secondo l'ordine del Peuerone) sarebbe per ogni lato 15. la superficie del quale sarebbe radice 9492 $\frac{1}{2}$. cioè bracc. 97 $\frac{1}{2}$. scarfe, noi diciamo scarfe, perciò che de' numeri sordi non si può trarre radice discreta, e la ragion vorrebbe, che la superficie di d. triangolo fusse bracc. 100. a punto, douẽdo esser vguale al quadrato L.M.N.O. Ma se riguardarai la regola da noi addotta, trouarai che ciascuna costa di d. triangolo deu'esser bracc. 15 $\frac{1}{2}$. scarfe, del quale facendone il conto, come si conuiene, trouarai, che ti darà di superficie radici 1008 $\frac{1}{2}$. $\frac{0}{3}$. $\frac{1}{3}$. che ridotto a numero sono bracc. 100 $\frac{1}{3}$. $\frac{1}{3}$. nò apũto, fanne proua.

Come si possa formare vn quadrangolo vguale ad vn triangolo.


36 Sia vn triangolo di qualsiuoglia sorte, del quale ne vuoi fare vn quadrangolo, come per effempio sia il triangolo A.B.C. tira prima la linea perpendicolare A.G. dipoi parti le linee A.C. & A.B. ciascuna in due parti vguali, come vedi nei punti H. & I. il che fatto tira la linea L.M. equidistante alla B.C. che passi sopra i punti H. & I. & hauerai formato il quadrangolo L. M. B. C. vguale al triangolo A.B.C.



Come d'un quadrangolo si possa fare vn quadrato vguale a quello.


37 Sia per effempio il quadrangolo sopradetto L.M.B.C. del quale ne vogliamo fare vn quadrato.

Facci così, piglia con il compasso tutto lo spatio L. M. e la larghezza L.B. e di questi due lati ne farai vn solo, che sia vguale a quelli, si come la linea L.B.M. dipoi diuidi tutta la lunghezza L. M. in due parti vguali in punto D. e da esso centro descriui il semicircolo L.E.M. dipoi dal punto B. tira vna linea perpendicolare tanto lunga, che vadi a trouare la circonferenza di detto semicircolo, come la linea B.F. e tanto sarà vno de' lati del quadrato, che desiderai nuouamente fare.



Come d'un quadrangolo si possa fare vn triangolo ortogonio, che sia doppio a detto quadrangolo.


38 Sia il quadro A.B.C.D. del quale vogliamo fare vn triangolo ortogonio di due lati vguali, e che sia doppio al detto quadrato. Fa così, tira le linee C.F. e C.E. che ciascuna sia lunga per due volte vno de' lati del quadrato, dipoi tira la linea E.F. & hauerai il triangolo ortogonio F.C.E. di due lati vguali, e doppio al quadrato.



Come si possa triplicare vn quadro.


39 Sia il quadro A.B.C.D. volendone formare vn'altro, che sia tre tanti; fa così piglia con il compasso la lunghezza d'vno de' lati del quadro, e con quell'apertura di sette descrui vn cerchio, la circonferenza del quale diuiderai in tre parti vguali, come per le lettere E. F. G. puoi vedere, dipoi tira la linea da vn punto ad vn'altro, come la linea E.F. ouero E.G. ouero F.G. & vna di queste linee, che sarà vguale a vno de' lati del quadro triplicato, come per essemplio, se il quadro piccolo A.B.C.D. fusse per ogni lato bracc. 7. noi diciamo che con vn'apertura di sette di 7. bracc. si trasferirebbe vn cerchio, che il suo diametro sarebbe braccia 14. & il maggior triangolo equilatero, che dentro vi capisse sarebbe per ogni lato radice 147. si come per la 26. poco più inanzi dimostraremo, che ridotto a numero sarebbe $12\frac{1}{4}$ e radice 147. cioè $12\frac{1}{4}$. sarebbe cia'cun lato del quadro triplicato, la superficie del quale sarebbe bracc. 147. la qual sarebbe

Come




*Come d'un quadro piccolo si possa fare vn quadro grande, che
capisca sette volte il quadro piccolo.*

40 Volendo fare vn quadro grande, che contenga sette volte vn quadro piccolo, la così, d. scriui il picciol quadro A.B.C.D. e distendi la linea B.C. otto volte, e formarai la linea B.E. dipoi parti la linea B.E. in mezzo in punto F. dal qual mezzo deferisci vn mezzo circolo, che vadi apunto sopra i termini della linea B.E. dipoi similmente distendi il lato C.D. del picciol quadro, fin'a tanto, che tocchi la circonferenza del semicircolo, come la linea C.G. ti dimostra, e d. linea sarà vguale al lato del quadro grande, che conterrà 7. volte il picciolo.



*Come da vna superficie circolare si possa destrinere vna
superficie quadrata.*


41 Sia per effempio il presente cerchio, del quale ne vogliamo fare vn quadro rettangolo vguale al detto cerchio. si così, tira il diametro A.B. che diuida il cerchio in due parti vguale, di poi diuidi cō 'e sette d. di metro in 8. parti vguale, fatto questo tira vna linea lunga per 10. ra ti 'i quelle del diametro del cerchio, & hauerai fatto vna linea, che sarà vguale al diametro del quadro rettangolo, la superficie del quale sarà poco meno che vguale a'la superficie del cerchio sopra- detto, perciòche se il cerchio fusse 8. braccia di diametro, la sua superficie sarebbe



41. E volendo del quadro fare vn tondo vguale al detto quadro, diuidasi il diametro del quadro in dieci parti, dipoi si metta vn piede del compasso sopra il punto del mezzo, e l'altro piè s'allarghi tanto, che intraprenda 4. di quelle diuisioni per ogni banda, cioè 8. diuisioni in tutto, e deferuasi vn cerchio, e quello farà vguale al detto quadro.

42. E dicendo, egli è il triangolo A.B.C. che la base B.C. è canne 20. & A.B. è canne 11. & A.C. è 8. quanto è la superficie. Sappi, che se il lato A.B. congiunto con il lato A.C. la somma loro non supera la base B.C. che tal proposta non si può soluere, ma simili quesiti si fanno a persone di poco sapere.

44. E dicendo, egli è vn triangolo equilatero, che dal centro a ciascun angolo v'è 8. braccia, si domanda quante braccia sono i suoi lati, e quanto è il catetto. Sappi, che dal centro di ciascun triangolo equilatero, a qualsivoglia suo angolo v'è $\frac{2}{3}$. di tutto il catetto, adunque se dal centro a ciascun angolo v'è 8. ne segue, che 8. sia li $\frac{2}{3}$. del catetto, per il che tutto il catetto farà 12. Laonde moltiplica 12. in se, fa 144. e perche la potenza del catetto d'ogni triangolo equilatero è sesquitercia alla potenza del lato del detto triangolo, però piglia il $\frac{7}{3}$. (per regola generale) di 144. ch'è 48. il quale aggiungi a 144. fa 192. e radice 192. farà ciascun lato.




R. 192.

45. E dicendo, egli è il triangolo A.B.C. equicrurio, il qual desideriamo diuidere in due parti vguali, con vna linea equidistante alla base B.C. si domanda in che parti della linea A.B. & A.C. bisognerà tirar detta linea diuidente il detto triangolo.

Facciassi vn quadrangolo rettangolo, contingente, & vguale alla linea A.B. & vero A.C. dipoi trouisi il centro di detto quadrangolo, tirando le linee diametrali in Croce, e doue i detti diametri s'interficano, quivi è il centro di detto quadrangolo, dipoi pigliasi il compasso, e pongasi vna delle sue hante sul punto A. e tenendola ferma, allarghisi tanto l'altra hanta del compasso che arriui al centro del

quadrangolo, dipoi ritirisi il semicircolo diuidente il detto triangolo, e perche il detto semicircolo interseca il lato A.B. in punto D. & il lato A.C. in punto E. perciò tira la linea D.E. retta, la qual farà parallela alla B.C. e detta linea diuiderà il detto triangolo in due parti uguali.



46 D'ogni triangolo, quella proportion che è dalla potenza della base a tutta la superficie del triangolo, e ancora dalla potenza della linea diuidente al la parte della superficie, che diuide, cioè quella, che si toglie via, essendo la detta linea equidistante alla base, come per esempio

47 Egli è il triangolo A.B.C. che A.B. è 13. B.C. è 14. & A.C. 15. & il catetto A.D. è 12. e tutta la superficie è 84. tirisi vna linea diuidente il triangolo, e sia equidistante alla base B.C. la qual sia F.G. che diuide il catetto A.D. in mezzo, in punto H. E perche quella proportion che dalla linea A.D. la qual è 12. alla B.C. che è 14. si dice essere ancora dalla linea A.H. che è 6. alla F.G. adunque F.G. farà 7. che si troua in questo modo, dicendo, se 12. di catetto vuol 14. di base, 6. di catetto quanta base vorrà? multiplica 6. via 14. fa 84. il qual parti per 12. ne vien 7. per la quantità della linea diuidente.

Hora noi habbiamo il triangolo A.F.G. che il catetto è 6. e la base è 7. e tutta la superficie è 21. dicesi che quella proportion dalla potenza della linea diuidente, ch'è 49. alla superficie che leua, che è 21. qual'è la potenza della base B.C. che è 196. alla superficie di tutto il triangolo, che è 84.

Perciò che se tu dirai così, 196. mi dà 84. di superficie, che mi darà 49? trouarai che ti darà 21. come voleuamo, si che tal proportion è dalla potenza della base di ciascun triangolo alla superficie, qual'è la potenza della linea diuidente alla parte che leua della superficie di d. triangolo.

48 E dicendo, egli è il triangolo A.B.C. di diuersi lati, che il lato A.B. è 13. e la base B.C. è 14. & il lato A.C. è 15. & il suo catetto A.D. è 12. e la sua superficie è 84. e la linea F.G. equidistante alla base B.C. ne leua 42. di superficie, si domanda quanto farà detta linea diuidente, e quanto farà il catetto del triangolo A.F.G. del qual la superficie è 42. Tu hai per la precedente, che tal propositione è dalla superficie del triangolo alla potenza della base, qual'è dalla superficie, che leua la linea equidistante, alla potenza d'essa linea, e tu vuoi sapere quant'è la potenza della linea, che leua la metà di 84. che è 42. però dirai così, se 84. di superficie



superficie vuole 196. di possanza di base, che vorrà 42^a opera, te ne verrà 98. e radice 98. farà la linea F.G. diuidente. Hor volendo trouare il catetto A.H. che cade sopra F.G. multiplica tutto il catetto A.D. che è 11. in se fa 144. del qual piglia la metà, che è 72. e radice 72. sarà il catetto A.H. del triangolo A.F.G. Fanne proua, tu sai la linea F.G. diuidente è radice 98. & il catetto A.H. è radice 72. e sai ancora, che a multiplicare il catetto via la base, fa la superficie di due triangoli, però multiplica il catetto che è radice 72. via la metà di radice 98. che è 24 $\frac{1}{2}$. fa radice 1764. che ridotto a numero è 42. per la superficie del triangolo A.F.G. adunque diremo, che la linea che taglia la metà della superficie del triangolo, la qual è F.G. farà radice 98. & il catetto A.H. farà radice 72.



Volendo per altro modo trouare la quantità della detta linea F.G. diuidente in due parti vguali il sopradetto triangolo il qual è di superficie 84.

Fa così, multiplica A.C. in se, cioè 15. via 15. fa 225. e di questo prendi la metà che è 112 $\frac{1}{2}$. e la radice di 112 $\frac{1}{2}$. farà la linea A.G. doue terminerà la linea diuidente, dipoi multiplica A.B. in se, cioè 13. via 13. fa 169. del qual prendi la metà, che è 84 $\frac{1}{2}$. farà la linea A.F.

Hor per saper quanto farà la linea F.G. multiplica B.C. in se, cioè 14. via 14. fa 196. del qual toglì la metà, che è 98. e Radice 98. farà la linea F.G. la qual diuiderà il triangolo in due parti vguali.




50 Ma volendo diuidere il detto triangolo in tre parti vguali.

Fa così, toglì il terzo della potenza de i lati cioè il terzo di 225. che è 75. e la radice di 75. farà la linea A.D. doue da tal banda terminerà la linea E.D. diuidente la terza parte di tutta la superficie.

Hor volendo saper doue terminerà la seconda parte. Fa così, toglì $\frac{2}{3}$. di 225 ne vien 150. e la radice di 150. farà la linea A.D.G. doue da tal banda terminerà la linea F.G. diuidente li $\frac{2}{3}$. di tutta la superficie del triangolo A.B.C.

Il medesimo modo conuien' offeruare per il lato A.B. il quale è 13. multiplica 13. in se, fa 169. del qual prendi il terzo, ne vien 56 $\frac{1}{3}$. e la radice di 56 $\frac{1}{3}$. farà la linea A.E. doue da tal banda terminerà la linea D.E. diuidente la terza parte di tutta la superficie; dipoi prendi $\frac{2}{3}$. della potenza A.B. cioè di 169. ne vien 112 $\frac{2}{3}$. e la radice di 112 $\frac{2}{3}$. farà la linea G.F. diuidente li $\frac{2}{3}$. di tutta la superficie. Hor per saper la quantità della linea E.D. toglì il terzo della potenza B.C. che la sua potenza è 196. & il terzo sarà 65 $\frac{1}{3}$. e la radice di 65 $\frac{1}{3}$. farà la linea E.D. e per saper quāto farà la linea F.G. toglì $\frac{2}{3}$. di 196. ne vien 130 $\frac{2}{3}$. e la radice di 130 $\frac{2}{3}$. farà la linea F.G. e così faresti volendo diuidere la superficie in quattro, o cinque, o più parti, &c.




51. E dicendo, egli è il triangolo A.B.C. che A.B. è 13. e la base B.C. è 14. & il lato A.C. è 15. & il catetto A.D. è 12. e la superficie è 84. & vna linea equidistante alla B.C. ne leua di superficie 35. si domanda la quantità della linea diuidete.

Poni, che la linea diuidente sia F.G. si farà adunque due triangoli A. B. C. & A.F.G. & il catetto A.D. diuide F.G. in punto H. diccsi che tal proportione è dalla possanza della base alla superficie del triangolo, qual'è dalla possanza della linea diuidente alla superficie, che diuide.


E similmente quella proportione è dalla possanza della base alla possanza della linea diuidente, che è dalla superficie del triangolo A.B.C. che è 84. alla superficie del triangolo A.F.G. che è 35. e perciò dirai così. Se 84. di superficie vuol di possanza di base 196. che possanza di base vorrà 35. di superficie? moltiplica 35. via 96. fa 6860. il qual parti per 84. ne viè $81\frac{2}{3}$. e radice $81\frac{2}{3}$. farà la linea F.G. diuidente.

52. E dicendo: egli è il triangolo A.B.C. che A.B. è 13. B.C. 14. & A.C. 15. vogliamo tirar vna linea equidistante alla B.C. la qual seghi il catetto in tal parte, che della superficie del triangolo, che è 84. ne leui $\frac{2}{3}$. domandasi quanto si leuerà del catetto.

Quando vn triangolo è diuiso da vna linea equidistante alla base, fa due triangoli simili, adunque nel triangolo A.B.C. tirandosi vna linea equidistante alla B.C. la qual poniamo che sia F.G. farà vn triangolo, che sarà A.F.G. simile al triangolo A.B.C. & i triangoli simili sono in vna proportione, però tu sai che la superficie del triangolo A.F.G. vuol esser $\frac{2}{3}$. di 84. che è $33\frac{2}{3}$. laonde 84. di superficie, vuole di possanza di catetto 144. perché il suo catetto è 12. che vorrà $33\frac{2}{3}$. ? opera ne viene $57\frac{1}{3}$. e radice $57\frac{1}{3}$. farà il catetto A. H. e tanto si leuarà del catetto.




53. E dicendo, egli è il triangolo A.B.C. che A.B. è 13. e B.C. è 14. & A.C. è 15. & il catetto A.D. è 12. e la sua superficie è 84. vogliamo tirare vna linea lunga 3. bracc. equidistante alla B.C. domandasi quanto leuara del catetto A.D. e della superficie del triangolo A.B.C. Perche come habbiamo detto si fa due triangoli simili, cioè A.B.C. & A.F.G. che sono in vna proportion, però dirai così. Se B.C. ch'è 14. mi dà di catetto A.D. ch'è 12. che mi darà la base F.G. ch'è 8. opera, ti darà $6\frac{6}{7}$. adunque segnerà il catetto in punto H. & A.H. farà $6\frac{6}{7}$. il qual farà il catetto del triangolo A.F.G. e se tu vuoi sapere la superficie che leua, moltiplica il catetto nella metà della base F.G. ch'è 8. e la metà è 4. farà $27\frac{1}{2}$. e tanto diremo che leuara di superficie del triangolo A.B.C.



54. E dicendo, egli è il triangolo A.B.C. che A.B. è 15. e B.C. 14. & A.C. 13. & il catetto A.D. 12. e la superficie 84. vogliamo dalla linea A.B. lontano 3. braccia dall'angolo A. tirare la linea E.F. diuidente la base B.C. in tal luogo, che diuida il triangolo A.B.C. per metà, si domanda quanto farà la linea E.F. e B.F.

Tu hai due triangoli A.B.C. & E.B.F. e sai che A.B. è 15. & il catetto A.D. è 12. e sai ancora, che B.E. è 12. perciò che se di A.B. se ne caua 3. resta 12. però dirai così. Se tutto A.B. ch'è 15. mi dà di catetto 12. che mi darà B.E. ch'è 12? opera per regola delle quattro cose proportionali, ti darà $9\frac{1}{5}$. e questo farà il catetto del triangolo E.B.F.

Hor volendo trouare la quantità della linea B.F. parti 84. cioè la superficie del triangolo A.B.C. per $9\frac{1}{5}$. ne viene $8\frac{4}{5}$. per la quantità della linea B.F. (e volendo sapere quanto sia linea E.F. moltiplica $9\frac{1}{5}$. che è il catetto del triangolo E.B.F. in se, fa $92\frac{1}{5}$. di poi moltiplica E.B. che è 12. in se, fa 144. del quale cauane $92\frac{1}{5}$. resta $51\frac{4}{5}$. e la radice di $51\frac{4}{5}$ farà dell'angolo B. per fino a doue cade il catetto, la qual radice è $7\frac{1}{5}$. che tratto di B.F. che è $8\frac{4}{5}$. resta $1\frac{1}{5}$. e tanto farà, da doue cade il catetto E.G. per fino al punto F. hor moltiplica $1\frac{1}{5}$ in se, fa $2\frac{1}{5}$. e questo aggiungi con la potenza del catetto E.G. la quale è $92\frac{1}{5}$. farà in tutto $94\frac{1}{5}$. e la radice quadra di tal congiunto farà la linea E.F. diuidente per metà la superficie del triangolo A.B.C.



La superficie quadrata, di lati, & angoli vguali, la possanza del suo diametro, è doppia alla possanza del suo lato.

La superficie d'un quadrato s'ha dal moltiplicare d'un lato in se medesimo, come per esemplo, vn quadrato, che sia per ciascun lato 4. moltiplica 4. in se, fa 16. e questa è la superficie di quel quadrato, e così d'ogni quadrato, che sia di lati. & angoli vguali.


55. Sia il quadrato A.B.C.D. che ciascun suo lato è 6. domandasi quanto farà il suo diametro, cioè vna linea dall'angolo A. per fino all'angolo C. la qual diuidi il quadrato in due triangoli vguali, che sono A.B.C. & A.D.C. i quali sono simili, & vguali, perciò che A.B. è vguale all'A.D. & il lato B.C. è vguale al lato D.C. e la linea A.C. è base comune dell'vno, e dell'altro triangolo, si che sono infra loro vguali.

Per la penultima del primo d'Euclide habbiamo, che la linea opposta all'angolo retto, può quanto possono le due linee contenenti l'angolo retto, adunque la linea A.C. che è diametro del quadrato, A. B. C. D. può quanto li due lati del quadrato, continente l'angolo retto, che ciascuno è 6. opposto al diametro A. C. però moltiplica 6. in se, fa 36. e questo raddoppia fa 72. e la radice di 72. sarà il diametro A.C.


E quando poi il diametro d'un quadrato fusse 8. e tu volessi sapere quanto sia ciascun suo lato, moltiplica il diametro in se, fa 64. del qual piglia la metà, ch'è 32. e radice 32. farebbe per la to il detto quadrato.

56. E dicendo, egli è vn Parallelogrammo, che la sua superficie è 432. & i lati son in proportion tripla, si domanda quant'è ciascun lato,

Poni, che il primo lato sia vna cosa, l'altro sarà 3. cose, douendo esser triplo. hora moltiplica vna cosa via 3. cose, fa cen: e questo è vguale à 432. parti 432. per 3. cen. ne viene 144. del qual prendi la radice ch'è 12. e tanto varrà la cosa, e 12. sarà lungo il minor lato, & il maggiore sarà 36. per essere in proportion tripla, moltiplica 36. via 12. fa 432. per la superficie.



57. E dicendo, egli è vna spalliera, la quale è bracc. 48. quadre, & è 3. volte più lunga, che larga, e vale duc. 50. si domanda volendone vn'altra, che vaglia duc. 100. e che sia nella medesima proportion quanto sarà lunga, e larga? Dirai così, se per d. 100. si compra bracc. 48. per 100. duc. quante braccia se ne comprerà? trouarai, che se ne comprerà bracc. 96. hor poni che detta spalliera sia larga vna cosa, di necessità sarà lunga 3. co. douendo la lunghezza esser tripla alla larghezza, moltiplica vn co. via 3. co. fa 3. co. vguale a 96. parti 96. per 3. ne viene 32. e radice 32. sarà la larghezza, tripla 32. come radice farà 288. e radice 288. sarà lunga, fanne proua, moltiplica 32. via radice 288. farà 96. apunto.



Br. 288.

58. E dicendo, egli è vna spalliera, la qual'è bracc. 120. quadre, & i suoi lati sono in proportion sesquitercia, si domanda da quant'è de' suoi lati. Poni che sia lunga 4. co. e larga 3. co. e perche sono i primi termini della sesquitercia, moltiplica 3. co. via 4. co. fa 12. co. perciò che a moltiplicare co. via co. fa censo, e questo 12. è vgua-

è vguale a 120. parti adunque 120. per 12. ne vien 10. e radice 10. vale la cosa; ma perche si proposè esser lunga 4. co. reca 4. cose a radice farà 16. multipl. 16. via 10. fa rad. 160. et tanto farà lunga, dipoi per la larghezza reca 3. a rad. farà 9. e questo multiplica via rad. 10. fa rad. 90. e tanto è larga, fanne proua, multipl. rad. 160. via rad. 90. fa 120. apunto.

B. 160.

B. 90

Superficie. 120.


Hauendo fin qui trattato delle superficie triangolari, e quadrangolari, resta al presente che diciamo delle superficie circolari, e come per le circonferenze di cerchi si trouino i diametri, e per i diametri si trouino le circonferenze, e superficie. **1** Poniamo hora che sia vn circolo, la cui circonferenza sia 22. si domanda quanto è il diametro.

Sappi, che Archimede Siracusano nobil Geometra, c'insegnò con dimostrazione viuissima, che la circonferenza corrispondeua al diametro del cerchio per $3\frac{1}{7}$ cioè che il diametro aggirandosi 3. volte, & $\frac{1}{7}$. intorno al cerchio, finisce apunto il circuito di quello, vero è, che molti dicono, che non è $\frac{1}{7}$. apunto, ma vn poco meno, di maniere che la circonferenza corrisponde al diametro, come il 22. al 7. la qual regola è stata dalla maggior parte degli huomini infino à qui osseruata, nè c'è stato ancor nessuno, che habbia saputo trouare regola migliore per sapere la quadratura del circolo, poiche con questa regola non si discerne differenza, o errore, che sia quasi sensibile.


Hora tornando al proposto circolo, che la sua circonferenza è 22. volendo sapere quanto sia il diametro, parti 22. per $3\frac{1}{7}$. ne vien 7. per la quantità del diametro di detto circolo.

2 E dicendo, egli è vn circolo, il cui diametro è 14. si domanda quanto è la sua circonferenza.

Sappi, che questa è l'econuerfa della sopradetta, perciò multiplica il diametro, cioè 14. via $3\frac{1}{7}$. farà 44. per la circonferenza di detto circolo.



3 Hor volendo trouare l'area superficiale d'un circolo, come per effempio sia vn tondo, il diametro del quale è 14. si domanda quanto è l'area superficiale; noi sappiamo (secondo le regole addotte) che il circolo, il qual sia diametro 14. la sua circonferenza farà 44. volendo noi adunque fare la quadratura, multiplichi la metà del diametro via la metà della circonferenza, cioè 7. via 22. fa 154. per l'area del detto tondo.



Trouiamo hora la medesima superficie in vn'altro modo; parti la circonferenza, cioè 44. per $3\frac{1}{2}$. ne vien 12. $\frac{2}{3}$. hor piglia il quarto di qualche gira intorno, cioè di 44. ne vien 11. e questo multipl. via 14. fa 154. come per il primo operare.

Ancora puoi moltiplicare tutto il diametro per la metà della circonferenza, cioè moltiplicare 14. via 22. fa 308. e di questo prenderne la metà, che è 154. per l'area sopradetta, è vero moltiplicare la metà del diametro via tutta la circonferenza, e del prodotto prenderne la metà.


Ancora puoi moltiplicare tutta la circonferenza, via tutto il diametro, e del prodotto pigliare il quarto, cioè moltiplica 44. via 14. fa 616. del qual pigliare il $\frac{1}{4}$. ne viene 154.

Ancora puoi moltiplicare la circonferenza in se, & il prodotto partire per $12\frac{2}{3}$. cioè, moltiplica 44. in se, fa 1936. il qual parti per $12\frac{2}{3}$. ne viene 154.

Ancora puoi moltiplicare il diametro in se, e del prodotto pigliare gli $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. il qual modo d'operare, è più in vso che nissun'altro; per il che moltiplica 14. in se fa 196. prendine $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. ne viene 154. per l'area del detto tondo.


Tutti i sopradetti modi deriuano dal primo, cioè di moltiplicare la metà del diametro, via la metà della circonferenza, e però Archimede disse il cerchio essere vguale à vn triangolo ortogonio, fatto che la base sia quanto tutta la circonferenza, & il cateto sia per la metà del diametro; l'area del quale si ha dal moltiplicare la metà della base via tutto il cateto, cioè moltiplicare la metà della circonferenza, via la metà del diametro.

E donde questo proceda, che à moltiplicare il diametro in se, e del prodotto prendendone gli $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. faccia l'area del tondo, lo vogliamo dimostrar con breuità; sia adunque il seguente cerchio, del quale il cetro sia E. & il diametro sia braccia 14. le quali moltiplicate in loro stesse, fano 196. cioè il quadrato A.B.C.D. e perche l'area del tondo, noi sappiamo che 154. e l'area del quadrato è 196. adunque d'un tondo, che il suo diametro sia vguale à ciascun lato d'un quadrato, la sua area sarà $\frac{3}{4}\frac{1}{2}$. di tal quadrato, che schisati sono $\frac{1}{4}\frac{1}{2}$.




Ancora se descriuerai vn tondo, il cui diametro sia 14. la sua circonferenza, sarà 44. diuidasi la circonferenza in 44. parti vguali, dipoi tirisi le linee da ciascuna parte per fino al centro, e formarassi 44. triangoli infra loro vguali, le basi dei

dei quali sarà la circonferenza di d. cerchio, e gli angoli acuti di tutti quei triangoli termineranno nel centro del d. cerchio. Fatto, & inteso questo, se si capiuolgerà vn triangolo sì, e l'altro no, accostandoli insieme, si formerà vn quadrilatero largo per metà del diametro, cioè bracc. 7. e lungo per metà della circonferenza, cioè bracc. 22. la superficie del quale sarà bracc. 154. E ben vero, che le base di detti triangoli nascono dalla circonferenza del tondo, e però non son retti, ma alquanto curue, laonde si conclude non si poter dar perfettamente la quadratura del cerchio; ancorche molti si sieno affaticati sopra ciò, nulladimeno, scôdo Archimede, questa è vna delle maggiori dimostrazioni, che dar si possa.




4. E dicendo, egli è vn mezzo cerchio, che l'arco è 22. si domanda quanto è il diametro, e quanto è la superficie; fa così, parti 22. per $7\frac{1}{2}$. ne vien 7. il quale raddoppia, fa 14. è tanto è il diametro, e volendo saper quant'è la superficie, opera come nella seguente proposizione.

5. Et essendoci proposto vn mezzo cerchio, come il seguente B.C.D. il diametro del quale sia B.D. che passi il centro A. e sia braccia 14. e l'arco B.C.D. sia braccia 22. volendo saper quante sia la superficie, multiplicasi il mezzo diametro A.B. che è 7. via la metà dell'arco B.C.D. che è 11. fa 77. e tante braccia sarà la superficie del proposto mezzo cerchio. Ancora se si multiplica il diametro B.D. ch'è 14. in se stesso fa 196. de' quali prendasi $\frac{3}{4}$. ne verrà 154. per la superficie di tutto il cerchio, la metà adunque di 154. ch'è 77. farà la superficie del mezzo cerchio.



6. E dicendo, egli è vna portione di cerchio A.B.C. che la corda A.C. è 18. e la faccia B.D. è 6. si domanda quanto sarà il diametro B.E. di tutto il cerchio. Perché la faccia B.D. sega in due parti vguale la corda A.C. ne segue, che A.D. sia 9. & il simile viene a essere D.C. multiplica adunque queste due parti di corda l'vna via l'altra, cioè 9. via 9. la qual cosa non è altro, che multiplicare la corda in se, fa 81. il qual parti per la faccia B.D. ch'è 6. ne viene $13\frac{1}{2}$; per la quantità della parte maggiore del diametro D.E. & a questo aggiungi la faccia B.D. ch'è 6. farà $19\frac{1}{2}$. l'intero diametro di tutto il cerchio.



7. E dicendo, egli è vna porzione di cerchio A. C. B. minore del mezzo circolo, che la sua corda A. C. è 18. e tutto il diametro B. E. del cerchio è $19\frac{1}{2}$. si domanda quant'è la faceta B. D. di detta porzione.





Fa così, piglia la metà di tutto il diametro, che è $9\frac{1}{4}$. qual multiplica in se, fa $95\frac{1}{16}$. dipoi multiplica la metà della corda A. C. cioè 9. via 9. fa 81. il qual cauà di $95\frac{1}{16}$. resta $14\frac{5}{16}$. e di questo prendine la radice, che è $3\frac{5}{8}$. e questo lo trarrai della metà del diametro, cioè di $9\frac{1}{4}$. resta 6. appunto, per la quantità della faceta B. D.

8. E dicendo, egli è vna porzione di cerchio A. B. C. la quale è maggiore del mezzo circolo, e tutto il diametro B. E. del cerchio è $19\frac{1}{2}$. e la parte maggiore del diametro, cioè R. D. è $12\frac{1}{2}$. il qual sega la corda A. C. nel mezzo, si domanda quanta braccia è la corda.

Fa così, piglia la metà del diametro B. E. che è $9\frac{1}{4}$. e questo è cauato della maggiore del diametro, cioè di B. D. che è $12\frac{1}{2}$. resta $3\frac{1}{4}$. e questo multiplica in se fa $14\frac{9}{16}$. dipoi multiplica il mezzo diametro, cioè $9\frac{1}{4}$. in se fa $95\frac{1}{16}$. del qual cauane $14\frac{9}{16}$. resta 81. e di questo prendine la radice che è 9. il qual raddoppia, fa 18. per la quantità della corda A. C.

9. E dicendo, egli è vna porzione di cerchio A. B. C. che la faceta A. D. è 2. il diametro F. G. di tutt' il cerchio è 10. si domanda quant'è la corda A. C. Fa così, piglia la metà del diametro che è 5. multiplica in se fa 25. dipoi cauà la faceta B. D. che è 2. della metà del diametro, che è 5. resta 3. e questo multipl. in se, fa 9. trahi questo 9. di 25. resta 16. e di questo prendine la radice che è 4. raddoppia lo fa 8. e tãto farà la corda A. C.

10. Settore di cerchio è vna figura, che sotto due linee menate dal centro all' arco è contenuta. Sia adunque il settore A. B. C. che ciascuna delle due linee che si partono dal centro A. e vanno à trouare l'arco B. C. è braccia 7. e l'arco A. C. è braccia $7\frac{1}{2}$. si domanda quant'è l'area superficiale di detto settore. Perche ciascuna di dette linee A. B. e B. C. vengono ad essere mezzo diametro di tutto il cerchio, adunque il diametro intero D. C. sarà 14. e volendo l'area di ciascun settore, bisogna multiplicar la metà del diametro di tutto il cerchio, via la metà dell' arco di detto settore, multiplica adunque la metà di 14. che è 7. via la metà dell' arco B. C. che è $3\frac{1}{2}$. farà 25. $\frac{1}{2}$. per l'area di detto settore.



11. E perche quel che s'è detto, più manifestamente apparisca, diremo così. Sia vn cerchio diuiso in 6. settori, il diametro del quale sia D. C. e sia 14. e passi per il centro A. noi sappiamo per altre propositioni fatte, che la circonferenza di tutto questo cerchio è 44. e la superficie è 154. per il che, se ben consideriamo, trouaremo che l'arco di ciascun settore sarà $7\frac{1}{2}$. perciò che diuiso la circonferenza che è 44. in 6. parti vguali, ne viene $7\frac{1}{2}$. hor se ciascuno de detti settori è braccia 25. $\frac{1}{2}$. di superficie, ne segue, che 6. settori simili faranno braccia 154. laonde se si moltiplicherà la metà del diametro del cerchio, via la metà dell'arco d'ogni settore, si hauerà sèpre la superficie di d. settore.




12. E dicendo egli è vn cerchio A. B. C. il diametro del quale è 14. che passa sopra il centro D. vogliamo di detto cerchio trarne il settore D. A. C. del quale noi non sappiamo quanto sia l'arco, ma sappiamo bene, che l'arco del settore D. A. B. è 15. e del settore D. B. C. parimente è 15. si domàda, quant'è la superficie del settore D. A. C. bisogna prima trouare, quãto sia l'arco A. C. Ma prima trouisi quanto gira intorno tutto il cerchio, il diametro del quale è 14. trouerai che gira intorno braccia 44. e tutto l'arco A. B. C. è 30. adunque l'arco A. C. è 14. fatto questo, moltiplica la metà del diametro cioè 7. via la metà dell'arco A. C. che è 7. fa 49. per l'area del settore D. A. C. e se vogliamo l'area degl'altri due settori, moltiplica la metà dell'arco A. B. C. che è 15. via la metà del diametro di tutto il cerchio, ch'è 7. fa 105. per la superficie de settori D. A. C. e D. B. C.




13. In Prato ci fu mandata la seguente figura D. B. C. E. con la presente domanda dicendo. Troua la superficie di questa figura, e piglia che misura ti vuoi: alla qual propoſta ſi diede la preſente ſoluzione. Noi ponemmo, che il centro di detta figura fuſſe il punto A. e dal centro A. per fino all'arco B. C. tirammo le due linee A. B. & A. C. le quali ponemmo, che ciaſcuna fuſſe 7. adunque tutto il diametro del cerchio farebbe 14. Ponemmo poi che l'arco B. C. fuſſe braccia 30. e moltiplicammo la metà di 30. ch'è 15. via la metà del diametro ch'è 7. fece 105. per la ſuperficie di tutta la figura A. B. C. reſta hora a trouare quant' ſia la ſuperficie intrapreſa dall'arco, e linee A. D. E. e tirifi la linea A. D. & A. E. e ciaſcuna poniamo che ſia $3\frac{1}{2}$. adunque tutto il diametro del minor cerchio farà 7. e tutta la ſua circonferenza farebbe 22. e per trouare quante braccia farà l'arco D. E. diremo così; ſe il mezzo diametro A. B. del maggior cerchio, ch'è 7. mi dà l'arco B. C. ch'è 30. che quantità d'arco mi darà il mezzo diametro A. D. ouero A. E. del minor cerchio, ch'è $3\frac{1}{2}$? moltiplica $3\frac{1}{2}$. via 30. fa 105. e queſto parti per 7. ne viene 15. e tanto farà l'arco D. E. e volendo ſapere quanto ſia la ſuperficie racchiuſa dall'arco D. E. e dal ſemidiametro A. D. & A. E. moltiplica il ſemidiametro A. D. ch'è $3\frac{1}{2}$. via la metà dell'arco D. E. ch'è $7\frac{1}{2}$. fa $26\frac{1}{4}$. per la d. ſuperficie A. D. B.

Laonde

Laonde trarrai $26\frac{1}{2}$ della superficie dell'arco maggiore, ci è di 105. resterà $78\frac{1}{2}$. per tutta la superficie intrapresa infra gl'archi D.B.C.E.




14. E dicendo egli è vna portione di cerchi A.B.C. la qual è maggiore che mezzo rondo, e la sua corda A.C. è 6. e la saetta B.D. è 9. e l'arco A.B.C. è 25. si domanda quanto è la superficie. Prima bisogna trouare quant'è tutto il diametro B.E. del cerchio, che de'criue tal portione. Prendi la metà della corda A.C. che è 3. e la sua metà è 2. moltiplicalo in se fa 9. il qual parti per la saetta B.D. che è 9. ne vien 1. il qual le aggiungi al 9. di d. saetta farà 10. per il diametro B.E. di tutto il cerchio. Hor volendo trouare la superficie piglia la metà del diametro B.E. la qual è 5. e questo moltiplica via la metà dell'arco A.B.C. la qual metà è $12\frac{1}{2}$. fa 62. $\frac{1}{2}$. il qual salua, dipoi caua la metà del diametro, che è 5. della saetta B.D. che è 9. resta 4. e questo moltiplica via la metà della corda A.C. che è 3. farà 12. il qual' ag giungi à 62. $\frac{1}{2}$. che saluasti, farà 74. $\frac{1}{2}$. per la superficie di detta portione.



15. E dicendo egli è vna portione di cerchio A.B.C. minor del mezzo cerchio, e la sua corda A.C. è 8. e la saetta B.D. è 2. e l'arco A.B.C. è $9\frac{1}{2}$. si domanda quant'è la superficie. Prima troua il diametro di tutto il cerchio in questo modo cioè piglia la metà della corda A.C. che è 4. il qual moltiplica in se fa 16. e questo parti per la saetta B.D. che è 2. ne vien 8. e questo aggiungilo alla saetta B.D. che è 2. farà 10. e tanto sarà il diametro di tutto il cerchio.


Hor per trouar la superficie di detta portione, moltiplica la metà del diametro di tutto il cerchio, la qual metà è 5. via la metà dell'arco A.B.C. che è $4\frac{1}{4}$. fa $23\frac{1}{4}$. e questo salua, dipoi della metà del diametro, che è 5. caua la saetta B.D. che è 2. resta 3. e questo moltiplica via la metà d'8. il qual' aggiungesi alla saetta per compire il diametro, la qual metà è 4. moltiplica adunque 2. via 4. fa 12. il qual tratto di $23\frac{1}{4}$. che saluasti, resta $11\frac{1}{4}$. per la superficie di detta portione minor che mezzo cerchio, la qual cosa, altro non vuol dire, se non che della superficie del settore A.B.C.E. che è $23\frac{1}{4}$. se ne caui la superficie del triangolo A.E.C. la qual è 12. e resterà la superficie della portione A.B.C.




16. E dicendo egli è vna figura la quale ha dell'Ouato, si come è la figura qui di sotto, della quale si domanda la superficie.

Fà così, tira la corda A.B. e farai due portioni di cerchio, vguale l'vna all'altra, E poniamo

e poniamo, che la detta corda sia 12. e l'vno, e l'altro arco sia 14. *Studia di trouar il diametro di tutto il cerchio (dal qual deriuano le dette portioni) secondo le regole date, e similmente la faetta di ciascuna portione, reggendoti secondo gli ammaestramenti, trouerai, che la superficie di ciascuna portione farà 27. le quali congiunte insieme fanno 54. per la superficie di detta figura ouata.*



17 E dicendo, egli è vn cerchio, che il suo diametro A.B. è 16. si domanda quãto sarà per lato il maggior quadro, che dentro si possa fare. Fà così, multiplica il diametro in se, fà 256. del qual piglia la metà che è 128. e di questo piglia la radice quadra, che è 11 $\frac{1}{2}$. e tanto sarà per lato il quadro C.D.E.F. dentro al dato cerchio.




18 E volendo trouare l'area della portione A.B.C. che per la corda A.B. sia 16. e la sua faetta C.D. sia 4. dice si, che prima bisogna trouare il diametro del tondo, donde tal portione è deriuata, e poi bisogna trouare la circonferenza del tondo, e dell'arco.

Per trouare adunque il diametro, multiplica la metà della corda in se, cioè 8. via 8. fà 64. e questo parti per la faetta, che è 4. ne vien 16. & a questo aggiungi la medesima faetta, cioè 4. farà 20. e tanto sarà il diametro del tondo, che ha formato detta portione.


Troua hora la circonferenza di detto tondo, per i modi dati, la quale è 62 $\frac{1}{2}$. E volendo sapere quanto è l'arco di detta portione A.B.C. fà così, toglì la metà della corda, che è 8. aggiungili la faetta C.D. che è 4. farà 12. toglì la metà di 12. che è 6. e questo parti per il diametro di tutto il tondo, che è 20. ne viene $\frac{3}{5}$. e tal parte sarà l'arco della portione di tutta la circonferenza del tondo, perche piglia $\frac{3}{5}$ di 62 $\frac{1}{2}$. ne viene 18 $\frac{3}{5}$. e tanto sarà l'arco della portione ABC.

Hora volendo trouare la superficie di d. portione, multiplica la metà del suo arco, che è 9 $\frac{3}{5}$. via la metà del diametro del tondo, che è 10. farà 94 $\frac{3}{5}$. e di questo cauane l'area del triangolo A.E.B. che nasce dal centro del tondo, e si cõgiunge cõ la corda A.B. la qual corda viene a essere base di detto triangolo, adunque la detta base sarà 16. & il catetto D.E. sarà 6. e l'area di d. triangolo sarà 48. cauau adunque 48. di 94 $\frac{3}{5}$. resta 46 $\frac{3}{5}$. e questa è la vera, e perfetta area della d. portione A.B.C. si è vera regola generale, e praticale.




19 Volendo dimostrare, che la detta regola è giusta, faremo così, formifi vn tondo, che il suo diametro sia 20. cioè tanto quanto sù il diametro del tondo, che produffe la sopradetta portione, dentro al qual tondo facciasi vna figura quadrilatera rettangola, la qual sia lunga 16. cioè vguale alla corda di d. portione, e la sua larghezza sarà 12. di maniera che haueremo formato 4. portioni di cerchio, cioè due maggiori, e due minori, e della portione A. C. la sua corda sarà 16. e la faetta B. D. sarà 4. e quel medesimo sarà la portione opposta G. H. I. che la corda è 16. e la faetta è 4. e della portione minore A. M. I. la sua corda A. I. sarà 12. e la faetta sarà 2. e quel medesimo sarà la portione opposta C. F. G. troua hora la superficie di tutte 4. le portioni nel sopradetto modo, trouaremo che l'area delle due maggiori portioni sarà $92\frac{1}{2}$. e l'area d'ambidue le portioni minori sarà $29\frac{1}{2}$. la quale aggiunta con $92\frac{1}{2}$ farà $122\frac{1}{2}$. per l'area delle 4. portioni, alle quali aggiungasi dipoi l'area del quadrilatero A. C. I. G. la qual è 192. sarà in tutto $314\frac{1}{2}$. che tanto sarà ancora l'area d'un tondo, che sia per diametro 20. & c.

20 La sopradetta regola da trouare l'area della portion del cerchio, la descrive, & infu gna Francesco Feliciano da Lazzisio Veronese, la qual regola è falsa, e noi l'habbiamo posta, e descritta nel medesimo modo, e con i medesimi numeri, che esso ha fatto; acciò che più manifestamente si conosca tal regola esser falsa, & prima dicchi, che quando pur tal sua regola fusse buona, per trouar l'area delle sopradette portioni (il che si nega) non scuirebbe però a trouare l'area d'altre portioni minori, o maggiori, come per effempio in questa. Egli è vna portione di cerchio, che la sua corda è 30. e la faetta è 10. si domanda quant'è la superficie. Prima bisogna trouare il diametro del cerchio d'onde procede tal portione, opera, secondo la regola di sopra data, trouarai, che il diametro del tondo sarà $32\frac{1}{2}$. e questo stà bene, descriui hora vn tondo, che il suo diametro sia $32\frac{1}{2}$. dentro al quale tira la corda A. C. che sia 30. e la corda G. E. che similmente sia 30. e fa che vna corda sia parallela all'altra, la faetta di ciascuna corda adunque sarà 10. Tirisi poi la corda A. G. e la corda C. E. di necessità ciascuna sarà $12\frac{1}{2}$. e così haueremo formato due altre portioni minori, opposte l'vna all'altra, & infra di loro vguale, che la faetta di ciascuna sarà $1\frac{1}{2}$. atteso che se di tutto il diametro H. D. che è $32\frac{1}{2}$. se ne cauà la lunghezza del tetragono, che è 30. restarà $2\frac{1}{2}$. il qual diuiso in due parti vguale, ne viene $1\frac{1}{4}$. e tanto sarà la faetta H. I. e parimente la faetta L. D. della portione opposta, e in qui stà bene. Vogliamo hora secondo la regola del sopradetto Feliciano, trouare quanto sia l'arco d'vna delle dette portioni minori, e sia la portione A. H. G. che la corda è $12\frac{1}{2}$. e la faetta è $1\frac{1}{2}$. noi sappiamo, che il diametro del tondo è $32\frac{1}{2}$. troua la sua circonferenza multiplicando il diametro via $3\frac{1}{2}$. farà $102\frac{1}{2}$. e tanto sarà la circonferenza del tondo, volendo hora trouare l'arco della portione A. H. G. si così, toglia la metà della corda A. G. la qual metà sarà $6\frac{1}{4}$. aggiungili la faetta H. I. che è $1\frac{1}{4}$. farà $7\frac{3}{4}$. e di questo prendi la metà, che è $3\frac{3}{8}$. e questo parri per il diametro del tondo, che è $32\frac{1}{2}$. ne viene $\frac{1}{2}$. e tal parte sarà l'arco A. H. G. di tutta la circonferenza del tondo, perche




perliche piglia $\frac{1}{2}$ di 102 $\frac{1}{2}$, ne viene 11 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ per la quantità dell'arco A.H.G. che la sua corda A.G. è 12 $\frac{1}{2}$. dimanierache secondo questa regola di Feliciano, ne seguirebbe, che in questa porzione di cerchio farebbe più la corda, che l'arco, la qual cosa è impossibile, e perciò noi diciamo tal regola esser falsa, si come habbiamo prouato.



21 Per voler dunque trouare la superficie di qualsiuoglia portione di cerchio, noi diciamo, che bisogna hauer notitia del diametro del cerchio, donde tal portione deriva, e della quantità della corda, e dell'arco, e poi operare secondo le regole seguenti.

Sappi, che a voler per le corde trouare gli archi, e per gli archi trouare le corde, bisogna hauer piena notitia delle sei specie di proporzionalità, le quali Euclide mette con tanta diligenza nel suo quinto libro; Perciò che senza dette proporzioni non è possibile fabricare tauole generali di corde, & archi, atteso che il voler trouare per le corde gli archi, e per gli archi le corde, è vna delle più difficili cose, che sia in tutta la Geometria, come per tutto l'Almagesto di Tolomeo appare, & anco in sua Cosinografia, e perciò non ci essend'emo a darne maggior dichiarazione.

Vno ha fatto tre punti con vn coltello sopra vna tauola, ouero con vna penna sopra vna carta bianca, i quali non sono in retta linea, vogliano con il compasso trouare il centro, cioè vn punto, intorno al quale menando vna circonferenza, che passi sopra tutti i tre dati punti; facciassi così, poniamo, che il primo punto sia A il secondo B. & il terzo C. come qui di sotto vedi; poni vn'asta del compasso sopra il punto A. e l'altra basta si che arriui al punto B. e descrivii il semicircolo F.G. & E.D. e così hauere fatto vna figura ouata, e nel medesimo modo farai sopra il punto C. & il punto B. facendo due semicircoli, dipoi piglia vna riga, e doue i semicircoli s'intersecano, quìui tirerai per il mezzo della figura ouata vna linea lunga a tuo piacimento, di manierache tu verrai a diuidere per mezzo ambedue le figure ouate, con due linee rette; e doue le dette due linee s'intersecaranno, quìui diremo, che sia il centro nel qual luogo, fermando vn'asta del compasso, & allargando l'altra per fino al punto A. e descrivendo vn cerchio, trouerai che la circonferenza di esso passerà giustamente sopra tutti i tre i dati punti.




E quan-

22. E quando d'un pezzo d'arco d'un pote, o d'una porta tu volessi trouare il centro del tondo che produffe tal particella d'arco; fa così, descriui si con il compasso tre tondi vguali nella facciata di tal parte d'arco, e fa che la circonferenza di ciascuno di detti tre tondi possi apunto sopra la circonferenza di detto pezzo d'arco, e li due tondi di fuori, opera che le lor circonferenze ti tocchino per l'apunto, e nel mezzo di tal toccamento poni il compasso.

E descriui il tondo del mezzo, e così farai due figure ouate, ouero biangule, dipoi con la riga tira giustamente le linee per mezzo di dette biangule, e doue le due linee rette s'interfcheranno, quivi sarà il centro del tondo, che produffe quella particella d'arco, e se più facilmente vuoi ritrouare il centro di qualsiuoglia arco, farai vna biangula in ciascheduna testa di detto arco, dipoi tirerai due linee rette, le quali diuidino le due biangule per il mezzo, & in quel luogo doue le dette linee rette s'interfcheranno, quivi sarà apunto il centro del tondo, che produffe quell'arco.




23. E dicēdo egli è il quadro C.D.E.F. che ciascun suo lato è braccia $11\frac{2}{3}$. cioè radice 128. si domanda quanto sarà il dia petro del minor tondo che di fuori lo circonda; fa così, multiplica vno de' lati di detto quadro in se, cioè $11\frac{2}{3}$ via $11\frac{2}{3}$ fa 128. qual rad doppia fa 256. e di questo pigli la radice quadra che è 16. e tanto sarà il diametro A.B. del detto cerchio.




E dicēdo egli è vn triangolo equilatero, come il seguente A.B.C. che ciascu suo lato è 20. si domanda quanto sarà il diametro D.E. del maggior tondo, che d'esso si possa fare. Fa così, multiplica vno dei lati in se, cioè 20. via 20. fa 400. e di

di questo pigliane $\frac{1}{2}$. ne viene $173\frac{1}{2}$. dipoi somma insieme tutti tre i lati del d. triangolo, fanno 60. del qual prendi la metà che è 30. e par i $173\frac{1}{2}$. per 30. ne viene $5\frac{2}{3}$. e questo raddoppialo fa $11\frac{1}{3}$. e tanto farà il diametro di detto tondo.




25 E dicendo, egli è vn triangolo equilatero, che per ciascun lato è 20. si domanda quāto farà il diametro del minor tondo, che di fuori lo circondi. Fa così, moltiplica vno de' lati in se, cioè 20. via 20. fa 400. e di questo prendi il terzo, che è $133\frac{1}{3}$. aggiungilo al detto 400. fa $533\frac{1}{3}$. e di questo pigliane la radice quadra, la quale è poco meno di $23\frac{1}{4}$. e tanto farà per diametro il detto tondo.



26 E dicendo, egli è vn tondo, che il suo diametro è $23\frac{1}{4}$. si domanda quanto farà per lato il maggior triangolo equilatero, che dentro si possa fare, fa così, moltiplica il diametro in se, fa $533\frac{1}{3}$. e di questo prendine il quarto, ch'è $133\frac{1}{3}$. e questo caualo di $533\frac{1}{3}$.


resta 400. del qual piglia la radice ch'è 20. e tanto farà per lato il d. triangolo. E volendo trouare i lati del triangolo per vn'altro modo. Sappi, che il caretto d'ogni triangolo equilatero farà sempre $\frac{1}{4}$. del diametro del minor tondo che di fuori lo circondi; piglia adunque $\frac{1}{4}$. di $23\frac{1}{4}$. che è $5\frac{2}{3}$. e questo moltiplica in se, fa quasi 300. del qual per regola gener. pigliane il $\frac{1}{2}$. che è 100. e questo aggiungilo al d. 300. farà 400. del qual prèdine la radice quadra, che è 20. e tanto farà per ciascun lato il d. triangolo. Ti potrai seruire della sopradetta figura.

27 E dicendo, egli è vn triangolo di diuersi lati, che per vna faccia è 13. per l'altra 14. e per l'altra 15. si domanda quanto farà per diametro il maggior tondo, che dentro vi si possa fare. Fa così, troua prima l'area del triangolo, la qual'è 84. e questo parti per la metà della somma di tutte tre le faccie del triangolo, la qual metà di esse faccie è 21. parti adunque 84. per 21. ne vien 4. raddoppialo fa 8. per il diametro del maggior tondo.



28 E dicendo, egli è vn triangolo equilatero, che per ciascuna faccia è 20. si domanda quanto farà per lato il maggior quadro, che dentro vi si possa fare. Fa così, somma insieme tutte tre le faccie del triangolo, fanno 60. e questo moltiplica in se, fa 3600. e di questo pigliane il $\frac{1}{2}$. ch'è 1200. quale aggiungi a 3600. fa 4800. e la radice di 4800. meno la somma di tutte tre

le facce del triangolo, sarà per lato il quadro, piglia adunque la radice di 4800. che è $69\frac{1}{2}$. del qual cauane 60. resta $9\frac{1}{2}$. per ciascun lato del quadro.




29 E dicendo, egli è vn triangolo ortogonio A.B.C. che il catetto A.B. è 12. e la base B.C. è 10. & il lato A.C. è quanto le potenze A.B. e B.C. giunte insieme, si domanda quanto sarà per faccia il quadro D.B.F.G. maggior che dentro si possa fare. Fà così, moltiplica A. B. via B.C. cioè 12. via 10. fa 120. e questo parti per il congiunto di A. B. con B.C. cioè per 22. ne vien $\frac{1}{2}$. e tãto sarà per ciascun lato il quadro.

Fanne proua, troua la superficie del quadrangolo D.B.F.G. la qual è $29\frac{1}{2}$. dipoi troua la superficie del triangolo ortogonio A.D.G. e similmente del triangolo minore G.F.C. le quali aggiungerai alla superficie del quadro; e trouarai che in tutto la superficie sarà 60. a punto che è vguale alla superficie del maggior triangolo A.B.C.

30 E dicendo, egli è vn triangolo equilatero, che per ciascun lato è 10. dentro al quale vogliamo descriuere vn'altro triangolo equilatero, il maggior che si possa, e metterlo al contrario, come qui sotto vedi, si domanda quanto sarà per lato, e che parte leuerrà della superficie del maggior triangolo. Sappi, che la metà del lato maggiore sarà uguale al minore; adunque sarà per ciascun lato 5. e perche il triangolo minore dentro descritto, è vguale a ciascuno delli tre triangoli, che intorno lo circondano, però noi diciamo, che essendo diuiso il maggior triangolo in quattro triangoli minori, & infra loro vguale, come chiaramente si vede, il triangolo del mezzo leuerrà la quarta parte della superficie maggiore.




31. Il Campanil di Pisa è tondo, il qual poniamo, che giri intorno hraccia 150. & il muro sia grosso braccia $3\frac{1}{2}$. si domanda quanto girerà intorno di dentro, fa così, raddoppia la grossezza del muro, la qual è $3\frac{1}{2}$. il suo doppio sarà 7. e questo moltiplica via $3\frac{1}{2}$. fa 22. il qual trahi di 150. resta 128. e tanto girerebbe intorno di dentro.



32 Egli è vn tondo, che il suo diametro è 8. si domanda quãto farà per lato il maggior quadro, che dẽtro alla quarta parte di d. cerchio si possa fare. Fa così, diuidi il d. cerchio in 4. parti vguali, come 4. settori, e dentro a vno di quei settori ci bisogna descriuere il maggior quadro, che sia possibile, e perche noi sappiamo che tutte le linee, che si partano da vn medesimo cẽtro, e vãno a trouar vna medesima circonferẽza sũno fra loro vguali, per questa ragion ne segue, che il diametro, ò vero linea diagonale del quadro da descriuerfi sia vguale al mezzo diametro di tutto il cerchio, adunque la linea sarà 4. la qual multiplica in se, fa 16. e di questo piglia la metà, che è 8. e radice 8. farà per ciascun lato il d. quadro, e sarà il maggiore, che in tal parte si possa fare.



33 Egli è vn quadrangolo rettang. lo A. B. C. D. del quale non si ha notitia quanto sia ciascun suo lato, ma si fa bene, che descriuendou dentro due tondi vguali, e li maggiori che possibil sia, ciascuno di essi è per diametro 4. si domanda quanto è per lato il detto quadro. Fa così, multiplica il diametro d'vno de' detti tondi in se, fa 16. raddoppia 32. & il diametro B. C. di detto quadro sarà 4. più rad. 32. troua poi quanto sarà per lato il quadrang. B




34 Egli è vn tondo, che gira intorno brac. 7. & vn' altro gira intorno brac. 2. si domanda quante volte il minor cerchio entrerà nel maggiore. Fa così, parti la circonferenza del maggior cerchio, per la circonferenza del minore, cioè parti 7. per due, ne viene $3\frac{1}{2}$. e questo multiplica in se, fa $12\frac{1}{4}$. e tante volte il maggiore conterrà il minore. Ancora


multipl. la circonferenza del maggior cerchio in se, fa 49. dipoi multiplica la circonferenza del minore in se, fa 4. per il qual parti 49. ne viene $12\frac{1}{4}$. e tante volte il minor cerchio entrerà nel minore, e volendo sapere quãte vol. e vn triangolo, ò quadrangolo, ò altra figura entrerà in vn cerchio, troua la superficie d'a. bidue, dipoi parti la superficie del cerchio per la superficie di quella tal figura che ci vuoi mettere dentro, e quello che ne peruerrà, tãte volte quella tal fig. entrerà in quel cerchio.

35 Egli è vna torre quadra la qual gira intorno di fuori braccia 50. & il muro è grosso brac. 2. $\frac{1}{4}$. si domanda quante braccia girerà intorno di dentro.


Fa così, parti 50. per 4. ne vien $12\frac{1}{2}$. e tãto farà di fuori ciascuna faccia, dipoi raddoppia la grossezza del muro, cioè $2\frac{1}{4}$. fa $4\frac{1}{2}$. il qual cauà di $12\frac{1}{2}$. resta 8. e tanto farà ciascuna faccia di dentro, adunque le quattro facce saranno 32. braccia.




36 Volendo raddoppiare vn quadrangolo rettangolo, tirisi la linea diametrale, e tanto farà il lato del maggior quadro, il qual farà doppio al minore, come per effempio sia il quadrato A. B. C. D. per ogni lato 12. moltiplica 12. in se, fa 144. et tanto è la sua superficie, raddoppiala, fa 288. e la radice di 288. ch'è poco meno di 17. farà per lato il quadro C. B. E. F. il qual farà doppio al quadrangolo minore.



37 Volendo raddoppiare la superficie d'un cerchio, fa così, descriui fuori di d. circolo. vn quadrangolo rettangolo minore, che si possa, contingente il detto cerchio, il qual quadrangolo farà per lato tanto quanto è il diametro di detto cerchio, dipoi descriui fuori di detto quadro il minor tondo, che si possa, il qual racchiuda il quadro apunto, & hauerai fatto il cerchio di fuori, che farà doppio a quello di dentro, & il diametro del quadro A. B. C. D. farà vno col diametro del minor tondo, che di fuori lo circonferue; E perche più manifestamente apparessa, che la superficie del maggior circolo è doppia alla superficie del minore, poniamo che il diametro del minore sia 6. la sua superficie sarà 28 $\frac{1}{2}$. & il diametro del maggiore sarà radice 72. la sua superficie, a lunque sarà 56 $\frac{1}{2}$. la qual è doppia alla superficie del minor cerchio.



38 Volendo a vn quadrangolo rettangolo aggiungere egualmente intorno li $\frac{1}{2}$. della sua superficie, come per effempio, sia il quadrangolo A. B. C. D. al quale vogliamo aggiungere li $\frac{1}{2}$. della sua superficie, si domanda quanto farà poi per ciascuna faccia. Fa così, tira la linea A. B. retta, e lunga per buon spatio, fin al pinto F. poi farai vn quadrilatero rettang. di 2. come il quadrilat. B. E. D. G. congiunto con d. linea A. B. F. e con il primo quadrangolo, dipoi farai vn altro quadrangolo simile al primo, come il quadrangolo E. F. G. H. congiunto con d. linea, e col quadrilatero B. E. D. G. Fatto questo diuidi in mezzo la linea A. B. E. F. che tal diuisione verrà in punto I. e dal d. punto I. formarai il semicircolo A. K. F. dipoi tira la retta B. D. tanto che interfecchi il semicircolo, la quale intersezione poniamo che sia in pinto K. e la linea B. K. diremo che sia ciascun lato del quadrangolo A. B. C. D. quando vi sarà aggiunto li $\frac{1}{2}$. della sua superficie intorno,



39 E volendo, che questo più manifestamente apparisca, si dimostrerà per numero. Sia adunque del quadrangolo A.B.C.D. ciascun suo lato 16. la superficie del quale sarà 256. e li $\frac{1}{2}$. di tal superficie sarà 192. & il quadrilatero B.E.D.G. s'è formato per li $\frac{1}{2}$. del quadrangolo A.B.C.D. per il che il lato B.E. e D.G. ciascuno sarà 12. e B.D. & E.G. ciascuno sarà 16. laonde la sua superficie sarà 192. che è apunto li $\frac{1}{2}$. di 256. Hor per esser tutta la linea A.B.E.F. diuisa in due parti uguali in punto I. & essendo tutta 44. ne segue, che A.B.I. per esser la metà di essa linea, sia 22. e B.I. sia 6. tirisi la linea I.K. la qual sarà 22. vguale alla linea A.B.I. perciò che si partono da vn medesimo centro, e vanno a trouare vna medesima circonferenza, di manierache noi haueremo il triangolo ortogonio K. B. I. che B.I. è 6. & I.K. è 22. e vogliamo mediante questi due lati trouare quanto sia il cateto K.B. moltiplica 22. in se, fa 484. dipoi multipl. 6. in se; fa 36. che tratto di 484. resta 448. e la radice di 448. che è poco meno di 21 $\frac{1}{2}$. sarà la linea K.B. adunque vn quadrangolo, che sia per ciascun lato, quanto la linea K.B. cioè 21 $\frac{1}{2}$. la sua superficie sarà 448. e se alla superficie del minor quadrangolo che è 256. vi si aggiungerà li $\frac{1}{4}$. cioè 192. sarà 448. apunto, ergo &c.

40 Vno ha vna tauola lunga bracc. 10. e larga bracc. 3. della quale vorrebbe fare vna porta, che fusse larga bracc. 4. e che fusse di due pezzi soli, si domanda quanto sarà alta.

Se ben Sebastiano Serlio ha detto che tal porta vuol che sia alta bracc. 7. e larga 4. noi diciamo esser impossibile; perciò che segando d. tauola diametralmente, come egli n' insegna, e spingendo poi il taglio d' vna parte sopra il taglio dell' altra per spatio di 3. bracc. come ei vuole, conclude, che d. tauola sarà lunga 7. br. e larga 4. il che è falso; perciocché le due punte, che auanzano, sono due triang. ortogoni, che la base di ciascuno è 3. bracc. & il cateto, cioè l' altro lato che corre a far l' angolo retto è vn braccio, adunque la quadratura d' ambedue sarà 3. braccia apunto, e la porta che resta è bracc. 28. quadre, alle quali aggiungendoue bracc. 3. delle due punte che auanzano faranno bracc. 31. e tutta la tauola, prima che si sega è braccia 30. e perciò tal sua conclusione è falsa.

Ma volendo far tal porta larga braccia 4. non si può dar determinata altezza, anzi conuiene inuestigarla in questo modo, cioè

Poniamo, che la tauola da segarsi sia la presente figura quadrilatera A.B.C.D. feghisi la d. tauola diametralmente, come fa la linea C.B. fatto questo, trouisi quanto cresce di larghezza per ogni braccio, che si spinga inanzi, vna parte sopra l' altra per d. taglio; e per trouare tal crescimento, diremo così;


Spingasi la testa A.C. sopra il taglio de l' altra parte, tanto quanto è lunga, cioè per spatio di 10. braccia, staranno congiunte come i due triangoli ortogoni A. C.F. e B.D.E. di manierache essendo congiunte le due teste insieme per la larghezza, faranno larghe braccia 6. adunque spingendou la parte A. C.B. della tauola, sopra l' altra parte, tanto quanto è lunga, cioè 10. braccia; ci darà 3. bracc. più di larghezza: per il che diremo e. si per regola del tre; se 10. bracc. che si spinga inanzi la tauola, ci danno di larghezza 3. braccia più; spingendola inanzi vn braccio solo, quan o ci darà di larghezza; moltiplichisi 1. via 3. fa 3. e questo partisi per 10. ne verrà $\frac{3}{10}$. d' vn braccio.

Hora vogliamo, che la tauola sia larga 4. braccia, cioè che creschi di larghezza vn braccio, perciò diremo così, se $\frac{3}{10}$. d' vn braccio di larghezza, ci crescono per spinger la tauola inanzi vn braccio di larghezza, che noi vogliamo che cresca,

H h 3

quante

quante braccia conuerà spinger inanzi la detta tauola, multiplichisi 1. via 1. fa 1. e questo partisi per $\frac{1}{3}$. ne verrà bracc. $3\frac{1}{3}$. e tanto conuerà spingere inanzi la detta parte di tauola A.C.B. per il che ne segue, che la porta sarà lunga bracc. $6\frac{2}{3}$. e non 7. come vuole il Serlio. Faccisene proua, noi habbiamo, che la porta sarà alta bracc. $6\frac{2}{3}$. e larga 4. la sua quadratura sarà bracc. $26\frac{2}{3}$. dipoi noi habbiamo le due punte che auanzano, come due triangoli ortogoni, che ciascuno è per la base bracc. 3. e $\frac{1}{3}$. & i lor lati concorrenti all'angolo retto, cioè il caretto di ciascuno è vn bracc. la quadratura adunque d'ambedue sarà bracc. $3\frac{1}{3}$. le quali aggiunte con braccia $26\frac{2}{3}$. fanno braccia 30. apunto, come era di bisogno.



41 Vno ha vn pezzo di terra in forma circolare, il quale è per diametro bracc. 63, come per essimio il diametro A.B. del sotto scritto cerchio, la superficie del quale vorrebbe diuidere in tre parti vguali in forma circolare, cioè che la parte di fuori contenesse l'altre due parti, come nel disegno vedi, si domanda, quanto resterà per diametro, tollone via la prima parte di fuori, e quanto poi resterà il diametro della terza parte concentrica, tollone via la seconda parte. Fa così, multiplica il diametro A.B. del maggior cerchio in se, cioè 63. via 63. fa 3969. e di questo prendine il $\frac{1}{3}$. che sono 1323. del qual prendine la radice quadra, ch'è 36. $\frac{2}{3}$. e tanto resterà il diametro C.D. tol' one la prima parte di fuori, dipoi multipl. il medesimo 63. in se, fa 3969. e di questo pig' l'ane il $\frac{1}{3}$. che è 1323. la radice del quale è 36. $\frac{2}{3}$. e tanto sarà il diametro E.F. della terza parte, che è quella di dentro concentrica, e sarà fac-



42 Il Pentagono equilatero, è vna superficie di 5. lati vguali, e di 5. angoli vguali, della qual figura petagonale i lati suoi si possono hauere dal diametro del circolo, che la circonferiue, e dai lati si può hauere il diametro del circolo, doue è descritta, e per i lati si può hauer la corda, che sotto tende all'angolo pentagonico; e per la corda il lato, e per quelli si troua la superficie.

Egli è vn pentagono, cioè vna figura equilatera di 5. tacce, che ciascuna è 8. braccia, si domanda quant'è la superficie. In troppo gran luogo s'entrerebbe, se noi volessimo dimostrare theoricamente il modo da trouare la superficie del pentagono, e di molte altre figure; perciòche, prima bisognarebbe dimostrare il modo da trouare il diametro del cerchio, che lo circonferiue, e mediante quello trouar la corda, che sotto tende all'angolo pentagonico, ma perche nostra intentione è sola dimostrarlo più per pratica, che per Theorica, però volendo trouare la superficie del proposto pentagono, farai così, multiplica vno de' suoi lati in se, cioè 8. via 8. fa 64. e questo per regola generale, cauata dalla theorica, multiplicherai via $1\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, che fa $110\frac{1}{2}$. e tanto sarà la superficie di detto pentagono.



Se in vn'altro modo vuoi trouare la superficie di detto Pentagono, fa così, troua prima il centro, dipoi tira vna linea perpendicolare dal centro nel mezzo di qualsiuoglia lato, e poniamo che d. linea sia braccia $5\frac{1}{2}$. Noi habbiamo, che tutto il pentagono gira intorno braccia 40. prendine la metà, che 20. e questo multiplica via $5\frac{1}{2}$. fa 110. per la superficie di d. Poligono. Con l'istesso modo si può misurare l'effagono regolare, trouando prima il centro.

L'effagono è vna superficie contenuta da 6. lati vguali, che ciascuno è vguale al semidiametro del circolo, doue è descritta d. superficie, e diuidesi in sei triangoli equilateri, per li quali si troua la superficie di d. effagono mediante i cateti.


43 Egli è vn'effagono equilatero A.B.C.D.E.F. che ciascun suo lato è 6. si domanda quant'è la superficie. Tu sai, che l'effagono si diuide in sei triangoli vguali equilateri, e ciascun lato di dd. triangoli è vguale al semidiametro del circhio che li circonferiue, dunque ciascun lato de' triag. sarà 6. & il diametro del circhio, che di fuori circonda l'effagono sarà 12. Troua hora il cateto d'vn triangolo, che ciascun suo lato è 6. Sappi, che la possanza del cateto è $\frac{1}{2}$. della possanza del lato d'ogni triangolo equilatero. La possanza del lato è 36. e $\frac{1}{2}$. di 36. è 27. e radice 27. diremo, che sia il cateto, volendo hora la superficie d'vn triangolo, piglia la metà di radice 36. e poniamo, che sia la base, la qual metà è 9. multiplica 9. via radice 27. fa 243. e rad. 243. sarà la superficie d'1. di dd. 6. triangoli, e noi voliamo la superf. di 6. triag. perche, multiplica in 6. fa 1458. e questo n. multiplica via 243. fa 8748. e la r. di 8748. sarà la superficie dell'effagono. Per altro modo troua la superf. Tu sai, che nell'effagono cade vn triag. equilat. cacciato co' gli angoli suoi in tre angoli dell'effagono, cioè A.C.E. & habbiamo detto che il diametro del cerchio, che lo circonferiue è 12. adunque il cateto di tal triangolo sarà 9. cioè $\frac{3}{4}$. del diametro; e la sua base è radice 108. la qual si troua così; multiplica il cateto in se, cioè 9. fa 81. e di queste pigliane il $\frac{3}{4}$. che è 27. aggiungilo a 81. fa 108. e la radice di 108. sarà la base, e se tu multiplichi il cateto in tutta la base, ne verrà la superficie di due triangoli, che farà la superficie di tutto l'effagono; perciòche A.D. che è diametro, passa per G. che è centro, e fa 6.

H h 4



triangoli

triangoli, tre de' quali sono dentro al triangolo A.C.E. che vno di essi è il triangolo A.G.C. l'altro A.G.E. e l'altro C.G.E. e quelli, che son fuori del maggior triangolo A.C.E. son questi cioè A.B.C. & A.F.E. e C.D.E. che tutti sono fra loro vguali, e perciò seta multiplichi il catetto del triangolo equilatero A.C.E. che è 9. recato a radice fa 81. via radice 108. che è la base, fa 8748. e la radice di 8748. sarà la superficie dell'effagono, come di sopra.

Ma volendo trouare la superficie dell'effagono più breuemente, fa così, multiplica vno de' lati in 6, cioè 6. fa 36. e questo per regola generale multiplicalo via $2\frac{1}{2}$. fa $93\frac{1}{2}$. e tanto sarà la superficie.





44. E se più presto, e più facilmente vogliamo trouare la superficie del sopradetto effagono A.B.C.D.E.F. fa così, descriui le tre linee diametrali, & hauerai diuiso l'effagono in 6. triangoli equilateri, & vguali, dipoi tira fuori dell'effagono la linea G.H. che sia lunga vn diametro, e mezzo dell'effagono, cioè brac. 18. che sono vguali a tre lati d'vno di detti triangoli; e sopra di d. linea vi descriuerai 3. triangoli vguali a quelli dell'effagono, e sopra le punte di dd. triangoli tira la linea I.K. che sia vguale, e parallela alla G.H. le quali chiudendole con le linee I.G. e K.H. formaranno vn quadrangolo I.K.G.H. lungo braccia 18. e largo brac. $5\frac{1}{2}$. cioè tanto quanto è il catetto d'vn triangolo; la superficie del quale sarà brac. $93\frac{1}{2}$. che vguaglia la superficie dell'effagono.




Come d'un Pentagono si possa fare un Quadrangolo.

45. Sia il Pentagono A.B.C.D.E. troua il centro di d. Pentagono, e tira le linee da ciascun angolo fino al centro, hauerai diuiso il Pentagono in 5. triangoli equilateri, & infra loro vguali, dipoi tira vna linea lunga due bafe, e mezzo d'vno di detti triangoli, e sopradetta linea, descriui due triangoli, e mezzo vguali a quelli del Pentagono, dipoi tira vna linea sopra le punte di detti triangoli, che sia vguale, e parallela alla già tirata. e ferrale come nell'effagono s'è fatto, & hauerai formato il quadrangolo F.G.H.I. vguale al Pentagono &c.



46. Egli è vn effagono la superficie del qual è 100. si domanda quante è ciascun suo lato. Perche l'effagono si diuide in sei triangoli vguali equilateri, de quali se tu ne predi vno, tu hauerai la sesta parte della superficie dell'effagono, piglia adunq. $\frac{100}{6}$. di cento, che è $16\frac{2}{3}$, e tanto sarà la superficie d vn triangolo. Volèdo poi sapere quato sia ciascun lato multip. $16\frac{2}{3}$. in se, fa $277\frac{2}{3}$, e questo per regola generale lo multiplicarai vsa $5\frac{1}{2}$. farà $1481\frac{1}{2}$. e la radice di $1481\frac{1}{2}$. farà ciascun lato del triangolo, e parimente dell'effagono, per. essere infra loro vguali.




L'ottagono è vna superficie di 8. lati vguagli; descruuendofi nel circolo, contiene quello con tutti gli angoli suoi, e dal diametro di tal circolo si ha la superficie dell'ottagono, come per essempio.

47 Egli è vn'ottagono, che il diametro del circolo, che lo circonferiue è 7. si domanda quant'è la superficie dell'ottagono. Noi habbiamo che la roffanza del diametro di tal circolo è 49. pigliane la metà, che è $24\frac{1}{2}$. & rad. $24\frac{1}{2}$. farà per lato il maggior quadrato, che si possa fare; & il quadrato iudentro poſto ſarà H.F.D.B. & habbiamo il diametro A.E. ch'è 7. diuidafi B.H. in punto I. & F.D. in punto L. & hauerai 4. triangoli, cioè B.A.H. & B.C.D. & D.E.F. & F.G.H. vguali, & ſimili infra loro, perciò la baſe d'vno di eſſi è vguale alla baſe di ciaſcun altro, & il catetto d'vno è vguale al catetto dell'altro, & A.L. farà catetto del triângolo D.E.F. adunque il diametro A.E. meno I.L. ſono due catetti, & A.E. è 7. & I.L. è radice $24\frac{1}{2}$. però ſe multiplicarai due catetti per vna baſe, farà la ſuperficie dei quattro triangoli; perciò che tu fai, che multiplicando vn catetto nella baſe del ſub triangolo, ne peruiene la ſuperficie di due triangoli, & multiplicando la metà del catetto via tutta la baſe, ne peruiene la ſuperficie d'vn triangolo ſolo; perliche ne ſeguita, che a multiplicare due catetti in vna baſe, ne peruenga la ſuperficie di quattro triangoli, & perciò multiplica 7. men radice $24\frac{1}{2}$. ridotto a radice via radice $24\frac{1}{2}$. che fa radice $1200\frac{1}{2}$. men $24\frac{1}{2}$. & queſto aggiungi con la ſuperficie del quadrato H.F.D.B. che è $24\frac{1}{2}$. & hauerai che la ſuperficie dell'ottagono farà radice $1200\frac{1}{2}$. Per altro modo ſi può trouare ancora tal ſuperficie.

Sappi, che d'ogni circolo, moltiplicando il suo diametro nel lato del triangolo equilatero, si ottiene la sua superficie.


gior quadro che ci si possa far dentro, ne peruiene la superficie dell'ottagono descritta in quello, tu sai, che il diametro del circolo è 7. e la sua possanza è 49. & il lato del maggior quadro, che si possa fare in tal circolo è radice 24 $\frac{1}{2}$. però moltiplica 49. via 24 $\frac{1}{2}$. fa 1200 $\frac{1}{2}$. e la radice di 1200 $\frac{1}{2}$. farà la superficie dell'ottagono.



48 Egli è vn circolo, che per diametro è bracc. 10. del qual ne vogliamo segare due braccia con la linea A.B. terminante nella circonferenza, domandasi la qualità di essa linea. Noi habbiamo per la 34. del terzo d'Euclide, che le linee, che s'intersecano nel circolo, che quello che si fa d'vna parte della linea nell'altra sua parte, è uguale a quello che si fa d'vna parte dell'altra linea nell'altra sua parte; adunque se si moltiplica vna parte nel diametro che è 2. nell'altra parte di d. diametro ch'è 8. fa 16. e perche la linea diuidente viene diuisa dal diametro ad angolo retto, ne segue che sia diuisa vguale, cioè, adunque ciascuna parte è radice 16. che moltiplicato radice 16. via 16. fa 16, apunto, adunque la linea diuidente A.B. farà 8.




49 Egli è vn circolo, che il suo diametro è 7. vogliamo co. vna linea retta leuare la quarta parte della circonferenza, si domanda quanto sarà la superficie, che si toglie via. Noi habbiamo, che il maggior quadro, che si possa fare nel circolo, che sia di diametro 7. il lato di d. quadro, farà radice, 24 $\frac{1}{2}$. e questo moltiplicato in se, fa 24 $\frac{1}{2}$. per la superficie di tal quadro, cauato della superficie di d. tondo che è 38 $\frac{1}{2}$. resta 14. il qual parti per 4. perche fuori del quadro restano 4. portioni vguali, e perciò conuien partire 14. per 4. ne viene 3 $\frac{1}{2}$. e tanto leuata di superficie di tal tondo, la linea, che sega $\frac{1}{4}$. della circonferenza.



50. Ancorche molte propositioni, e figure superficiali da noi poste, non habbino a seruire al pratico misuratore, nulladimeno a noi è parso bene il dimostrarle, si per spasso dei lettori, come per affotigliamento dell'intelletto di quelli, che all'intelligenza di cose maggiori desiderano peruenire. Resta hora, che dimostriamo la varietà di qualche corpo, così sferico, come cubo: mediante li quali in molte altre cose ti potranno seruire. Li corpi adunque hanno tre dimensio-
lunghez-

lunghezza, larghezza, & altezza, ouero profondità, e sono di molte ragioni, bẽ che noi non intendiamo trattare, se non d'alcuni corpi regolari, e trouare la loro area superficiale, e corporale, e prima cominciamo da quelli, che sono d'angoli retti, per procedere quanto piu si può ordinatamente, e per far questo cominceremo dal cubo, e così chiamato dai latini, il quale è vn corpo solido, fatto di 6. superficie quadre, & vguali infra di loro, & ad angoli retti, come per essepio.

1 Egli è vn cubo, cioè vna pietra quadrata, fatta a modo d'vn dado, che per ciascun suo lato delle 6. facce è 4. braccia, si domanda quante braccia cube farà. Fa così, moltiplica 4. lunghezza, via 4. larghezza, fa 16. e questo 16. farà la superficie d'vna faccia di esso dado, hor moltiplica 16. via 4. altezza, fa 64. e tante braccia quadre corporee farà la d. pietra, cioè si formerebbe in detta pietra 64. dadi, che ciascuno sarebbe lungo, largo, & alto vn braccio ad angoli retti.



2 Egli è vn cubo, che per ciascun suo lato è 4. braccia si domanda quanto farà per lato vn'altro cubo, che sia doppio a questo. Noi sappiamo, che il cubo, che è per ciascun lato 4. la sua area corporale è 64. e volendo fare vn'altro, che sia doppio a questo, raddoppia 64. fa 128. e radice cuba di 128. che è poco meno di 5. sarebbe per ciascun lato il cubo maggiore per il doppio del sopradetto.

Sfera, o vogliamo dire figura sferica, è vn corpo solido contenuto, e chiuso da vna sola superficie, nel mezzo del quale è vn punto, dal quale tutte le linee rette prodotte fino alla sua superficie sono infra di loro vguali.

Il diametro della sfera è vna linea retta, la quale passando per il centro, arriva da due parti alla superficie della sfera.

Affe di sfera è vna linea retta, che passa per il suo centro, e le sue estremità arrivano alla superficie di detta sfera, la qual si volge attorno al detto Affe, che sia immobile.

3 Egli è vn corpo sferico, cioè vna palla, che il suo diametro, ouero Affe è 7. si domanda quanto farà la superficie. In molti modi si può ritrouare la superficie di detta palla, e per il primo farai così, moltipli. il suo diametro, che è 7. via la circonferenza di detta palla, che è 22. fa 154. e tanto farà la superficie; & in altro modo, come dice Archimede. Sappi, che ogni superficie di sfera è 4. tanti della superficie piana del maggior cerchio di quella propria sfera, come per essepio.




La sfera, che il suo diametro è 7. il maggior cerchio di essa farà 22. & vn cerchio, che la sua circonferenza sia 22. il diametro farà 7. e la superficie piana di detto cerchio farà $38\frac{1}{2}$. dieci, che la superficie di d. palla farà 4. tanti della superficie di detto cerchio, moltiplica adunque $38\frac{1}{2}$. via 4. fa 154. come di sopra.

Ma se noi volessi sapere, quante braccia quadre corporee fusse d. palla; lo potremo sapere nei seguenti modine prima, moltiplica la superficie della palla, che è 154. via la metà del diametro, ouero moltiplica la metà della superficie via tutto il diametro. che in ciascun modo fa 539. del qual pigliane il $\frac{1}{3}$. ch'è 179 $\frac{2}{3}$. e tante brac. cube farà d. corpo. Et in altro modo, moltipli. la superficie della palla, via la sesta parte del diametro, e ne peruerà la quadratura di d. corpo. Ancora se moltiplichì la terza parte della superficie via la metà del diametro, ne verrà

verrà il medesimo, come di sopra. Ancora, se moltiplichi la superficie piana del cerchio della sfera, che è $38\frac{1}{2}$, via tutto il diametro, e del prodotto ne prenderai $1\frac{1}{2}$, ti verrà la medesima quadratura; perciò che, secondo Archimede, quella colonna, che ha per base il cerchio della palla, e la sua altezza sia quanto tutto il diametro di d. palla, corrisponde per sequaltera, cioè per la metà più a d. palla. Ancora, devi sapere che ogni cubo contiene in se vn corpo sferico, il quale è $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ del d. cubo, cioè se il cubo fusse 7. per ogni faccia, la sua corporal quadratura farebbe 342, e se di questo se ne piglia gli $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$, ne viene 179 $\frac{1}{2}$, si come per i sopra detti modi habbiamo concluso; e perciò i pratici costumano moltiplicare il diametro della palla in se, e di tal hum. cubico, cioè cebicare il diametro, e di tal hum. cubico prenderne li $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$, e ne peruiene la quadratura della palla; e se di 343. che è la quadratura del cubo, se ne cauà gli $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$, restarà 179 $\frac{1}{2}$, per la quadratura di detta palla.


La ragione perche se ne cauà gli $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$, è questa cioè et ha vn dado, che sia per ogni lato 7. del quale ne vogli calare vna palla, la maggiore che si possa, e tu vieni a scantonare d. cubo, di maniera che b. è prouato, che quello che se ne getta è $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ di tutto quello, che prima era il cubo; e quello che rimane viene ad esser $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$ di tutto il cubo. E dicendo egli è vna sfera, che la sua superficie è braccia 6. 16. si domanda quanto è il diametro. Fa così, parti 616. per 343. ne viene 196. e di questo piglia la rad. quadra, che è 14. e tanto sarà il diametro di d. palla. E se si ha vn cubo quadrato, che ciascun suo lato è di 4. si domanda quanto sarà il diametro della sfera, che la circonferenza. Dicesi, che da proportion della potenza del diametro della sfera, alla potenza del lato del cubo in quella descritto è tripla, cioè, come 3. a vno, però moltiplica il lato del cubo, che è 4. in se, fa 16. hora dirai, se vno fusse 16. che farebbe 32 opera, farebbe 48. e rad. 48. sarà la potenza del diametro della sfera.

E se è vna sfera, che il diametro suo è 7. si domanda il lato del maggior cubo, che dentro vi si possi ponere, ouero formare. Questa è contraria alla precedente, noi habbiamo che il diametro è 7. la potenza del quale è 49. e quella proportion, che è dalla potenza del diametro della sfera alla potenza del lato del cubo, è come 3. a vno, però dirai così, se 3 fusse 49. che farebbe vno moltiplica, e pari, secondo la regola, ne vien 16 $\frac{1}{2}$, e radice 16 $\frac{1}{2}$. sarà il lato del cubo.



7 Se della superficie d'vna sfera, che il suo asse è 7. ne vogliamo far superficie d'un cubo, si domanda quanto farà il lato del cubo. Noi habbiamo che la sfera della quale il suo asse è 7. la sua superficie è 154. e perche il corpo cubico ha 6. facce, però diuidi 152. per 6. ne vien $25\frac{2}{3}$. e radice $25\frac{2}{3}$. farà il lato del cubo, e la superficie di ciascun lato farà $25\frac{2}{3}$.

8 Se della superficie del cubo, che il suo lato è 4. si vuol far superficie d'vna sfera, si domanda quanto farà il suo asse, ouero diametro. Fà così, vedi quanto è la superficie del cubo, ch'è per lato 4. multiplica 4. in se, fà 16. e perche il cubo ha 6. facce, multiplica 16. via 6. fà 96. e tanto è la superficie del cubo, della qual bisogna far superficie d'vna sfera, che sia 96. parti adunque 96. per $\frac{1}{4}$. ne viene $122\frac{2}{3}$. e di questo piglia la metà come a radice fà 4. parti $122\frac{2}{3}$. per 4. ne vien $30\frac{1}{4}$. e la radice di $30\frac{1}{4}$. diremo che sia il diametro, ouero asse della sfera, che la sua superficie sia 96.




9 Egli è vna sfera, che il suo diametro è 9. si domanda quanto farà per lato la maggior piramide equilatera di 4. base triangolari, che in detta sfera si possa formare. Fà così, multiplica il diametro della sfera in se cioè 9. fà 81. e di questo prendine li $\frac{3}{4}$. che sono 54. e la radice 54. che è appresso a $7\frac{1}{4}$. diremo, che sia per lato la detta piramide.

Quàdo l'area corporale d'alcuna piramide vuoi misurare, l'area della sua base di che forma sia, per il terzo dell'altezza di detta piramide, multiplica, e quel che ne peruerà farà la corporal quadratura di detta piramide.

10 Egli è vna piramide triangolare, che per ciascuna faccia della base è 2. & è alta à piono bracc. 12. si domanda quante braccia cube è. Prima troua la superficie del triangolo equilatero, che per ciascuna faccia è 2. offeruando le regole date, trouarai, che la sua superficie sarà la radice di 3. che multiplica to per il terzo dell'altezza di detta Piramide, cioè per il terzo o di 12. che è 4. recato a radice, farà 16. hor multiplica 16. via 3. fà 48. e radice 48. diremo, che sarà la quantità corporale di detta piramide.



Egli è vna Piramide triangolare diuersilatera, che il maggior lato della sua base è 3. l'altro lato è $2\frac{1}{2}$. e l'altro è $1\frac{1}{2}$. & è alta bracc. 12. si domanda la corporal quadratura. Fà così, prima troua l'area superficiale della base, cioè del triangolo diuersilatero, trouarai che sarà radice $3\frac{1}{2}$. il qual multiplica via il $\frac{1}{3}$. dell'altezza, che è 4. recandolo prima a radice, farà 56. e la radice di 56. diremo, che sarà la quadratura di d. piramide. E se fusse vna colonna triangolare diuersilatera, cioè, che i lati della base non fussero uguali, della quale volessi sapere la quadratura, multiplicaresti la superficie della base via tutta l'altezza della colonna, e così faresti se fusse di 4. o più fac. 12 Egli è vna Piramide triangolare diuersilatera, che il lato AB della base è 13. & il lato B.C. è 14. & il lato A.C. è 15. e non si quanto sia alta, ma sò bene, che la corporal quadratura è 756. si domanda quanto è alta, cioè la linea del piombo.



Fà così, troua la superficie della base, A.B.C. la qual è 84. e noi habbiamo, che se si multiplica la superficie della base d'ogni piramide

A 15 C

mide



me via il terzo dell'altezza, ne peruiene la quadratura corporale di d. piramide, perliche ne segue, che le bracc. 756. che sono la quadratura della proposta ci piramide sieno peruenute dalla multiplicatione di 84. via il terzo della sua altezza, parti adunque 756. per 84. ne vien 9. e questa sarà la terza parte dell'altezza di detta piramide, adunque tutta la piramide sù alta 27. e così farai le simili.

13 Egli è vna piramide quadrangolare, la quale nella sua base per ciascuna faccia è bracc. 4. & alta perpendicolarmente bracc. 40. si domanda la sua corporal quadratura. Fà così, troua la superficie della base, cioè del suo quadro, che per ogni lato è 4. e la superficie di esso quadro è 16. dipoi troua la corporal quadratura, come se fussè vna colonna quadra, multiplicando 16. via l'altezza che è 40. fà 640. ma perche ogni laterata colonna è tripla alla sua piramide, adunque è necessario pigliare il $\frac{1}{3}$. di 640. ne viene 213. $\frac{1}{3}$. per la quantità corporale di detta piramide.

14 Egli è vna piramide tonda, il diametro della sua base è 10. br. e dalla cima fino alla circonferenza della base è bracc. 12. si domanda quante braccia quadre corporee farà la d. piramide. Prima bisogna trouare la linea del piombo, cioè la sua altezza, e per trouare tal'altezza, multiplica 12. in se, fà 169. dipoi multiplica la metà del diametro, la qual'è 5. in se, fà 25. il qual trarrai di 169. resta 144. e la radice quadra di 144. ch'è 12. diremo che sia la linea del piombo, cioè l'altezza di d. piramide. Hora che tu hai trouato l'altezza, bisogna trouare la superficie della base, la qual'è per diametro

10. la sua superficie sarà 78 $\frac{5}{8}$. e questa multiplicarai via l'altezza di d. piramide. Hora che tu hai trouato l'altezza, bisogna trouare la superficie della base, qual'è per diametro 10. la sua superfic. sarà 78 $\frac{5}{8}$. e questa multiplicarai via l'altezza di d. piramide, ch'è 12. farà 942 $\frac{5}{8}$. del qual ne prenderai il terzo, che è 314 $\frac{5}{8}$. per la corporal quadratura; e se tu multiplichi 78 $\frac{5}{8}$. via il terzo dell'altezza, cioè via 4. farà similmente 314 $\frac{5}{8}$.

15 Egli è vna piramide, di che forma sia non fa caò, la qual'è alta bracc. 6. della quale ne vorrei far due parti vguali, cioè, che vna parte rimanesse piramide intera, e l'altra parte fussè vna piramide corta, si domanda quanto sarà l'altezza di ciascuna; si così, multiplica 6. in se cubice, fà 216. e di questo pigliane la metà, che è 108. e la radice cuba di 108. farà l'altezza della piramide intera, e della piramide corta, la sua altezza sarà bracc. 6. men la radice cuba di 108. e così vñ sempre di che parte vuoi.



16 Egli è vna piramide tonda, che il diametro della base è 10. ed alla cima, fino alla circonferenza della base è 13. domanda quant'è l'arca superficiale. Fa così, troua prima quant'è la circonferenza di detta base, multiplicà 10. via 3. $\frac{1}{2}$. fa 31. $\frac{1}{2}$. dipoi multipl. quant'è dalla cima fino alla circonferenza, cioè 13. via la metà della circonferenza, ch'è 15. $\frac{1}{2}$. farà 204. $\frac{1}{2}$. & a questo aggiungerai la superficie della base, la qual'è 78. $\frac{1}{2}$. farà in tutto 282. $\frac{1}{2}$. e tanto farà la superficie di tutta la piramide. Ancora se multiplicarai la superficie della base, che 78. $\frac{1}{2}$. via 13. farà 1021. $\frac{1}{2}$. e questo parti per la metà del diametro, che è 5. verrà similmente 204. $\frac{1}{2}$. e così diremo che tante sono le braccia superficiali di detta piramide, senza quella della base, alle quali, se aggiungeremo 78. $\frac{1}{2}$. della base, faranno in tutto 282. $\frac{1}{2}$. per la superficie di tutta la piramide, come di sopra.

17 E se accadesse misurare vn troncone di piramide di 6. facce alla qual mancasse la punta, ma dalla base al suo tutto fusse di lati, e facce vguale. Faci in questo modo, tirinsi le linee de suoi lati per fino a tanto che congiungendosi insieme terminino il tutto della parte che manca, e volendo fare, questo pongasi due regoli a diritto per lo lungo di due lati opposti di detta parte di piramide, & i detti regoli sieno talmente lunghi, che andando ad vnirsi insieme terminino la lunghezza di tutta la piramide, come se non fusse rotta; e doue i detti regoli concorrono a congiungersi insieme diremo, che sia la punta della piramide; dipoi misurisi tutta la piramide come se fusse intera, e pongasi che ciascun lato della base sia 6. e la linea del piombo di tutta la piramide sia 15. Prima troua la superficie della base, la quale è vguale a vn'effagono, che per ciascun lato è 6. la superficie adunque sarà 18. 8748. come per la 43. si disse, che ridotto a num. farà 92. $\frac{1}{2}$. il qual multiplichisi via il terzo dell'altrezza, che è 5. farà 468. e tante braccia quadre sarebbe tutta la piramide, con quella parte che gli manca; hora bisogna trouare quante braccia quadre gli manca; pongasi che i lati della rottura, o piano di sopra, ciascun sia braccia 3. adunque noi hauremo ci manca vna piramide piccola di 6. facce, che ciascun lato della base farà 3. della quale vogliamo sapere la corporale quadratura.

Trouisi prima la linea del piombo la qual farà 7. $\frac{1}{2}$. dipoi troui la superficie dell'effagono, cioè della base della piramide piccola, che per ciascun lato è 3. multiplichisi 3. in se, fa 9. e questo multiplichisi via 2. $\frac{1}{2}$. fa 23. $\frac{1}{2}$. e tanto è la superficie della base, la qual multiplichisi via 7. $\frac{1}{2}$. fa 175. $\frac{1}{2}$. del qual piglisi il terzo, ne vien 58. $\frac{1}{2}$. per la corporale quadratura della minor piramide; se si trarrà adunque 58. $\frac{1}{2}$. di 468. ci resta 409. $\frac{1}{2}$. e così diremo che la piramide rotta, o mezza farà braccia 409. $\frac{1}{2}$. quadre corporee.

18 Egli è vna colona di pietra, la qual'è tonda. & è alta braccia 25. & il suo diametro è braccia 2. si domanda l'arca corporeale: Prima troua la superficie del circolo della base, multiplicando 2. in se, fa 4. e di questo prendi li $\frac{1}{4}$. ne vien 1. & tanto è la superficie della base, la qual moltiplica via l'altrezza di d. colona, che è 25. farà 25. e tante braccia quadre corporee farà d. colonna e volendo saper quante libbre pesa sappi, che ogni braccio quadro pesa libbre 100. perciò multipl. 25. via 100. fa 2500. e tante libbre diremo che pesa detta colona, e tenendo che pesa più vn braccio quadro di naimo, che vn braccio quadro di pietra.






19 Ma perche le colonne tonde, secondo che ci dimostra Vetruiuo non vanno vguualmente grosse, se non fino al terzo di loro altezze, e dal detto terzo fino alla sommità vanno mancando quasi $\frac{1}{2}$. di lor grossezza, perciò vogliamo in questa dimostrare il modo di misurarle. Hor poniamo che fusse la sopradetta colonna, che il diametro della sua base è 3. & il diametro della sommità, poniamo che fusse $2\frac{1}{2}$. è la sua altezza braccia 28. e volemmo sapere la sua corporal quadratura. Diceffi che prima si misuri dalla base fino al terzo dell'altezza di detta colonna, che sono braccia $9\frac{1}{2}$. & il suo diametro tanto della base, come alla sommità di braccia $9\frac{1}{2}$. farà 3. la qual parte di colonna misurerai come la sopradetta moltiplicando il diametro in se fa 9. del qual prendi li $\frac{1}{2}$. che sono $7\frac{1}{2}$. e questo moltiplica via la terza parte dell'altezza di detta colonna, che è $9\frac{1}{2}$. farà 66. appunto, per le braccia quadre corporee di detta parte di colonna. Hora ci rimane a misurare il resto di detta colonna, la qual sarà alta braccia 18. & il diametro della base sarà braccia 3. e quel della sommità sarà braccia $2\frac{1}{2}$. e perciò diceffi questa non esser altro che parte d'vna piramide tonda, della quale la sua intera altezza trouar ci conuiene; il che a voler fare, farai così, troua prima la differenza che è da $2\frac{1}{2}$. diametro della sommità infino a 3. diametro della base; la qual differenza è $\frac{1}{2}$. per il che cos arguirai, se $\frac{1}{2}$. di differenza de' diametri mi dà 18. d'altezza, che mi darà tutta la base che è 3 multiplica 3. via 18. fa 56. il qual parti per $\frac{1}{2}$. ne viene 112. per l'intera altezza di d. piramide, adunque l'altezza dell'aggiunta è $93\frac{1}{2}$. Hor se ben consideri, tu hai due piramidi, che l'altezza dell'intera è 112. & in diametro della sua base è 3. è l'altezza della trouata, o vero aggiunta, e braccia $93\frac{1}{2}$. & il diametro della sua base è $2\frac{1}{2}$. che è vguale al diametro della sommità di detta colonna, hor trouerai la quantità d'ambidue le dette piramidi, come nelle passate s'è dimostrato, e trarrai la quantità della trouata, e minor piramide, che è 152. in circa, della quantità della maggiore, che è 264. & il resto che è 111. farà l'area corporale de $\frac{2}{3}$. dell'altezza di tutta la colonna, cioè di quella che ci restò a misurare, e se l'aggiungeremo con braccia 66. quadre corporee, che fu la terza parte dell'altezza di detta colonna, faranno 177. & tante braccia quadre conuiene esser tutta l'intera colonna.




20 Sono due Torri in yn piano, che l'altezza A.B. della maggior torre è braccia

e l'altezza dell'altra C.D. è brac. 80. e dall'vna torre all'altra, che è la linea B.D. è brac. 100. & infra queste due Torri v'è vna fonte in tal luogo, il qual pontamo sia il punto F. che mouendosi in vn medesimo tempo due colombi, vno per cima di ciascuna torre, e volando di pari volo, giungono alla fonte in vn istesso tempo, si domanda quante braecia la fonte era presso a ciascuna torre. La proposia conclude, che ciascun colombo faccia dalla cima della torre, della qual si parte, fino alla fonte, transito vguale, ancorche vna sia piu alta dell'altra, & il transito A.F. bisogna che sia vguale al transito C.F. la qual cosa se ben consideri, altrouen è che due triangoli ortogoni, de'quali i lati loro opposti a gl'angoli retti sono fra loro vguali, si come il triangolo ortogonio A.B.F. & il triangolo C.D.F. de'quali habbiamo solo notitia della lor perpendicolare, che del triangolo A.B.F. la sua perpendicolare è 90. e del triangolo C.D.F. la perpendicolare è 80. e le lor base non sappiamo quante sieno, ma sappiamo bene, che fra ambedue le base sono brac. 100. cioè la distanza da vna torre all'altra. E perche Euclide, dice, che la congiunzione de'quadrati de' due lati, che concorrono a far l'angolo retto, è vguale al quadrato del lato opposto all'angolo retto, e così per il contrario, onde ne iegue, che di 100. bisogna far due tal parti, che il quadrato della maggior parte aggiunto al quadrato della sua perpendicolare C.D. ch'è 6400. faccia tanto, quanto aggiungere il quadrato della minor parte al quadrato della sua perpend. A.B. che è 8100. E volendo trouar questo, farai così, multipl. in se la perpendicolare C.D. che è 80. fa 6400. dipoi multipl. in se la perpendicolare A.B. ch'è 90. fa 8100. del qual cauane 6400. resta 1700. & a questo aggiungi il quadrato di 100. cioè della distanza D.B. che il suo quadrato è 10000. farà in tutto 11700. qual parti per il doppio di 100. cioè di d. distanza, ne vien $58\frac{1}{2}$. e tante brac. diremo che la fonte sia lontana dalla minor torre, e l'auanzo fino in 100. che v'è $41\frac{1}{2}$. sarà lontana la fonte dalla torre maggiore, e per prouare, che tanto transito sia C.F. quanto A.F. fa così, al quadrato di 80. aggiungi il quadrato di $58\frac{1}{2}$. fanno giunti insieme 9822. e la rad. di 9822. farà il transito C.F. di poi al quadrato di 90. aggiungi il quadrato di $41\frac{1}{2}$. faranno giunti insieme 9822. e la rad. di 9822. farà il transito A.F. e sono questi due transiti fra loro vguali.



21 Vno ha tre palle di cera, che vna volta intorno 2. braccia, e l'altra 3. e l'altra 6. si domanda volendo far di queste tre palle vna sol palla, quante voltate intorno. Fà così, multipl. in se medesimo la circonferenza di ciascuna, cioè 2. via 2. fa 4. e 3. via 3. fa 9. e 6. via 6. fa 36. e tutti questi prodotti aggiungili insieme, fanno 49. del quale pigliane la radice ch'è 7. e 7. braccia girerà intorno quella sol palla, fatta di tutte tre le sopradette &c.



Lasciando vn poco da parte queste piaceuolezze, le quali son considerate più dalla teorica, che dalla pratica, e tornando alla pratica, della quale intendiamo trattare, dimostreremo al presente, come si misurino le muraglie, i palchi, i legnami, & altre cose, che giornalmente accadono.

Sappi, che i palchi, i Tetti, gli scialbi, & i legnami si misurano superficialmente come le terre; i quali lauori si pagano a tanto la canna, secondo l'vsanze de' paesi, ouero secondo le conuentioni fatte, tra l'artefice, & il padrone, che fa fabbricare; ma delle muraglie si misura la lunghezza, l'altezza, e la grossezza, quando sono muraglie grosse, e così si vengono a ridurre a canne quadre corporee, e pagansi similmente secondo l'vsanza, o conuentioni, come di sopra.

E delle muraglie sottili, che son grosse men d'un braccio, si misura la lor superficie, e delle volte murate la lor superficie di sopra, ancorche dai muratori, si misurino di sotto, per hauer maggior arco.

E delle pietre conce si misura la lor superficie, e de' dauanzali la lor lunghezza, e simili altre cose, le quali mediante i nostri documenti potrai misurare le superficie, e corpi.

22 Ed dicendo egli è vn muro lungo braccia 18. alto braccia 6. e grosso braccia 4. si domanda quante canne è.

Fà così, multiplica la lunghezza via l'altezza, cioè 18. via 6. fa 108. e questo multiplica via la grossezza del muro, che è 4. fa 432. e tante braccia quadre corporee è il detto muro, delle quali volendone far canne, & essendo la canna lunga braccia 4. diccsi che vn muro il qual sia lungo vna canna, cioè 4. braccia, e alto 4. braccia, e grosso vn braccio, il detto muro farà 16. braccia quadre corporee, il quale vien ad esser vna canna apunto, si che nota bene, che vna canna quadra di muro è 16. braccia. Parti adunque 432. per 16. ne vien 27. & auanza 0. così diremo, che il detto muro farà 27. canne, e 0. braccia, le quali poi si valutarono a tante lire la canna, quante son d'accordo.

E quando

Quando in dette muraglie fossero porte, finestre, e certi altri vani, si misura ogni cosa a vn corso, come se fusse tutto muro.

23 Vno ha dato commissione ad vn Muratore, che gli faccia vn muro lungo braccia 20. & alto braccia 16. e grosso vn braccio, con patto di pagarlo a ragione di lir. 8. la canna.

Il muratore ha fatto il muro grosso $\frac{1}{2}$. d'vn braccio, si domanda quante canne sarà il d. muro, e quante lire douerà hauere. Fa così, multiplica la lunghezza del muro, via l'altezza, cioè 20. via 16. fa 320. e se il muro fusse stato grosso vn braccio sarebbe 320. braccia quadre corporee, ma perche è grosso $\frac{1}{2}$. perciò tu vedi, che ci manca la quarta parte d'l muro, di quel che restorono d'accordo, che si fabbricasse, per il che cauane il quarto, in questo modo, piglia il $\frac{1}{4}$. di 320. che è 80. il qual tratto di 320. resta 240. braccia quadre corporee. Ancora se tu multiplichi la lunghezza via l'altezza, e via la grossezza, ti verrà il medesimo; hor di queste braccia 240. ne farai canne a 16. braccia per canna, faranno canne 15. le quali a lire 8. la canna, montano lire 120.

24 Egli è vn muro fatto a scarpa, cioè che le sue due teste sono come due triangoli ortogoni, & vguale, il qual muro è lungo braccia 15. alto perpendicolarmente braccia 12. e grosso nel fondamento braccia $2\frac{1}{2}$. si domanda quante canne è. Perche i muri fatti a scarpa hanno le lor teste come vn triangolo ortogonico, perciò piglia la metà dell'altezza, come perpendicolare, ouero la metà della grossezza del fondamento, come base, e multiplica la metà dell'altezza, via la grossezza del fondamento, ouero la metà di tal grossezza via tutta l'altezza; hor piglia la metà di 12. che è 6. il qual multiplica via $2\frac{1}{2}$. fa $16\frac{1}{2}$. e tanto farà la superficie di dette teste di muro, multiplica poi questa superficie, cioè $16\frac{1}{2}$. via la lunghezza del muro, che è 15. farà 247. $\frac{1}{2}$. e tante braccia quadre corporee farà il detto muro. Potessi ancora multiplicare la grossezza via l'altezza, & il prodotto multiplicare via la lunghezza, e del prodotto pigliarne la metà: multiplica adunque $2\frac{1}{2}$. via 12. fa 33. e questo multiplica via 15. fa 495. e di questo prendi la metà, che è 247. $\frac{1}{2}$. come di sopra, e tante braccia quadre farà il detto muro.

25 Egli è vn muro lungo braccia 40. alto braccia 36. & è di tre diuerse grossezze, in questo modo, cioè, che dal fondamento fino all'altezza di 12. braccia dou'è il primo palco è grosso braccia $1\frac{1}{2}$. e dal primo palco fino al secondo, che v'è d'altezza 12. braccia, è grosso vn braccio, e dal secondo palco fino alla cima di detto muro, che v'è pur d'altezza 12. braccia, è grosso $\frac{1}{2}$. d'vn braccio, si domanda quante canne è, volendo, che il muro sia vgualeme grosse vn braccio. Fa così, prima tu hai vn muro lungo braccia 40. alto braccia 12. e grosso braccia $1\frac{1}{2}$. multiplica 40. via 12. fa 480. e questo multiplica via $1\frac{1}{2}$. farà 720. e questo salua; dipoi tu hai vn'altro pezzo di muro lungo braccia 40. al o braccia 12. e grosso vn braccio, multiplica 12. via 40. fa 480. il qual multiplica via vno, cioè via la grossezza, che è vn braccio, farà pure 480. e quest' salua, diroi, tu hai vn'altro pezzo di muro lungo braccia 40. alto braccia 12. e grosso $\frac{1}{2}$ d'vn braccio; multipl. 40. via 12. fa 480. e questo multipl. via $\frac{1}{2}$. che è grosso, farà 240. hor aggiungi 720. con 480. e con 240. faranno 1440. e tante braccia quadre corporee farà il d. muro, e perche ogni 16. braccia quadre fanno vna canna, perciò parti 1440. per 16. ne vien 97. $\frac{1}{2}$. e tante canne diremo, che sia d. muro.

26 Vno vuol fare vn muro di mattoni lungo braccia 16. alto braccia 9 $\frac{1}{2}$. e grosso

e grosso $\frac{1}{2}$. d'un braccio, si domanda quanti mattoni vi anderà, togliendo mattoni lunghi $\frac{1}{2}$. braccio, larghi $\frac{1}{4}$. e grossi $\frac{1}{2}$.

Fà così, quadra corporalmente il d.muro, multiplicando 16. di lunghezza, via 9 $\frac{1}{2}$. d'altezza, che fa 152. il qual multipl. via $\frac{1}{2}$. ch'è la sua grossezza fa 114. per le braccia quadre corporee di d.muro. Hor per sapere quanti mattoni entrerà in d.muro, prima conuien sapere quanti n'entra in vn braccio quadro, e però multiplica la lunghezza d'un mattonè, ch'è $\frac{1}{2}$. bracc. via la larghezza ch'è $\frac{1}{4}$. fa $\frac{1}{8}$. e così diremo, ch'ogni mattonè sia $\frac{1}{8}$. d'un bracc. di superficie, di maniera che concluderemo, che 8. mattoni faranno vn braccio superficiale, e volendo poi vn br. di grossezza, essendo vn mattonè grosso $\frac{1}{2}$. conuien multiplicare 8. mattoni di superficie via 8. mattoni, che conuien che sia grosso il muro d'un braccio, farà 64. e tanti mattoni, diremo che vadà al braccio quadro corporeo, onde volendo sapere quanti n'entrerà in detto muro, multiplica 64. via 14. farà 7296. e tanti mattoni bisognerà prouedere per detta muraglia.

27 Vno vuole mattonare vn palco d'vna sala; che il suo vano è lungo br. 20. e largo 18. si domanda quanti mattoni ordinati vi anderà. Perche i mattoni, le piuelle, e le mezzane son d'vna medesima lunghezza, e larghezza, però di ciascuna sorte ne v'è 8. al bracc. quadro superficiale, perche volendo sapere quanti mattoni, o mezzane ammattoneranno la d.sala, o palco, fà così, quadra prima superficialmente il vano di tale stanza, e quello di poi multipl. via 8. cioè multipl. 20. lunghezza, via 18. larghezza, fa 360. braccia superficiali, le quali multiplica via 8. fa 2880. e tanti mattoni, o mezzane andarebbe in detta sala.

28 Et hauendo a misurare muraglie tonde, come la muraglia d'vntorione, o d'un pozzo, qual fusse alto bracc. 20. e la grossezza di d.muro fusse vgualeme grossa 2. bracc. & il diametro del suo vano fusse per tutto bracc. 10. e vollessi sapere quante bracc. quadre corporee fusse d.muraglia; fà così, raddoppia 2. bracc. che è la grossezza del muro, fa 4. e questo aggiungi con 10. bracc. ch'è il diametro del suo vano, farà 14. e tante bracc. farà il diametro del muro, con quel del vano di esso pozzo, o Torrione, e l'altezza sua è bracc. 20. laonde dell'operare, come se fusse tutto pieno, multiplicado 14. in se, fa 196. del qual prendine $\frac{1}{2}$, ne viene 154. e tante bracc. quadre la superficie del suo fondamento; hor multiplica 154. via l'altezza, ouero profondità, ch'è 20. farà 3080. e tante braccia quadre corporee farebbe essendo tutto massiccio, ma per esser ci il vano, bisogna quadrare esso vano, multiplicado 10. suo diametro in se, farà 100. del quale prendine $\frac{1}{2}$, ne viene 78 $\frac{1}{2}$. e questo multiplica via 20. ch'è l'altezza di d. muro, farà 1571 $\frac{1}{2}$. per la quantiti del vano, qual trahi di 3080. resterà 1508 $\frac{1}{2}$. per le braccia quadre corporee della muraglia di d. Torrione, o pozzo.

29 Egli è vn pozzo, ouero cisterna rotonda, che il diametro del suo vano è braccia 6. e v'è alta l'acqua braccia 14.


Si domanda quanti barili d'acqua v'è dentro, tenendo ogni braccio quadro 5. barili. Ma in Siena v'è misurare a staja, delle quali ne v'è 12. al braccio quadro.

Fà così




Fà così, multiplica il diametro in se, cioè 6. via 6. fà 36. del quale pigliane $\frac{1}{4}$. ne viene 28 $\frac{3}{4}$. e questo multiplica via l'altezza dell'acqua, che è 14. farà 396. e tante braccia quadre corporee d'acqua vi farà.

E perche habbiamo detto, che ogni braccio quadro tien 5. barili, perciò multiplica 5. via 396. farà 1980. e tanti barili d'acqua farà in detto pozzo, o cisterna.



30 Egli è vna cassa, la qual è lunga br. 5. larga braccia 2 $\frac{1}{2}$. & alta braccia 2 $\frac{1}{2}$. si domanda quante staia di grano tiene, tenendo ogni braccio quadro staia 9. Fà così, multiplica 5. lunghezza via 2 $\frac{1}{2}$. larghezza, farà 12 $\frac{1}{2}$. e questo multiplica via 2 $\frac{1}{2}$. che è alta, farà 28 $\frac{1}{4}$. e tante braccia quadre farà il vano di detta cassa; e perche ogni braccio di d. vano tiene 9. staia perciò multiplica 28 $\frac{1}{4}$. via 9. farà 257 $\frac{1}{4}$. e tante staia di grano capirà in d. cassa.




31 Egli è vn monte di grano in mezzo d'vna sala, ammontato, e raccolto più che si può, che il diametro d'ella circonferenza è brac. 7. e nel mezzo è alto br. 3. si domanda quanto farà il d. grano. Questa proposta altro non ci rappresenta, che vna piramide corta circolare, la cima, ouero punta della quale sia più ottusa, che acuta, e perciò secondo l'ordine delle piramidi non de bisogna soluerla.

Prima troua l'area superficiale del cerchio, multiplicando il diametro in se, cioè 7. via 7. fà 49. e di questo prendine gli $\frac{1}{4}$. ne viene 38 $\frac{1}{2}$. e tanto è la superficie del cerchio, hor multipl. 38 $\frac{1}{2}$. via il terzo dell'altezza di d. mote, il quale è alto 3. brac. & il $\frac{1}{3}$. di d. 3. è 1. multipl. 1. via 38 $\frac{1}{2}$. fà 38 $\frac{1}{2}$. e tante braccia quadre corporee farà il d. monte di grano, e perche ogni braccio quadro contiene in se 9. staia, perciò multiplica 38 $\frac{1}{2}$. via 9. fà 346 $\frac{1}{2}$. e tante staia di grano farà in d. monte &c.

32 E se la proposta hauesse detto, che il monte del grano girasse intorno brac. 22. e fusse alto nel mezzo braccia 3. volendo sapere quante staia di grano fusse in d. monte, douerebbersi far così.

Multiplichisi 22. in se, fà 484. e questo partisi per 12 $\frac{1}{2}$. (qual serua sempre per regola generale in ogn'altra) ne viene 38 $\frac{1}{2}$. e tanto è l'area superficiale del cerchio; multiplichisi poi 38 $\frac{1}{2}$. via il terzo dell'altezza, & il prodotto multipl. via 9. farà 346 $\frac{1}{2}$. &c.



22

Egli

33 Egli è vn monte di grano appoggiato a vn muro, che dall'vn'estremità all'altra di tale appoggiamiento è braccia 7. & è alto nel mezzo di tal'appoggio braccia 3. si domanda quante staia farà in d. monte.

Chi rettamente considererà questa proposta, conoscerà che il muro doue è appoggiato il grano, serue per altrettanto grano, quãto è in quel monte, perciò che tal monte appoggiato a vn muro, vien ad esser la metà d'vn monte nel mezzo d'vna sala; per ilche, ne farai il conto, come se fusse vn monte intero circolare, e di tutta la quantità, ne prenderai la metà, & hauerai l'intento tuo.

34 Egli è vn monte di grano appoggiato in vn canto, ouero angolo d'vna sala, amontato più che si può, che da ciascuna estremità del suo giro al d. angolo v'è braccia $3\frac{1}{2}$. e l'altezza sua 3. br. si domanda quante staia di grano farà in d. monte.

Questo non è altro che la quarta parte d'vn monte circolare in mezzo d'vna sala, e volendo sapere quanto grano vi sarà, raddoppia il semidiametro, cioè $3\frac{1}{2}$. farà 7. multipl. 7. in se, & il prodotto multipl. via $1\frac{1}{2}$. e quel che fa multipl. via il terzo dell'altezza, & il prodotto multipl. via 9. staia, che va al braccio quadro & hauerai, che vn monte circolare, che il suo diametro fusse 7. e l'altezza fusse braccia 3. vi farebbe staia $345\frac{1}{2}$. di grano, e perche il monte, ch'è nel d. canto vien ad esser la quarta parte d'vn monte circolare, perciò prendi il $\frac{1}{4}$. di $346\frac{1}{2}$. ne vien $86\frac{1}{4}$. e tante staia di grano diremo che sia in detto monte.

35 Egli è vn caniccio da seccar castagne, il qual è lungo braccia 6. largo br. $5\frac{1}{2}$. e vi son alte le castagne braccia $1\frac{1}{2}$. si domanda quante staia di castagne vi farà.

Fa così, multiplica 6. lunghezza via $5\frac{1}{2}$. larghezza fa 33. e questo multipl. via $1\frac{1}{2}$. d'altezza, farà $49\frac{1}{2}$. e tante braccia quadre corporee faranno le dd. castagne, e perche ogni braccio quadro tien 9. staia, perciò multipl. br. $49\frac{1}{2}$. via 9. farà $445\frac{1}{2}$. e tante staia di castagne diremo, che sia sul detto caniccio, ma perche ogni 3. staia di castagne fresche seccandole in detti canicci, tornano vno staio di castagne bianche, e nette, e secche, perciò direbbono i montanari al padrone, che delle dd. staia $445\frac{1}{2}$. di castagne, che sono sopra il d. caniccio con la scorza, tornariano staia $148\frac{1}{2}$. di castagne bianche, la qual cosa non è vera, perciò che hauendo messo le castagne sul detto caniccio a poco a poco, cioè vn giorno 4. facca, vn'altro giorno 6. &c. secondo, che più, e meno ne conducono dalle selue, e facendoui fuoco sotto per asciugarle dall'humidità, e per seccarle, come s'vfa, vengono le dd. castagne a restringersi, e calcarsi insieme, di maniera che staia 2. $\frac{1}{2}$. di castagne col cuscio, ouero scorza, asciutte sul caniccio faranno vno staio sicuramente, o più di castagne bianche, e nette, per ilche le staia $445\frac{1}{2}$. se le partirai per $2\frac{1}{2}$. ne verrà 178. e tante staia di castagne bianche diremo, che si trarrà della detta caniccicata.

Ma di ciò non se ne può dar conto sicuro, atteso che secondo la qualità delle castagne calano più, e meno.


36 Egli è vn tino, che per diametro del vano del fondo è braccia 3. & il diametro della bocca è br. $2\frac{1}{2}$. & è alto br. $2\frac{1}{2}$. si domanda quanti barili tiene, & essendo pieno d'vne pigiate quãti barili di vino renderà, rendendo il $\frac{1}{2}$. meno della tenuta.

In diversi modi si può hauer notizia delle tenute d'anni, e delle botti, e prima diremo del modo, che giustamente si douerebbe osservare.

Noi diciamo, che se ben si considera la forma d'vn tino, altro non ci rappresenta che vna parte d'vna piramide ton la, della quale il diametro della sua base è 3. braccia. & è alta br. $2\frac{1}{2}$. si conuien hora inuestigare il resto dell'altezza di d. piramide, in questo modo, cioè, caua $2\frac{1}{2}$. che è il diametro della bocca, di 3. dia-

metro

tro del fondo di effo tino, resta $\frac{1}{2}$. dipoi dirai così, se $\frac{1}{2}$. differenza di diametri mi danno brac. $2\frac{1}{2}$. d'altezza, che mi darà brac. 3. ch'è il diametro del fondo di d. tino multipl. 3. via $2\frac{1}{2}$. fa $7\frac{1}{2}$. e questo parti per $\frac{1}{2}$. ne vien 10. e tanto farebbe alta la d. piramide essendo intra; adunque la piramide trouata, ouero aggiunta sopra la bocca del tino, viene ad esser alta 10. brac. men $2\frac{1}{2}$. che è l'altezza del tino, cioè brac. $7\frac{1}{2}$. Hor tu hai due piramidi, che l'altezza della maggiore è 10. brac. & il diametro della sua base è 3. br. e l'altezza della minore, cioè dell'aggiunta è br. $7\frac{1}{2}$. & il diametro della sua base è br. $2\frac{1}{2}$. cioè la larghezza della bocca del tino. Laonde ridotto che hauera i braccia quadre corporee a imbedue le piramidi, trarrai la quantità della maggiore, e trouarai che la maggior piramide sarà br. $23\frac{1}{2}$. quadre, e la minore sarà br. $9\frac{1}{2}$. che tratto la minore dalla maggiore, resterà br. $13\frac{1}{2}$. & tante braccia cube vien ad essere il vano del d. tino, hor perche ogni brac. quadro tien 5. barili, multipl. 5. via $13\frac{1}{2}$. farà $68\frac{1}{2}$. et tanti barili diremo, che tenga d. tino. Ma essendo pieno d'vne pigiata, e volendo sapere quanti barili di vino renderebbe, cava il $\frac{1}{4}$. di $68\frac{1}{2}$. resterà $45\frac{1}{2}$. e tai barili ne renderà, auuertendo, che rende più vino l'vua de' piani, che l'vua de' poggi, & ancora secondo i temporali rende più vn'anno, che l'altro, e similmente le qualità dell'vuc.



27. Volendo trouare la tenuta del sopradetto tino in vn'altro modo, fa così multipl. il diametro del fondo in se, cioè 3. via 3. fa 9. dipoi multipl. $2\frac{1}{2}$. in se, che è il diametro della bocca, fa $5\frac{1}{4}$. hor troua la superficie mezzana, la qual'è infra 9. e $5\frac{1}{4}$, multipl. $5\frac{1}{4}$. via 9. fa 45. $\frac{1}{4}$. e di questo prendi la radice quadra, che è $6\frac{1}{2}$. e questa sarà la superficie mezzana, dipoi somma insieme $6\frac{1}{2}$. con $5\frac{1}{4}$. e con 9. fanno $20\frac{1}{4}$. e questo multipl. via il terzo dell'altezza di d. tino, il qual'è br. $2\frac{1}{2}$. che il terzo di tal'altezza è $\frac{1}{2}$. hor multipl. $20\frac{1}{4}$. via $\frac{1}{2}$. e del prodotto prendine $\frac{1}{4}$. ne verrà $13\frac{1}{2}$. et tante braccia cube sarà il vano di d. tino, che a 5. barili di tenuta il braccio quadro, terrà barili $68\frac{1}{2}$. come di sopra per il primo operare.

E se si multiplicarà il diametro del fondo, via il diametro della bocca di ciascu tino, farà la proportio mezzana. che si cerca, senza trouarla per la radice quadra.

Vogliamo dimostrare ancora in altro modo a trouare la sopradetta tenuta, il quale è molto più facile, perciòche non accade operare per via di piramide, nè seruirsi di radice quadra, nè meno vi concorre rotti; ma è ben vero, che nò vi è così giusto, nè rēde la tenuta per l'aputo. come nei soprad. modi, ma poco varia.

Hor sia il soprad. tino, con tutte le sopradette misure de' diametri, & altezza.

Somma 3. diametro del fondo, con $2\frac{1}{2}$. diametro della bocca, farà $5\frac{1}{2}$. e di questo prendi la metà, ch'è $2\frac{1}{4}$. la qual metà multiplica in se, e del prodotto prendine $\frac{1}{4}$. farà $5\frac{1}{2}$. e questo deu multiplicare via $2\frac{1}{2}$. che è l'altezza

di d. tino, farà $12\frac{1}{2}\frac{1}{2}$, e tante braccia cube diremo che sia il vano, il qual moltiplica via 5. barili, che tiene il braccio quadro, farà barili $67\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. per la tenuta del sopradetto tino; che poco varia dalla tenuta del primo operare.

Auuerendo l'operante, che quando s'hada moltiplicare più rotti, e sani, e rotti infra di loro, non si deue a ogni due 5. che si moltiplica partire per il suo partitore, ma si deue ridurre tutti i sani a rotti, e poi distenderli, come vna moltiplicatione di rotti, e moltiplicare tutti i denominatori l'vno via l'altro, finche son finiti, e poi moltiplicare i denominatori, per ridurre vna partitione sola, & vn partitore solo, e così facendo haurà più accorto, e facile operare, come facendone proua si potrà certificare.

Ci resta a dimostrare vn modo facilissimo più di tutti gl'altri sopradetti, per misurare i tini, le botti, le pile, & altri vasi da tener olio, & altre cose, nel qual modo d'operare non interuenon rotti, nè radici, nè si prendono gl' $\frac{1}{2}\frac{1}{2}$, nè meno si opera per via di piramidi, o altri trauagli, ma solo si opera, come al presente ci prepariamo a dichiararti, benchè tal'ordine renda qualche variatione.

Sogliono i pratici misuratori di botte, e tini; quella misura, che s'vsa in quella Città, o conado, doue si trouano, diuidere in molte particelle, le quali si chiamano punti, & alcuni hanno diuiso vn braccio in 43. punti, alcuni in 45. altri in 48. & in 60. ma il braccio nostro di Pescia, sopra il quale s'è fatto lo scandaglio per trouare tali tenute s'è diuiso in 43. punti, con i quali si misura le tenute delle botti, e d'altre cose, come leggendo potrai intendere.

38. Egli è vn tino che per diametro del vano del fondo è punti 120. e per diametro della bocca è punti 90. & è alto punti 100. si domanda quanti barili tiene.

Secondo il commun. uso, sarà così. Somma insieme i punti del fondo con i punti della bocca, cioè 120. con 90. fanno 210. della qual somma piglia la metà che è 105. il qual moltipli. in se fa 11025. e questo moltiplica via l'altezza del tino, che è punti 100. farà 1102500. punti, & a questa regola ogni mille punti rendono la tenuta d'vn fiasco, cioè 2. boccali, e 20. fiaschi fanno vn barile, parti adunque 1102500. per 1000. ne viene fiaschi 1102 $\frac{1}{2}$. i quali partendoli per 20. ne viene barili 55. e fiaschi 5. per la tenuta del detto tino. Sappi, che vn fiasco di vino pesa libbre 6. & vn barile pesa al netto libb. 120. apunto.

39. Egli è vna Vasca, ouero canale murato pieno d'vno pigiate, il qual è lungo br. 4. largo 2 $\frac{1}{2}$. e alto 2. si domanda quanto vino rederà, rimouendo per la vna cappa tra il terzo, & il quarto, cioè $\frac{1}{3}\frac{2}{3}$. della tenuta, e $\frac{1}{4}\frac{1}{4}$. della tenuta rendendo il vino. Fa così, moltipli. la lunghezza via la larghezza, & il prodotto moltipli. via l'altezza, e quel che fa moltipli. via $\frac{1}{3}\frac{2}{3}$. e quel che fa moltipli. via 5. perche 5. barili capean vn vano, che per ogni verso sia vn braccio, offeruando il modo del moltiplicare sani, e rotti, trouarai che renderà barili 70 $\frac{1}{2}$. apunto.


40. Egli è vna botte, che il diametro di ciascun fondo del suo vano è brac. 2. & al coeciume il suo vano è alto brac. 2 $\frac{1}{4}$. e la distanza dall'vn fondo all'altro è brac. 2. si domanda quanti barili tiene, tenendo il braccio quadro 5. barili.

Sappi, che vna botte non è altro, che due tini spondati, quali infra loro le baffe si voltano, e congiungono, & è proprio, come quadrare due pani di piramidi tonde, ouero due piramidi corte, e l'area corporale di ciascuna piramide corta, rich dal sommare della superficie mezzana, la qual si troua infra l'area della base, e l'area della terza di d. piramide, con l'area della base, e della testa, cioè sommare il quadrato dei numeri di detti due diametri, e quella somma moltiplicarla via il $\frac{1}{4}$. dell'altezza di d. piramide corta, e del prodotto pigliarne $\frac{1}{4}\frac{1}{4}$. e quel che ne verrà saranno braccia quadre corporee.

Segan-

Segando adunque la detta botte per il cocchiume, fatto due piramidi corte, delle quali il diametro delle lor base è bracc. $2\frac{1}{2}$. & il diametro della lor testa, ouero capo è br. 2. e ciascuna è alta vn braccio. Perciò che il vano da vn fondo all'altro di tutta la botte è br. 2. il qual segando in mezzo, ne viene vn braccio per parte. Troua hora l'area corporale d'vna di dd. piramidi, ma prima troua la superficie mezzana, che è fra la base, e la testa, in questo modo, cioè, multipl. $2\frac{1}{2}$. di base in se, fa $5\frac{1}{4}$. dipoi multipl. 2. diametro della testa in se, fa 4. hor multipl. queste due aree, ouero quadrati l'vno via l'altro, cioè 4. via $5\frac{1}{4}$. farà 20. $\frac{1}{4}$. del qual prédi la rad. che è $4\frac{3}{4}$. e questa è la superfimezzana infra $5\frac{1}{4}$. e 4. se si multipl. il diametro dell'vn fondo, via il diametro della bocca, cioè 2. via $2\frac{1}{2}$. farà $4\frac{1}{2}$. che farà la proportion mezzana.

Fatto questo somma insieme 4. e $5\frac{1}{4}$. e $4\frac{3}{4}$. cioè tutte tre l'aree, faranno 13. $\frac{1}{2}$. questo multipl. via $\frac{1}{2}$ dell'altezza, la qual è vn braccio, del qual pigliandone il terzo, ne viene $\frac{1}{4}$. multipl. adunque 13. $\frac{1}{2}$. via $\frac{1}{4}$. e del prodotto pigliane $\frac{1}{4}$. ne verrà $3\frac{1}{4}$. e tanto farà l'area corporale d'vna di dd. piramidi; per il che fra ambedue essendo vguale faranno il doppio, cioè $7\frac{1}{2}$. e così diremo che la d. botte sia brac. $7\frac{1}{2}$. quadre corporee, e perche ogni braccio quadro tien 5. barili, la d. botte terrà barili 35. e fiaschi $10\frac{1}{2}$. o poco meno.



- Hor soluasi per quest'altro modo più commune, somma insieme il diametro d'vno di due fondi, con l'altezza del mezzo del cocchiume, cioè somma 2. cò $2\frac{1}{2}$. e di questo prendi la metà, che è $2\frac{1}{4}$. il qual multipl. in se, e del prodotto prédi ne viene $3\frac{1}{4}$. e questo multipl. via la distanza, che è da vn fondo all'altro, cioè via 2. farà $7\frac{1}{2}$. e tante braccia quadre farà la d. botte, multipl. per 5. barili, che tiene il braccio quadro; farà barili 35. e fiaschi $9\frac{1}{2}$. o poco più, che chiaramente si vede, osservando il modo comune &c.

41 Egli è vna botte, che il diametro del fondo di dietro è braccia $2\frac{1}{2}$. & il diametro del fondo dinanzi è braccia $2\frac{1}{2}$. e nel mezzo del cocchiume è alta brac. 3. e da vn fondo all'altro è brac. 3. si domanda quanti barili terrà.

Questa la deferisce Francesco Galigai Fiorentino nel 9. lib. della sua Pratica Propositione 50. la quale ha mal sorta, nè possiamo pensare, come vn'huomo tanto perito non habbia conosciuto vn tal'errore, ma certamente da noi si crede che sia stata inauerrenza, e che si sia rapportato a vna proposta simile, che pone Filippo Calandri, come Autore più antico, e veramente buono, ma in questo caso non l'hanno intesa, o non l'hanno considerata.

Il detto

Il detto Francesco Calandri Fiorentino pone, che il diametro del fondo dinanzi di tal botte sia braccia $2\frac{1}{2}$. e nel mezzo del cocchiame sia braccia $2\frac{1}{2}$. & il diametro del fondo di dietro sia br. 2. e dall'vn fondo all'altro sia br. 3. e la risolue, che terrà barili $47\frac{1}{2}$. &c. Nel risolver la tenuta delle sopradette botti, ambidue offeruano il medesim'ordine. Perciò che sommano insieme tutti tre i diametri, cioè il diametro del fondo dinanzi, con quel del fondo di dietro, e co quel del cocchiame, i quali in tutto (quelli della botte del Galigai) fanno 8. e questo partono per 3. per le 2. misure, ne viene $2\frac{2}{3}$. e questo moltiplicano in se, e del prodotto prendono $\frac{1}{3}$. e quel che ne viene lo moltiplicano via la distanza de' fondi, & il prodotto lo moltiplicano via 5. barili, che tiene il braccio quadro & in son ma il Galigai risolue, che la d. botte tiene barili $83\frac{1}{2}$. e Filippo Calandri dice, che la sua tiene barili $47\frac{1}{2}$. auuertendo il lettore, che le misure de' diametri delle botti, che ciascun di loro deserue son differenti, si come habbiamo di sopra detto, ma solo concordano nel modo dell'operare. Sentiamo alcuni, che dicono; Non basta il dire, che la regola da loro usata in risolver le tenute delle sopradette botti non sia buona, ma bisogna dimostrare, che sia cattua, ai quali rispondiamo così, che con le proprie loro armi si vengono a offendere, la qual cosa intendiamo al presente dimostrare, e prima.

La regola, che essi offeruano nel trouar la tenuta d'vn tino (ancorche non sia secondo l'ordine delle piramidi corte) nulladimeno, noi l'approuiamo per buona; e perche vna botte, come poco di sopra s'è detto, nò è altro che due tini sfodati, che hanno volto le basi de' lor fondi l'uno all'altro, perciò segando la detta botte del Galigai nel mezzo del cocchiame si farà due tini, che il diametro del fondo di ciascu no sarà br. 3. & il diametro della bocca d'vno di essi sarà br. $2\frac{1}{2}$. e dell'altro sarà br. $2\frac{1}{2}$. e ciascu no di dd. tini sarà alto br. $1\frac{1}{2}$. Cerca la lor tenuta, secondo l'ordine che si offeruano nelle tenute de' tini, e similmente, che noi habbiamo poco indietro dimostrato; trouarai che il minor tino terrà barili 40. e fiaschi 12. in circa, e l'altro, che sarà il maggiore, terrà barili 48. e fiaschi 14. in circa, che sommato insieme queste due tenute faranno barili 88. e fiaschi 26. Et ciò dice, che terrà barili $83\frac{1}{2}$.

Equella, che deserue il Calandri, dice che tiene barili $47\frac{1}{2}$. e noi trouiamo, che secondo la regola, che esso offerua nella tenuta de' tini tennebbe barili 53. e fiaschi 8. dimanierache con queste ragioni, e con le loro armi, ci pare hauer dimostrato il loro errore, perciò che tanto deuon tenere due mezze botte, quanto vna botte intera, essendo le due mezze yguali all'intera &c.

Volendo trouar la tenuta della sopradetta botte, senza diuiderla in due tini, o in due piramidi corte.

Parai così, somma insieme i diametri de' due fondi, cioè $2\frac{1}{2}$. con $2\frac{1}{2}$. fanno 5. del quale prendi la metà, che è $2\frac{1}{2}$, e questo somma con il diametro del cocchiame, il qual è 3. sarà $5\frac{1}{2}$. e di questo prendi la metà, che è $2\frac{1}{2}$. e questo moltiplica in se, sarà $7\frac{1}{4}$. del qual prendi $\frac{1}{3}$. ne vien $2\frac{2}{3}$. e questo moltiplica via la distanza de' fondi, la qual è 3. & il prodotto sarà 8. braccia quadre corporee, le quali moltiplicarai via 5. perche ogni braccio quadro tien 5. barili, trouarai, che la d. botte terrà barili 89. e fiaschi $\frac{1}{2}$. dimanierache calculandone la tenuta a vñ di due tini, e comparandela con la regola sopradetta, ci dà di differenza fiaschi 23. in circa, e secondo la regola del detto Galigai, ci dà di differenza barili $5\frac{1}{2}$. in circa.

Se de' sopradetti due tini ne procurarai la tenuta, secondo la regola delle piramidi

midi corte, trouarai, che il minore terrà barili 40. e fiaschi $17\frac{1}{2}$. & il maggiore terrà barili 48. e fiaschi $14\frac{1}{2}$. i quali fra anbedue terranno barili 89. e fiaschi $12\frac{1}{2}$.

42 E dicendo, egli è vna botte, che per diametro del fondo dinanzi è punti 84. e per diametro del fondo di dietro è punti 88. e per dianetro del cocchiume è punti 100. e dall'vn fondo all'altro è punti 76. si domanda quanti barili tiene.

Nel misurare delle botti, bisogna hauerci gran consideratione, e pratica; perciò che alcune sono sottili, & alcune grosse di doghe tanto in testa quanto nella circonferenza del corpo, doue si fa il cocchiume, & in ogn'altra parte; alcune poi hanno le doghe grosse in testa, e sottili in tutto il resto del corpo; E perche le doghe delle botti per dentro sono alquanto incauate, e curve, di maniera che mettendo vna riga diritta alla bocca della botte, e dirizzandola fino alla caprugine, ouero incassatura, che fa la detta doga con li fondi, dou'è vn canalino fatto col pialletto; non diciamo che la detta riga toccherà sciancate in due estremi, cioè la bocca della botte, & il d. canalino, ma fra questi 2. estremi la d.riga nò toccherà le doghe per esser incauate, e curve, perche si consuma nel misurare i diametri de' fondi, misurare insieme la metà della grossezza delle doghe, e questo si fa, acciò che venga ragguagliato tal concavità di doghe. E perche molte volte accade, che i fondi delle botti non son tondi, ma sono più alti, che larghi, deriuato dai legnami male stagionati, perciò bisogna, che si misurino i detti fondi per la larghezza, e non per l'altezza, e dirittura de' fondi; perche misurando poi il diametro del cocchiume, si misura a piono, e per tal via si vengono a ragguagliar i diametri.

Noi habbiamo sempre sentito dire, che appresso della scienza è bene hauer la pratica, e questo possiamo dire con verità, poiche hauendone noi tante volte fatta esperienza, e poi misuratosi il vino, che s'è messo, o cauate delle botti, che ne possiamo parlar come per arte; si come affermò il Signor Leonardo l'apiri Canonico di Pescia, al quale noi misurammo vna botte piena di Trèbiano, e secondo la regola da noi osservata, e qui descritta, trouammo che teneua barili 4. e fiaschi $19\frac{1}{2}$.

Et il detto Sig. Canonico videndo disse, & ecc ol fiasco giusto di misura, ci ho messo dentro cento fiaschi di Trèbiano, che son 5. barili apunto.

Hora tornando alla nostra proposta, noi diciamo, che volendo trouare la tenuta della detta botte, conuien sommare insieme anbedue i diametri de' fondi, faranno 172. del qual prendi la metà, che è 86. e questo son na. con cento diametro del cocchiume sarà 186. e di questo ancora pigliarai la metà, che è 93. il qual moltiplica in se, fa 8649. e questo n. moltiplica via la distanza de' fondi, cioè via 76. sarà 657324. e questo partirai per mille, perche mille punti fanno la tenuta d'vn fiasco: ne verrà fiaschi 357. che sono barili 32. e fiaschi 17. per la tenuta delle dette botti.

43 E dicendo, egli è vna botte la qual tiene barili $8\frac{1}{2}$. & ha vna sola cannella in tal luogo, e di tal qualità, che aprendola manda fuori in vn' hora vn. basile di vino, quando la detta canna per a 2. hore a n. andar fuori vn' altro basile, e per cauar il terzo basile, pena 3. hore, e per il quarto pena 4. hore, e così seguitando a tanti barili, tante hore pena a mandarlo fuori, per capire, che quarto più vino esce fuori, tanto più pigra, e tene getta, per il peso del vino, che debilita, si domanda in quant' hore sarà vota la detta botte.

Fa così, tu vedi, che questo è progressione continua, e perche tal progressione comincia

comincia dall'vnità, non vuol dir altro questa proposta, se non questo, cioè, raccogli tutte l'vnità, che sono da 1. per fino a $8\frac{1}{2}$.

Laonde aggiungi 1. sopra $8\frac{1}{2}$. farà $9\frac{1}{2}$. e questo moltiplica via la metà dell'vltimo termine della progressione, cioè via la metà d' $8\frac{1}{2}$. ch'è $4\frac{1}{2}$. farà $40\frac{1}{2}$. & in tante hore dirai, che saranno vsciti barili $8\frac{1}{2}$. di vino, &c. & così puoi da te formare altri bellissimi casi per altre progressioni, come dupla, e tripla 3.

44. Egli è vna botte che tiene barili 40. & ha 40. doghe vguali, si domanda vna botte, che tenga barili 24. di quãte doghe verrà esser alla medesima ragione, cioè che tãto siano lunghe, e larghe le doghe della maggior botte, come della minore.

Fà così, moltiplica 24. barili, cioè la tenuta della minor botte, via la potenza del numero delle doghe della maggior botte, che per esser 40. doghe, la potenza di 40. farà 1600. e questo moltiplica via 24. farà 38400. il qual prodotto parti per 40. barili, che tiene la maggior botte, ne viene 960. del qual prendi la radice, che è quasi 31. e di doghe 21. vorrà esser la botte di 24. barili, conforme alla proposta.

45. E dicendo, egli è vn tino, che il diametro del suo fondo è brac. 4. & il diametro della bocca è braccia 3. & alto braccia 3. e v'è dentro tanto vino, che alza braccia 2. si domanda quanti barili ve n'è.

Fà così, trahi il diametro della bocca, che è 3. del diametro del fondo, che è 4. restarà 1. di poi dirai così, se bracc. 3. altezza di tutto il tino, mi dà di differenza 2. di diametri vn braccio, che differenza mi darà bracc. 2. d'altezza? moltiplica 1. via 1. fa 2. e questo parti per 3. ne vien $\frac{2}{3}$. e questo caualo del diametro del fondo, cioè di 4. resta $3\frac{2}{3}$. e tanto farà il diametro di d.tino all'altezza di due braccia, & in questo modo il tino grande l'hauerai diuiso in due tini, vn pieno, & vn voto, il pieno hauerà per diametro del fondo bracc. 4. e per diametro della bocca bracc. $3\frac{2}{3}$. e sarà alto bracc. 2. & il voto hauerà per diametro del fondo la bocca del pieno, cioè bracc. $3\frac{2}{3}$. e per diametro della bocca sarà bracc. 3. & alto vn braccio, opera, secondo le regole date, trouando le lor tenute, trouarai, che il tino grande, se fusse pieno terrebbe barili 144. e fiaschi $7\frac{1}{2}$. e calculando il vino che v'è dentro, secondo le misure sopradette del tino pieno vi farà barili 105. e fiaschi 12. di vino, e se cercarai la tenuta del resto del tino, cioè di quella parte vota, secondo le sopradette misure, trouarai che in quella parte vota v'entrarebbe barili 39. e fiaschi 7. di vino, che fra il pieno, & il voto terranno barili 145. e doueano tenere barili 144. e fiaschi $7\frac{1}{2}$. per il che ci viene di differenza fiaschi 12. $\frac{1}{2}$. la qual differenza non si puol attribuire a errore notabile; perciò che è impossibile trouare perfettamente la quadratura de' corpi circonferentiali, poiche da nessun Filosofo, fino ad hora, s'è trouata perfettamente la quadratura del circolo.

46. Et hauendo a misurare le botti piene, offerua la medesima regola, come se fussero vote; ma sappi, che bisogna sanarle, & aprirli la bocca, ouero cocchiame, s per trouare il diametro della bocca, come per trouare la distanza da vn fondo all'altro, perciò che volendo trouare tal distanza per di fuori (come alcuni n'insegnano) col misurare la lunghezza di tutta la botte, e di tutta la lunghezza ne cauano la quantità della doga, che auanza fuori del fondo, due volte, e poi ne cauano la grossezza d'vn fondo due volte, la qual grossezza bisogna considerarla, e cauarla a caso, la qual cosa a noi non piace, perche alle volte le doghe de' fondi son grosse, e molte volte son sottili, secondo che vengono fatte dall'arte fice; e perciò volendo trouare tal distanza, studia di trouarla con vna mazzetta souile, in questo modo, cioè.

Fà d'hauere vna mazzetta di legno verde con la scorza, diretta, é sottile, atta a piegarsi quando a te piace, e lunga per metà della dogà della botte, dou'è la bocca, o poco più, e metti d.mazzetta per la bocca della botte, e procura di mādā d.mazza a dirittura della dogà della bocca, la quale vadi a trouare il fondo dinanzi, fino alla capuggine, doue si congiunge con la dogà della bocca, e quando tu senti, che d.mazza tocca il fondo nel sopradetto luogo, allora senza muouerla con l'vnglia del dito grosso della mano, che tiene d.mazza, segna nella scorza di d.mazza la lunghezza, che è dal fondo, fino alla bocca, dipoi nel medesimo modo, troua la distanza, che è dal fondo di dietro fino alla bocca, perche molte volte per inauertenza dell'artefice, la bocca della botte non vien fatta nel mezzo apunto della distanza da vn fondo all'altro.

¶ Nel questo, fà d'hauere apparecchiato il tuo passetto, diuiso in tanti punti secondo l'ordine del paese, e vedi fra ambedue le misure, che segnasti in d.mazza quanti punti sono, ai quali aggiungi ancora la larghezza della bocca, e poi ne calcolarai la tenuta secondo le regole date.

Ma potrebbe alcuno dire, che misurando tal distanza in due volte per la bocca della botte, che tal misura non andrà per linea retta, come si richiede, per esser più alta la bocca, che i fondi, ai quali si risponde, che con la scienza, col giudicio, e con l'esperienza si ragguaglia, & accomoda ogni cosa; E perche noi misureranno in vn giorno 22. botte piene di Trebbiano nel medesimo modo in Bescia, qual trebbiano poi si portò via parte in barili, e parte nelle medesime botte, si trouò, che non vi correua di differenza dalle misure da noi fatte, che vn fiasco, o due il più.

Habbiamo inteso, che in Francia misurano le botte piene con vn certo strumento facile, del quale, non habbiamo hauuto notizia per considerarlo.

¶ Volendo più sicuramente prender la distanza da vn fondo all'altro delle botti essendo piene, saria bene che fussero vn poco sceme, o scemarle almen tanto che potesse forare sottilmente, nella maggior altezza del fondo dinanzi, senza spandersi il vino; dipoi metter nel medesimo foro vna cannuccia, ouer mazza dirittissima, talmente lunga, e sottile, che dirittamente arriui all'altro fondo, dipoi cauarla, e per il medesimo foro con vn poco di fil di ferro arroncino in cima prender la grossezza di d. fondo, e d. grossezza cauarla di tutta la lunghezza della mazza, o cannuccia sopradetta, cioè di tutta quella che si nese nel corpo della botte con la grossezza del fondo dinanzi, e quella tal lunghezza che restarà farà la distanza di fondi, quale misurerai con il passetto, nel modo, che di sopra habbiamo tratta, e questo è il più sicuro modo da prender le distanze di tali fondi, che si possi trouare quando le botte son piene.

46. Le fosse, ouero buche da grano, si costumano farle ouate, ma più larghe nel fondo, che da capo, e più larghe nel mezzo, che in altra parte.

Hor presupposto, che fusse vna buca da grano, che il diametro del vano del fondo sia bracc.4. & il diametro del mezzo sia bracc.6. & il diametro della bocca sia bracc.2. alta br.4. si domanda quante stia e terrebbe, tenendo il bracc. quadro stia 9. Questa è simile a vna botte, della quale sia maggiore il diametro d'vn fondo, che il diametro dell'altro, si come poco di sopra si disse, e perciò secondo la regola, che offeruasti a trouare la tenuta di tal botte, bisogna offeruarla a trouare la tenuta di questa fossa. E se bene in più modi si può trouare detta tenuta niente di meno il migliore, e più giusto è quello delle piramidi corte, ma alquanto più difficile, e tedioso, perche, se ben consideri tal fossa, altro non è che due

fini,

tini sfondati, che fra di loro le bafe si volrano, adunque il diametro del fondo di ciafcun rino farà brac.6. ch'è vguale al diametro del mezzo di tal fossa, e ciafcun di dd. tini farà alto br.2. cioè la metà dell'altrezza di tutta la fossa, quando pur il diametro del mezzo segasse l'altrezza di d. fossa in due parti, & vno d'essi farà per diametro della bocca brac.2. vguale alla bocca della fossa, & il diametro della bocca dell'altro farà brac.4. vguale al diametro del fondo della fossa. Troua hora la tenuta secondo la regola delle piramidi corte, trouatarai, che vno di essi, cioè il minore terrà staia 245 $\frac{1}{2}$, e l'altro maggiore terrà staia 358 $\frac{1}{2}$. che somate insieme queste due tenute faranno staia 603 $\frac{1}{2}$. per l'intera tenuta di tutta d. fossa.

47 Volendo la quadratura delle fornaci da calcina, perche per tutta Toscana s'vfa farle tonde, & vgualmente larghe, però terrai il modo che s'è dimostrato a misurare i pozzi, cioè multipl. il diametro in se, & il prodotto multipl. via $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. e quel che ne viene multiplic. via l'altrezza di tal fornace, e quest'vltimo prodotto faranno brac. quadre, quali multiplicarai via 9. o 10. o quante staia v'è al braccio quadro sicò i paesi, e quell'vltimo prodotto sarà le staia, che terrà d. fornace.


48 Egli è vn viuaiò, ch'è lungo brac.12. largo brac.10. & alto brac.4. & è pieno d'acqua, nel qual cade vna pietra lunga br.3. larga br.3. & alta br.2. si domanda quanti barili d'acqua farà vscir fuori del viuaiò. Noi habbiamo detto, che il viuaiò è pieno, e perciò non per altro s'è posto le misure del viuaiò, se non per mostrare, che la pietra può facilmente entrare nel viuaiò sotto l'acqua, adunque basta trouare l'arca corporale di d. pietra; multipl.3. ch'è lunga, via 3. ch'è larga fa 9. e questo multipl. via 2. ch'è alta fa 18. , braccia solide diremo, che sia la d. pietra, multiplica 18. via 5. fa 90. e 90. barili d'acqua farà vsrire.

49 Egli è vn viuaiò lungo br.8. largo br.6. alto br.6. e v'è alta l'acqua br.4. nel qual cade vna palla di pietra tonda, che il suo diametro è br.3. si domanda quãto alzarà l'acqua in d. viuaiò. Prima si deue trouare l'arca corporale di d. pietra, perche il diametro 3. volte in se, fa 27. e di questo piglia $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. ne vien 14 $\frac{1}{2}$. e tante br. cube farà la d. palla, quali partirai per la superficie dell'acqua, cioè del prodotto della lunghezza, ch'è 8. via la larghezza, ch'è 6. fa 48. parti 14 $\frac{1}{2}$. per 48. ne viene $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. e $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$. d'vn braccio alzarà l'acqua nel viuaiò.

50 Vno ha due sacchi d'istessa altrezza, vno tiene staia 4. e l'altro 9. e li vuol guastare, e del medesimo panno vuol fare vn sacco grande della medesima altrezza, che erano prima, si domanda quante staia terrà il sacco rifatto.

Fà così, aggiungi 9. con 4. fanno 13. e queste salua, di poi multiplica 4. via 9. fa 36. del qual piglia la radice quadra, ch'è 6. raddoppia farà

12. il qual aggiungi con 13. che saluasti farà 25. e 25. staia diremo che terrà il sacco rifatto.



51 Vno ha vn sacco, che tiene staia 36. del quale vuol far 3. sacchi vgnali, si domanda quanto terrà ciascuna. Fa così, perche vuol far 3. sacchi, multipl. 3. in se, fa 9. e questo sarà partitore di 36. cioè della tenuta del sacco grande, parti adūque 36. per 9. ne vien 4. quale multiplicato per 3. fa 12. e tanto terrà ciascun sacco.

52 Vno ha quattro sacchi vgnali, che ciascuno tiene staia 3. si domanda volendone fare vn sacco solo quante staia terrà. Fa così, multipl. 4. sacchi in se, fa 16. e questo multiplica via staia 3. che tiene ciascun sacco, fa 48. e tante staia terranno i quattro sacci aggiunti insieme, cioè il sacco grande.

53 Vno ha quattro sacchi d'vna medesima altezza, ma di diff. rēte tenuta, che vno di essi tiene staia 2. l'altro staia 5. l'altro staia 4. e l'altro 10. e vorrebbe di tutto il panno de' detti quattro sacchi fare vn sacco solo; si domanda quante staia terrà.


Questa proposta la mette Giouanni d'Ortega Spagnolo, propositione 34. e dice che tra tutti quattro i sacchi terranno staia 101. e noi diciamo, che non l'ha intesa, e che tal proposta l'ha mal soluta, si come per le sopradette regole (e da altri Autori addotte) intendiamo prouare, e prima.

Poniamo che vno hauesse solamente due sacchi, de' quali vno tenesse staia 2. e l'altro staia 5. come i sopradetti; e d'ambidue ne volesse fare vn sacco solo; secondo le regole da noi date di sopra, trouarai, che il d. sacco terrebbe staia $13\frac{1}{2}$. hor lasciamo questo da parte, e poniamo che la medesima persona hauesse due altri sacchi simili d'altezza, e che vno di essi tenesse staia 4. e l'altro staia 10. simili ai sopradetti, e che parimente di questi due sacchi ne volesse fare vn sacco solo, trouarai, che terrebbe staia $26\frac{1}{2}$.


Hor noi habbiamo due sacchi grādi, fatti di 4. sacchi, che vno tiene staia $13\frac{1}{2}$. e l'altro staia $26\frac{1}{2}$. e di essi ne vogliamo fare vn sacco solo, si domanda la sua tenuta; opera secondo l'ordine di sopra dato, trouarai terrà staia $77\frac{1}{2}$. in circa; noi diciamo in circa, perche de' numeri fordi non si può dar radice definita, adūque con questa proua si conosce, che la solutione di tal proposta dell' Ortega è falsa.

54 Volendo quadrare vn corpo irregolare, cioè senza regola, come volissimo quadrare vna pietra di strauagante struttura, o vna statua di marmo, o di bronzo &c. Fa così, metti la d. statua dentro ad vn viuajo, o vaso, doue sia tant'acqua, che cuopra la d. statua, o sia distesa a giacere, ouero ritta non in porta, e fa vn segno nel muro del viuajo, o sponda del vaso, al piano della superficie dell'acqua; dipoi cauā la statua, e vedi quanto è abbassata l'acqua, e tanto quanto si sarà abbassata riduci a braccia quadre corporee, multiplicando la lunghezza del viuajo via la larghezza, & il prodotto multiplica via l'altezza di quell'acqua, che è scemata, e quel che ne verrà tante braccia quadre corporee dirai sia la d. statua.

55 E dicendo egli è vna pila d'Olio, cioè vn vaso di pietra, di forma quadrilatera, la quale è lunga braccia 4. e larga braccia 3. & alta braccia $2\frac{1}{2}$. ad angoli retti, si domanda quante libbre d'olio alla grossa tiene, tenendo il braccio quadro libbre 50. grosse. Sappi, che vna libbra grossa sono due sfacchi d'olio, la qual pesa libbre 11. & once 3. sottili, & ogni libbra sottile è once 12. Nel misurare qual si uoglia vaso, troua prima la superficie del fondo di dentro, e quella tal superficie multiplica via la sua altezza à pionbo, & hauerai l'area corporeale. Multiplica adunque braccia 4. di lunghezza via braccia 3. di larghezza fa 12. e questo multiplica via braccia $2\frac{1}{2}$. d'altezza, sarà braccia 30. corporee, e perche ogni braccio quadro corporeo tiene libbre 50. grosse, multiplica 30. via 50. fa 1500. e tante libbre d'olio alla grossa diremo che tenga detta pila.



56 Egli è vn vaso murato, ouer pila da tener olio, il quale ha sei facce vuali, i lati della quale nel fondo, & in bocca ancora sono vuali, e ciascū lato è bracc. 4. e la sua altezza del vano è bracc. 5. si domanda quante libbre d'olio alla grossa tiene. Fa così, troua la superficie del fondo, secondo la regola breue dell' effa- gono, multipl. 4. in se, fa 16. e questo multipl. generalmente per $2\frac{1}{2}$. fa $41\frac{1}{2}$. e a ne braccia quadre farà la superficie del fondo, multiplica $41\frac{1}{2}$. via 5. che è l' altezza di tal vaso, farà 208. bracc. quadre corporee, e dipoi multiplica 208. via 50. farà 10400. e tante libbre d'olio alla grossa terrà.



57 Perche in molte parti di Toscana, e fuori ancora, si costuma fabbricare certi vasi quadri fatti di 6. tauole di pietra, quali pietre vengono della miniera di Genova, & essi vasi si chiamano poi pile, ouero pozzi da olio, dentro ai quali vasi si conserua l'olio, & anco il grano, e perche il misurar dette pile a braccia, anchor che il braccio sia diuiso in 12. once, ouero in 20. soldi, in ogni modo volendoli misurare minutamente, è forza pigliar parte d'oncia, o di soldo, per il che ne peruiene il fastidioso operare de' rotti. Laonde per tor via tal difficoltà, con grandissima nostra fatica habbiamo ritrovato il modo di misurare dette pile a punti, con quei medesimi punti, che si misurano le tenute delle botti, acciò che quelli, che non hanno pratica delle ragioni de' rotti, possino sicuramente partecipare di questa pratica. Sappi, che 1590. punti quadri sono la tenuta d'vna libbra grossa, e per certificarti, che questa sia la verità, repli chiamo la prima pila di sopra posta la qual è lunga bracc. 4. che a 43. punti per bracc. farà lunga punti 172. & è larga bracc. 3. cioè punti 129. & è alta bracc. $2\frac{1}{2}$. cioè punti 107 $\frac{1}{2}$.

Hor volendo trouar la sua tenuta per via de' punti, fa così, multiplica 172. via 129. farà 22188. e questo multiplica via $107\frac{1}{2}$. farà 2385210. il qual bisogna partire per 1590. ne viene $1500\frac{2}{3}$. e tante libbre d'olio alla grossa tiene &c.

E volendo ancor sapere quante staia di grano tiene; Sappi, che tanto vano occupa staia 9. di grano, quanto 50. libb. d'olio alla grossa, perciò per regola del tre dirai, se il vano che tiene 50. libbre d'olios'empirebbe con 9. staia di grano il vano di libb. 1500. d'olio, da quante staia sarà ripieno? Multipl. 1509. via 9. & il prodotto parti per 50. ne viene 270. e tante staia terrà la d. pila, o vaso.

58 E se accadeffe misurare vn vaso tondo, come vn pozzo, ouero vna botte, e volemmo sapere quante libbre d'olio alla grossa teneffe, volendoci seruire delle misure de' punti, come per essemplio.

Egli è vn vaso tondo, come vn pezzo, che il diametro del fondo, del mezzo, & in bocca, è ugualmente punti 140. & è alto punti 100. si domanda quante libb. grosse tiene. Fa così, multipl. il diametro in se, cioè 140. via 180. farà 19600. e questo multipl. via 100. farà 1960000. il qual parti per 100. ne vien 5960. e questo parti per 20. ne viene 98. e tanti barili di vino terrebbe d'vaso, ma perche noi desideriamo sapere quant'olio tiene, perciò dirai così, se il vano di 5. barili s'empie con 50. lib. grosse d'olio, il vano di 98. barili, da quante libb. d'olio s'empierà? perciò che tanto vano occupa 5. barili di vino, quanto 50. libb. d'olio; multipl. 98. via 50. fa 4900. il qual parti per 5. ne viene 980. e tante libb. d'olio terrà d. vaso, e con il medesim ordine trouarai la tenuta d'vna botte, o d'altri vasi tondi.


Egli è vna Torre alta br. 40. e da piè vi passa vn fiume, il qual non sò quante braccia sia largo, n'a sò bene, che tirando vna corda dalla cima della torre fino all'altra riuua rincentito alla torre, è lunga la detta fune braccia 50. si domanda quante braccia è largo il fiume.

Questa se ben consideri altro non è, che vn triangolo ortogonio A.B.C. che il lato A.B. è 40. il qual viene ad esser l'altezza della torre, & il lato B.C. ch'è la larghezza del fiume a noi ignoto, & il lato A.C. ch'è 50. viene ad esser la lunghezza della fune.

Sia adunque l'angolo B. retto. Noi habbiamo, che quel quadretto, che si fa del lato opposto all'angolo retto, è uguale ai due quadrati, che si fanno degli altri due lati, che concorrono a far l'angolo retto, adunque il quadrato del lato A.C. puole quanto il quadrato del lato C.B. e del lato A. B. Multiplichisi adunque A.C. in se, cioè 50. farà 2500. multiplichisi di poi A.B. che è 40. in se, farà 1600. cauasi di 2500. resta 900. per il quadrato di C.B. piglisi la radice di 900. qual'è 30. e tante brac. farà largo il fiume.

Cò la notizia dell'altezza della torre, e la larghezza del fiume potremo inuenire la lunghezza della fune, e con la notizia della fune, e del fiume potremo ancora trouare l'altezza della torre.

60 Vn viandante a piedi caminando giunse alla Riuua d'vn fiume, il qual'era largo br. 30. e non v'era nè ponte, nè barca da poterlo passare, laonde stando a osservare se vedea con l'arue qualche barca, venne vn grandissimo vento, il qual ruppe vn'albero, che era su la riuua del fiume a lui



uicio, il qual'albero era alto br.50. e lo ruppe in tal parte, che stando attaccato il tronco rotto al tronco ritto, la cima di d.albero toccaua apunto l'altra riuu del fiume, e così fece ponte al viandante, per il qual passò all'altra riuu, si domanda quante braccia se ne ruppe, e quante ne rimase ritto di d.albero. Fa così, moltiplica l'altezza dell'albero in se, fa 2500. dipoi moltiplica la larghezza del fiume in se, fa 900. il quale aggiungi con 2500. farà 3400. il qual salua, dipoi raddoppia l'altezza dell'albero, farà 100. e per questo 100. parti 3400. ne vien 34. per la parte dell'albero, che si ruppe, adunque qualche rimase in piedi fu braccia 16.

61 Vn Contadino taglia vn'albero, ch'è alto br.40. e dà sì gran colpi, che ogni colpo, che dà fa piegare la cima dell'albero verso la terra vn braccio, si domanda in quanti colpi lo farà cadere. E' cosa manifesta, che la via, che fa la cima dell'albero nel cadere se fusse visibile, si vederebbe fare vn'arco, e potendo la d.cima tagliar la terra, e foggirando ritornare al primo luogo, farebbe vn tondo, del quale l'arco che fa la cima nel cadere viene ad esser la quarta parte di detto tondo, per il che dirai così.

Egli è vn tondo, che il mezzo diametro è 40. brac. si domanda quanto girarà intorno: Raddoppia 40. farà 80. il qual moltiplica via $3\frac{1}{2}$. farà 251 $\frac{1}{2}$. e tante braccia girerebbe intorno il circolo che farebbe la cima, se potesse ritornare al suo luogo; ma perche l'arco, che fa nel cadere è solo la quarta parte, perciò piglia il quarto di 251 $\frac{1}{2}$. ne viene 62 $\frac{1}{2}$. & in tanti colpi lo porrà in terra.

62 Egli è vna colonna, della quale n'è fitto sotto terra il $\frac{1}{4}$. & il $\frac{3}{4}$. di tutta la sua altezza è sopra la terra, n'apparisce 6. brac. si domanda quant'è lunga tutta la colonna. Fa così, poni che la colonna fusse lunga br.12. della qual lunghezza pigliane il $\frac{1}{4}$. & il $\frac{3}{4}$. che son 7. e questo caualo di 12. resta 5. adunque, se la colonna fusse lunga br.12. come si propose, ne farebbe sottoterra br.7. e fuori della terra n'apparirebbe br.5. per il che dirai così, se br.5. mi restano fuor della terra, da br.12. ch'io n'apposi che fusse lunga, le 6. brac. che veramente auanzano sopra la terra, da che lunghezza verranno? multipl.6. via 12. fa 72. il qual parti per 5. ne vien 14 $\frac{2}{5}$. e tante braccia dirai, che fusse lunga la detta colonna.

63 Braccia 3. di corda legano vn fascio di 60. bastoni, domando quanti bastoni simili faranno legati da vna corda di 6. braccia. Fa così, multipl. 3. in se, fa 9. dipoi multipl.6. in se, fa 36. Fatto questo dirai, se 9. legano 60. bastoni, quanti ne legaranno 36? multipl.36. via 60. fa 2160. il qual parti per 9. ne viene 240. e così diremo, che 240. bastoni si legaranno con le 6. braccia di corda &c.

64 E dicendo braccia 3. di corda legano 60. bastoni, si domanda 240. bastoni simili da quante braccia faranno legati.

Fa così, multipl.3. in se, fa 9. dipoi dirai, se 60. bastoni son legati da 9. da quante braccia faranno legati 240? multipl.240. via 9. fa 2160. e questo parti per 60. ne vien 36. del qual prendi la radice ch'è 6. e br.6. di corda legaranno 240. bastoni.

65 Vno vuol fare vn mantello alto brac.2. si domanda quante braccia di panno v'entrarà, il qual panno è largo braccia 1 $\frac{1}{2}$.

Chiara cosa è, che stendendo il mantello in terra farebbe vn tondo, che il suo diametro farebbe due tanti dell'altezza del mantello, adunque il diametro di tal tondo farebbe 4. braccia, si domanda quanto è quadro, moltiplica 4. in se, fa 16. del qual prendi $\frac{1}{4}$. ne vien 4. e tante braccia di panno largo vn braccio entrerebbe nel detto mantello; e perche dice, che il panno è largo br.1 $\frac{1}{2}$. parti adunque 12 $\frac{1}{2}$. per 1 $\frac{1}{2}$. ne vien 8 $\frac{1}{2}$. e tante br. di panno faranno vn mantello alto br.2.


66 Vn giouine vuol fare vn mantello, e troua vn fatto, e gli domanda quante braccia

braccia di panno largo br. $1\frac{1}{2}$. andará a fare vn mantello della tal lunghezza.

Il Sarto gli risponde, e dice, che 9. braccia di panno largo br. $1\frac{1}{2}$. gli faranno il mantello della lunghezza, ch'egli domanda; quel giouine andò a vn fondaco per leuare il panno, e non ne trouò di tal larghezza, ma il più largo, ch'è trouò fu di brac. $1\frac{1}{2}$. si domanda quante braccia gli conuerrà pigliarne, acciò che il mantello sia della medesima lunghezza.

Fà così, multiplica $1\frac{1}{2}$. via 9. fà 15. e questo parti per $1\frac{1}{2}$. ne vien 10. e tante braccia di panno, largo br. $1\frac{1}{2}$. gli conuerrà pigliare per fare il mantello.

67 Egli è vn padiglione da campo, come il segnato A.B.C.D. che l'albero A.C. che lo regge è alto brac. 8. e dalla cima dell'albero A. fino alla circonferenza B. ouero C. di d. padiglione v'è br. 10. si domanda quante brac. di panno è in d. padiglione, che il panno è largo br. $1\frac{1}{2}$. Prima bisogna trouare quante braccia è il diametro d. el piano ouero base di d. padiglione, quando sia teso, e se ben confideri altro non è che vna piramide tonda, la qual sia alta a piombo brac. 8. cioè l'albero, e dalla cima di d. piramide per fino alla circonferenza della base v'è br. 10. hor volendo sapere quanto sia tutto il diametro B.D. farai come se fusse vn triangolo equicrurio, cioè, che il cateto sia br. 8. e gli altri due lati, cioè A.B. & A.D. sono fra loro vguagli, e ciasenno è br. 10. e la base B.D. che viene ad esser il diametro del padiglione, noi non sappiamo quanto sia, ma desideriamo saperlo, perciò multiplichisi A.B. ouero A.D. cioè 10. in se, fà 100. dipoi multiplichisi il cateto A.C. in se, cioè 8. fà 64. che tratto di 100. resta 36. e la radice quadra di 36. ch'è 6. diremo che sia C.D. ouero B.C. cioè il semidiametro della base di d. padiglione, adunque tutto il diametro B.D. farà 12. Trouisi hora quanto sia la circonferenza di d. padiglione, multiplichisi 12. via $3\frac{1}{2}$. farà $37\frac{1}{2}$. del qual predasi la metà, ch'è $18\frac{1}{2}$. e questo multipl. via 10. cioè per l'altezza ch'è dalla circonferenza, fino alla cima di d. padiglione, farà $188\frac{1}{2}$. e tante bracc. quadre di panno diremo, che vi farebbe, se il panno fusse largo vn braccio, ma perche s'è detto, che il panno è largo br. $1\frac{1}{2}$. perciò partasi $188\frac{1}{2}$. per $1\frac{1}{2}$. ne verrà $125\frac{1}{2}$. e tante braccia di panno, largo br. $1\frac{1}{2}$. diremo che sia nel d. padiglione.



Il fine del Sesto Libro.

K k 2

LIBRO

L I B R O S E T T I M O




PERCHE molte volte accade al pratico misuratore liuellare acque per far acquidotti da condurre acque da vn luogo ad vn'altro per far fontane, ouero Mulini, disseccar paludi, o voltar fiumi &c. La onde per non gettar via il tempo, la fatica, e la spesa nel far fossi, e tagliar poggi, e luoghi, e poi non vi fusse la caduta dell'acqua, per ciò bisogna vedere se dal piedè dell'acqua, doue si vuol pigliare, per condurla doue ci piace, v'è quella caduta, che si richiede a fonte, o mulini, o disseccamenti di paludi, e quella caduta, che vi si troua, bisogna (se vuoi far fonte, o disseccamenti) compartirla in tutta la distanza; ma se vuoi far mulini, bisogna conseruare il suo primo piano doue si toglie l'acqua, per fino al piano de' capezzali de' canali, ouero trombe di detti mulini, acciò che venga ad hauer maggior caduta l'acqua, è ben vero, che conuien darli oltre al suo piano, vn poco di caduta, acciò che l'acqua possa caminar con più forza; e quando l'acqua ha poca caduta, per far che canini, bisogna dare al fossato, o all'acquedotto qualche poco di suolta, ma non troppo subbita, perciò che le suolte fanno sgonfiare l'acqua, e va più veloce, che andando diritta.

Hor sia che noi fussimo al piè d'vn monte, doue fusse vn'acqua, che scaturisse fuor di detto monte; la qual volemmo condurre ad vna Villa, lontana 200. càne, &c. Nel quale spatio il terreno in qualche parte fusse più basso, dell' acqua, & in qualche parte fusse più alto, & in qualche parte fusse nel medesimo piano, e volendo superare l'acqua ch'è a piè del monte è più alta, o più bassa, che non è la Villa, doue la vogliamo condurre, prima fa d'hauere il tuo liuello, il qual habbia il piede piano, e commodamente largo, per poterlo posare in terra, e si sottèggarito, il qual sia alto due braccia, cioè che dal regolo, doue passa la linea visuale per fino in terra, la linea del piombo sia due braccia.


Si fabbricano i lielli di più forti, d'alcuni bisogna seruirsene con l'acqua, e d'alcuni con l'archipendolo, e con vn regolo piano, e diritto, sopra il qual regolo sia incassato, ouero incollato due laminette, o tauolette perforate, talmente che li due fori di dette tauolette siano in certa linea, e congiunti vguilmente, col piano di d. regolo, & i detti fori vogliono esser piccoli, che apena il raggio visuale vi possa passare, e quando con l'archipendolo hauerai messo in piano il d. regolo, guardarai per li due fori, o traguardi il punto, che hauerai appostato, o fatto mettere, eretto in qualche canna, o pertica. Ancora con vna squadra perfettamente giusta si può facilmente liuellare qualsiuoglia distanza. Facciassi adunque vna squadra a similitudine dell'infrascripto A.B.C.D.E.F. e sopra la maggior gamba A.B. incollisi le due laminette, o tauolette forate, come per effèmpio le due tauolette S. T. talmente che li due fori siano congiunti vguilmente con il piano della gamba A.B. come di sopra s'è detto del regolo, e quando in cambio di detti fori si facesse alle due tauolette vn poco d'incauo largo poco meno che la larghezza

larghezza del piano, doue sono incollate le dette tauolette, a similitudine di due ponticelli di cetra, ma vogliono esser tali incaui alti dal piano doue sono incollate le tauolette tanto quanto la linea visuale possa passare, e potendo la vista passare per vn spatio largo quasi quanto il piano della squadra, che farà sotto i dd. ponticelli, si potrà più prestamente veder il punto del quale si cerca, se è più alto, o più basso, o di quà, o di là dell' dirittura della gamba A. B. della squadra, di poi bisogna fissare vn ferretto sottile in punto G. e tirare la linea G. H. sottilissima, & equidistate al lato BC della gamba corta della squadra, al qual ferretto, ouero punta di spilla s'attacchi il pioniobo G. K. e farà finita la squadra.



Hauendo noi detto in che modo si deue far la squadra, ci resta a dare il modo di fabbricare il piede, sopra il quale bisogna aggiustare, e mettere in liuello la squadra, ma perche l'esperienza c'insegna a conoscere il vero dal falso, però diciamo, che essendoci trouati a liuellare più volte intorno ai laghi, paludi, e fiumi per il Serenissimo Gran Duca di Toscana, ci siamo seruiti del liuello con l'archipendolo, & altre volte con l'acqua, ma dipoi habbiamo giudicato, che questo nuouo modo da noi descritto sia più comodo, e facile. Facciassi adunque vn piede di legno con il gambo a similitudine del piede, e gambo N. O. il qual gambo sia legato in punto P. e ricongiunto insieme con vn ferro nel mezzo, di manierache la parte N. R. possa girare secondo che ci piace, e la parte P. O. stia ferma, facciassi dipoi vn braccio di legno nella parte del gambo N. P. come nel disegno vedi, e quasi in cima al detto braccio farai passare vna vite di ferro, che foti il detto braccio all'in su, come la vite disegната in punto R. dipoi la maggior gamba della squadra accomoda la, cioè sospendila ad vn ferro, prima fiso, quasi in cima del gambo N. O. il qual ferro stia fermo nel gambo, & il d. ferro auanzi tanto fuori del gambo per fianco, che possa entrare nel foro della maggior gamba della squadra, di manierache possa alzare, & abbassare a similitudine d'vno go di statera, o di bilancia, operando che il maggior peso di d. squadra sia la parte, che deue posare sopra il braccio, doue sarà la vite, come nel presente disegno meglio

potrai cōprendere, e quādo il filo, del perpendicolo G.K. caderà a piombo dirittamente lungo la linea sottilissima G.H. allora diremo che la detta squadra sia giustamente liuellata, e messa in piano: la detta vite adunque seruirà per fare alzare, & abbassare la gamma grande della squadra tanto quanto li piacerà, perciò che s'aggiustarà, e metterassi in piano alla grossezza d'vn pelo prestissi no, e chi non lo crede prouì.



Hor volendo noi liuellare vno spatio terreo di 200. canne, come si propoſe, il qual terreno ſia hor alto, & hor baſſo, a ſimilitudine della Curui line a ABCDEF. poniamo che il punto A. ſia l'acqua a piè d'vn monte, o in vna coſta, & il punto F. ſia la villa, doue la vogliamo condurre, e che infra la d. acqua, e la vil la vi ſia poggia ſolte di qualche valletta, o arbori i quali impediſcono il tranſito viſuale dall'acqua alla Villa, vogliamo certificarci chi ſia più alto, e quanto, o l'a cqua o la Villa. Prima piantifi il liuello al piè dell'acqua, & eſſendo il luogo che vogliamo liuellare ſpatioſo, ſi puol fare i tratti longhi, cioè le poſitioni, ma ſe vi fuſſe impedimento d'arbori, o d'altra coſa, biſogna far le poſitioni, e le vedute più corte.

Poniamo hora che tutto lo ſpatio della curuilinea A.B.C.D.E.F. non ſi poſſa vedere con meno di cinque vedute, e la prima veduta ſia A. B. fac cino piantare vna canna, o vero perſica, lunga 5. o 6. o 7. braccia in punto B. perpendicolarmente, nella quale accomodifi vna carta, o vero qualche altra coſa bianca grande quanto vn' habuo, o poco più, il qual ſegno bianco poſſa in detta canna alzarſi, & abbaffarſi, ſecondo che ci piacerà.

Fatto queſto aggiuſtiſi il liuello che guardi rettamente la canna poſta ſul punto B. & abbaffiſi, o vero alziſi tanto quel ſegno bianco in d. canna, che guardando per li fori delle tauolette della squadra, ſi veda giuſtamente quel ſegno bianco, & aggiuſtato che ſarà, fermiſi il ſegno bianco di maniera che non poſſa mouerſi.

Dipoi miſuriſi dal detto ſegno fino a terra, e poniamo che vi ſia braccia $1\frac{1}{2}$. & il noſtro liuello habbiamo detto che è alto braccia due, cioè dalla line a viſuale ſino a terra.

A lunque il terreno in punto B. ſarà più alto che il terreno del punto A. vn mezzo braccio, e queſto notiſi ſopra vn libretto a ciò preparato, dicendo coſi.

Per la prima poſitione il terreno alzi braccia $\frac{1}{2}$. fatto queſto piantifi il liuello in punto B. e leuiſi via la canna, e pongaſi in punto C. & aggiuſtiſi il liuello alla diſtanza di detta canna, & alziſi, o abbaffiſi tanto il ſegno bianco, che per i fori, o vero tra guardi del liuello ſi veda il detto ſegno.


Dipoi miſuriſi dal detto ſegno bianco fino a terra, e poniamo che vi ſia braccia 3. & il liuello è alto braccia 2. cauſi 2. di 3. reſta 1. adunque il terreno in punto C. è più baſſo che il terreno in punto B. vn braccio, e queſto notiſi ſopra il libretto. Per la ſeconda poſitione ha di caduta braccia 1.

Fatto queſto mettaſi il liuello in punto C. e la canna in punto D. & aggiuſtiſi alla volta di detta canna, e poniamo che la linea viſuale batta in terra, proprio

in


in punto D. ch'è la maggior altezza di tal veduta. Laende notifi nel libretto dicendo. Per la terza positione il terreno alza br.2. perciò che tâto è alto il nostro liuello. Dipoi mettasi il liuello in punto D. & aggiustifi alla volta del segno bianco della canna eretta in punto E. dipoi misurifi dal d. segno fino a terra, e poniamo, che vi sia br.5. & il liuello è alto br.2. causi 2. di 5. resta 3. adunque il terreno del punto E. sarà più basso br.3. che quel del punto D. il qual notifi sopra il libretto, dicendo. Per la quarta positione ha di caduta br.3. Fatto questo mettasi il liuello in punto E. e la canna con il segno bianco mettasi in punto F. dove è la villa, & aggiustifi il liuello nel modo top radetto, dipoi misurifi dal segno bianco fino a terra, e poniamo che vi sia br. $1\frac{1}{2}$. & il liuello è alto br.2. caua $1\frac{1}{2}$. di 2. resta $\frac{1}{2}$. & questo notifi sopra il libretto dicendo. Per la quinta, & vltima positione il terreno alza br. $\frac{1}{2}$. e con questo medesimo ordine si douerebbe procedere in tutte quelle positioni, che accade se farfi.

Hor questo inteso, son. n. in fi tutte l' altezze (che nel libro di sopra detto sono notate, da per se, e tutte le cadute da per se, come per essemplio in queste nostre positioni, la prima alza br. $\frac{1}{2}$. la terza br.2. e la quinta alza br. $\frac{1}{2}$. che in tutto fanno br.3. d' altezza, son. n. in fi hora le cadute, noi habbiamo che per la seconda positione ha di caduta br.1. e per la quarta positione ha di caduta br.3. che sommate insieme fanno 4. perche se conosce, ch'è maggiore la caduta, che la salita, e perciò caua br.3. che alza il terreno in più volte, di br.4. che abbassa il terreno in più volte, resta 1. e così diremo, che il terreno dal punto A. per fino al punto F. ha di caduta vn braccio apunto.



Egli è vna Torre, che fa d'ombra braccia 80. della quale desideriamo sapere l' altezza.

Fa così, piglia vn passetto lungo quanto ti piace, hor poniamo ch'è sia lungo braccia due mettilo retto perpendicolarmente, e nota tutto ad vn tempo l'ombra che fa la torre, e l'ombra che fa il passetto, e misura giustamente l'vna, e l'altra, che l'ombra della torre habbiamo posto di sopra che sia 80. braccia, e l'ombra del passetto poniamo che sia braccia 2. $\frac{1}{2}$. opererai per regola del tre dicendo, se braccia 2. $\frac{1}{2}$. d'ombra son prodotte da braccia due d' altezza del passetto, le braccia 80. d'ombra, da quante braccia d' altezza faranno prodotte? moltiplica 80. via due fa 160. il qual parti per due $\frac{1}{2}$. ne viene 66. $\frac{1}{2}$. e tante braccia diremo che sia alta la Torre.



Come l'altrezza d'una Torre, o d'altra cosa si possa misurare con uno specchio, posto a giacere in terra.

Seruaci per effempio, che l'altrezza, la qual vogliamo misurare sia la torre A.B. Togli vno specchio piano, ouero vna sfera di cristallo, e mettilo a giacere sopra il piano del terreno, il qual poniamo, che sia in punto C. dipoi discostati tanto dallo specchio, che risguardando in esso, ti si rappresenti la cima della torre, o altra cosa da misurarsi, hor poniamo, che tu sia in punto D. misura quanto è discosto lo specchio da te, cioè da' tuoi piedi, stando tu ritto perpendicolarmente, e diciamo, che tu sia discosto 2. braci. dipoi misura con vn'asta, ouer con vn filo, che habbia il piombino attaccato, quanto sia dalla tua vista E. che risguarda nello specchio la cima della torre, per fino in terra, e diciamo che vi sia braci. $2\frac{1}{2}$. dipoi misura quant'è dal piede della torre B.

per fino allo specchio C. e poniamo

che vi sia braci. 50.

laonde per regola

del tre, diciati, se br.

zi di piano, intras-


preso sta me, e lo

specchio, vede br.

$2\frac{1}{2}$ d'altrezza, se

br. 50. che è discosto

sto




sto la torre dallo specchio, quanto vedrà alto? multipl. 50. via $2\frac{1}{2}$. fa 125. il qual parti per 2. ne vien 62 $\frac{1}{2}$. e tanto diremo, che fusse alta la detta torre.

Come le dette altezze si possono misurare con vn'Asta.

Apparecchisi vn'Asta non molto lunga, ma sopra tutto dirittissima diuisa in braccia, & il braccio diuiso in soldi, e denari; si come s'vsa quando si vuol misurare alcuna cosa minutamente. Fatto questo discostati dalla Torre, o altra altezza da misurarsi, quanto ti piace, e rizza la d. asta sul piano, dal quale la proposita Torre si rilieui ad angolo retto, dipoi discostati, o appressati tanto all'asta che ponendo l'occhio in terra, e guardando verso la cima dell'asta, la veduta arrivi ancora dirittamente alla cima della torre, come per essempio; sia la torre A.B. & il piano sopra il quale essa torre è eleuata ad angolo retto, sia B.C. e l'asta ritta sopra il piano, sia D.E. qual poniamo che sia alta br.3. misurisi lo spatio ch'è fra l'occhio, & il piè dell'asta, con l'istesse misure con le quali è diuisa l'asta.


Dicesi, che in quella proportion, che corrisponde l'asta allo spatio, corrisponderà ancora l'altezza della torre, alla distanza del piano intrapreso infra l'occhio e la base di d. Torre; laonde, se l'asta D.E. sarà vguale allo spatio D.C. si potrà dire, che lo spatio terreo B.C. sia ancora vguale all'altezza A.B. ma se lo spatio infra l'occhio, & il piè dell'asta fusse minore dell'asta, chiara cosa farebbe, che l'altezza della torre fusse maggior dello spatio intrapreso fra l'occhio, e la torre.

Ma se lo spatio infra l'occhio, & il piè dell'asta fusse maggiore dell'asta, diceti, che la distanza del piano infra l'occhio, & il piè della torre sarà maggiore, che l'altezza di d. torre, & in quella proportion auanzarà la d. altezza, che lo spatio auanza l'asta. Perilche hauendo noi proposto che l'asta sia alta br. 3. se lo spatio D.C. sarà br. 3. e la linea visuale, che si parte dal punto C. passerà per la cima dell'asta, & arriuarà rettamente alla cima della Torre A. dicesi che tanto sarà il piano B. C. intrapreso infra la torre, e l'occhio, quanto l'altezza A.B. di d. torre.




Poniamo hora, che lo spatio del piano intrapreso infra la base B. della torre, e l'occhio C. sia br.80. e che lo spatio tra l'occhio, e'l piè dell'asta, cioè D.C. sia 4. br. e la linea visuale A.C. che riguarda la cima della torre, segghi l'asta in punto G. misurisi la parte dell'asta G.D. la qual poniamo che sia br.2. e soldi 5. (de' quali ne v'è 5. al braccio) laonde per regola del 3. dirai così, se con br.4. di spatio piano, si vede l'altezza di br.2. e sol.5. le br.80. di piano quant'altezza vedranno? multipl.80. via $2\frac{1}{2}$. fa 180. qual parti per 4. ne vien 45. e tante br. diremo, che sia l'altezza della torre A.B. Per poter meglio deseriuere i numeri dentro alle figure, habbia no diuiso lo spatio D.C. in 4. parti, le quali sono vguale a 20. di quelle del piano B.C.

Ma



Ma se dal piè dell' asta
dell'occhio, cioè lo spatio
D.C. fusse br. 2. e la linea
visuale C.A. segasse l'asta
in punto I. e la parte dell'
asta I.D. fusse br. $2\frac{1}{4}$. e lo
spatio del piano dal piè del
la torre all'occhio fusse br.
80. e noi volessimo sapere l'
altezza della torre A.B. fa-
rai così, per regola del tre,
dicendo, se con bracc. 2. di
spatio di piano si vede vn'
altezza di br. $2\frac{1}{4}$. con le br.
80. di piano, quante brac-
cia d'altezza si vedrà? mul-
tiplica 80. via $2\frac{1}{4}$. si 220.
il qual parti per 2. ne vien
110. e tante braccia diremo
che sia l'altezza della tor-
re A.B. & ogni diuisione
comprende bracc. 10.



Volendo noi con il sopradetto ordine d'vn'asta misurare qualsivoglia altezza, prima si bisogno situarsi in vn piano liuellato con la base di quell' altezza, che vogliamo misurare, dipoi fermar l'occhio in terra, e far portar l'asta perpendicolarmente sopra il detto piano, tanto inanzi, o indietro tra l'occhio, e l'altezza da misurarsi, che la linea visuale passi per la cima dell'asta, e rettamente vada a ferire nella cima di tal'altezza, dipoi conuien misurare lo spatio, che è dal piè dell'asta, fino all'occhio, e così il piano, che s'intraprende fra la base della Torre, e l'occhio, e dipoi operar secondo le regole date.

Se ben noi (per ritrouar l'altezze delle sopradette torri) habbiamo fatto mouer l'occhio, & accostarlo, e discostarlo dal piè dell'asta, & ancora habbiamo fatto segare con la linea visuale l'asta, e non l'habbiamo fatta passare alla cima, tutto s'è fatto per dimostrare la forza delle proportioni, e in quella proportionione, che corrisponde l'asta allo spatio tra essa, e l'occhio, corrisponde ancora l'altezza delle torri alla distanza del piano tra esse torri, e l'occhio, &c.

Vogliamo inuestigare vna lunghezza piana con vna squadra ordinaria.

Poniamo di voler sapere quanto sia lunga la piazza della nobilissima, e fertilissima Terra di Pescia Patria nostra, e sia per esempio, che noi iussimo a piè di detta piazza su la porta di S. Pietro, e noi volemmo sapere quante braccia sia dalla detta porta doue ci trouiamo per fino a piè della porta del cortile del Palazzo di Giustitia, il quale è in capo di detta piazza.

Poniamo che detta lunghezza sia liuellata, e perfettamente piana, la qual piazza sia A. B. & il punto B. sia la porta del cortile, & il punto A. sia la porta di San Pietro doue ci trouiamo: apparecchisi vn'asta alta braccia 3. e diuidasi il braccio in soldi, e denari, la qual'asta habbia vn piede simile a vn luccernero, come vedi l'asta A. C. acciò che possa star ritta perpendicolarmente; piglisi dipoi vna squadra ordinaria, e sia D. C. E. e pongasi con il suo angolo di dentro in cima di detta asta, di maniera che la gamba più lunga C. D. della squadra sia volta verso l'altro termine B. accostisi dipoi l'occhio all'angolo C. della squadra, & alzisi, o abbassisi detta squadra, fino a tanto che per il piano C. D. si veda precisamente il punto B. e come tal punto si veduto bisogna fermar la squadra che non si moua, perciò fare, habbiamo considerato, che sia a proposito di mettere per fianco nel mezzo di detta asta vn bischero da leuti, ma alquanto inaggiore, il qual possa girare dentro ad vn foro che sarà in detta asta, secondo che con la mano ci piacerà voltarlo, dipoi attacchisi vna corda sottile da leuti, o vero vno siago come più gli piace alla gamba C. E. della squadra, e l'altra testa di tal corda s'auolga al detto bischero, e quando haueremo per la gamba C. D. veduto il punto B. volgasi tanto il bischero, che la corda stia tirata, di maniera che la gamba C. D. non possa più abbassarsi come nel seguente disegno puoi vedere.

Fatto questo senza mouere la squadra pongasi l'occhio all'angolo C. riguardisi per il piano C. E. della gamba corta della squadra, e notisi doue la linea visuale bari in terra nel medesimo piano di B. A. la qual poniamo che bari in punto F.


Fatto questo, diceci che in quella proportionione, che corrisponde l'asta retta A. C. allo spatio A. F. corrisponderà ancora la propostaci lunghezza della piazza.

A. B.

A.B. alla quantità di essa asta; Perciò che se l'altezza dell'asta A.C. insieme cō quel che alza di più la grossezza della gamba della squadra posta sopra la d. asta, farà br. 3. cioè soldi 60. e la linea visuale della gamba C.E. batteffe in terra lontano dal piè dell'asta vn mezzo soldo, cioè in punto F. diccsi, che bisogna partire soldi 60. cioè l'altezza A.C. per vn mezzo soldo, ne viene 120. e 120. altezza simili all'A.C. diremo che sia la lunghezza della piazza A.B. adunque se l'asta insieme con quel che alza di più la grossezza della squadra farà brac. 3. la linea AB. farà 360. braccia.

Soluasi per quest'altro modo, essendo diuiso il braccio in soldi, e denari, noi haueremo, che l'asta A.C. alzarà denari 720. e lo spatio A.F. del piè dell'asta, fino a doue batte in terra la linea visuale della gamba C.E. della squadra sarà den. 6. partasi 720. per 6. ne viē 120. e 120. alte simili si dice esser luga la d. piazza A.B.


Non c'è parlo fuor di proposito il formare la sopradetta proposta, doue sia interuenuto che lo spatio A.F. sia stato parte d'vn braccio, anzi parte d'vn soldo; solo per maggiore intelligenza di quelli, che poco fanno, e procurano d'intendere, e sapere assai: Perciò che, si come 6. denari sono $\frac{1}{20}$ di tutta l'altezza A.C. e lad. altezza corrisponde per 120. volte allo spatio A.F. così la d. lunghezza, corrisponderà per 120. altezze d'asta, che sono brac. 360.



Come senz'alcuna squadra, ma solo con due aste si possa ritrouare la sopradetta lunghezza.

PROpongasi la sopradetta lunghezza A.B. della piazza di Pescia; diccsi, che senza che ci partiamo dalla Porta di S. Pietro, doue ci trouiamo in punto A. e senza alcuna squadra, ma solo con due aste, vogliamo inuestigare quante braccia sia dalla d. porta, per fino alla porta del cortile del palazzo di giustitia; la qual porta poniamo, che sia il puto B. apparecchiasi due aste d'vgnale altezza, che ciascuna sia alta brac. 3. presupponendo, che la lunghezza A.B. sia liuellata, e perfettamente piana; mettasi perpendicolarmente vna di dette aste in punto A. sul piano della porta di S. Pietro, doue ci trouiamo, la qual asta sia diuisa in quante parti ci piace; hor poniamo, che le braccia di d. asta sieno diuise in soldi, e denari, e l'asta ritta sia A.C. fatto questo tiriamoci a dietro lontano dalla detta asta per spatio di 5. braccia, e pongasi perpendicolarmente l'altra asta D.E. la quale sia situata nel medesimo piano dell'orizzonte, e dirittura A.B. si come è situata parimente la prima asta A.C. dipoi, come haueremo accomodato perpendicolarmente in vn medesimo piano le due aste, a dirittura della lunghezza AB. pongasi l'occhio in cima dell'asta D.E. e riguardisi il piè della porta del cortile cioè il punto B. che farà l'ultimo termine della lunghezza della piazza, e doue la linea

linea visuale interseccherà l'asta A. C. facci si notare minutamente, la quale intersezione poniamo che sia il punto F. dipoi considerisi quanti soldi, o denari sia dall'intersecatione E. per fino alla cima C. di d'asta, cioè quanto sia F. C. la qual parte poniamo che sia 10. denari, troui si hora 10. denari che parte sono d'un braccio, e perche vn braccio è diuiso in 20. soldi, & vn soldo in 12. denari, perciò diemo che 10. denari sono $\frac{1}{2}$ d'un braccio. multiplichi si hora l'altezza dell'asta D. E. che è braccia 3. via lo spatio, ch'è da vn'asta all'altra, che tale spatio ponemmo, che fusse bracc. 5. multiplichi si adunque 3. via 5. fa 15. il qual partasi per $\frac{1}{2}$ ne viene 30. del qual cauasi lo spatio A. D. ch'è 5. restará 355. e tante braccia diremo che sia la lunghezza della piazza A. B. auuertendo il lettore, che se la prima asta A. C. la ponemmo su la porta di S. Pietro; ci si forza mettere la seconda indietro, cioè in Chiesa; perciò che volendola mettere inanzi, come si doueua, ci conueniua piantarla più bassa del piano A. B. rispetto alli scatinì, che sono dinanzi a d. porta; e perciò nel nostro operare c'è peruenuta la lunghezza B. D. ch'è 360. delle quali detrattono le 5. bracc. che ci tirammo indietro, restano bracc. 355. per la lunghezza di tutta la piazza A. B.




Come si possa ritrouare ogni lunghezza con lo Squadro ordinario da misurar le Terre.

Seruiaci per essempio, che sia vna fortezza lontana da noi, della quale vogliamo sapere la distanza; e poniamo caso, che il punto A. sia vn campo spatiofo, doue ci trouiamo, per il quale possiamo andare inanzi, e indietro a nostro piacimento, & il punto B. sia la fortezza.

Facciati così, apparecchiati quattro mazze, ouero canne ben diritte, che ciascuna sia lunga br. 3. in circa, e con lo squadro formisi vnquadro perfetto, ad angoli retti sopra il piado del campo, & vno de' suoi lati sia congiunto con la lontananza A. B. da qual parte ci piace, o dalla destra, o dalla sinistra in punto A. a similitudine del quadro A. C. E. D. e sopra ciascun angolo piantisi perpendicolarmente vna mazza, ouero canna, dipoi ci discosteremo tanto dall'angolo E. a dirittura della linea A. E. che riguardando il punto B. della fortezza, la linea visuale passi per la canna dell'angolo D. e tutto ad vn temoo senza mouersi si vedino in retta linea le canne A. E. Hor poniamo, che il d. quadro sia per ogni lato br. 30. e poniamo ancora, che dall'angolo E. ci siamo discostati 2. bracc. fino al punto F. doue la linea visuale passando per il punto D. vede rettamente il punto B. della fortezza, per il che si viene a formare il triangolo ortogonio F. A. B. volendo noi hora ritrouare la distanza A. B. multiplichi si A. C. ch'è 30. via tutto A. F. ch'è 22. farà 660. e questo partasi per la differenza, che si trouará infra il lato C. D. del quadro, e di tutto il lato A. F. che tal differenza noi sappiamo ch'è 2. bracc. partasi adunque 660. per 2. ce ne verrà 420. per la lontananza A. B. e questo modo d'operare si puol offeruare tanto in costa, quanto nel piano.

Come




Come si possa fabbricare vn instrumento da misurare la larghezza d'vna cordina di muraglia, o trinciera, alla quale altri non si possa accostare.

Per fare vn instrumento, il quale da' Latini è chiamato baculo, apparecchi si vn regolo quadro, & vguilmente grosso, di legno durissimo, atto a non si torcere, e lungo due braccia almeno, di moderata grossezza, come nel disegno puoi comprendere; diuidasi poi il d. regolo in alcune parti vguali, come più piacerà.

Hor poniamo, che sia diuiso in otto parti, e la lunghezza di tutto il detto regolo sia A.B.

Facciasi dipoi vn'altro regolo, lungo solamente quanto vna delle parti, e che hai diuiso il primo regolo, e sia tanto grosso, che vi si possa fare nel mezzo vna buca quadra, talmente larga, che il regolo A.B. possa passare comodamente per la buca del regolo corto, facendo sempre angoli a squadra, e chiamisi questo regolo corto il trauesale C.D. Ma perche il n. instrumento nel seruirsi a misurare qualsiuoglia larghezza, tenendolo sospeso su le braccia, cioè con le mani, non si potrebbe tener fermo, di maniera che giustamente si potesse mandare i due raggi visuali a scrivere nell'estremità della larghezza della muraglia da misurarsi, perciò habbiamo ordinato, che si faccia vn'asta col suo piede da reggersi ritta, la qual'asta sia alta quanto vn'huomo, simile all'asta G.H. nella cima di d. asta facciasi vn poco d'incavo, tanto quanto facilmente vi si possa posare il regolo A.B. percioche volendolo tenere, e regger tutto con la mano, non si può tenere talmente fermo, che si possa aggiustare la vista con la larghezza da misurarsi, e col trauesale C.D. e così si potrà mettere il trauesale in che parte del regolo ci piacerà, che la detta asta G.H. non ci darà impedimento, e l'esperienza t'insegnerà meglio il modo di adoperarlo.



Se' noi vogliamo con quest' instrumento misurare vna linea posta a giacere nella pianura per il traueso, ouero la larghezza d'vna muraglia, alla quale non ci possiamo


possiamo accostare; faremo così. Sia la propostaci linea, o larghezza E.F. tra uerso d'un piano, alla quale non ci possiamo appressare, rizzisi nel luogo doue noi siamo l'asta G.H. e sopra la d.asta si posi il regolo A.B. in tal modo che dirittamente risguardi verso il mezzo della linea E.F. più che possibil sia, del qual luogo, doue ci trouiamo appostaremo vn punto nel mezzo di d.muraglia, il qual mezzo poniamo che sia il punto O. Fatto questo muouasi il trauersale C.D. e fermisi a qualsiuoglia diuisione del regolo A.B. come per esserupio diremo d'hauerlo fermo alla sesta diuisione, pongasi dipoi l'occhio al punto B. & abbassisi il regolo A.B. verso il puto O. che ponemmo fosse il mezzo della linea E.F. da misurarsi, e senza muouer l'occhio da tal punto, risguardisi tutto a vn tempo l'estremità del trauersale C.D. dimaniera che la linea visuale arriui ad vn tratto secondo i suoi lati corrispondenti B.C.E. e B.D.F. dipoi notisi il luogo, doue siamo stati a tal'operatione, o veduta, eol rizzarui vna bacchetta.

Mouiamoci poi di d.luogo, mouendo ancora il trauersale, e se ci tireremo indietro dalla prima posizione, auuertasi di rizzarsi con la medesima dirittura; e mettere il trauersale più inanzi verso il punto A. sopra la propinqua diuisione; E se dalla prima posizione ci accostassimo per linea retta verso il puto O. appostasi nella muraglia, bisognerà tirare indietro il trauersale verso il punto B. e fermarlo su la settima diuisione, e dipoi piantare l'asta G.H. in tal luogo, che sia sopra la linea retta, qual deriua dalla prima posizione per fino al punto O. dipoi mettasi il regolo A.B. sopra le d.asta, & addirizzisi verso il punto O. e mettasi l'occhio al punto B. risguardando l'estremità del trauersale C.D. e tutto a vn tempo l'estremità della linea E.F. da misurarsi, come si fece nella prima operatione; e fatto questo notisi il punto doue siamo stati con la seconda operatione, o veduta.

Misurisi dipoi lo spatio, che è infra la prima, e seconda posizione, che tanto sarà ancora la propostaci linea, o muraglia E.F. si come per le seguenti figure ciascuno potrà comprendere.

Auvertasi di piantar l'asta, che regge lo strumento in tal luogo, che il d.regolo A.B. risguardi sempre più che possibil sia verso il mezzo di quella linea, che vogliamo misurare, appostandosi vn punto in d.luogo, come di sopra habbiamo narrato, acciò che il trauersale C.D. venga a opporsi come linea parallela a quella da mirarsi, perciò che, se in tale operatione noi ci ponessimo in tal luogo, che fuissimo per fianco alla linea da mirarsi, ancorche si addirizzasse il regolo verso il mezzo di d.linea, in vano ci affaticheremmo, atteso che se ben consideriamo, altra figura non si forma tra l'occhio B. & il trauersale C.D. che vn triangolo equicrurio, del quale la sua base è il trauersale, e gli altri due lati uguali, sono le visuali B.C. e B.D. & il suo catetto viene ad essere la parte del regolo A.B. la qual viene intrapresa fra il punto B. per il che se i razzi visuali B.C.E. e B.D.F. non fossero uguali, in vano ce rearemmo la lunghezza della linea E.F. & i detti razzi visuali non possono esser uguali, se non ci discostiamo dal mezzo di d.linea da misurarsi ad angoli retti, e piantar l'asta che regge lo strumento in tal luogo, che la dirittura del regolo risguardi precisamente nel mezzo di quella linea, o muraglia che vogliamo misurare; la qual dirittura scruue per catetto del triangolo equicrurio B.E.F. del quale la sua base sarà E.F. & i due altri lati uguali saranno li due lati visuali, cioè B.E. e B.F. e così il trauersale C.D. il qual si ferma nel regolo A.B. ad angolo retto, verrà ad opporsi parallela alla linea E.F. da misurarsi, e con quest'ordine troueremo la lunghezza di d.linea; misurisi dipoi dalla prima posizione alla seconda, troueremo che vi sarà br. 32. e così parimente la linea E.F. sarà br. 32. che è &c.

Seconda



Come con una squadra si possa misurare l'altezza d'una cosa eleuata sopra il piano dell'Orizzonte della quale si possa andare alla base.

Fabbrichisi vna squadra più giu sta che possibil sia di legname stagionato, & atto a non si torcere, simile a quella, che habbiamo dimostrato, e descritto per liuellare, e mettere in piano, la quale habbia il perpendicolo del piombino, & il gambo, ouero piede da posarsi sopra la detta squadra. Tolgasi dalla maggior gamba della squadra le laminette, e facciasì vna striatura, ouero canaleto triangolare in d. squadra, e gamba A. B. il qual canaleto sia lungo tanto, quanto è lunga la gamba A. B. della squadra, e d. gamba sia lunga almeno vn braccio, la qual si diuida in quante parti ci piace: hor ordiniamo che sia diuita in 60. parti, le quali domanderemo punti: dipoi facciasì vn regoletto corto, & ad vna testa di d. regoletto intraglasi vna striatura triangolare, di maniera che possi (stando ritto il regoletto) camminare facilmente per quel canaleto fatto nella maggior gamba A. B. della squadra & eleuarsi sopra il piano di d. squadra sempre ad angoli retti: et al regoletto lo chiameremo il perno D. E. qual poniamo che sia lungo & auanzi sopra la squadra $\frac{1}{2}$ bracc. cioè punti 30. simili ai punti della gamba A. B.


Volendo hora con d. strumento misurar l'altezza d'vna cosa apparente sopra vn piano. come per essempio l'altezza della Torre G. F. accomodisi la d. squadra sopra il suo piede, e voltisi la maggior gamba di essa alla dirittura della torre F. G. e metiasì in liuello la d. squadra, come col perpendicolo del piombo potrai ciò fare, e come sia posta in liuello, app. stifi vn punto in d. torre, che sia vno col medesimo piano della squadra, come il punto H. dipoi pongasi l'occhio al punto A. della squadra, e con vna mano mandisi il perno D. E. tanto in àzi, o indietro, che il raggio visuale partendosi dal punto A. passi per l'estremità del perno, cioè per il punto D. e tutto ad vn tempo il medesimo raggio di veduta veda, & arriui precisamente alla cima d. lla torre, che è il punto F. e senza muouer l'occhio, nè meno la squadra, si veda parimente con vn altro raggio di veduta per il piano della gamba maggiore della squadra il punto H. nella torre.

Fatto

Fatto questo notifi sopra qual punto s'è fermato il perno ; cioè quanti punti s'intraprende la l'occhio A. & il perno D.E. hor poniamo che lo spatio A.E. della squadra sia punti 20: misurati dipoi dal piè della torre fino a doue cade il perpendicolo dell'occhio A. cioè tutto lo spatio G.K. qual poniamo che sia 80. br. fatto questo dicaſi coſi per regola del tre: ſe 20. punti di piano, ſono intrapreſi dall'altezza di 20. punti, cioè dal perno D. E. da quant'altezza ſarà intrapreſo tutto il piano A.H. onero G.K. che l'vno, e l'altro è br.80. multiplichiſi 80. via 30. ſà 2400. il qual partiſi per 20. ne viene 120. & a queſto aggiungaſi l'altezza, che è dall'occhio A. per fino in terra (quando lo ſpatio G.K. ſia perfetto piano) ouero al detto 120. aggiungaſi l'altezza, che è dalla baſe G. della torre, fino al punto H. appoſtatofi in d.torre nel mettere in liuello la squadra, la qual'altezza poniamo che ſia br.2. aggiungaſi adunque 2. a 120. ſarà 122.e tante braccia concluderemo, che ſia l'altezza della torre F.G.

E volendo ſapere quanto ſia il raggio viſuale A.F. cioè la linea diametrale, multiplichiſi la linea viſuale liueſſata A.H. in ſe, la qual'è br.80. ſarà 6400. dipoi multipl. l'altezza H.F. della torre in ſe, la qual'è br.120 ſarà 14400. al quale aggiugli 6400. ſarà 20800. di queſto. preſi la propinqua radice quadra, che è 144 $\frac{1}{2}$. vel circa, e tante brac. diremo che ſia la linea diametrale A.F. Aggiungaſi per maggiore intelligenza che il perno D.E. non vuol eſſer tanto groſſo, che quella teſta di detta squadra. anzichè della groſſezza della gamba A.B.

Fà biſogno, che n'auanzi vn poco dall'vna e l'altra bāda di d. perno, per poter vedere, & appoſtare vn punto liueſſato nell'altezza da miſurarſi, il che far nō ſi potrebbe, quando il perno fuſſe groſſo, tātto quanto la gamba della squadra, atreſſo che impedirebbe il raggio viſuale.



Come artificialmente con la sopradetta squadra si possa misurare l'altezza cosa apparente, alla quale non si possa andare, né vedere la base, o fondamento di quella, & in un medesimo tempo inuestigare la distanza, che è dal punto dove ci trouiamo, fino a doue il piano dell'orizzonte interseca tal' altezza, ancorche tal fondamento ci sia occulto. & in un istesso tempo vogliamo ritrouare la linea diagonale, qual è dal luogo, doue ci trouiamo, fino alla sommità dell'altezza apparente.

Sia la proposita cosa apparente la torre F.G. posta in cima d'un monte, & il piano doue ci trouiamo sia K.L. sopra il quale si estolle la gibbosità del monte, e sopra il monte la torre.

Non diciamo di volere inuestigare l'altezza del monte, e della torre separatamente, & vnitamente, come più ci piace, con la d. squadra, cioè da doue còcorre perpendicolarmente in fondo tutta l'altezza della gibbosità del mōte, oò il piano dell'orizzonte, nel quale ci trouiamo, per fino alla cima del mōte, o della torre.

Sia adunque il concorso, che fa la perpendicolare di tutta l'altezza con il piano dell'orizzonte dentro alla gibbosità della terra in punto M. occulto, dimaniera che tutta l'altezza, che terchiamo d'inuestigare venga cominciare dal fondamento M. occulto, e finire in cima del monte in punto G. ouero in punto F. alla cima della torre, quali altezze del mōte, e della torre aggiugendole insieme faranno la perpendicolare F.M. la qual concorre col piano I.K. percioche essendo prostrate con la mente le due linee I.K. & F.G. penetrante la d. gibbosità terrena, concorreriano in punto M. il quale non è apparente per causai di gibbosità.

Pigliasi lo strumento della squadra sopradetta, e mettasi in liuello, doue ci trouiamo nel piano in pūto H. a dirittura della gibbosità T. e della torre F.G. di poi mandisi il perno tanto inanzi, o indietro, che dal punto A. della squadra si veda l'estremità del perno in punto D. e tutto ad vn tempo il medesimo raggio di veduta scuopra precisamente il punto F. in cima della torre.

Fatto questo, notisi sopra qual punto s'è fermato il perno, cioè quanti punti sono della squadra dal punto A. per fino al punto E. del perno, hor poniamo che tale spatio sia punti 15. di poi senza muouer d. strumento, riguardisi dal pūto A. fino al punto G. che è la congiunzione della cima del monte, con la base della torre, e notisi in che parte del perno D.E. passi il raggio visuale A.G. il qual poniamo, che passi sopra 20. punti di d. perno in punto N. cominciando a contare i detti punti dal punto E. ascendendo gradatamente verso il punto D.

Già fatto, notisi sopra vn foglio questo, cioè: Per la prima positione tra il perno, e l'occhio ci viene punti 15. di piano; e per l'altezza del monte T.G. ci viene nel perno punti 20. di poi notisi il luogo, doue s'è fatta la prima positione, il qual luogo deu' essere doue cade il perpendicolo dell'occhio, cioè dal punto A. fino in terra, che sarà in punto H. e quiui piantisi vna bacchetta, o faccisi qualche altro segno. E quando tutto ciò sarà notato, tolgasi via lo strumento, e trasportisi rettamente alquanto inanzi, ouero indietro.

Poniamo hora di ritirarci indietro, e fermarci nel medesimo piano in punto K. a accomodisi il d. strumento liuellato alla medesima dirittura del monte T. e della torre, si come nel prim'operare si fece, e mandisi il perno tanto inanzi verso il punto B. della squadra, che diligentemente guardando dal punto A. la som-

mità del perno D. tutt'ad vn tempo si veda la cima della torre F. e senza muouer lo strumento guardarsi dal punto A. il punto G. ch'è la cima del monte, troueremo, che la linea visuale A. G. segará il perno D.E. in punto N. alla distanza di 2. punti, si come intersecò nella prima positione.

Dipoi guardasi sopra quanti punti della squadra s'è fermato il perno: hor poniamo, che dal punto A. fino al punto E. del perno vi sia 45. punti, ouero diuisioni della squadra. Fatto questo, notifi il luogo della seconda positione il qual sarà doue caderà in terra il piombo dal punto A. in punto K. Misurati poi la distanza, ch'è dal punto H. della prima positione, fino al punto K. della seconda; qual poniamo, che sia br. 200. dipoi notifi sopra il sopradetto foglio, dicendo


Per la seconda positione tra'l punto E. del perno, e l'occhio A. ci viene sopra la squadra punti 45. e per l'altezza del monte T. G. ci viene intersecato nel perno i medesimi 20. punti, che più ne meno in vna medesima operatione non possono essere. Hauendo con diligenza notato tutte le sopradette cose, ci sarà cosa facile a ritrouare tutta l'altezza M.F. del monte, e della torre insieme vnitamente, o separatamente l'vn'altezza dall'altra, come più ci piacerà.

Facciasi così; si caui 15. punti (che restò tra l'occhio e'l perno nella prima positione) di 45. punti, che ci restò nel secondo operare, restará 30. e questo sarà partitore di br. 200. cioè della distanza, che sarà dalla prima alla seconda positione; partasi adunque 200. per 30. ne verrà $6\frac{2}{3}$. e questo multiplichisi via tutta l'altezza del perno D.E. che è punti 30. sarà 200. e tante braccia sarà tutta l'altezza T.F. alla quale aggiungasi l'altezza del nostro strumento, la qual poniamo, che fusse br. 2. sarà br. 202. per tutta l'altezza M.F. Trouisi hora per la medesima regola l'altezza del monte, cioè la linea occulta del piombo C.M. caui 15. punti di 45. come di sopra s'è fatto, restará 30. partasi la distanza K.H. ch'è br. 200. per il sopradetto 30. ne verrà $6\frac{2}{3}$. e questo si multiplichi via punti 20. del perno, che furono intersecati dalla linea A. G. in ambedue le positioni; multiplichisi adunque $6\frac{2}{3}$ via 20. sarà 133 $\frac{1}{3}$. per l'altezza della linea S.G. occulta, alla quale s'aggiunga br. 2. ch'è l'altezza dello strumento, sarà 135 $\frac{1}{3}$. e tante braccia sarà la linea perpendicolare O.M. occulta nella gibbosità del monte.

Cauisi hora 135 $\frac{1}{3}$. di 202. restará 66 $\frac{2}{3}$. per l'altezza della torre C.F.

Volendo noi hora inuestigare quanto sia tutto il piano orizzontale, cioè la linea K.M. ouero la linea visuale S.T. del piano del nostro strumento, la quale è vguale, & equidistante alla linea K.M. Si faccia così, per regola del tre, dicendo, se 30. punti (che sono l'altezza del perno) nella prima positione ci danno di piano sopra la squadra 15. punti; l'altezza T.F. ch'è br. 200. quanto ci darà di piano? multiplichisi 15. via 200. sarà 3000. il qual parti per 30. ne verrà 100. per tutta la linea del piano H.M. ch'è la distanza della prima positione; e volendo sapere quanto sia la distanza K.M. ouero S.T. per la sopradetta regola del tre, dirassi così; se 30. punti d'altezza del perno; nella seconda positione ci danno di piano sopra la squadra punti 45. le br. 200. ch'è l'altezza T.F. quanto ci daranno di piano? multipl. 45. via 200. sarà 9000. il qual parti per 30. ne verrà 300. br. e tanto sarà la linea K.M. ouero S.T. Resta hora a trouare la linea diagonale S.F. in multipl. l'altezza T.F. ch'è br. 200. in se, sarà 40000. dipoi multipl. in se la lunghezza della linea S.T. ch'è br. 300. sarà 90000. e questo si congiunga con 40000. sarà 130000. e di questo si prenda la propinqua radice quadrata, che sarà 360 $\frac{1}{2}$. incirca, e tante braccia diremo che sia la linea diagonale S.F. e tutte queste commensurationi si ritrouano con similitudine di triangoli, e dei lor lati proportionali;

Se in queste misure, doue bisogna operare con due posizioni, è di necessità v fare molta diligenza; perciò che ogni minimo punto, che si lasciasse causerebbe error grandissimo.



Come si faccia il quadrante Igonomonico, strumento commodissimo, per misurare le distanze, l'altezze, e profondità, descritto anco da Cosimo Bartoli.

HAuendo fin qui dimostrato, come cō vna squadra si possino ritrovare le distanze, e l'altezze delle cose apparenzi, niente dimeno il quadrante Igonomonico per queste attioni è instrumento accomodatissimo, e perciò non ci pare cosa inconueniente dir con maggior breuità che sia possibile il modo di farlo.

Se ben da Cosimo Bartoli Accademico Fiorentino è stato descritto molto eccellentemente, dall'opera del quale hauendo noi tratte molte cose più importanti, e necessarie alla Pratica, l'habbiamo accomodate in questa nostra opera, forse più distintamente. Apparechiasi adunque vna lamina d'algun metallo ben piana, e grossa poco più che la costa d'un coltello; ouero piglisi vna tauoletta d'algun legno sodo, e ben secco, grossa almeno quanto il dito grosso della mano, e la d. lamina, o tauoletta riducasi in quadro perfettissimo d'angoli retti, che sia almeno vn braccio per ogni verso, perche quanto più grande sarà il quadro, tanto più nell'operare ci verrà l'operatione giusta.

Si può fare, che la d. lamina, o tauoletta sia per ogni verso vn mezzo braccio, o vn palmo, ma quando fusse così piccola, non si potrebbe diuidere in molte parti distinte, come si richiede.

Si potrebbe ancora il d. strumento fare con 4. regoli di legno ben congiunti insieme, che faccino vn quadro perfetto di 2. o 3. bracc. per ogni lato, il qual ci renderebbe l'operatione molto più giusta, ma farebbe cosa tediosa a trasportarlo da vn luogo ad vn'altro, come accade.

Not

Hor poniamo di voler fare d. strumento in vna tauoletta quadra, e d'angoli retti, qual sia per ogni verso vn braccio. Scelga la faccia più pulita, & in quella s'incollì vna carta ben bacina, commodamente giosta, ma pulita, e spianisi ben e con qualche cosa lascia, acciò non resti rezza, e cresca, dipoi tirisi vna linea da tutti 4. i lati, la qual linea sia lontana dal canto viuo di fuori quanto vna costa di coltello, o poco più, e ciascuna linea sia vgualemente lontana dal canto viuo acciò che formino vn quadro perfetto, e su gli angoli deue queste 4. linee si congiungono insieme, scriuasi A.B.C.D. Posto dipoi vn regolo diritto dal punto A. al punto C. tirisi vna linea diagonale, che sia A.C. quale chiamaremo linea dell'ombra media. Fatto questo a ciascuno de' lati B.C. e C.D. tirisi ancora tre linee parallele, quali vadino a riscontrarsi nella già tirata diagonale A.C. e che insieme con le B.C. e C.D. lascino tre interualli, o spatij talmente proportionati fra loro, che l'vno sia sempre il doppio più largo, che l'altro, & il maggiore spatio, che sarà quel di dentro, nel qual si deue scriuere i numeri, sia largo quanto vn dito grosso, e ciascuna di quelle due linee, che sono propinque alli detti due lati B.C. e C.D. diuidasi in 12. parti vguali, e dall'angolo, ouero punto A. a ciascuna duna delle dette 12. e 12. diuisioni, tirisi le linee diuidenti li tre spatij, ouero interualli a schiancio, e ciascuna di esse 12. parti, dipoi si ridiuida in 5. parti vguali, e da ciascuna di dd. parti nuouamente fatte, tirisi le linee, come l'altre, ma che intraprendino a punto due interualli. & in questo modo facendo, ciascuno de' lati B.C. e C.D. farà diuiso in 60. parti.

Si può ridiuidere ciaschena di dette 60. parti, in altre 5. parti vguali, e tirar le linee dentro all'ultimo interuallo, cioè al più propinquo di B.C. e C.D. tenedo sempre fermo il regolo sul punto A. a ciascuna di dd. diuisioni, e così ciascun lato B.C. e C.D. farà diuiso in 300. parti vguali, quando la grandezza della tauoletta ce lo compotti, e queste ultime diuisioni le chiamaremo minuti, quali seruiranno molto più puntualmente, e sottilmente, di quello farebbe solamente le 12. prime diuisioni.

Dentro il più largo interuallo dell'vno, e dell'altro lato in ciascuna di dette 12. diuisioni, scriuinsi i numeri, cominciando dal B. e dal D. in questo modo 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. talche il 60. tanto nell'vno, quanto nell'altro lato termini con la diagonale in punto E.

Fatto questo, si facci vna riga diritta, vguale, e piana da per tutto, a similitudine de l'A.F. la qual chiamaremo Linda, e sia almeno tanto lunga, quanto è la linea diagonale A.C.


Questa Linda deusi conficcare il centro della sua testa A. sopra l'angolo A. della tauoletta, come nel disegno puoi comprendere, talmente ch'ella si possa mandare in su, & in giù per la faccia dello strumento liberamente.

Ma prima sopra la lunghezza, e dirittura di detta Linda, conficchisi vn ferretto vicino al punto F. il qual sia lungo poco men d'vna spilla, e grosso quanto la cima d'vn puntauolo da fatti, e quella parte di detto ferretto, che riguarda, anzi è vno con la dirittura della linea della fede, vuol esser piana, e non tonda, & vn simil ferreo conuiene che auanzi sopra il centro di essa linda in punto A. il quale farà tutt'vno con quel perno, che si tiene la linda nello strumento, e questi due ferretti, che auanzaranno sopra il piano di essa linda seruiranno per traguardi, ouero mire, liquali deouono esser posti in linea retta, e corrispondere insieme con la linea della fede alla linea diagonale A.C. come dimostrano le lettere G.H. dimodo che la linea della fede A.F. corra col medesimo piano

Ll 3 delle

delle due mire, e vadi giustamente a ciascuna delle già fatte diuisioni, secondo che ci occorrerà, e così haueremo finito di componere il quadrante Gnomonico.

Ma perche la linea Diagonale A. C. diuide in due parti vguali il quadrante, perciò, come di sopra s'è detto, la chiamaremo linea dell'ombra media, & il lato diuiso B. C. lo chiamaremo ombra retta, perciò che ogn'un sì, che l'ombra causate dal sole, e dalle Torri, o arbori, ne quali battendo il Sole le ribatte in terra, si chiamano ombre rette, & il lato diuiso C. D. lo chiamaremo ombra versa, se ben poco importano i nomi di quest'ombre, perche noi non vogliamo feruirci di quest'istrumento per misurar l'altezze con l'ombra del sole.




Come se misuri una linea diritta in un piano con il quadrante Gnomonico.

Cap. V.


Sia il piano B. E. d. l qual vogliamo trouare con il quadrante la sua lunghezza. Accomodisi il quadrante, di maniera che il lato diuiso B. C. sia vno con il piano, e linea

esempio siano 2. multipl. 60. ch'è il lato dello strumento via 50. br. che ti sei discostato dal punto F. fa 3000. e questo parti per il numero de' punti, che interseca la linda, cioè per 2. ne viene 1500. e tante braccia diremo, che sarà la lunghezza F.G. come ti dimostra la seguente figura.




Come si misuri una distanza in un piano da un luogo ad un'altro, lontani dal sito doue ci trouiamo.

Se fossero le due torri E.F. la cui distanza vorremo sapere senza accostarci ad alcuna di esse. Prima misurisi la distanza, ch'è dal punto H. doue ci trouiamo fino alla torre E. e similmente dal punto H. fino alla torre F. le quali distanze per esempio poniamo, che la torre E. sia distante da noi br. 40. e la torre F. sia distante br. 54. dipoi accomodisi lo strumento orizzontalmente, in tal modo, che il lato A.B. vada a dirittura della torre E. per esser più vicina, fatto questo senza muouer lo strumento, girisi la linda a dirittura della torre F. il che fatto notifi nel lato A.B. con il compasso 40. punti di quelli dello strumento, che rappresentano le 40. br. ch'è lontana la torre E. dalla nostra operatione, e sopra la linda, ouero linea visuale A.F. noterai 54. punti, che rappresentano le 54. br. dipoi tirisi vna linea dal termine de' 54. punti al termine de' 40. come la linea M. N. dipoi misurisi con le sette la sua lunghezza, e facciasene paragone cō i punti diuisi nello strumento, e quella quantità di punti, che intraprenderà d. linea M. N. tante braccia diremo, che sia la distanza delle due torri, cioè dalla torre E. allà torre F. perciò che la medesima proportionè, che h il triangolo H. E. F. l'ha ancora il piccol triangolo A. M. N. dello strumento.



Ma perche molte volte le distanze da doue ci trouiamo alle torri potrebbero esser maggiori, che non sono i punti dello strumento, come per effempio, se la distanza H.F. fusse 900. bracc. e la distanza H.E. fusse 700. bracc. allora bisogna notare nello strumento solo le parti proportionate a queste, come 90. sopra la linda, ouero linea visuale H.F. e sopra il lato A.B. dello strumento notare 70. punti, ma bisogna poi ricordarsi di accrescere vn'O. ouero altra figura proportionata al numero dell'apertura delle festi, cioè alla quantità de' punti, che ci rappresentass: la linea M.N. & haueremo il numero delle bracc. che faranno dalla torre E. alla torre F. come per effempio sia la torre F. distante da noi bracc. 900. e la torre E. bracc. 700. nota nel lato A.B. dello strumento 70. punti, e nella visuale H.F. sopra la linda nota 90. punti, se l'apertura poi delle festi da vn numero all'altro fusse 40. di quei punti dello strumento, v'accrescerai vn zero, che farà 400. percioche se 90. ci dà 900. e 70. ci dà 700. per la regola del tre, il d. 40. ci darà 400. come nel presente disegno si vede.



*Come si misuri l'altezza d'vna cosa eleuata sopra il piano del terreno
ad angolo retto col quadrante Gnomonico Cap. 2.*

Se noi fussimo in vn piano, e volessimo misurare l'altezza d'vna torre posta nel medesimo piano, della quale distintamente si vedesse il piede, come per effempio la torre E.G. ouero E.H. o pure E.K. e noi fussimo lontani dalla torre nel d. piano in punto A. Trouisi prima la distanza A.E. cioè da doue ci trouiamo fino al piè della torre, qual distanza poniamo che sia br. 240. Poggisi in tal modo il quadrante sopra il piano A.E. che il lato A.B. del nostro strumento, sia vno col piano A.E. & i lati suoi diuisi, e scompartiti, cioè B.C. e C.D. si voltino dirittissimamente ad essa torre da misurarsi. Posto dipoi l'occhio in terra al punto A. del quadrante (il quale è vno col punto A. del piano) alzisi, o abbassisi tanto la linda, che la veduta dell'occhio passando per ambe le mire, vadi al termine della propostaci altezza, e notisi in che parte batte la linda; il che farà, o nel punto C. comune all'vno, & all'altro lato, ò nel lato B.C. o nel lato C.D. che altroue non può battere.

Sia hora l'altezza da misurarsi E.K. e la linda batte nel lato B.C. in punto I. e B.I. sia 40. di quei punti, che tutto il lato del quadrante B.C. è 60. e si come 40. punti sono li $\frac{2}{3}$. di 60. così E.K. sarà li $\frac{2}{3}$. di A.E. talche se A.E. per modo
di


di esempio farà 240. br. la propostaci altezza E.K. farà li $\frac{2}{3}$. di 240. cioè 160. br.

Ouerò per regola del tre dicasi così, se A.B. ch'è 60. punti di piano, ci danno d'altezza B.I. ch'è 40. gl'istessi punti, lo spazio A.E. ch'è br. 240. quante braccia d'altezza ci daranno? moltiplichisi 240. via 40. farà 9600. il qual partasi per 60. ne verrà 160. per l'altezza E.K. come voleuamo.

Ma se la linea batterà nell'angolo C. del nostro strumento, secondo la dirittura della linea diagonale, e l'altezza da misurarsi sia E.H. è cosa manifesta che la d'altezza sia uguale al piano A.E. e se il d.piano farà 240. br. sarà ancora 240. braccia l'altezza E.H.

Ma se la linea batterà nel lato C.D. come per modo di dire battesse in punto F. e l'altezza da misurarsi fusse E.G. in tal caso egli è chiaro, che l'altezza E.G. sarà maggiore che la distanza che si prese dal piano A.E. e d'altezza corrisponderà in quella proportione al piano A.E. che tutto il lato A.D. corrisponderà alla distanza F.I. e se D.F. sarà 40. punti di quelli che il lato del quadrante è 60. perche 60. corrisponde al 40. per la metà più, similmente l'altezza E.G. farà per vna volta, e mezzo del piano A.E. Din anichache se A.E. farà 240. br. la propostaci altezza E.G. sarà 360. br. simili.

Auertendo, che sempre che la linea, o linea visuale passerà per il lato B.C. ch'è l'ombra retta, l'altezza da misurarsi sarà sempre minore che lo spazio del piano intapreso fra l'occhio, e il pic della torre. E se la linea passerà dirittamente sopra la linea dell'ombra media, l'altezza da misurarsi sarà uguale al piano intapreso. Ma se la linea passerà nel lato diuino C.D. ch'è l'ombra versa, allora diremo che l'altezza da misurarsi sarà maggiore del piano intapreso fra l'occhio, e la base di d'altezza, ch'è quanto ci occorreua dimostrare.



Come trouandosi in luogo alto, eleuato ad angolo retto sopra il piano dell'Orizzonte si possa con il quadrante misurare vna linea diritta posta in detto piano.

Cap. 3.

Seruaci per effempio, che ci trouassi no a vna finestra d'vn palazzo, ouero in cima della Torre E. B. e noi volessi no misurare dal piè della torre la linea E. A. ouero E. F. o pure E. K. posta nel piano.

Accomodisi il lato diuiso B. C. dell'ombra retta del nostro quadrante in cima della Torre, & il punto B. del quadrante, e la linea E. B. della torre sia vno col punto B. del quadrante, e la linea E. B. della torre sia vna con il lato A. B. del quadrante, dunanierache A. B. e B. E. diuentando vna linea sola, la qual sia A. E. cacciati a piombo sopra il piano E. H. F. K. per la qual cosa il lato B. C. del quadrante si opporrà parallelo al d. piano E. H.

Posto dipoi l'occhio al punto A. alzisi, o abbassisi tanto la linda, che la veduta passando per il piano d'ambedue le mire artui alla fine della propostaci linea.


Fatto questo, notisi il punto, doue batte la linda, la qual'è forza che batte, o nel punto C. o nel lato B. C. o nel lato C. D. che in altri lati non può battere, e quando batterà nel punto C. dicessi che la propostaci linea da misurarsi E. F. sarà vguale all'altezza della Torre E. B. più l'altezza B. A. del nostro strumento, e per saper l'altezza della Torre, si potrà mandar vn filo da cima a terra, con vn piombino, e misurar poi detto filo, il qual se sarà braccia 120. aggiungauisi l'altezza del quadrante, che è vn braccio, farà 120. braccia, e tanto sarà ancora la linea E. F.

Ma battendo la linda nel lato B. C. dell'ombra retta, come sopra per auuentura in punto G. e la linea da misurarsi fusse E. H. e l'intersecata B. G. sia per modo di dire 40. di quell'istesse parti, che tutto B. C. vguale all'A. B. è 60. e si come il 60. corrisponde al 40. per la metà più, così ancora l'altezza A. E. sarà per vna volta, e mezzo la linea E. H.

E se l'altezza A. E. sarà braccia 120. la linea E. H. del piano sarà il terzo meno, cioè braccia 80. come per regola delle quattro cose proportionali possiamo vedere, dicendo

Se l'altezza di A. B. che è punti 60. ci dà 40. punti di piano; l'altezza A. E. che è braccia 120. quanto ci darà di piano? multiplichisi 120. via 40. farà 4800. il qual partito per 60. ne verrà 80. per la lunghezza della linea E. H.

Ma se la linda batterà nel lato C. D. dell'ombra versa, come per effempio dicasi che batte in punto I. e che la linea da misurarsi nel piano sia E. K. e l'intersecata D. I. sia per modo di dire 40. punti, di quelli che tutto il lato C. D. vguale all'A. D. è 60. dicessi che A. D. sarà medefimamente in proportion e si squilatera con l'intersecatione D. I. per il che, se l'altezza A. E. sarà 120. braccia, il piano E. K. sarà per vna volta, e mezzo la detta altezza, cioè braccia 180. e se per regola delle quattro cose proportionali ce ne vorremo certificare, dicasi così; Se l'altezza dell'intersecatione D. I. del nostro strumento che è punti 40. ci dà 60. punti simili di piano, che è il lato A. D. l'altezza A. E. che è 120. bracc. quante bracc. di piano ci darà? multiplichisi 120. via 60. farà 7200. il qual si parta per 40. ce ne verrà 180. per la quantità della linea E. K. come voleuamo.




Come si misuri una lunghezza d'una pendice d'un monte con il quadrante. Cap. 4.

IL medesimo modo, che si offeruò nel misurare vna lunghezza in vn piano, si potrà medesimamente offeruare nel misurare vn pendio d'un monte. Sia adunque la lunghezza della propostaci pendice H.I. e ritrouandoci noi al piè della pendice in punto H. pongasi il lato B.C. del quadrante per lo lungo a diritto di essa H. I. ponendol'angolo B. sopra il termine H. e voltisi il lato C.D. a dirittura della cima I. pongasi dipoi l'occhio all'angolo A. & alzisi, o abbassisi tanto la linda, che per lo mire si veda la cima I.

Dipoi notisi doue batte la linda nel lato C. D. la qual per essempio diciamo, che batte in punto G. per il che si dice che in quella proportion, che corrisponderà il lato A.D. all'intersecata D. G. corrisponderà ancora la pendice H. I. al lato A.B.

Ma per maggiore intelligenza, seruaci che D.G. sia 2. minuti, di quelli che il lato C. D. del quadrante è 300. e si come 300. corrisponde ad esso 2. per 150. volte, la propostaci pendice H.I. sarà medesimamente per 150. volte la A. B. di mani erache il lato del quadrante essendo vn braccio la detta pendice H. I. farà 150. braccia simili, e se il lato del quadrante fusse due braccia, la detta pendice sarebbe 300. braccia.



Come stando noi a piè d'un monte. si possa col quadrante misurare l'altezza d'una Torre in cima di detto monte . Cap. 3.

Sia la pendice del propositoci monte A.E. & in cima del detto monte sia la torre E.F. della quale vogliamo sapere la sua altezza.


Ritrouandoci adunque a piè del monte in punto A. bi'ogna prima trouare la lunghezza del pendio del monte A.E. la qual trouarai in quel modo, che s'è detto nella passata propositione, qual pendio poniamo hauer trouato, che sia br. 150.

Fatto questo accomodisi il quadrante con l'angolo A. sopra il punto A. del pendio del monte, doue ci trouiamo, voltando il lato B.C. verso la torre, & il lato A.B. sia vno con il pendio A.E. alzisi poi, o abbassisi la linda tanto, che per le mire si veda la cima F. della torre. Dipoi non mouendo punto il quadrante sospendasi vn filo col piombo, che intersechi la linda in qual parte si voglia, la quale intersecazione diciamo, che sia in punto G. ma il lato A.B. del quadrante bi'ogna che l'intersechi precisamente nel mezzo, come per esempio in punto H.

Et il filo intrapreso dal piano della vedura della linda, & il lato A.B. qual farà G.H. misurisi distendendolo sopra il lato C.D. il qual filo trouiamo che sia più 12. e la parte A H. del quadrante farà punti 30. simili di quelli che tut o il lato è 60.

Dicesi, che in quella proportion, che corrisponderà l'interseca parte A.H. all'intrapresa parte del filo G.H. corrisponderà ancora il pendio del monte A.E. all'altezza

altezza della torre E.F. come per le 4. cose proportionali potremo trouare, dicēdo
 Se A.H. ch'è punti 30. di pendio ci danno l'altezza del filo G.H. ch'è pūti 12.
 Ie br. 150. di pendio, quante braccia d'altezza ci daranno? multiplichisi 12. via
 150. farà 1800. il qual si parta per 30. canne ne verrà 80. e tante braccia diremo
 che sia alta ta dettā torre.




Sappi, che a voler misurare vn pendio d'vn monte, tanto ritrouandoci noi in cima, cōme da piè del monte, si offerua il medesim'ordine, come se si hauesse a misurare vna lunghezza in vn piano, perciōche sempre la linda, & il raggio visuale conuien che passi per il lato D.C. del quadrante, la quale per altre ombre non può passare in simili operazioni.

Come trouandoci noi sopra vn monte, ouero torre. si possa misurare vna torre minore posta nel piano. Cap. 6.

Sia il monte A.E. dalla cima del quale, doue ci trouiamo in punto A. vogliamo misurare la torre E.G. posta nel piano. Prima misurisi il pendio A.E. cioè quanto

quanto sia dalla cima del monte, doue ci trouiamo, per fino al piè della torre da misurarsi, nel modo, come si haueſſe a misurare vna linea a piano; il qual pendio poniamo, che ſia braccia 360. dipoi voltando lo ſtrumento pongaſi l'angolo A. del quadrante ſopra il punto A. della cima del monte, doue s'è fatta la prima operatione, di maniera che il lato A.B. ſia vno col pendio A.E. voltando il lato B.C. quaſi oppoſto all'altezza della torre E.G. & alzati, o abaſſati tanto la linda, che la veduta paſſando per le mire arriui alla cima G. della torre da miſurarſi. Fatto queſto, ſenza muouer lo ſtrumento, nè la linda, la ciſi cadere vn filo col piombino, il quale interſechi la linda in qual parte ſi voglia, purchè interſechi il lato A.B. del quadrante preciſamente nel mezzo, come farebbe in punto H. e la parte del filo intrapreſa dal piano del raggio viſuale della linda, e dal lato A.B. del quadrante ſia per eſſempio H.I. Dicciſi, che quella proportionè, che haueà la parte A.H. del quadrante, con l'altezza del filo H.I. intrapreſo dalla linda, e dal lato A.B. haueà ancora la medeſima proportionè il pendio A.E. con la minor altezza propoſta E.G. miſurati adunque l'intrapreſo filo H.I. il qual per modo di dire ſia punti 10. & il lato A.H. è punti 20. di quelli, che tutto il lato del quadrante è 60. laonde per regola delle 4. coſe proportionali, dicati coſi, ſe 30. punti di pendio mi danno d'altezza punti 10. le braccia 360. di pendio quante braccia d'altezza mi daranno? multiplichiſi 360. D via 10. farà 3600. qual partiſi per 30. ne verra 120. e tante braccia concluderemo, che ſia alta la torre E.G.




Puon col detto quadrante Geometrico misurare le profondità d'elle valli, de' pozzi, e molt'altre cose, delle quali per breuità lasceremo il figu arne le dimostrazioni, assicurandoci, che chiunque hauerà ben compreso il modo d'adoperare detto quadrante, secondo le propositioni, e dimostrazioni sin qui fatte, gli sarà cosa facilissima à ritrouare ancora il modo da misurare ogn'altra cosa. E tutte quelle misure, che si posson trouare col quadrante Geometrico sopradetto, si possno ancora ritrouare con l'Astrolabio, con l'Olometro, col quadrante fatto nella quarta parte d'un cerchio, e con molt'altri instrumenti, e nuoue inuentioni; ma il quadrante fatto nella quarta parte d'un cerchio, per essere instrumento facile a fabbricarsi, più che non è l'Astrolabio, e l'Olometro, noi descriveremo il modo di fabbricarlo, secondo, che l'ha descritto Cosimo Bartoli Fiorentino, Eccellente Mattematico.

Modo di fabbricare il Quadrante dentro alla quarta parte d'un Cerchio.

Pigli si vna piastra d'Otone, o di Rame, ouero si pigli vna tavola di legno pulita, soda, & atta a non si piegare, o torcere, nella quale disegnisi la quarta parte d'un cerchio con due linee, quali partendosi dal centro A. con angolo retto vadino a terminare nella circonferenza di d. cerchio della quale intraprendino la quarta parte, come dimostra il disegno A.B.C.D. diuidasi poi questa quarta parte di circonferenza in due parti vguale con vna linea retta, la qual partendosi dal centro A. vadi apunto a terminare nel mezzo dell'arco in punto C. disegnisi poi dentro a questa quarta parte il maggior quadrangolo rettangolo, che possibil sia, come nel disegno si vede il quadrangolo A.B.C.D. diuiso per il mezzo dal diametro A.C. Tirisi dipoi due altre linee sotto le linee B.C. e C.D. che siano parallele alle già tirate, dalla parte di dentro verso il centro, le quali infra tutte tre lascino due interualli, l'vno de' quali, cioè quello, ch'è vicino al centro A. sia il doppio più largo che l'altro. Dipoi diuidasi ciascun de' lati B.C. e C.D. in 4. parti vguale infra loro. Fatto questo, pongasi la testa d'un regolo sopra il centro A. in tal modo, che applicando l'altra testa del regolo sopra qualsiuoglia della già fatte diuisioni, si possa tirar lineette infra detti interualli dalla prima alla terza linea, le quali lineette risguardino tutte verso il centro A. dipoi ciascuna di esse 4. e 4. parti si ridiuidano nuouamente in altre tre parti infra loro vguale, tirandole lineette, come dell'altre s'è detto, che risguardino il centro A. ma che non passino l'interuallo minore, di maniera che la parte del lato B.C. sarà diuisa in 12. & in 12. parti quella del lato C.D. descriuasi poi dentro degli spazij de' due interualli maggiori i lor numeri, cominciando da' punti B. e D. andando verso il punto C. distribuendoli con quest'ordine 3. 6. 9. 12. talmente che il 12. dell'vno, e dell'altro interuallo termini con il diametro A.C. Puossi ancora ciascuna delle 12. parti di qualsiuoglia lato ridiuidar di nuouo in 5. parti vguale, purché ce lo comporti la grandezza dello strumento, il quale non vorrebbe esser minore di mezzo braccio per ciascun lato di d. quadrangolo, tanto che ciascun di detti due lati fusse diuiso in 60. parti, come si fece nel quadrante Gnomonico. Faciensi poi due mire, come s'usa, e si commettino per testa, l'vna presso al centro A. e l'altra presso al punto D. e che siano forate a dirittura, e tali fori, doue conuien che passi il razzo visuale, debbono esser vno col piano A.D. Attacchisi dipoi vn filo di seta al centro A. con vn piombino da piede, che esca quanto si voglia della circonferenza, come vedi nel disegno.


Come



Como si misuri una linea a piano con il detto quadrante.


Sia la propostaci linea G.H. rizzisi da vna delle due teste di d. linea vn'asta a piombo d'vna determinata, & a noi nota altezza, o misura; hor sia che la d. asta si regga sopra la testa G. di d. linea, e sia la d. asta G.A. sospendasi poi il quadrante sopra la d. asta, in questo modo cioè, che l'angolo A. del quadrante, doue sta annesso il filo, sia vno con la cima A. ouero altezza di d. asta, alzisi poi, o abbas- sisi il quadrante (lasciando andare il filo col piombino libero) fino a tanto, che ponendo l'occhio all'angolo A. del quadrante, il razzo visuale passando per am- bedue le mire M.N. arriui all'altro termine della propostaci linea, cioè al punto H. fatto questo considerisi doue batte il filo nel lato B.C. atteso che il più delle volte batterà in esso: hor poniamo che batte nel punto I. dicesi che in quella pro- positione, che corrisponderà il lato A.B. del quadrante alla parte B.C. parte B.I. corrisponderà ancora la linea G.H. all'altezza dell'asta, talche se B.I. farà 2. di quelle parti, che tutto il lato del quadrante è 12. perche 12. corrisponde per 6. tanti al 2. perciò la linea G.H. farà ancor essa per 6. volte la lunghezza di d. asta; talche se l'asta farà 3. br. la propostaci linea G.H. farà br. 18. e se l'asta fusse al a br. 4. la d. linea G.H. farebbe br. 24. Ma se i lati B.C. e C.D. fussero diuisi in 60. e 60. parti, e che la parte B.I. intersecata dal filo fusse 25. di quelle parti che tutto B.C. è 60. perche 60. corrisponde per 30. tanti al 2. perciò la lunghezza dell'asta: e se i lati del d. quadrante fussero diuisi in 120. parti, operisi nel modo sopradetto

&c. dicendo, che in quante più parti ha giustamente diviso il d. strumento, tanto più giuste si ritrovaranno le lunghezze, che si desiderano misurare, e così in ogni altra operatione.



Come si misurano l'altetze con il quadrante del cerchio

Sia la Torre G. F. eleuata sopra il piano terreo G. H. ò vero G. L. ò vero G. I. della qual si possa andare alla base. Volendo noi inuestigar la sua altezza con il quadrante del cerchio facciasì così: e prima con l'ombra del sole. Poniamo, che l'ombra retta della torre sia G. I. spondasi il quadrante a vn'asta in tal luogo in d. piano presso al punto I. che partendosi il razzo solare dalla cima della torre passi per due mire del quadrante, e vadi a ferire in detto piano in punto l. ch'è l'estremità dell'ombra, lasciando andare il filo col piombo libero, doue ci vuole, auuertendo di alzare, o abbassare, cioè soggiare tanto il quadrante che il raggio visuale, ouero solare passando per le due mire, figuri la retta F. I. fatto questo notifi doue batte il filo col piombo, il qual di necessità caderà o nel lato B. C. dell'ombra retta, o nel lato C. D. dell'ombra versa nell'angolo C. punto mezzano infra l'vna, e l'altra ombra, secondo che la base della torre ci sarà più presso, o più lontana. Dicasi che il filo batta nel lato C. D. dell'ombra versa al punto E. e che la parte D. E. intrapresa dal filo sia 30. di quelle parti vguali, che tutta la C. D. è 60. misurisi dipoi l'ombra G. I. cioè il piano, del punto l. per fino al punto G. dou'è la base della torre, la qual lunghezza poniamo, che sia bracc. 300. e si come tutto il lato C. D. ch'è 60. corrisponde per due volte al 30. che sono le parti intraprese, così lo spatio terreo G. I. ch'è 300. corrisponderà per due volte la propostaci altezza F. G. multiplichisi a lunghe 300. via 30. fa 9000. e questo paratali per 60. cioè per tutto il lato F. A. D. ne verrà 150. bracc. per tutta l'altezza della torre. E volendo sapere quanto sia il raggio solare l. F. multipl. 300 in se. fa 90000. dipoi multipl. 150 in se, fa 22500. e questo agguagliasi con 90000. sarà in tutto 112500. e di questo predasi la radice quadra et tanto sarà la diagonale l. F.



Ma se il filo col piombobatteſſe in punto C. che è il puſto mezzano in ſe 2. ombre, come ſi dimoſtra per il quadratè figurato nella poſitione della diagonale L. F. dicſi, che tanto farebbe lo ſpatio G. L. quanto l'altezza G. F. della Torre.

Ma ſe il filo batteſſe nel lato B. C. dell'ombra retta, all'hora concluderemete ſi direbbe, che fuſſe maggior l'altezza da miſurarſi, che l'ombra, ò vero ſpatio terreo intrapreſo dalla Torre à doue ci trouaſſimo; come per eſempio, poniamo che l'ombra, ò vero ſpatio terreo ſia G. N. e ſia brac. 75. accomodiſi il quadratè in tal modo che il raggio ſolare, ò vero viſuale paſſando per le mire dell'inſtrumento cauſi la retta N. F. e ſubito ſi noti in che parte dell'ombra retta batte il perpendicolo; hor poniamo che il filo intraprenda 30. punti di tutto il B. C. dell'ombra retta, e perche il 30. ha proportion ſubdupla col 60. cioè per la met. al 60. ſara ancora l'ombra G. N. per la metà dell'altezza G. F. multiſichiaſi adunque 75. braccia d'ombra retta via 60. fa 4500. il qual ſa taſi per l'intrapreſe parti del lato B. C. cioè per 1. E. che ſu 30. ce ne verrà 150. apunto, e tante braccia diremo che ſia alta la Torre.

Come ſi miſurino l'altezze con il quadrante del Cerchio alle quali non poſſiamo accoſtarci.

Sia la Torre G. F. della quale vogliamo ſaper l'altezza. Pigliſi il quadrante, e ſoſpendaſi a qualche coſa ſtabile, come farebbe a dire vn'altra, alta poco men di tre braccia, per poter n'egli aruiar con l'occlio all'inſtrumento, e tr'guardi di eſſo; dipoi accomodiſi la diſta con l'inſtrumento ſoſpeſo in cima ſtalmente che ſi poſſa girare da baſſo ad alto nel più perfetto piano che poſſibil ſia in ſe la baſe della Torre, e doue ci trouiamo.


Fatto queſto voltiſi il quadrante in tal modo, che paſſando il raggio viſuale per ambedue le mire arriui al punto F. che è la cima della torre da miſurarſi, e notiſi doue batte il filo col piombo, che il più delle volte caderà ſopra il lato dell'ombra verſa.

Hor poniam q in queſta prima operatione d'eſſer nel piano della torre in punto H. e la veduta paſſando per le mire ſiguri la retta J. F. & il perpendicolo batte ſopra il punto C. dell'ombra media, la proportionè adunque del lato A. D. ſarà proportionè ad vguaglià al lato D. C. e perche meglio ſ'intenda, noi diciamo che ſe il perpendicolo intraprendeſſe 4. punti del lato dell'ombra verſa, de' quali tutto il lato A. D. è 60. biſognarebbe partire 60. per 4. ce ne verrebbe 15. e queſto farebbe il primo numero quotiente, il qual biſognarebbe ſaluare per la prima operatione; ma perche il filo ha intrapreſo 60. punti, perciò partaſi 60. per 60. ne vien vno, e queſt vno primo quotiente conuien ſaluare, e notare il punto I. del raggio quotiente.

Dipoi accoſtandoci, ò diſcoſtandoci rettamente dalla torre, e dal primo operare, di nouo facciaſi la ſeconda operatione.

Hor poniamo d'eſſerci ritirati rettamente indietro, e fermato l'aſta dell'inſtrumento in punto K. e la retta viſuale paſſando per le mire ſia K. L. & il perpendicolo batte nel lato B. C. dell'ombra verſa in punto E. e che il filo intraprenda parti 37. $\frac{1}{2}$. partaſi 60. per 37. $\frac{1}{2}$. ne vien 1. $\frac{1}{2}$. che è il ſecondo num. quotiente, e di queſto cauſi 1. qual ſi il primo quotiente che ſaluatiſti, reſterà $\frac{1}{2}$. dipoi miſuriſi lo ſpatio terreo da vna veduta all'altra, cioè dal punto I. al punto L. e diciaſi che ſia 30. bracc. partaſi il d. 30. per $\frac{1}{2}$. che è la differenza de' due quotienti, ne verrà 30. e tante braccia diremo che ſia l'altezza della Torre G. F.

Poteuamo




Potemo ancora servirci della misura del piano terreno intrapreso dalla prima e seconda positione del nostro instrumento, come per effeimio ; Diciasi che la prima positione dell'asta nella nostra prima operatione si eriggeffe sopra il piano G.L. in punto H. e nella seconda operatione si ponesse in punto K. misurisi dal punto H. al punto K. troueremo che vi sarà 24. braccia. le quali conuien partire per la differenza de' due quocianti, cioè per $\frac{7}{2}$. partasi adunque 24. per $\frac{7}{2}$. ne verrà 40. & a questo conuien aggiungere l'altezza dell'asta, che regge l'instrumento, la quale in questo nostro disegno ci rappresenta ala braccia 10. se m'ho, che ne dimostra l'altezza G. N. E se bene il detto quadrante apprisce sospeso sopra più alto dell'altezza G. N. noi l'habbiamo fatto per poter meglio di egnar il detto instrumento, e dividerlo proportionatamente, acciò che il piombo, e le lettere di dimostrationi non si occupassero insieme, per maggior intelligenza del lettore, e per dimostrare ancora effectiuamente col compasso, che tali altezze si trouano con il detto quadrante nel sopra-detto modo. Ma se hauessimo disegnato il quadrante alto 2. ouero 3. braccia, come si richiede (di quelle che tutta la torre è alta braccia 50.) noi non hauereimo potuto dimostrare in figura le lettere diuisioni, e misure dell'instrumento ; Laonde per meglio dimostrare tal modo d'operare è veramente buono, ne daremo vn'effeimio più chiaro con la seguente figura.

Poniamo hora che l'altezza da misurarsi sia la Torre G. F. la quale habbiamo diuisa col compasso in 8. parti uguali ; dipoi diciamo che la prima positione dell'asta, che regge l'instrumento si sia fatta nel piano G.L. in puto H. e che il raggio visuale battea nel punto I. & il filo col piombo caschi nel punto C. ch'è il punto

mezzano

mezzano infra l'ombre. Poniamo ancora, che i lati A. B. e B. C. del nostro quadrante siano diuisi in 6. parti vguali con somma diligenza, per poter meglio dimostrare gli effetti di tal instrumento in vn picciol carta, come facciamo; hor perche il filo in questa prima positione intraprende 6. punti, percio noi ha-
ueremo 1. per il primo numero quoziente, per esser proportione d'vqualità.


Poniamo hora d'efferei ritirati in dietro, e fatta la seconda positione dell'asta in punto K. e la retta visuale sia F. L. & il filo col piombo intraprenda 4. punti di B. C. ch'è l'ombra versa, di quelle che tutto il lato A. D. vguale al lato B. C. è 6. partasi 6. per il detto 4. ne vien $1\frac{2}{3}$. e questo sarà il secondo numero quoziente, del quale bisogna cauare il primo; cioè 1. resterà $\frac{2}{3}$. per la differenza de' due quozienti, il qual sarà nostro partitore. Fatto questo misurisi da vna veduta all'altra, cioè dal punto I. al punto L. ch'è lo spatio terreo, che si troua infra i due raggi visuali, doue manifestamente si vede, che vi è 4. brac. partasi detto spatio per $\frac{2}{3}$. che restò per nostro partitore, ne verrà 8. e tanto diremo, che sia l'altezza G. H. al qual 8. non bisogna aggiungere l'altezza dell'asta dell'instrumento, percio che ci siamo seruiti dello spatio intrapreso dai due raggi visuali. Ma se noi vorremo seruirci dello spatio, che s'intraprende da vna position dell'asta all'altra, misurisi dal punto H. fino al punto K. trouaremo che vi sarà 3. brac. il qual partasi per $\frac{2}{3}$. comun partitore, ce ne verrà 6. & a questo bisogna aggiungere l'altezza dell'asta del nostro instrumento; la qual chiaramente si vede, ch'è 2. brac. faranno in tutto br. 8. per l'altezza della torre G. F. ancorche alcuni vogliano, che s'aggiunga non l'altezza dell'asta, ma l'altezza della perpendicolare, ch'è dall'occhio fin a terra nelle operationi, le quali altezze mai saranno vguali, percio che nella seconda positione bisogna girare da basso ad alto, ouero da alto a basso l'instrumento, e percio la perpendicolare, che sarà dall'occhio a terra nella seconda operatione non sarà vguale alla prima. Appresso di questo dicono ancora, che si misuri lo spatio terreo, il qual viene intrapreso dalla perpendicolare dell'occhio a terra della prima operatione, alla perpendicolare dell'occhio a terra della seconda; e noi diciamo che bisogna seruirsi dello spatio, che vi è intrapreso dalla prima, e seconda positione dell'asta, e così verrà piu giusta la nostra operatione, come nel presete disegno fatto per modo d'esempio si può chiaramente comprendere.



Come si possa leuar la pianta d'una Città, e d'ogn' altro luogo.

Facciassi fare due righe d'ottone, ò di rame, ò ver di legno bene stagionato le quali sieno ben diritte, e lunghe poco più d'un braccio, come dimostra la seguente figura A.B.C. e le dette righe sieno congiunte insieme nel centro B. con tal'arte che possino liberamente aprirsi, e chiudersi come vn compasso.

Dipoi fabbrichisi vn'altro instrumento simile, ma piccolo, lungo poco più d'un palmo, che similmente si possa aprire, e ferrare. I atti che faranno i detti instrumenti, se vorrai leuar la pianta d'una Città comincia da vn'angolo di essa, ò di fuori, ò di dentro delle mura doue sia minor impedimento al poter girare intorno, e piglia l'instrumento più grande, & accostalo all'angolo con tal'arte che le righe tocchino ambidue i muri di esso angolo, dipoi metti il piccolo instrumento sopra il primo intal modo, che stia aperto, e formi il medesimo angolo che forma il grande, e doppo metti quel piccolo instrumento sopra la carta, doue vuoi descriuere la pianta, ma con tal diligenza, che non apra, ne ferri più di quel che faceua quando posaua sopra l'instrumento grande, e così descriuerai quell'angolo sopra la carta; e se vuoi saper quanto bisogna tirar lunga la prima linea, ti conuenrà misurar quante braccia è la lunghezza di detta cortina, come per essemplio io fuisse braccia 100. e così formerai 100. braccia sopra la carta con quella scala che haueuati fatta sopra l'instrumento piccolo, e con il compasso darai 100. braccia di lunghezza a detta linea, e così farai al secondo angolo, & a tutti gl'altri, che trouarai intorno intorno, figurando Porte, Baluardi, Cavalieri, Torrioni, & altre cose che intorno a dette muraglie fussero, fin tanto che girando intorno alla Città, tu peruenghi al medesimo angolo doue cominciasti a operare.




Se le sopradette cose con diligenza offeruerai, non solamente con la detta squadra Zotta metterai in disegno la pianta d'vna Città, ma di qualsiuoglia sito, o paese, senza offeruatione di bussola, o di venti. E perche nostra intentione non è di trattar dell' eccellenza della Geografia, e Corografia, perciò lasceremo di descriuere il modo da fabbricare la bussola, e come s'adoperi per mettere in disegno le Prouincie, o Regni, con le sue Città, Terre, Castella, Fiumi, Laghi, Liti, Porti, & altri luoghi notabili da mettere in Carta, o in Tavola piana, se bene il Mondo è di forma sferica. Posciache da Sebastiano Munstero nella Cosinografia vniuersale, da Niccolò Tartaglia, da Cosimo Bartoli, e da Abel Fullone, e da molti altri Scrittori nelle loro opere è stato dimostrato leggiadramente non solo il modo di fabbricar la bussola, ma ancora il modo di adoperarla, e mettere in disegno le Prouincie, benche diuersamente; Si che a te Lettore lasceremo la cura di proceder più oltre, se di tal cose vuoi hauer notizia.

Fine del settimo, & vltimo Libro del Teatro Mathematico.









1-2.

$$\begin{array}{r} 75 \\ 15 \\ 10 \\ \hline 600 \\ 63 \\ 350 \\ \hline 280 \end{array}$$

01
16
00
00
1.0

namque rex
p. m. 10. 11.

Louis Landry